

丹溪摘玄二



丹溪摘玄卷之三

大風門

癰 痘 癫 風 汗 班

丹溪云癥風即癲病也斯病是受天地間殺物之氣謂之癥風以其酷烈暴悍可畏耳自由嗜慾無度勞傷氣血或大怒憂愁驚驚恐抑鬱不伸或肺虛膚空醉卧當風或因大熱解脫汗出如水或新浴後近風或露卧湿地或因被傷引入風毒或卒風暴雨寒水濕瘴侵入肌膚當時感受以致大風之患病因流注經絡傳入肺腑發於四肢内外薰蒸而成疮癧此病不過乎陽明一經者其疣瘡與瘡氣先受之則上肺多益先受之則



下牀多氣血俱受則上下牀俱多大陽明經胃與大腸也無物  
不受風之入也若不絕味遠也皆不免再發不可救矣仍用三  
棱針刺委中出血不能忌口與房事者不治病受在上氣先受  
之宜醉仙散取涎血於齒縫中病受在下血先受之宜通天再造  
散取涎血陳物并虫於谷道中大抵受病有三種一種風水二  
種傳變三種日不調養

有三不治症

百皮肉死 下疼二日骨節脫落言聲啞三者年深更  
血瘀已死故不可治也

有五死証

一曰皮死肌肉不活二曰肉死割切不痛三曰血死潰爛成膿及瘡  
四曰筋死手足脫落五曰骨死鼻梁崩塌斷唇白眼氣短聲哑  
有四可治証

百眉毛脫落可治一曰血死潰爛成瘡可治三曰脚板穿可治四  
曰鼻梁崩塌可治已上雖見危篤亦有可治之理

### 各經受証

肺經受証先落眉毛肝經受証回起紫泡腎經受証脚底先穿  
脾經受証過身如癬坐瘡心經受証先損其目

### 有忌飲食法

撮忌濃鹽醬醋房事胡椒生姜煨燒炙大發風辛辣熟

物反茄子蕎麥胡桃牛馬驥駢猪羊諸魚鴛鴦癰疚若  
喫醋或煎聞之則風痛人食鴛鴦食之患大風駢肉動  
風其脂尤甚犯黍稷食猪肉令人大風蕎麥久食動風氣

和猪肉食之脫人肩髮酒醉當風以扇搧之發紫癩食

蝦發風動氣生瘡癩豆腐多食動風氣食宣草動風氣

猪肉和姜食之發大風羊與豚同食患癲癇以此覘之常

人尚有禁忌何況有風疾人手宜淡粥淡菜芋頭棗子

姜藕淡醋鴨肉鴨彈鯽魚白魚惟宜烏梢蛇淡酒煮

食之以助藥力

治身有麻木紫點於晴暖無風時以三棱針於委中刺出

惡血用益於刺處重擦用新水入益洗淘去惡血壯者多刺  
小者少刺四十五日內湏出血三次再於損竹二穴絲竹空二穴  
迎香二穴地倉二穴人中一穴再用氣針於十手指縫十腳指  
縫內針之使毒氣通泄仍在委中出益

### 醉仙散

胡麻仁 牛蒡子 蔓荆子 狗杞子各五錢爲粗末同炒紫色  
白蒺藜 苦參 瓢萎根 防風各五錢並生用

石八味末之極細每兩半入輕粉二錢拌勻大人一錢空心日  
午臨卧各一服用茶清下服後五七日間先於齒縫內出惡  
臭涎水渾身覺痛昏悶如醉利下惡臭屎爲糜兒

量虛實加減與之重者先以再造散下之候補養平復後與此藥

通大再造散

皂角刺一兩炒經年者佳 大黃一兩泡 白牽牛六錢半生紗 鐘金草兩 風油一錢半即芥子

朴硝少許

右末之每服五錢日未出時面東無灰酒調下以淨桶後剝下蟲頭小虫病輕者止利如魚腸尖穢蟲口爲陳虫亦爲新虫三五日再進一服直候無虫則絕根也醉仙丹造散看間服之

清胃湯治發汗

升麻 白芷 防風 白芍 乾葛 牛蒡

當歸

川芎

羌活

麻黃

紫草

木賊

駕鷄藥

右剉水二鐘煎如汗不出用葱頭茶助之

蒸法治出汗

川駕鷄頭

經海蛤如某子大者川山甲各等分

右末之每用五錢葱白汁搜成餅子經約一寸半貼在患處  
脚手心絳縛定用麻黃紫蘇紫背浮萍牛蒡煎湯將  
貼藥手足於湯內浸之待汗滿身麻木出時拭乾半月再  
用

吐法治方在前麻木条下

透經解毒湯治筋挛難伸縮

川山甲 紅花 蘇木 羌活 荆芥 防風

蟬退 天麻

當歸 白芷各一錢  
連翹 牛蒡各一錢

川芎五分

右剉水酒各一鍾煎

分消散治大利

黑牽牛 白牽牛

大黃

芒硝

羌活 蘭桂柳

大腹子

白芷 番梨

沙苑腎形

墨炭 番梨各五錢

右末之每三錢至五錢砂糖水調服四更服之

清神湯

大黃 芒硝

甘草各三錢  
山梔 薄荷各一錢  
黃芩各二錢

連翹

升半 耳菊

黃連

黃柏 竹葉各一錢

右㕮咀每約一兩五錢水二碗煎茶鍾內八分入密少許同服

神芳丸治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫及有瘡癧咽喉不利  
大小便閉澁一切風熱

大黃 黃芩 滑石各四錢 生牽牛頭末二兩 黃連

薄荷 川芎各五錢

右末之滴水丸每三十九熱水下

殺虫金粉散

輕粉大分鬱金 管仲 川芎甲殼各半錢 皂角刺

麻黃各一錢

右末之每二三錢酒壺鍾入蜜一匙五更服之服後通身麻  
五七日昏悶口中牙縫出血已消去勿服如不昏悶再加一

錢服之服後昏悶再勿服

妙應丸治久患風疾腹中有虫

大風子 檳榔

大黃各一兩  
另取頭末分

黑半另取頭末兩木香 錫灰

醋炒

史均子肉另研

雷丸

蕪荑各二兩

右末之數一帶鬚葱白綢九梧子大每服四錢隔宿少飲食  
五更溫水吞湯或葱白湯下已生冷物三日如人拾歲上  
咸半服之

淨肥散治薰藥

雄黃 硫黃 輕粉

天仙子 甘草節 杏仁子

薰薑 蛇麻各一兩



古揉繩薪艾壹丙用草紙搘艾將前藥末俱入紙內筒捲尺  
許長筒用新瓦貳片合而熏之黃水逐乾麻木遂退未愈再  
依法熏之熏時男子用瓦襯包護外腎婦人包護胸乳陰陽亦  
用遮護身軀以重衣被蓋之勿令當風透咽露喉

### 搽癩風瘡

牛肉一兩即大風子黃蜂巢末七錢白芷 牙皂 羊蹄根 黑獨養各三錢  
雄黃 輕粉 蟬殼 皮硝 枯礬 寒水石各一錢

右末之膏猪脂油調塗

冬方 季子肉四兩即大風子芝蔴升黑豆半升即大風子炒熟蕓肉 羊屎 馬屎各三合

鹽半斤 右春爛和勻煎成油

如搽大風瘡用前油入輕粉雄黃生肌散白礬如簽背瘡將前  
油一碗入黃蠅貳兩銅青一碗半溶成膏一塊故攤膏藥先用  
松樹根計圍一圈在紙上如背瘡樣大小圈內用此膏攤之貼  
如瘻瘍爛瘍將前黃蠅膏次桐油溶化搽之

如疥以之蘇油溶前黃蠅膏再入輕粉硫黃枯礬搽之  
桃柳荆槐枸杞子葫蘆蔓及茵陳葱椒叟少飛盐似蟬  
殼金銀花用繩透骨棟根并皂角刺風薰洗即除根

### 洗浴

又方 苦參 荆芥 陀麻子 防風

獨活 膜浮萍

澤蘭根 蒼耳葉 純霜何葉

經霜桑葉

鹽一斤

右用水九斗旋煎旋添煎乾參半斗去渣入頭醋一大升旋放湯內熏洗湯冷又添又洗勿令有風走泄湯氣務要汗透百一次百二次看天氣溫和不用火圍以物遮風勿泄其氣寒冷用烈火燒煖四圍重密遮風勿浮泄氣大令汗透先須用有力一人或二人將絞擦藥於遍身上下前後俱要藥到再洗再擦再洗再擦汗透為度若倦姑往

擦藥

肥皂半斤皂角肉四兩白芷另研羌活羊蹄根釐射香一錢

喬肉五錢防風兩另土硝二兩半

和用鹽搜和搘碎成團鹽約一兩半

瘡爛則洗之

地骨皮 荊芥 苦參 細辛等分蟬殼 加倍

右剉每二兩半河水煎熏洗遍身出血為妙如浴必要大浴缸  
放湯寬浸洗良久大効如痒如盪一兩和鹽洗之

如聖散治淋洗大風

蔓荆子 羌活 玄參 苦參 紫參 沙參 獨活  
厚朴 陳皮 荆芥 麻黃 紫浮萍 各兩 蔓荆子  
防風 白芷 威靈仙 各兩 桃柳枝 各三握 其草五錢

右末之量三錢水五升煎乘熱薰洗

搽瘡

漏芦根四兩搗爛  
入猪油或香白芷

輕粉

雄黃  
枯礬各五錢

蜂房末一兩

右搗和如泥搽瘡上如乾丹入鳩燭在內

花蓋石散治有瘡決之

花蓋石一箇  
黃丹二兩飛  
寒水石四兩煅

右末之用大楓油調搽瘡口如脚底穿用花蓋石散加輕

粉海螵蛸

風瘡爛破水出

五倍子末津唾調塗

若皮膚有破處五靈脂末清油調全

紫金膏治大風疙瘩遊風癰疹

薑溫一兩百合五錢黃丹二錢

右末之入醋宜分津垂四分拌勻將猪葉微搽擦動瘡上將  
菜攤紙上隨塊大小貼之

每日洗面用桑枝炭一斗熱湯淋取炭十一碗次用大黑豆羨  
豆一味浸漿水半碗入熟米一碗和勻洗頭面三日一浴一旦洗  
面

每洗面用

皂香

白芨

白欵

殭蚕

蒺藜

升麻各一錢

三奈

白芷

白附

羌活

防風

南星



南京中医药大学图书馆版权所有