

仁文書院集驗方六



南阜先生仁文書院集驗方目錄

卷之一

中風

傷寒

陽傷感 陰傷感

感冒

諸寒

瘟疫

濕瘟

中暑

濕

燥

消渴

火

鬱火

痰

痰火

卷之二

咳嗽

失音

脾胃

瘡疾

陽瘡 陰瘡

痢疾

泄瀉



霍亂

嘔吐

呃逆

翻胃

積聚

痞塊

水腫

鼓脹

黃疸

卷之三

頭痛

眼疾

耳疾

鼻疾

腮腫

鬚髮

口舌

牙齒

咽喉

腋氣

汗斑

心氣痛

腰痛

腳氣

疝氣

痔漏

下血

脫肛



卷之四

補益

安神

諸氣

諸血

虛勞

汗症

骨蒸

癆瘵

濁症

諸淋

遺精

遺尿失禁

小便閉

大便閉

大小便閉

通治

誤吞物

骨硬

解諸毒

諸虫類傷

犬傷

五絕

中惡

各飲食忌類

衣服類

雜事類

六畜類

卷之五 婦人科

廣嗣

調經

帶下

崩中

安胎

胎前雜症

胎漏

小產

臨產

難產

胞衣不下

產後

卷之六 小兒科

初生

臍風

驚口重舌

夜啼

急慢驚風

痰喘

風癇

中惡天吊

變蒸發熱

疳病

感冒

伏暑

盜汗

咳嗽

瘡疾

痢疾

吐瀉

泄瀉

理脾

積聚痞結

諸疳

耳目

腹痛

陰腫

二便

脫肛

行遲

骨硬

諸瘡

痘症

麻疹

卷之七 外科

癰疽

腫毒

疔瘡

瘰癧

癭瘤

乳癰



懸癰

楊梅瘡

便毒

魚口瘡

陰囊濕痒

疳瘡

臂瘡

癰瘡

流注

諸小瘡

湯火傷

折傷

竹木刺及指爪傷面

金瘡

破傷風

膏藥

仁文書院集驗方目錄



仁文書院集驗方卷六

安城 鄒元標 父彙集

瀛海 馮嘉會 父訂刊

昭武 丘北麟 父叅閱

初生

延生方 小兒初生臍帶脫落後取置新瓦上用炭火四圍燒

至烟將盡放土地上用瓦盞之類蓋之存性研爲末預將

硃砂透明者爲細末水飛過臍帶若有五分重硃砂用貳

分五厘地黃當歸身煎濃汁一二蜆殼調和前兩味抹兒

上脣間及乳母乳頭上一日之內晚至盡次日大便遺下

穢汚濁垢之物終身永無瘡疹及諸疾

解胎毒方 出墨寶齋章賜堂

小兒落地呱呱地一聲口中血塊下腹便成胎毒約半日用藥二味煎水將舊細青布洗淨纏食指展藥水輕輕洗口內舌與唇藥水任嚥下能令毒氣從胎糞出可免肚痛之症

黃連 夏多用

甘草 冬多用約各一錢爲佳

治小兒初生

用甘草一指節長炙透割碎以水二合煮取一合以指頭纏蘸汁點兒口中約一蜺殼吐出血胸中惡汗待其饑渴更

與兩服不吐盡一合止則兒智慧無病

又方 初生時即用猪膽一枚以水七升煎取四升澄清浴兒

令長大及終身永無諸疾

小兒三朝洗浴後須用艾葉末擦去灰梗淨絨如菉豆大燒臍帶
三壯一生免臍風肚痛等症

燒方

用方軟綿紙一塊約四五寸中取一孔放在洗兒者手掌
中紙孔對中指用人抱定懷內使弗動將臍帶穿過紙孔
兩指夾定手背粘兒腹毋令大緊帶盤紙上加艾一層火
燒過令抱住外用舊絹片縛在腹上借煖氣祛風除濕終

身肚腹不痛

治小兒胎中受熱生下面赤眼閉不開大小不通不能進乳

用澤瀉

二錢半

生地黃

二錢

猪苓

赤茯苓

天花粉

各一錢五分

茵陳甘草

各一錢

剉碎和勻每服三錢水一盞煎七分令乳母食後捏去宿乳服藥少頃乳之

治小兒五臟大熱

用山梔子炒過爲末每服二錢水煎服

治初生不乳用好乳一酒鍾葱白三寸入銀器內煎滾服之不用葱如無銀器瓦器亦可



一初生小兒三日內啼哭腹內響打屁陰囊稀名爲盤腸氣用

蟬退

五隻水洗
去頭尾

防風

三分

薄荷

一分

玄胡索

四分

木通

四分

車前子

三分

耳草

一分

如唇紅目赤者加宣黃連

一分

燈心一丸煎服

治小兒初生三日去驚邪辟惡氣用牛黃大豆許細研以赤蜜

如酸棗許共研勻以綿蘸之與吮一日令盡

治兒生七日助穀神以導達腸胃用粟米研爛煮粥飲如乳母

每日與半粟穀喫

治初生兒至十日噤用牛黃少許研細以淡竹瀝調一字灌之



更以猪乳點口中卽差

一小兒肚臍突出用原斷臍帶并艾葉同燒灰以油胭脂調搽

卽安

治小兒初生臍不收乾方

用鮮橄欖核磨水搽之妙

又方 用綿繭亂髮燒灰樵之

又方 用白礬煨白龍骨煨等分爲末傅之

又方 用綿子燒灰存性爲末塗傅

治撮口發禁

用甘草

二錢五分

水一盞煎六分去渣溫與服令吐痰涎自愈

治小兒臍赤腫

用杏仁杵爛傳臍腫上

治小兒臍腫汁出

用枯白礬末傳或黃柏末傳之

又方臍不乾

用伏龍肝塗之或用白龍骨和枯礬等分傳之

用升諸相安至通用曰諸骨味林登等不計之
又式翻不練細亂髮燒灰樵之

又方用林白藥末對通黃酥末煎之未得之

或心兒翻翻書出灰存性為末塗得

用杏二升微火煎至土

或小便尿有無性才一歲前六分去渣溫食服今已既老宜食



臍風

治內吊腹疼

用乳香沒藥各三錢木香姜黃各四錢爲末煉蜜成丸貯磁罐內量兒大小加減煎鈎藤湯化下

又方

用蓬朮半兩阿魏一錢以溫水化阿魏浸蓬朮一晝夜焙乾爲末每服一字煎紫蘇米飲空心調下

治小兒盤腸氣痛

用木香一塊於乳鉢內磨水半盞調乳香沒藥末少許煎數沸服之立効

仁文書院集
又方

用炒茴香延胡索等分爲末空心米飲調下

治小兒因剪臍傷於風濕或尿在抱裙之內遂成臍風面赤唇

青啼聲不出名曰撮口

用白殭蚕爲末蜜調塗口內卽差

又方 用牛黃一分竹瀝少許研勻抹入口中

又方 用完全生葱二根搗汁用真殭蚕三個研末調塗其母

乳頭上令兒吃之或用乳調蚕末灌之兒口卽開

治小兒犯撮口風荷包風驚口風臍風等項并牙跟邊生白點

名爲馬牙作痛啼哭不吃乳卽看口內堅硬之處或牙跟