

本書有著作權及版權不准抄襲及翻印

書名	猩紅熱白喉腦膜炎問答
編著者	莊畏仲
出版者	上海公平路三十四號 大華書局
排印者	上海三明明印刷廠
出版日期	中華民國二十三年九月初版 中華民國二十年 月 版
裝訂冊數	平裝一冊
定價	大洋三角
總發行所	上海公平路三十四號 大華書局
分發行所	上海及各省 世界書局
本書編號	183

醫學衛生問答叢書發刊要旨

誰都知道健康是人生的幸福；誰都願望自己和家族身體的健康。可是大家都免不了病；病了當然急求治愈。因此社會上很多的人士，都不免要感到醫藥衛生常識的飢荒；同時他們必然渴望得到一個指點迷途的南針。

環顧市肆，關於醫藥衛生的書籍，固然是美不勝收；可是非太嫌高深，便失諸平淡。很不合普通日常生活的需要。本局有鑒於此，特請海內醫界通儒，從事於醫學衛生問答叢書的編輯；成一部有系統而切實用的著作。舉凡內科病、傳染病、腸胃病、喉病、眼病、神經病、小兒病、婦人病、性病、娩產和其他種種關於保健、防病、看護、救急等方法，無不一一詳述。主幹者，程瀚章醫師；編輯者，石錫祐、范守淵、郭人驥、莊畏仲、莊覺、許偉子、章詩賓、劉以祥、謝筠壽、蘇記之、龔惠年諸醫師，都是醫界先進，文壇碩彥，學識經驗，兩俱豐富；各書概用問答體裁編述，以科學為經，以國情為緯，淺顯明白，切於實用。不但可以備作家庭衛生的顧問，社教機關的導師，就是高級和初級中學衛生科的教師和學生，也可從這裏面得到補充的教材，和作課外的參考。而醫界在實用方面，未嘗不可把本叢書利用，以備遺忘。付刊伊始，謹述發刊要旨如上：

開卷的話

從年頭到臘尾，地球不絕的運行著，同時宇宙間的么微生體，也不絕地向人類康健的壁壘進攻。你瞧！這許多的傳染病，小小的么魔，竟是我們全人類的大敵；尤其是可愛的嬰兒們，身體這般嬌嫩，抵抗力這樣缺少，所以從春天到秋天，小兒患傳染病而死的，不知多少，這是民族存亡上一樁大事，為談育嬰保健的人們所極關心的。

猩紅熱、白喉、腦膜炎三種傳染病，罹患的人雖不限於小兒，然在醫學統計上，畢竟這三種病的罹患者以小兒為占多數；並且這三種病症，每為流行性或散在性流行的。疾病流行的時候，預防和治療的方法，是任何人都應該具有的必需智識；我國人對於疾病這件事，往往少有認識，未病之前不知預防，病了尚未知所患是什麼病，已經知道是確實患著那一種疾病之後，又不知道那一種療養的方法是適當妥善的路徑，徒然盲衝瞎撞地空費時間和金錢，這是深可浩歎的！還有神經過敏的人，在某種傳染病流行時，患了別種疾病，也便疑心到所患的是流行的疾病，便錯誤了醫法，這也是喫了缺少沒有常

識的虧。

本書是醫學問答叢書的一種，專就猩紅熱、白喉、腦膜炎三種疾病研究，把他們的定義、原因、症狀、診斷、經過、預後、預防、治療等種種方法，用問答體一一揭示他們的精義，使普通人對於這三種疾病，獲得一切智識，以便實用上有所參考。

猩紅熱就是爛喉痧，白喉就是喉風，這兩種疾病固然是很重要的；腦膜炎的種類又是多得很多，本書所討論的，是急性薄腦膜炎、流行性腦脊髓膜炎，和結核性腦膜炎三種；急性薄腦膜炎，每續發於他種疾病，而流行性腦脊髓膜炎和結核性腦膜炎二病，也以小兒患之爲多，不可不加以特別的注意。二十三年一月編者識。

目次

第一章 猩紅熱	一
第一節 定義	一
第二節 原因和傳染	二
第三節 病程概況	五
第四節 各分症	八
第五節 診斷	一五
第六節 預後	一六
第七節 預防	一七
第八節 療養	一八
第九節 看護人的注意點	二〇
第二章 白喉	一二三

第一節	定義·····	二三
第二節	病原·····	二四
第三節	傳染·····	二五
第四節	症狀·····	二八
第五節	各分症·····	三二
第六節	診斷·····	三五
第七節	預後·····	三六
第八節	預防·····	三八
第九節	療養·····	四一
第一目	病室·····	四一
第二目	飲食·····	四二
第三目	治療的標的·····	四三
第四目	局部療法·····	四四

第五目	對毒性一汎療法(血清療法).....	四六
第六目	對症的治疗.....	五〇
第三章	腦膜炎.....	五五
第一節	提綱.....	五五
第二節	急性薄腦膜炎.....	五六
第一目	定義及原因.....	五六
第二目	症狀.....	五七
第三目	診斷.....	六一
第四目	治療.....	六三
第三節	流行性腦脊髓膜炎.....	六四
第一目	定義及原因.....	六四
第二目	症狀.....	六七
第三目	異常症和後貽症.....	七一

第四目 診斷·····	七二
第五目 預後·····	七四
第六目 療養·····	七四
第七目 預防·····	七七
第四節 結核性腦膜炎·····	七八
第一目 定義及原因·····	七八
第二目 症狀·····	八〇
第三目 經過及預後·····	八四
第四目 診斷·····	八五
第五目 治療·····	八七

第一章 猩紅熱

第一節 定義

問 猩紅熱是什麼病？

答 猩紅熱是一種有發熱並且有發疹的一種急性傳染病。

問 這病侵害人體那一部器官？

答 這病先侵咽喉部，後達全身，有時侵及腎臟。

問 這病西文叫什麼？

答 德文叫做 *Scharlach*，英文叫做 *Scarlet fever*。

問 我國人一般稱猩紅熱叫什麼？

答 大概這病叫做爛喉痧。

第二節 原因和傳染

問 猩紅熱的病原菌是什麼？

答 猩紅熱的病原菌，雖還沒有充分闡明，可是有許多學者以一種鍊狀球菌，認為猩紅熱的病原。

問 猩紅熱傳染的徑路，明瞭沒有？

答 這是無疑地已經明瞭的了。

問 怎樣傳染呢？

答 本病從人傳染給人，或者因介於中間的人，或病人所使用的物品，或空氣等媒介，而致傳染的。

問 倘不和病人密接，也能感染麼？

答 雖不和病人親密地接觸，祇要你到過病人住室，不論時間的長短，就有感染的機會。

問 猩紅熱的毒素，有耐久性沒有？

答 猩紅熱病原的毒素，有極強耐久性，所以病室、衣服、雜物、玩具、圖書以及一切，都可以做傳染的媒介；雖是經過數月甚至數年之後，還能媒介傳染。

問 本病的病毒，存在那裏？

答 本病病毒，存在於病人的組織體液分泌物和排泄物中；像：血液、淚液、鼻涕、咯痰、表皮落屑和大小便中，往往有病毒存在。

問 這許多存在的病毒，傳染力怎樣？

答 傳染力非但很強，並且在猩紅熱病程中任何一期都有傳染力的。

問 全病程各期的傳染力也有強弱麼？

答 猩紅熱全病程中的傳染力，潛伏期最弱；發疹期最強；落屑期次之。所以本病的傳染力，從潛伏期起，一直到落屑終結，始終保持，不過略有強弱之分罷了。

問 小兒能傳染猩紅熱症麼？

答 猩紅熱最能傳染給小兒，可是比麻疹的罹病率，略為少一些；哺乳中的小兒，罹猩

紅熱的，又比較少些。

問 成人也得傳染本病麼？

答 也得傳染，可是比較的少一些。然在中國和日本的情形，成人罹猩紅熱症的，也不在少數。

問 在統計上，猩紅熱的傳染，和性別可有甚麼關係？

答 這卻沒有什麼大關係，不問男女都是一樣。

問 本病從那一部侵入？

答 本病侵入的門戶，大概是扁桃體；除扁桃體外，也有從皮膚外傷侵入的實例；更有從產褥子宮侵入的。前者叫做創傷猩紅熱，後者叫做產褥猩紅熱。

問 猩紅熱流行的情況怎樣？

答 本病在大都市中四時不絕，尤流行於秋冬二季，從九月到翌年二月，持續流行。

問 患本病後有免疫性麼？

答 一度罹本病後，大都受得本病的免疫性。

第三節 病程概況

問 猩紅熱傳染以後，有一定的潛伏期麼？

答 有的，但潛伏期多少，很不一定；普通傳染之後，隔數天的潛伏期發病，隔兩星期以上發病的，卻很少。

問 本病發病的最初情形怎樣？

答 本病發病的最初，有反覆的惡寒戰慄，繼來三十九度以上的發熱，發頭痛、精神恍惚、痙攣、嘔吐等症狀。咽頭有灼熱的感覺，往往在嚥下時覺得疼痛，頸腺腫脹。

問 這種情形是病程中的那一期？

答 這種情形，算是前驅期。

問 過後便是那一期？

答 前驅期過後——或隔了一天，或是當天，便起發疹，這一期叫做發疹期。

問 發疹部的位置先後次序怎樣？

答 既入發疹期，頸部先行現出發疹，其次蔓延於四肢的伸側和各關節及手足等處，而顏面部頭部則較少。

問 疹的形性怎樣？

答 疹是猩紅色針頭大的小斑，且稍稍隆起，各疹相融合，呈汎發性潮紅。

問 咽部黏膜和舌，有變化麼？

答 咽部黏膜，發黏膜炎性炎症以外，並且也發生內疹；舌的變化，在初期則舌尖和邊緣，呈著明紅色，中央部則有灰白黃色的苔，然一二天後，漸次剝離，全面呈猩紅色；且因舌乳頭腫脹，致舌面凹凸不平。

問 其他部分的黏膜，也有病理變化麼？

答 眼結合膜、支氣管黏膜，往往同時發炎。

問 腺體和脾臟，有沒有變化？

答 頸腺腫脹極著明，他部的淋巴腺，也間有腫脹的，脾臟也往往腫大。

問 尿有沒有變化？

答 尿中含有蛋白質，但不呈雙氮反應。

問 發疹期共經過幾天？

答 大概四天至六天。

問 以後便怎樣呢？

答 以後便移行於落屑期。

問 落屑的情形怎樣？

答 因部位的不同，落屑或成膜狀，或成糠秕狀。

問 落屑期諸症怎樣？

答 落屑期諸症減退，咽部炎症和腺腫等消失；熱也漸次下降。

問 落屑期約有幾天？

答 落屑期的繼續日數，雖沒有一定，約經過兩星期。

第四節 各分症

問 猩紅熱症的熱候怎樣？

答 猩紅熱體溫急劇升騰，達三十九度以上，到翌日更上昇一些；熱度在發症的全盛期間稽留，跟著疹的褪色而同時渙散狀下降，下降通常在第九天到第十二天。如果到第二星期依然不降熱，就有合併症存在的懷疑。此外很少數的猩紅熱症，竟不發熱。

問 病人的脈搏怎樣？

答 脈搏數和熱度的比例爲多，在有熱時往往一分鐘達一百二十到一百五十次以上；醫師可懷心臟衰弱的恐懼。

問 本症所發的疹，色澤怎樣？

答 針頭大的疹，初呈鮮紅色，後漸加濃，大多數從周圍隆起；疹和疹的中間，起初還存有健康的皮膚，到後來一片腫脹潮紅，呈汎發性紅色，但精細檢查時，仍得將初