

永類鈴方

五



診候六脈

七表八裏九道之脈為候
 浮為在表
 沉為在裏
 數為在腑
 遲為在臟



主表行陽王五度以候
 左關前一六淫為外所因
 分為之迎
 寒暑燥濕風熱皆為
 外傷有餘之證

取之為腑脈上節
 得之緩者為胃氣中節
 得之為臟脈下節

人迎左關寸
 尺

手太陽
 相火足少陽
 寒氣足太陽

表

小腸土
 膽府土
 膀胱土

心火
 肝木
 腎水

裏

手少陰
 足厥陰風木
 足少陰君火

陽生於尺動於寸三陽從地長也

寸

陽六分
 陽三分
 為陽九分

寸二分為魚際

寸口脈之大會五

藏六府之終始

受氣於中

陰三分 為陰寸

陰主於寸動於尺 三陰從天起 亥人反此 背負也

尺部寸外為澤

關者陰陽之會 尺者性命之根

氣口 右關 尺寸

燂釜 手足陽明 手少陽 手陽明

表

三焦 土 胃 脾 土 太陽 土 金 肺

裏

手足厥陰 足太陰 濕土 手太陰

腑 胃 臟

浮 中 沉

浮 於皮膚間得

中 於肉間得

沉 於筋骨間得

主裏行陰二十五度以候 右關前二十七情為內所因 分為氣口 喜怒憂思悲恐驚飲食 勞役皆內傷不足之謂



入式之圖

表風 表寒

裏虛 裏冷

表濕 表熱

裏實 裏燥

南陽濟人書傷寒要方

此卷至十板終

仲景傷寒百十三方証多藥少直証有異而病同經藥同而或治兩証
辨其証者其經之病其病者其証之藥又百問中一証下有數種藥方
主治者皆須將病對藥將藥合病而藥又有冷熱與辛甘發散酸苦湯
甘之不同正方之下難於其載其見於鈐方之中者如詳矣今但列見患病名於藥
方之下凡有是病當求鈐方中各項傷寒門類之下其合於脈証者考而謹擇之

桂枝湯

証具太陽經可汗頭痛項強四肢疼發熱惡寒熱多惡寒往來惡寒似瘧身各
桂枝湯

桂枝

芍藥

參兩

甘草

二兩

局方

乙兩

以咀

每服

三分

水盪

半生

姜五片

棗二

枝煎七分去滓溫服春夏加減見太陽經可汗門素虛寒人不用加減傷寒中風方
加黃芩二兩陽旦湯內寒外熱虛煩本方加乾姜黃芩二兩名陰旦湯互見陰陽經

桂枝湯

証具發熱惡寒熱多惡寒少面赤似瘧各門

桂枝

芍藥

甘草

參兩

麻黃

半兩

炮焙

杏仁

十二個

泡去

尖去

兩仁者

以咀每服三分生姜四片棗一枚水盪半煎八分溫服

桂枝湯

証具傷寒似瘧

屬太陽

桂枝

芍藥

甘草

參兩

麻黃

二兩

炮焙

甘草

二兩

以咀

每服

八分

溫服

微汗

以咀每服三分生姜四片棗一枚水盪半煎八分溫服微汗

桂枝湯

証具發熱惡寒熱多惡寒少各門

屬太陽

桂枝

芍藥

甘草

參兩

石膏

六兩

炮碎

麻黃

二兩

炮焙

以咀

湯便如上

桂枝湯証具可汗門 加桂以能壯奔豚氣也 屬太陽

桂枝湯為藥三兩 甘草二兩 炙咀湯使如上

桂枝湯証具里之疼自汗惡風小便難各門 屬太陽

桂枝湯為藥各二兩 甘草二兩 炙咀湯使如上

桂枝湯証具胃脘痛門 去芍藥以味酸脈促胃脘痛者結胸故單用辛甘發散毒氣

桂枝湯為藥各二兩 甘草二兩 炙咀湯使如上 有微寒者加附子半枚炮小便利愈又名

桂枝湯証具胃脘痛門 三証皆屬太陽

桂枝湯証具項強發熱小便利各門 屬太陽

芍藥 茯苓 白朮 各二兩 甘草二兩 炙咀湯使如上 小便利即愈

桂枝湯証具發狂門

桂枝 蜀漆 各二兩 甘草二兩 炙咀湯使如上 龍骨二兩 炙咀湯使如上

桂枝湯証具腹滿痛門 太陽病下之腹滿痛屬太陽

桂枝三兩 甘草二兩 炙咀湯使如上 利者先煎芍藥令沸 炙咀湯使如上

桂枝湯証具身痛門

桂枝 人參 各二兩 芍藥二兩 甘草二兩 炙咀湯使如上

桂枝湯証具腹滿痛門 以腹滿痛屬太陽

桂枝六分 芍藥三兩 甘草二兩 炙咀湯使如上 痛甚加芍藥二兩 炙咀湯使如上

桂枝湯証具虛煩門 屬太陽



桂枝半兩甘草炙牡蛎煑龍骨炙四啗每服三
分水盡煎分溫服

桂枝湯証具証仲門屬太陽

桂枝或兩甘草乙兩炙啗咀湯使如

桂枝湯証具下利心痞嘔門

桂枝甘草炙各乙兩炙白朮人參乾姜炮各乙兩啗咀湯使如

桂枝湯傷寒九日風濕身體煩疼不能轉及不嘔不渴脉浮虛而濡屬太陽

桂枝乙兩附子乙枝炮甘草三分炙若大便難小便自利去桂加白朮乙兩三分

啗咀每服三錢生薑四片棗一枚煎分溫服

桂枝湯証具項強自汗門但身微汗論桂枝湯中加葛根豈本用麻黃誤矣

桂枝芍藥甘草炙各乙兩炙葛根乙兩炙麻黃乙分一本无啗咀湯使如

桂枝湯証具喘急門屬太陽

桂枝芍藥甘草炙各乙兩炙厚朴炙姜炙各三分杏仁炙皮炙七下啗咀湯使如

桂枝湯証具三陽經可汗發執惡寒虛煩喘急各門

麻黃壹即乙兩止泡云黃汁乾桂枝乙兩甘草炙半兩杏仁去皮尖三五枚

啗咀杏仁實各每服三分水盡半煎分溫服取微汗加減見前傷寒集要

麻黃湯証具喘急門屬太陽

麻黃壹即乙兩止泡杏仁三枚去皮尖石膏兩炙甘草炙乙兩啗咀湯使如

麻黃湯証具少陰証門

麻黃湯 麻黃 芍藥 甘草 附子 各二兩 附子 乙枚炮 以咀湯使如土

麻黃湯 証具陰証門

麻黃 芍藥 細辛 各二兩 附子 乙枚炮 以咀湯使如土

麻黃湯 証具發黃門 屬陽明

麻黃 芍藥 甘草 連翹 各二兩 杏仁 五十个 炙 上 芎藭 半升 生梓白皮 切二兩

以咀每服三升 生薑 片棗 乙枚 水盡半煎 入 酒服

麻黃湯 証具四支厥逆門 若下部脈不至 咽喉不利 吐膿血 利不止者 難治 屬厥陰

麻黃 芍藥 甘草 升麻 當歸 各二兩 分 知母 黃芩 各三分 姜 桂枝 三分 芍藥

桂枝 茯苓 白朮 甘草 炙 麥門冬 炙 乾姜 炮 石膏 碎 已上各二分

以咀每服三升 水盡半煎 八分溫服 汗出愈

麻黃湯 証具兩強下利門 屬太陽若與陽明合病必自利

麻黃 二兩 麻黃 芍藥 甘草 附子 各二兩 桂枝 芍藥 甘草 炙 各二兩 但喘加制半夏 乙兩半

又名葛根半夏湯 以咀每服三升 生薑 片棗 乙枚 水盡半煎 八分溫服 覆取汗

葛根湯 証具喘急門

葛根 黃芩 乙兩半 甘草 炙 黃連 乙兩半 以咀每服三升 水盡半煎 八分溫服

小柴胡湯 証具三陰三陽經可汗白頭項強耳聾舌眩鼻淵胸脇心煩痞結服痛

身黃手足溫 嘔吐酸水 渴者不食 大便硬或溼 小便難或不利 或自可 多服 諸語發

熱惡寒往來 寒熱 熱 少腹滿 人熱 惡寒 傷寒 後陰陽易共得 各門 可見



黃芩之兩半 腹中痛去黃芩加芍藥三分 心下悸小便不利者黃芩加茯苓二兩

人參之兩半 有微熱不渴去人參加桂枝二兩半 溫覆取微汗愈若咳嗽去人參

張子加五味子二兩二分 乾姜一分

半夏之兩二分 湯中煩不嘔者半夏人參加桔梗炙甘草用四分之二若渴者去

半夏更加人參三分 桔梗根二兩

柴胡四兩去芦 甘草二兩半炙 棗子六枚若脅下痞硬去棗子加牡蛎二兩熬

咬咀每服三分生薑四片棗子三枚水盡半煎八分去滓溫服

証其三陰三陽經脈沉實可下發熱汗出不解惡寒者而虛煩者皆心腹痞結

脹滿霍亂嘔吐下利大便難秘往來寒熱潮熱如瘧瘧言者舌燥勞後膈噎門

柴胡四兩 黃芩二兩半 芍藥二兩半 半夏制之兩二分 枳實炙之六分 身熱未解不可服

咬咀每服二分生薑四片棗子六枚水盡半煎八分溫服取利欲下者加大黃二兩

証其發熱頭疼語各問 屬太陽

柴胡之兩半 桂枝二兩 黃芩二兩 人參半兩芍藥半兩半夏四兩炙甘草二兩炙 湯使如

証其發熱汗虛煩往來寒熱小便不利渴各問 屬太陽

柴胡四兩 桂枝二兩 黃芩二兩 芍藥二兩 乾姜甘草炙牡蛎熬各二兩

咬咀每服三分水盡半煎八分溫服

証其發熱語各問 屬太陽

柴胡黃芩各二兩 鉛丹人參桂枝茯苓各三分半夏半合制 大黃半兩

龍骨二兩 牡蛎二兩 半根 咬咀 每服三分 生薑四片 棗之枚 水盡半煎八分 溫服

証具 關熱 門方 同 小柴胡 方等 分 加 棗 硝 三兩 湯使 亦同 屬 太陽

証具 發熱 惡寒 煩躁 身痛 筋惕 肉瞤 發熱 傷寒 集要 論 治 太陽 中風 汗出 惡風 服

麻黃 二兩 湯泡 三遍 桂枝 甘草 炙 各二兩 杏仁 二十个 桑白皮 石膏 半斤 雞子 大棗 碎

咬咀 每服三分 生薑四片 棗子一枚 水盡半煎八分 溫服 取汗 若汗多 不用下 溫粉 撲之

溫粉 方 白朮 黃芩 白芷 各等分 為末 每二兩 桑白皮 三兩 和勻 周身 撲之

証具 發熱 喘咳 喘嗽 痰飲 腹滿 小便不利 各門

麻黃 二兩 湯利 者 去麻黃 加羌活 花柳 彈子 大棗 炙 亦色 若喘者 去麻黃 加附子 半枚

如小便不利 下腹滿 去麻黃 加茯苓 炙 亦色 若喘者 去麻黃 加杏仁 兩半 桑白皮

半夏 二兩 湯分 湯利 者 去半夏 加枯梗 炙 亦色 若喘者 去麻黃 加杏仁 兩半 桑白皮

桂枝 各二兩 半 五味子 二兩 咬咀 每服三分 水盡半煎八分 溫服

証具 發熱 惡寒 風熱 多 少 腹痛 心悸 虛煩 論 并 各門

桂枝 二兩 半 芍藥 三兩 甘草 炙 二兩 膠飴 半升 旧 有 微溼 或 喘 者 去 膠飴

咬咀 每服三分 生薑四片 棗子一枚 水盡半煎八分 溫服 尺脈尚遲 加黃芪末 二兩 煎

証具 可下 項強 下 緊 滿 各門 屬 太陽

錦紋 大黃 二兩 半 連珠 甘遂 赤者 之字 為末 芒硝 五斤 水三盞 先煮大黃至一盞 去滓 下硝

沸下 甘遂末 溫服 得便利 止 後服 胸中 無 堅物 勿服 之

証具 桂枝 人參 各二兩 甘遂 半兩 大棗 三十个 桂枝 炙 亦色 若喘者 去麻黃 加杏仁 兩半 桑白皮



大黃湯 証其胸緊滿身腫虛煩渴者 屬太陽

大黃 四兩 芒硝 三分 杏仁 五分 枳實 大者 五枚 苦葶藶 三分 右大黃葶藶為末入杏仁

稍合研爛如彈抄并遂末半升白蜜二合二盞煮一盞頓服其遂性猛量虛實服之

陷胃湯 証其心下緊滿 屬太陽

半夏 貳兩半 湯洗黃連 貳兩 枳實 大者 五枚 用

以咀每服三升水盞先煮枳實至盡半却下前藥煎八分溫服微利黃連為度

承氣湯 証其三陰三陽經可耳聾目乾爛時滿痛膈噎喘急咳逆自利大便秘鞭蓄血發

熱惡寒往來未定熱潮熱心煩虛煩懊憹自汗頭汗惡熱諸語小便數陰腫裏縮各門

錢穀大黃 四兩 湯洗厚朴 貳兩 枳實 大者 五枚 去殼炒半兩 芒硝 二兩

以咀每服三升水盞先煮厚朴枳實至盡大黃芒硝煮一沸溫服以利為度

小承氣湯 証其如大承氣湯但審脈証之微甚量酌用之并見痰飲門

大黃 四兩 枳實 大者 五枚 厚朴 貳兩 以咀每服三升水盞先煎八分溫服以利為度

調胃承氣湯 証其少陽經發熱惡寒諸語小便數或赤胸膈滿痛大便秘或瀉惡熱煩而

自汗各門 甘草 二兩 芒硝 三分 大黃 貳兩 以咀每服三升水大盞煎七分消沸服

桃核承氣湯 証其太陽陽明經發熱蓄血少腹

大黃 四兩 桂枝 二兩 甘草 二兩 芒硝 三分 桃仁 五十枚 杏仁 五十枚 以咀湯使知之以微利為度

肥瘠子 証其陽明厥陰經可吐發熱胃滿虛煩懊憹不得眠各門又名瘠子甘草敗湯

肥瘠子 大者 五枚 香豉 貳兩 枳實 大者 五枚 甘草 半兩 水盞先煎瘠子甘草後入豉煎溫服



施子生薑湯若嘔者用施子鼓湯等分加生薑先煎施子鼓煎溫服得吐後服
施子厚朴湯下後煩腹滿不得眠施子七枚制厚朴二兩枳實二枚炒分二服煎溫服得吐解
施子乾姜湯下後身熱不去微煩施子七枚乾姜二兩分作服煎溫服
施子藥皮湯身黃發熱施子八枚黃藥二兩甘草二兩水煎溫服
右二施子諸湯病人旧有微瘧者不可服

施子大黃湯發汗後臍下悸欲作奔豚氣者

茯苓四兩桂枝二兩甘草二兩每服棗二枚用甘爛水盡半煎八分溫服甘爛水以水至
盆中急挽之候有珠千百相逐取用之又七味葱白湯用勞水者同此義也

施子桂枝湯証具頭眩目 屬太陽

茯苓二兩桂枝二兩白朮二兩甘草二兩以咀三分水盡半煎八分溫服

施子自汗不渴

茯苓二兩甘草二兩桂枝二兩以咀每服三分水盡半生薑五片煎八分溫服

施子少陰證咽痛者

甘草二兩以咀分六分溫服不差与桔梗湯

施子證具惡寒吐逆自汗虛煩咽痛小便數各兩 屬太陽

甘草二兩乾姜二兩以咀每服三分水盡半煎八分溫服

施子甘草湯治脉結代心動悸 屬太陽

甘草二兩人參二兩生地黃二兩桂枝二兩半脉行二兩分麥門冬二兩分



以咀每服三錢生薑五片棗七枚水盪半入酒半盪煎八分阿膠一片令烊盡溫服

芍藥甘草湯 本前甘草乾姜湯證服湯後微愈足溫者更作芍藥甘草湯屬太陽

白芍藥二兩甘草炙二兩以咀每服三錢水盪半煎八分溫服

厚朴薑半夏甘草人參湯 治發汗後腹脹滿者屬太陽

制厚朴四兩制半夏二兩乙二分甘草二兩人參半兩

以咀每服三錢水盪半生薑五片煎八分溫服

大黃黃連瀉心湯 證具惡寒心下滿門屬太陽

大黃二兩黃連二兩黃芩二兩以咀每服三錢泔湯二盪熟漬之時久絞去滓煖溫分服

附子瀉心湯 證具惡寒自汗心滿門用上瀉心湯三味等分絞汁別煎炮附子乙不加汁內溫服

半夏瀉心湯 證具心滿門傷寒五六日發熱而嘔柴胡湯證具反下之柴胡證仍在復與柴胡

湯此雖已而不為逆必惡寒而振發熱汗出而解若心下滿而腹痛者結胃也並屬太陽

制半夏二兩乙二分黃芩二兩乾姜炮甘草炙各二兩黃連半兩

以咀每服三錢棗七枚水盪半煎八分溫服

甘草瀉心湯 證具下利心滿各門傷寒中風

甘草炙二兩黃芩二兩乾姜炮各二兩半夏泡乙二分六棗七枚黃連二兩人參各半兩

以咀每服三錢水盪半煎八分溫服

生薑瀉心湯 證具發熱下利心滿各門屬太陽

黃芩二兩甘草炙二兩人參各半兩乾姜炮黃連各半兩半夏泡乙二分

公咀每服分永盡半生薑七片棗二枚煎至一盞溫服

白虎湯 證具三陰三陽經頭痛面垢手足逆發熱惡寒虛煩渴諸語發黃大便秘遺瀉腹痛

自汗各門 知母三兩甘草炙之兩粳米三合石膏八兩搗碎

咬咀每服三分永盡半煎八分米熟為度去滓溫服

白虎加參湯 證具發熱惡寒手足逆身痛腹滿虛煩自汗渴諸語遺尿各門

石膏四兩搗碎 知母二兩半 甘草炙半兩粳米二合半人參五分咬咀湯使如上

白虎加桂湯 治瘧疾但熱不寒等分同上白虎湯加桂二兩半咬咀湯使如上

白虎加芍藥湯 治濕溫多汗等分同上白虎湯加芍藥二兩半咬咀湯使如上

五苓散 證具大陽經可水霍亂吐利自汗煩躁渴發熱頭痛小便不利不得眠各門

朱苓去黑皮三分澤瀉二兩二分白朮 茯苓去皮各三分桂枝半兩不見火

各自事治見等分却和勻咬咀清入脾末子濁入胃中量心神恍惚加辰砂隔年不可用

朱本湯 證具發熱渴嘔嘔嘔煩不得眠小便不利各門及少陰下利

朱苓去皮 茯苓 阿膠炙過澤瀉滑石各二兩咬咀每服三分永盡半煎七分溫服

附子湯 證具口噤惡寒身痛各門

附子炮乙枚茯苓芍藥各二兩人參二兩白朮二兩咬咀每服三分永盡半煎七分溫服

桂枝附子湯 證具傷濕身痛各門 屬太陽

桂枝二兩附子乙枚半炮甘草二兩咬咀每服三分永盡半生薑五片棗二枚煎八分溫服

本附湯 證具厥陰經風濕身痛身腫各門其人大便堅小便自利者



白朮二兩 附子二枚半炮 甘草二兩 以湯能逐水氣 咬咀湯 使如上

甘草附子湯 證具身腫小便不利門 履太陽

甘草炙 白朮各二兩 附子二枚炮 桂枝二兩 身腫加防風二兩 悸者加茯苓二兩 小便不利加茯苓二兩半

咬咀 每服二分 水盪半煎七分 溫服 汗出即解

芍藥甘草湯 證發汗病不解反惡寒者虛也

芍藥三兩 甘草六兩 附子二枚炮 咬咀湯 使如上

乾姜附子湯 證具虛煩不得眠門 屬太陽

乾姜炮二兩 附子生用二枚 咬咀湯 使如上

理中丸 證具霍亂頭痛心滿各門 大病後復喜噎胸中有寒及勞復証

人參二兩 腹滿倍之 乾姜炮 甘草炙 白朮各二兩 蜜元彈丸 湯化服 腹中未熱加服熱湯佐之

理中湯 證具惡寒霍亂吐利胃脘痛腹脹嘔吐泄瀉煩渴多眠欲寐各門

人參三兩 乾姜四兩 甘草二兩 白朮各三兩 若腹滿加人參二兩半 寒者加乾姜二兩半 渴

加白朮二兩半 膈上痰腎氣動也 未加桂四兩多吐者去白朮加薑三兩下多者还用

白朮 悸者加茯苓二兩 又拘急腹滿下利或轉筋去白朮加附子二枚生用

咬咀 每服二分 水盪半煎七分 溫服

四逆湯 證具三陰三陽經頭痛又逆疼厥身痛心腹緊滿脹痛霍亂吐利逆泄瀉發熱

惡寒虛煩自汗小便自利各門 強人加附子半枚 乾姜二兩半

甘草炙 乾姜炮二兩半 附子生用二枚 咬咀 每服四分 水盪半煎七分 溫服



霍亂吐瀉証具四文脈逆并疼泄瀉腹痛欬悸小便秘各門 經來飲調下

甘草八兩 枳實三兩 橘皮四兩 芍藥四兩 若熱者加五味子乾姜各一兩 下利悸者加桂半兩 小便不利者加茯苓半兩 腹痛加炮附子半枚 泄瀉下重先煎薤白湯入藥煎汁溫服

霍亂吐瀉証具四文脈微而利利止者亡血也

甘草炙三兩 附子一枚 炙三入 炙三兩 乾姜炮二兩 半 咬咀每服三錢水盪半煎分溫服

茯苓白通湯汗下後不解煩躁

茯苓二兩 人參半兩 甘草炙二兩 乾姜七分 附子半枚 生薑皮 咬咀湯使如上

當歸四逆湯治手足厥寒脈細欲絕 屬厥陰

當歸洗 桂枝芍藥細辛各二兩 通草 甘草炙各二兩 咬咀水盪半煎分溫服

當歸四逆加珠珀湯証具惡寒泄瀉小便自利門其人內有久寒者 屬厥陰

當歸洗 桂枝芍藥細辛各二兩 甘草炙二兩 木通炙二兩 珠珀五兩

咬咀每服三錢水盪半生薑四片 煎分溫服

通脈四逆湯証具腹痛霍亂吐泄瀉發熱惡寒小便自利門 屬少陰

甘草炙二兩 乾姜炮二兩 附子大者一枚 生用 若面赤者加通須全葱九莖 腹痛去葱 加芍藥

二兩 嘔加生薑二兩 咽痛去芍藥加桔梗二兩 利止脈不出者加枳實二兩

咬咀每服三錢水盪半煎分溫服

通脈四逆加猪膽湯証具身大寒加猪膽汁半合 証具霍亂門咬咀煎分溫服

黃連湯胸中有痞胃中有邪氣腹痛欲嘔 屬太陽



甘草炙黃連乾姜炮桂枝各兩人參各兩半芒硝兩半 以水三升煮取一升半分再服

黃連阿膠湯 少陰病三息煩不得眠

黃連二兩阿膠三兩黃芩二兩芍藥二兩雞子黃半升水煎入膠溶雞子黃攪勻溫服

黃芩湯 證具下利門用湯散熱脈達為寒腹冷本不食反能食此名陰中必死屬厥陰

芍藥二兩黃芩二兩甘草炙各二兩以水五升煮取二升半分再服

黃芩瀉心湯 證具嘔吐門 屬太陽

黃芩二兩半夏半升芍藥二兩甘草炙各二兩以水五升煮取二升半分再服

干薑湯 證具頭痛心滿脅痛嘔吐痰飲各門

干薑二兩芍藥二兩甘草炙各二兩以水五升煮取二升半分再服

元花赤熱甘遂大戟各等分為末杵以苦水二升半煎肥棗十枚取八合末強人乙錢

抵當丸 證具胸脅小腹脹滿發黃蓄血門

水蛭熬去子五枚碎劉斷用石炭炒再熬桃仁四枚去皮尖大黃三分 蟅虫五枚去足翅熬

為末作一丸以水大盞煎至七分頓服時下血不下再作

抵當湯 證具腹滿蓄血吐血譫語大便秘門

水蛭十枚製法如上不製入腹再生大黃二兩酒洗蟅虫十枚去皮尖桃仁七枚去皮尖

以咀作二服水二盞煎七分溫服

承氣湯 證具大便秘門跌陽脈浮而濇濇則胃氣強濇則小便秘數浮濇相搏大便必鞭其脾為

約脾約丸用枳實等分不同為老人津少便秘屬陽明

麻仁五兩白芍藥枳實各四兩杏仁兩半去皮尖大黃八兩厚朴半兩姜制炙
煉蜜為丸梧子大飲下十九

茵陳蒿湯證且發黃小便不利門

嫩茵陳蒿各兩六黃三錢半大梔子三枚

豉水二大盞先煎茵陳減半盡後味煎八分溫服利小 傷寒發汗黃自小便中出

牡蛎澤瀉散證具腰痛小便不利陰陽易勞復門

牡蛎炙澤瀉蜀漆洗去腥商陸熱意應煮海旱澤瀉 枯樓根各等分

右為散飲服方寸已小便利止後服

竹葉石膏湯傷寒解後虛羸少氣逆欲吐并陰陽易勞復等證

淡竹葉半把半夏六錢乙字湯泡石膏四兩碎人參半兩 薑炙半兩麥門冬去心

炙咀每服三錢水盞半生薑四片粳米百餘粒煎八分米熟去滓溫服唯 力加生薑兩半

枳實芍藥湯大病差後勞復

枳實乙枚去穢炒施子三枚半肥者豉乙兩半綿包

清漿水二盞半煎八分方入枳實施子煎取九分入豉再煎五沸 去滓溫服令汗出

若有宿食內大黃如棋子五六枚同煎

白通湯少陰病下利脈微

附子乙枚生用乾姜乙兩炮炙咀三錢水盞半葱白寸煎七分溫服

白通加豬膽汁湯少陰病利不止脈近無脈乾嘔而煩

