

吳鞠通醫案

陸士誥主編

基本醫書集成

江苏工业学院图书馆  
藏书章

南汝賢璉  
編著

通醫案

世界書局印行

中華民國二十六年六月初版

吳鞠通醫案 (全一册)

實價國幣五角


(外埠酌加運費匯費)

主編者 陸士諤

發行者 陸高誼

出版者 上海大連灣路  
世界書局

發行所 上海及各省 世界書局



版權所有 不准翻印

序

醫之有案。猶國之有史也。治國者鑑於古代。治亂興衰之故。而後知所以爲政理民之道。爲醫者察於昔人起疴拯危之神。而後知所以治病用藥之方。蓋皆積所經驗。以傳諸後世。而資其師法者也。其爲書固不重哉。淮陰吳鞠通先生。醫聲振海內。蓋不特葉氏之高弟。抑亦仲聖之功臣也。生平著述有溫病條辨。醫醫病書。及吳氏醫案諸書。而醫案尤先生畢生精力之所薈萃。今條辨既傳布全國。爲世寶貴。而醫醫病書亦已刊行。獨醫案一書。向鮮傳本。偶有鈔錄。藏者亦祕不示人。遂使先生數十年經驗之良模。不獲見知於世。寧不惜哉。三十年前。余曾向下灶胡氏處假錄一通。常置案頭。用資師法。友人見者。均嘆爲良書。轉相傳鈔。幾於日不暇給。夫傳播古籍。以嘉惠後學。吾人之責也。若謂表章先賢。則吾豈敢。至案中有用量過重處。僉謂刊時可刪去。此余期期以謂不可。蓋刊行古書。須存古書真面。俾後學得窺遺澤。凡書內之或是或非。應在讀者各自加其主見。倘妄行編次。隨意割截。不若自行著作。何必借古人之名。而滅古人之實。逞一己之私。而貽後人之憾耶。

吳翰通醫案 序

丙辰二月後學高德僧汝賢謹序

目錄

卷一

中風	.....	一
瘦痰	.....	三
肝風	.....	四
肝厥	.....	七
脇痛	.....	一〇
肝癰	.....	一九
癲狂	.....	二四
虛勞	.....	三三
吐血	.....	三九
衄血	.....	五〇
便血	.....	五一
腫脹	.....	五六
單腹脹	.....	六四

腹脹.....六五

滯下.....六五

積聚.....八一

淋濁大小便閉.....八五

泄瀉.....九二

卷二

暑溫.....九五

伏暑.....一〇九

濕溫.....一三四

中燥.....一四〇

瘧.....一五六

冬溫.....一六一

傷寒.....一六四

卷三

頭痛.....一八三

胃痛.....一九一



產後	三〇一
陰吹	三一八
交腸	三一九
調經	三一九
帶下	三二五
臟燥	三二六
兒科	
痘症	三二六
痘	四〇一
瘰癧	四〇五
食積	四〇七
飧泄	四〇九
咳嗽	四一二
暑溫	四一四
伏暑	四一五

# 吳鞠通醫案

後學高德僧汝賢重錄

## 卷一

### 中風

陶氏六十歲左肢拘攣。舌厚而蹇不能言。上有白苔。滴水不能下咽。飲水則噎。此中風挾痰之實症。前醫誤與膩藥補陰。故隧道俱塞。先與開肺。

生石膏

四兩

杏

仁

四錢

鮮桑枝

五錢

雲苓塊

五錢

防

己

五錢

白通草

一錢五分

薑半夏

五錢

廣

皮

三錢

煮三杯

分三次服。

服一帖而飲下咽。服七帖而舌腫消。服二十帖諸病雖漸減而無大效。左肢拘攣如故。舌腫雖消而語言不清。脈兼結。余曰。此絡中有塊痰堵塞。皆誤補致壅之故。非針不可。於是延郝七兄針之。針法本高。於舌上中泉穴一針出紫黑血半茶杯。隨後有物如蚯蚓。令伊子以手探之。即從針孔中拉出膠痰一條如勺粉長七八寸。左手支溝穴一針透關。左手背三陽之絡。用小針針十餘針。以後用藥。日日見效。前方止滅石膏之半。服至七十餘帖。而能策杖行矣。服九十帖能自行出堂上轎矣。諸症悉除。

哈六歲 中風溼。口歪。臂不舉。腿腫。脈洪數。口渴。胃不開。與辛涼開水道法。

石 膏生四兩 扶苓皮一兩 桂 枝三錢 滑 石飛一兩 晚蠶砂三錢

防 己二錢 半 夏五錢 白通草二錢 桑 枝五錢 煮三盃。分三次服。

二帖而效。十四帖全愈。後以補脾胃收全功。

葉氏三十歲 中風。神呆不語。前能語時。自云頭暈。左肢麻。口大歪不食。六脈

弦數。此痺中也。與柔肝法。

直生地八錢 白 芍生三錢 左牡蠣五錢 生鱉甲五錢 麥 冬二錢

炙甘草三錢 煮三杯。分三次服。

一帖而神有清意。人與之言能點頭也。又於前方加生阿膠三錢。丹皮

四錢。三帖而半語。七帖而大愈能食。十二三帖而如故。

李氏七十歲 伏暑夾痰飲。肝鬱。又加中風頭痛。舌厚白苔。言蹇畏寒。脈洪數

而弦。先與辛涼清之。

連 翹三錢 苦桔梗三錢 桑 葉三錢 銀 花三錢 茶菊花三錢

甘 草一錢 薄 荷一分 刺 蒺 藜二錢 煮三杯。分三次服。四帖。

又 頭痛畏寒。舌厚漸消。苔不退。茲以通宣三焦。兼開肝鬱。

飛滑石六錢 半 夏四錢 白蔻仁二錢 雲扶苓連皮五錢 薏 仁五錢

廣鬱金二錢

杏仁泥五錢

香附二錢

白通草一錢

煮三杯。分三次服。

服二十餘帖而大安。一切復元。

### 瘕癥

某氏其人本有肝風頭痛病根。少陽鬱勃。真水不能上濟可知。又現伏暑內發。新涼外加。金來尅木。木愈病矣。少陽所致為瘕癥。理固然也。勉與清膽絡兼清心包。己卯七月

犀角三錢

羚羊角三錢

茶菊花三錢

丹皮五錢

細生地五錢

鈎藤鈎二錢

桑葉三錢

苦桔梗二錢

鮮荷葉去蒂一枚

甘草一錢五分

煮三杯。分三次服。間服紫雪丹一二錢。

又此症肝風無疑。昨服柔肝清熱之劑而燒退。是外邪已解。現在大脈弦細。手足發涼。似有厥意。治法熄風之中。似宜添入開心胞之絡為是。倘一二天不醒。便難挽回矣。

細生地五錢

沙參二錢

生牡蠣三錢

羚羊角三錢

丹皮五錢

刺蒺藜二錢

生龍甲三錢

阿膠二錢

石菖蒲一錢

茶菊花三錢

甘草一錢

嫩桑枝廿寸

煮三杯。分三次服。

間服紫雪丹牛黃丸。

又用玉女煎加犀角丹皮。

又 用玉女煎加犀角丹皮連翹銀花重用石膏知母。  
又 少陽頭痛甚急。外因亦未盡解。

生石膏兩一

連翹連心三錢

茶菊花三錢

細生地五錢

銀花三錢

冬桑葉三錢

左牡蠣五錢

麥冬不去心五錢

鉤藤二錢

羚羊角三錢

丹皮五錢

生甘草二錢

炒知母二錢

天冬二錢

煮三杯分三次服。

間服紫雪丹二分。

肝風

章氏七十歲老年上虛下盛。又當厥陰司天之年。厥陰主令之候。以故少陽

風動。頭偏右痛。目係引急。最有壞眼之慮。刻下且與清上。癸亥正月廿八日

羚羊角三錢

連翹一錢

刺蒺藜二錢

茶菊花二錢

桑葉二錢

生甘草八分

苦桔梗一錢五分

薄荷八分

煮二杯分二次服。日二帖。服二

日。

少陽頭痛已止。現在胸痞脇脹。肝胃不和。肢痛腰痛。議兩和肝胃之中。兼

與宣行經絡。三十日

桂枝尖二錢

半夏五錢

製香附二錢

杏仁泥三錢

廣皮一分

生薑汁三匙

廣鬱金二錢

青皮一錢

煮三杯分三次服。二帖

因食冷物。晝寐。中焦停滯。腹不和。泄瀉。與開太陽鬲陽明法。二月初二日

桂枝五錢 茯苓塊五錢 肉果煨一錢五分 半夏三錢 生茅朮三錢

炮姜一錢五分 猪苓三錢 藿香梗三錢 廣皮五錢 澤瀉三錢

廣木香一錢五分 頭煎兩茶杯。二煎一茶杯。分三次服。

諸症向安。惟餘晨泄。左手脈緊。宜補腎陽。初四日

茯苓塊五錢 補骨脂三錢 蓮子連皮五錢去心 生於朮三錢 煨肉果三錢

芡實三錢 兔絲子二錢 五味子一錢 水五碗。煮成兩碗。分二次服。渣

再煮一碗。明早服。

即於前方內去兔絲子。加牡蠣粉三錢。初七日

太陽微風。以桂枝法小和之。初十日

桂枝二錢 茯苓塊三錢 生薑二片 半夏三錢 炒白芍二錢

大棗去核一枚 廣皮二錢 炙甘草八分 煮二杯。分二次服。

右目澀小。酉刻後眼前如有黑霧。議鬆肝絡熄肝風益肝陰法。十一日

何首烏三錢 沙參三錢 茶菊花一錢五分 沙蒺藜二錢 桔梗一錢五分

生甘草八分 青箱子二錢 煮二杯。分二次服。

三帖後了然如故。

陶氏 右脈洪大。尺部更甚。左脈弦細。上盛下虛。卒中不能言。如中風狀。乃肝風內動。絡熱竅閉之故。證勢甚重。癸酉二月十五日

鈴羊角一錢 沙參一錢五分 茶菊花一錢五分 苦桔梗一錢 麥冬二錢

刺蒺藜一錢 生鱉甲三錢 桑葉一錢 生甘草八分 細生地五分

煮二杯。分二次服。日一二帖。服三日。

上盛下虛。竅閉不能言。用輕清合芳香開上。今稍能言。但虛煩不眠。心悸頭暈。仍係厥陰未熄。茲用補心肝之體。兼實下法。二十日

大生地五錢 沙參三錢 扶苓塊三錢 炒白芍六錢 麥冬不去心五錢

炒棗仁三錢 生龜板四錢 阿膠二錢 炙甘草三錢 整硃砂綿裹五錢

蓮子連皮心五錢 水五杯。煮取兩杯。分二次服。渣再煮一杯服。

黃三十歲 肝風內動。脈弦數。乃真水不配相火。水不生木。故木強而直上行。頭暈甚。即顛厥也。久不治為痲中。醫云痰者妄也。先與清肅少陽膽絡。繼以填補真陰可也。此症最易錯看胎害不小

鈴羊角三錢 桑葉三錢 苦桔梗二錢 黑芝蔴研細三錢 丹皮二錢

鉤藤鉤二錢 茶菊花三錢 薄荷七分 生甘草一錢 煮三杯。分三次服。

丸方 定風珠

肝厥

高氏四十歲

肝陽上竄。因怒即發。十餘年矣。經云。久病在絡。豈經藥可效。再

肝厥之症。亦有寒熱之不同。此證脈沈而弦細。其為寒也無疑。大凡寒厥

必死。今不死者。以其為腑厥而非臟厥也。現脇下有塊有聲。經色紫黑。議

先用溫通絡脈法。乙丑十一月十一日。

新絳紗三錢

半夏五錢

降香末三錢

川椒炒黑二錢

旋覆花包三錢

生香附三錢

桂枝尖嫩三錢

歸鬚二錢

桃仁炭三錢

煮二杯。分二次服。三帖。

額氏二十歲。除夕日亥時。先是產後受寒。痺痛。醫用桂附等極燥之品。服之

大效。醫見其效也。以為此人非此不可。用之一年有餘。不知溫燥與溫養

不同。可以治病。不可以養生。以致少陰津液被劫無餘。厥陰頭痛。單巔頂

一點痛不可忍。畏明。至於窗間有豆大微光即大叫。必室如漆黑。而後少

安。一日厥去四五次。脈弦細數。按之無力。危急已極。勉與定風珠潛陽育

陰以熄肝風。

大生地八錢

麻仁四錢

生白芍四錢

生龜板六錢

麥冬不去心四錢

生阿膠四錢

生鱉甲六錢

海參二條

生牡蠣六錢

雞子黃去渣後化入攪勻二枚

甘

草灸五錢

煮成八杯。去渣。上火煎成四杯。不時頓服。

微見小效。加鮑魚片一兩。煮成十杯。去渣。煎至五杯。服如前。正月初一日

又見效。方法如前。初二日

厥止。頭痛大減。猶畏明。方法如前。初三日

腰以上發熱。腰以下冰涼。上下渾如兩截。身左半有汗。身右半無汗。左右

渾如兩畔。自古方書未見是症。竊思古人云。琴瑟不調。必改絃而更張之。

此症當令其復厥。厥後再安則愈。照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜

即厥二三次。初四日

照前定風珠原方分量。一帖服後。厥止神安。初五日

仍照前方。初七日

方皆如前。漸不畏明。至正月二十八日外。徹去帳幔。湯藥服至二月春分

後。與專翁大生膏一料全愈。初八日

楊女四十九歲

初因肝鬱脇痛。繼而肝厥犯胃。醫者不識病名。肝着。與絡病治

法。無非滋陰補虛。或用涼藥。以致十年之久。不能吃飯。飲粥湯。止一口。食

炒米粉。止一酒杯。稍聞聲響。即瘳厥。終夜抽搐。二三日方漸平。六脈弦緊

而長。經閉二年。周身疼痛。痰飲咳嗽。終年無已時。骨瘦如柴。奄奄一息。此