

百效內科全書三

太醫院手授經驗百効內科全書卷之五

金谿龔居中應圓父編輯

潭陽劉孔敦若樸父訂刊

喘

脈滑靜而手足溫者易愈。脈浮瀦身冷難治。

喘者氣為火所鬱。而痰在肺胃之間。必非一端。如痰喘者。凡喘動
便有痰聲。火喘者。乍進乍退。得食則減。陰虛喘者。自小腹下火
起而上。氣虛喘者。呼吸急促而無痰聲。胃虛喘者。抬肩抬項。喘
而不休。大率胃中有邪火。膈上有稠痰。邪火上攻。肺氣不清。火
氣鬱遏。發而為喘。用清金降火之劑。行氣化痰之藥。喘遂止。而

火遂降。何喘之有。若以燥熱之藥治喘。以火濟火。咎將誰歸。

○喘主方

陳皮

去白

甘草

五分

白茯苓

一錢半

夏湯泡

枳壳

以八分

桔梗

去芦

八分

○右剉劑。姜煎服。

○哮喘者。加杏仁

去皮尖。麻黃節

乾葛

六分

○喘嗽遇冬則發。此寒包熱也。去半夏。白苓。加麻黃

防風。黃芩。木通。紫蘇。杏仁

各等分

○陰虛者。去半夏。加四物。貝母

去心

瓜蒌仁

去壳

黃芩

酒炒

○氣虛者。加入參

去芦蘇子

六分

五味

六粒

阿膠

一錢炒

○血虛者。加當歸。川芎。芍藥。苓。連。知

母。黃栢。○痰喘者。加黃芩。黃連。桑白皮。石羔。知母。○痰盛者。加

杏仁。天花粉。連翹。○胃虛者。加入參。白朮。黃芪

蜜炙各一錢○所用

阿膠宜分虛實，若久病發喘，必是肺虛，故用阿膠、人參、五味之類補之。若新病氣喘而實者，宜用三拗湯瀉之。方見

取痰清喘湯 治喘哮及治風寒鬱于肺，夜嗽者。

麻黃

節不去根

杏仁

皮尖不去

甘草

生或半

知母

貝母

各一錢

○右用

姜三片，水煎服，有熱加黃芩一錢。

神秘湯 治上氣喘急，不得臥者。

橘皮

桔梗

紫蘇

五味

人參

各等分

○右以咀水煎，食后服。

杏蘇飲

治上氣喘嗽，浮腫。

紫蘇葉

二兩

五味子

大腹皮

烏梅肉

肥杏仁

各五錢

廣陳皮

牙桔梗

麻黃

去節

桑白皮

炒阿膠

各七錢半

紫苑

甘草各一 ○右剉劑生薑同煎食後溫服

定喘湯 治一切喘咳

白果二十一枚去壳炒黃色 麻黃 二錢 蘇子 二錢 甘草 一錢 款冬花 三錢

杏仁 錢半 桑白皮 三錢 黃芩 錢半 半夏 三錢 ○右白水煎服

四磨飲 治七情鬱結上氣喘急者

沉香 烏藥 枳壳 枳榔各等分 ○右用白滾湯各磨湯內飲

九寶飲 治老人小兒素有喘急過寒暄不常發則連綿不已咳

嗽吼喘夜不得臥者

蘇子 沉香 薄荷 陳皮 麻黃 桂心 桑皮 杏仁

麻皮 甘草各等分 ○右咬咀姜三片烏梅一個全煎溫服

葶藶五皮湯 治上氣喘咳面目浮腫

陳皮 大伏皮 桑皮 生姜皮 茯苓皮 葶藶各等分 焙

右咬咀水煎臨臥服

石膏青黛湯 治哮喘氣急胸膈痞滿有升無降

石膏七分 可黛七分 大黃 一錢 厚朴五分 玄參七分 柴胡七分

枳實炒六分 枳實六分 貝母八分 蘇子八分 枝子七分 花粉八分

黃連九分 ○右水一鍾半姜一片煎一鍾食遠服

哮喘斷根方

天門冬去心二兩 麥門冬去心二兩 杏仁去尖心五錢 瓜蒌仁五錢

胡桃仁五錢 ○用水熬成膏碗盛又用蜜半斤真麻油四兩 先

將十兩生姜取汁同麻油熬次入蜜熬熟和煎藥膏共成一處
熬成膏將確盛貯出火氣每用白滾湯調三五茶匙空心服此
藥膏亦可治火喉痺如神

玉液丸

治風雍化痰涎利咽喉清頭目除咳嗽止煩熱

寒水石

燒令赤出火毒水飛過三十兩

半夏

姜汁浸洗淨為末一兩

白礬

枯礬十兩

○右

共為末麴糊為丸梧桐子大每服三十丸食後淡姜湯下

火候丹

治多年哮喘如神

猪肺一個

白砒

一兩

為末入肺內包煨存性要肺并藥烏金

紙炭色為度色若不黑恐毒傷人全要火候工夫不可見戲

漢石炭

二兩

生石羔

一兩

熟石羔

一兩

生礬

一兩

熟礬

一兩

壳

炒一兩

前胡

一兩

青皮

一兩

○

右共為細末，醋打麵為丸，如藥

豆大，每服二十九，火酒溫送下，或茶亦可。小兒十五丸，年久重極，三十丸立效。

附帶單方

凡諸喘不止，須用枳實、研極細末，一二錢，生薑湯調

下止之。或用蘿蔔子蒸熟，皂角燒灰等分為末，生薑煉蜜丸，如

豆大，服五七十噀化止之。

一方治老人久喘，新秋患痢，數日效逆，其脈豁大，其形瘦弱，用黃

柏炒褐色為末，粥丸，以參朮煎湯下。

又方治久喘，用皂角燒灰，蘿蔔子二兩，蒸熟為末，每服二錢，蜜水

調下。

又方治久喘用杏仁去皮尖童便浸一日一換半月取出焙乾搗爛每用枣大一丸以薄荷一葉蜜一點水煎服
一方治齁疾用陝東七枚烏梅七個俱將肉剥下入信二分百草霜一分同搗令極勻如菜豆大每服五丸至十丸量入大小用之茶清下當發時日進一服除根

哮

哮者竅隙氣散之名也此病多感於幼稚之時呼吸急促客犯鹽醋滲透氣脫津液不清鬱積成痰窒塞道路不得舒暢所以作聲也故名曰哮丹谿專主於痰多用吐法愚以施於初起之時

稟受壯者可行而愈。恐久者或不能取効也。雖用吐法暫得一
時之快。復來依然如舊矣。必須淡食薄味。行氣消痰。庶可見効。

○哮喘主方

陳皮一錢去白

甘草五分

白朮一錢

半夏製二錢

枳壳炒八分

桔梗七分

貝母一錢

海粉一錢

細辛二分

香附鹽水炒五分

○右剉姜水煎服

○如哮喘十數年不愈。宜竹瀝化痰丸。久服之奏効。方見痰門

五虎二陳湯治哮喘喘急痰盛

麻黃各一錢

杏仁各一錢

石羔二錢

陳皮一錢

半夏一錢

茯苓去皮一錢

人參八分

細茶一撮

沉香

木香各五分另水磨入

○右剉藥生薑三

片葱白三根水煎服

家珍堂

三白丸 治諸般咳嗽吼氣

白大半夏生用 白砒三錢 白礬三錢 雄黃通明三錢 巴豆仁去油

三錢○右將白礬鎔化入砒末在礬內焙乾取出搗爛再炒成砂

同前藥為細末麵糊為丸如粟米大人服十丸小兒三五丸

咳嗽茶下吼氣桑白皮湯送下

附哮喘方 凡遇哮喘用雞蛋一個畧敲壳損膜不損浸尿缸內

三四日夜取出煮熟吃神効

一法用細葉馬蹄香一握姜一小片杵碎用米飲湯調和絞去渣

溫服用鵝翎探吐

一方以訶子為末白芥子蒸熟搗丸服之

一方治哮喘過厚味痰者用蘿蔔子淘淨蒸熟晒乾為末姜汁浸蒸餅為細丸每服三十粒津下

一方用豆豉二錢白礬火煨二錢入言二分火煨為末飯為丸如菜豆大每晚茶吞三五個神効無比但宜淡食薄味切戒葷腥熱毒之物

嘔吐

附惡心

脈宜滑數微胃強而乾嘔脾強而吐食

有穀有物謂之嘔吐有穀無物謂之噦皆火氣焰上之故也有痰膈中焦食不得下而嘔吐者有氣逆而嘔吐者有寒氣鬱於胃口而嘔吐者有食下反出而嘔吐者有久病胃弱聞穀氣而嘔

藏者。內經曰。諸逆嘔酸暴注下迫皆屬於火。以降火為先。化痰為次。惡心者。欲吐不吐。欲嘔不嘔。心中兀然而煩。乃是熱氣侵胃。非心經之病。皆胃口之病也。宜以運脾和胃為主。清熱為上。熱散胃和。何惡心之有。

○嘔吐主方

陳皮一錢 茯苓一錢 半夏姜炒一錢 香附鹽水炒八分 藿香五分 甘草

三神麴炒八分 生薑五片 ○若因痰膈中焦而嘔吐者。脈當沉

滑。加貝母去心八分 枳殼炒八分 桔梗去芦八分 蒼朮淋浸炒八分 川芎八分

當探吐。以提其氣。○若因胃中有熱而嘔吐者。脈當洪實。加黃

連。梔子俱姜汁炒各八分 砂仁八分 或只加苓連去香附藿香神曲。○

若因怒氣相干而嘔吐者。脈當弦濇。加川芎芍藥。酒炒各八分。吳茱

萸。六分。川黃連。酒炒八分。倍生姜。○若因久病胃弱而嘔吐者。脈當

弦緩。加扁豆。炒八分。枳實。炒八分。山查子。一錢。紅豈。六分。白朮。四分。○若因飲

食過傷而嘔吐者。脈當氣口緊盛。加川芎。八分。大麥芽。炒八分。山

查肉。一錢。砂仁。八分。或可探吐之。○若飲酒之人。早晨作嘔者。

脈當洪滑。加乾葛。八分。吳茱萸。六分。蒼朮。酒炒八分。澤瀉。六分。○若

因夏月感暑熱作嘔者。宜用六和湯。方見霍亂門。○若因痰熱

惡心。加黃連炒枝子炒。白朮黃芩。去香附。藿香神麴。○若時常

惡心。口吐清水。心胃作痛。食則止。飢則痛。此胃中有虫。去香附

藿香。加苦練根史君子煎服。○若因胃虛而嘔吐惡心者。去香

附藿香神麴加人參白朮生姜汁○若胃熱嘔吐煩渴去香附

藿香神麴加黃連山枝竹茹人參白芍麥門冬烏梅炒米○若

胃寒嘔吐清水冷涎去香附神麴加人參白朮乾姜丁香砂仁

官桂烏梅○若嘔吐發熱去藿香神麴加柴胡黃芩人參竹茹

生薑橘皮湯 治乾嘔噦或致手足厥冷

橘皮四兩生薑半斤○右咬咀水七盞煮至三盞去滓逐旋服

藿香安胃散 治胃氣虛弱不能飲食時嘔吐惡心者

藿香 人參 陳皮 各一丁香 五分○右剉作一服水一盞半

煎至七分服

四君佐使湯 治久病胃弱聞穀氣則惡心而嘔聞藥氣則嘔者

人參

去芦 白朮 炒

茯苓

各一錢

甘草

二分

橘紅

藿香

各五分

砂仁

四分 神麴 炒

陳倉米

一撮

○右取順流水

二盞

加伏龍

肝

研細攪渾

候澄清去滓

加姜末煎稍冷服遂納而不吐

附嘔吐單方

凡遇嘔吐一時無藥用雞卵一枚以滾水浸候內

熱吞下即止如不止再煮糖心雞卵一枚加姜汁一二匙和勻

服又寒入胃嘔吐不止者用生薑韭菜搗汁開熱酒服即止若

吐虫而嘔者只用黑鉛炒成灰与枳榔末等分米飲調下如神

一方治因暑因熱而嘔吐者削竹上青皮一團藍靛一匙水一鍾

煎冷服

膈噎翻胃

氣虛脈緩而無力。血虛脈數而無力。痰脈沉伏而大。氣滯脈沉而滿。

膈噎翻胃之症。病源不一。有因思慮過度而動脾火者。有因忿怒太甚而動肝火者。有因久食煎炒而生胃火者。有因淫慾忘逐而起腎火者。蓋火氣炎上。薰蒸津液成痰。初則痰火未結。咽膈乾燥。飲食不滑順利。為膈為噎。久則痰火已結于胃之上脘。飲食雖進。停滯膈間。須臾而出。謂之嘔吐。至於胃之下脘不開。飲食雖進。良久而出。謂之反胃。治宜各從其類而施。切不可妄用香燥之藥。及厚滋味。蓋香能散氣。燥能耗血。厚滋味能助火。而生痰也。慎之慎之。