

世醫得効方

九



卷之十三

風科

風狀論雜

中風惡證

中風要說

虛證

熱證

通治

癰風

瘰癧風

歷節風

癰風

卷之十四

產科兼婦人雜病科

濟陰論

護胎

保產

產後

下乳汁

世醫得效方



風科得效方卷第十三

雷河內庫

建寧路官醫提領陳

志

刊行

南豐州醫學教授危

亦林

編集

江西等處官醫副提舉余

賜山

校正

風科

論雜風狀

中風大法有四一曰偏枯二曰風痺三曰風懿四曰風痺

夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟且速治之

偏枯者半身不遂肌肉偏不用而痛言不變智不亂病在

分腠之間溫卧取汗益其不足損其有餘乃可復也



風痲者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則可治甚

即不能言不可治

知蒙切

風懿者奄忽不知入咽中室窒窒然舌強不能言病在臟

病先入陰後入陽治之先補於陰後瀉於陽發其汗身轉

輒者生汗不出身直者七日死

風痺濕痺周痺筋痺脉痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有證候

中風照證

口開者心氣閉絕也遺尿者腎氣閉絕也手散者脾氣閉

絕眼合者肝氣閉絕鼻鼾者肺氣閉絕備此五證尤不可

治五證中絕是一證猶當審餘證以救療蓋以初中則服

合者多痰上則鼻鼾者亦多惟遺尿口開俱見爲惡心爲
五臟主君腎爲一身根本誠不可閉絕也

中風要說

凡中風脈無不大者非熱也是風脈也中風有冷熱陽病
則熱陰病則冷冷則用溫風藥熱則用涼風藥不可一槩
用也凡中風皆不可吐出涎人骨節中皆有涎所以轉動
滑利中風則涎上潮咽喉中痰響以簾壓下涎再歸骨節
可也不可吐出者臨涎時問快意非久枯了手足不可不
戒小兒驚風亦不可吐出涎其患與大人同方其發搐搦
之時不可捉住手足捉住則涎不歸手足當不隨從寬拘
之可也

至室丹療
中急風不語
中惡氣絕中
諸物各脫風
中熱 毒瘡
陽毒山嵐
瘴氣毒瘡
毒水毒火
血暈口鼻
出惡氣
心煩燥氣
喘逆難
悶難死
下已諸疾
並用童子小
便一盒
自然汗三五
滴入於小便
內過化
下三四至

中風須大作湯劑方有成效若風歸手足名曰小中不宜
用正風藥深冷但用平和湯劑雖不能為全人亦可留連
歲月戒之戒之

虛證

通氣驅風湯治男子婦人血氣虛弱虛風攻注肌腠顛掉
肩臂刺痛手足拳攣口眼喎斜半身不遂頭目旋暈痰涎
壅盛語言蹇澀行步艱難心忪氣短寒風所湊四肢拘急
鼻塞聲重頭疼脾胃不和心腹刺痛胸膈不快少力多困
精神不爽不思飲食嘔吐惡心霍亂吐瀉胎前產後但是
氣虛百病皆可服之

天台烏藥

川白芷

川芎



五神效又

癰腫積聚

伏熱嘔吐

氣逆心大

風秘利便

惺惺目昏

眠睡不安

口乾燥渴

狂語並瘧

生烏犀屑

朱砂屑

雄黃珠珀

琥珀屑

牛黃屑

射干龍腦

各二分

銀箔名

杜草

陳皮

白木

麻黃

枳殼

人參

古為末每服三錢紫蘇木煎湯調下去白木加乾薑

僵蚕名烏藥順氣散卒中風氣不順手足偏枯流注經

絡四肢骨節疼痛或身如板片舉動不得筋脉拘攣先

宜多服得手足間微汗為妙又脚氣步履艱難脚膝軟

弱婦人血風老人冷氣上攻胸臆兩脅刺痛咳嗽心腹

膨脹為散每服四錢生薑三片紅棗二枚煎服或開水

身軀不能屈伸溫酒調服遍身搔痒抓成瘡薄苛煎服

常服疎風通滯氣調榮衛進飲食大有神效一方每

加天麻一兩沉香五錢亦效並不拘時候

聖藥



安惠居
為未元在酒
挽後過溪
去定約得淨
教而後文後
石特生庫戒
為細末入食
藥研勻將安
急香膏重湯
度此成後人
諸藥中和
搜成劑盛
不津器中
並旋口如桐
子大用入湯
化下三四至五
回又煮小兒諸
病急驚心驚

治中風不省人事漸醒半身不遂口眼喎斜
手足顫掉語言蹇澀肢體痠痺神情昏亂頭目眩重筋脈
拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側亦治脚氣緩弱久服
之瘥有病風人常服不可缺以防暗証

麻黃去根

人參

黃芩

白芍藥

川芎

甘草

杏仁去皮

防己

桂枝各貢兩

防風去根

附子炮去皮

防己

右劉散每服四錢水一盞半生薑三片棗二枚煎不拘
時候溫服取汗隨入虛實與所中輕重也筋急拘攣
語遲膝弦加意改仁治筋急加人參黃耆為藥以避
中寒服后稍輕并加當歸全愈脚氣痠弱不能轉側

卒中客作
 不得眠睡
 煩躁不安
 指極每三處
 脫服三四次
 湯下
 瀉胃同治諸
 臥手足不隨
 神志昏憒
 語言蹇澀
 眼喎斜視
 肘臂不舉
 骨節煩痛
 頭旋眩暈
 恍惚不寧
 健忘怔忡
 痰涎壅

心神恍惚加扶神遠志。骨節煩疼有熱者去附子倍
 加芍藥。煩燥大便澀去附子倍芍藥加竹瀝。臟寒
 大便自利去黃芩加白朮附子。骨肉冷痛者加肉桂
 附子煩燥多驚者加犀角。嘔逆腹脹人參半下。自
 汗去麻黃。語言蹇澀手足顫掉石菖蒲竹瀝。大便
 秘胸中不快枳殼大黃。氣塞不通沉香。有痰南星
 數片。發渴麥門冬乾葛瓜根。身疼秦艽。上氣浮
 腫喘急防風桑白皮以上所加各一两小兒慢驚煎取
 藥汁一盞入生薑汁再煎一二沸日三服夜二服夏間
 又有熱者減桂一半春加麻黃一两夏加黃芩一两秋
 加當歸四兩冬加附子半兩風虛加川芎一两一方加



滯及皮膚
 頑厚守痺
 不仁
 防風
 白龍腦
 乳香
 羚羊角
 白毒
 松樹皮
 沉香
 丁香
 牛黃
 麻黃
 雄黃
 水香
 木香

水香縮砂獨活各一兩川烏炮三分亦效牙關緊用南
 星末半錢龍腦一字頻擦牙上令熱即自開

治諸虛風涎潮痰厥神昏頭暈語澁手足搐搦
 半身不遂及歷節風痛筋脉挛急

川芎

半夏

防風

名老西

甘草

半兩

全蝎

去毒

附子

生

川烏

去皮脂

木香

南星

文半兩

右劉散每服四分水一盞半生薑十片煎溫服不拘時
 候氣虛加沉香氣逆緊蘇合香丸不利有痰加半夏人
 參頭暈頭疼加大麻半兩全蝎二錢煎熟入麝香熱風
 左癱右瘓口眼喎斜口噤不能言手足頑麻於本方中



各二兩

茯苓

白附子

厚朴

芍藥

真珠

三分

乾蟬

烏頭

白蛇

三三

琥珀

白豆蔻

金箔

去附子川烏

治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲

痰氣上壅六脈沉伏或浮盛兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈

川烏

天南星

附子

各一兩

木香

半兩

右劉散每服三大錢水一盞半生薑七片煎稍熟服

感風濕卒中五積散合和服不省人事細辛阜角少

許為末或只用半夏為末以蘆管吹入鼻中俟噴嚏少

蘇然後進藥痰涎壅盛每服加全蝎五枚仍服養正

丹每服三七粒鎮墜之以其用硫黃黑錫皆有利益則

痰涎隨去矣因氣中者以沸湯化蘇合香圓一粒乘熱

灌下仍用前藥汁濃麝沉香汁少許同煎一沸服之



右為個末入
研藥令勻
煉蜜搜和
同如雞頭
大每服九
細嚼溫酒
下荆芥
茶下亦得
如至三九
如破傷
中風者強
手搖口緊
發潮即以此
熱豆淋酒
化破三九
幹口而灌
下少時再

四身冷厥用靈砂丹歲丹二七粒兼服
三建湯治男子婦人
中風虛極六脈沉伏舌強不能
言語痰涎併多精神如癡手足偏廢不能舉動此等證狀
不可攻風只宜扶虛

天雄

附子

川烏並生去皮
各一兩

木香

不見火

沉香

農磨水
熟地入

石剉散每服四分水二盞生薑十片煎七分空心溫服

金匱治一切風疾氣血俱虛陰陽偏廢卒暴中風僵

臥昏塞涎潮搐搦不省人事失音舌強手足攣曳口眼喎

斜或難痰偏枯半身不遂語言蹇澀舉止錯亂四肢麻痺

汗口而灌久治顛癇倒卧目瞤不開涎盛作聲或角弓反張目睛直

服汗出乃愈

龍虎丹治

婦人新得

急慢風

逐手筋

風攻

瘡疥

瘡疥

瘡疥

瘡疥

瘡疥

瘡疥

瘡疥

視口禁閉絕牙關緊急并治風搏筋絞牙齒疼痛耳作
蟬鳴皮膚攢搐頻欠喜睡項強拘急不能回顧及昏腦風
虛脚膝疼痛步履艱難偏風流注一邊屈伸不得無問新
久並能治之

川烏頭

炮去

大附子

炮去

白附子

炮各

白僵蚕

炒去

白茯苓

去刺

五靈脂

去石

白礬石

研各

沒藥

研各

朱砂

研

細墨

磨汁

麝香

研

各真銀半

右為末用墨汁和藥每兩作六圓窰乾金箔為衣每服

一圓生薑半兩和皮擦取自然汁化盡為度用無灰酒

半盞溫熱調前藥溫服量病人酒性多少更飲酒一二

升投之以助藥力次用衣被蓋覆便卧汗出為效勢輕

赤白肝風
 眼瞤偏風
 刺黃凡肢
 內後脾凡
 多吐逆酒
 行步不前
 凡鼻塞項
 膝凡令人
 睡氣凡由
 與行腎凡
 內輝鳴陰
 溫痺
 黑牽牛
 藿香
 天麻 牛膝
 當歸浸切焙
 微炒

每服半圓不以時候如有風疾常服尤佳補益五臟固
 密真元通流關節祛逐風邪壯筋續骨神效

重寶湯 治風補虛順榮衛通血脈并腰腳膝沉重緩弱無
 力及治手足風累驗

續斷

杜仲去食皮 防風

牛膝酒浸焙

華陰細辛

白茯苓

人參

辣桂去麋皮

當歸

切焙

甘草

炙

川芎

獨活

秦艽

去土

熟地黃

各半兩

酒

右剉散每服五錢水二盞而過空腹熱服若左臂不遂
 得痊愈后而手指不便無力試諸藥不效者不半劑可
 愈血虛躄弱加鹿茸肉蓯蓉各半兩

黃芩 錦沙
 天竺黃 青
 細辛 洗
 半夏 洗
 附子 炮去皮
 何首烏 去皮
 羌活 焙
 獨活 焙
 川芎 洗
 桂枝 生各
 茯苓 二兩
 寒水石 通
 石膏 碎
 白芍 洗
 甘草 炙

回春湯

治一切諸虛不足風疾血氣交攻凝滯脈絡

拘急攣拳氣不升降癱瘓痲痺痰涎壅盛脾胃不和飲食
 不進此藥去風和氣活血大有神效凡治風不可專用風
 藥攻之愈急則愈甚服此輕者一月重者二三月自然愈
 矣且無再作夫血氣和平榮衛調順則風證不攻而自去

附子 炮

人參

麻黃 去節

黃芩

防己

香附子 去毛

杏仁 去皮

川芎

當歸

各壹兩

茯神 兩半

陳皮

防風 各一兩

白芍藥

伍兩

沉香

川烏 炮

各半兩

半夏 兩半

桂枝

兩

白朮 貳兩

天台烏藥 平

兩

乾姜 乙兩

黃耆 參兩

甘草

熟地黃 各壹兩

生乾地黃 壹兩



白芷生

菊花

川鳥

白殭蚕

猶不少生冬

牙
石
不
研

木香生

水銀
慢火

子

雄黃

厂香
乙研

屯
屯
屯

力

白草

天

卷一

三錢水一盞半薑三片棗一枚煎空心通口服常服效

眞珠母

參分
研細

當歸

—

熟地

與兩名書

人參

1

酸棗仁

1

柏子仁

各壹

犀角

人

獲神

1

沉香

龍齒

冬半外

✓

1

1

1

銀器薄苛煎湯食后吞下

銀器
恐行
錢

御風膏
治口眼
斜

右用苧麻子去殼碾碎塗在手心以一孟子置在手心

草麻子上用熱水置盂中口正則急取盂子左癰冷者



各三兩
 烏蛇 酒洗
 虎骨 八兩
 龜板 研末
 右為藥煉密
 為劑每服壹
 兩如雞子大
 用酒可下
 下日連壹服
 重即兩服產
 后驚風吐瀉
 見物朱砂酒
 磨下產后身
 多產腫無腫
 理皆沉身如針
 刺髮隨梳落
 面黃心逆並
 當服下日
 進為服若

手心右癰塗在手心口眼纔正急洗去藥只隨症變左

右貼亦可又治產難者爛研塗兩脚心纔生下便洗去

又用桂心酒煮取汁故紙蘸貼患處左喘貼右右喘貼

左即正

又括蔓攪爛絞取汁和大麥麴搜作餅灸令熱熨如正

便止不令太過

又大鱸魚一條以針刺頭上血左斜塗在右右斜塗左以

平正即洗去鱸放之

治諸般風痺手足疼痛步履艱難服膝緩弱久服

身輕壯健行動快捷大和氣血通行榮衛補虛排邪有益

真氣

