

新刊仁齋直指方論

四



新編仁齋直指方論卷之二十二



癰疽

附

乳癰 疔瘡 癰瘰 癰瘰 漏瘡



癰疽論

癰疽五發發腦發鬚發眉發頤發背是也人之一身血氣周流而無間稍有壅聚莫不隨所至而發見焉又豈特五者而已哉俗以**癰疽**附於癰疽之列以是為五豈知癰與疽不過癰疽之一物古書所載僅有所謂癰疽則癰亦同出而異名也若癰若疽前未之聞合是以為五發其可乎癰者壅也疽者沮也血氣壅沮寒熱不散陰滯於陽則發癰陽滯於陰則發疽而所發無定處也蓋衣服厚煖則表易招寒滋味過多則裏易生熱感受日久熱勝於寒寒化為熱六腑蘊熱騰出於膚肉之間其發暴盛腫而光軟皮薄以澤侵展廣大者為癰其患浮淺不傷筋骨此可治也五臟蘊熱攻炊乎肌骨之內其發傳蓄狀如痞

癰皮厚以堅淡白焦枯者為疽其患沉深傷筋蝕骨此不可治也凡發熱憎寒頭痛惡心筋節拘牽氣急悶悶或病渴經年是皆欲發癰疽之證發於喉舌頭面腦項肩背臂腹四肢大節女子妬乳數者為險其他為緩腫高而軟者發於血脈腫下而堅者發於筋骨肉皮色不變者發於骨髓近骨者多冷近虛者多熱近骨久不愈則化血成虫近虛久不愈則傳氣成漏成虫則多癢少痛或先癢後痛成漏則多痛少癢或不痛不癢若形狀腫大按而後痛者其膿深小按即痛者其膿淺按之軟而即復者有膿按之強而不復者無膿瘡淺者欲在厚處瘡深者欲在薄處腫起堅硬膿稠者為實腫下軟慢膿稀者為虛有實熱者易療虛寒而邪熱多者難療癰疽已決去其膿而煩疼尚未全退其脈洪麗者又難為力要之癰疽脈來帶澁但得和緩為平若洪麗則銳毒不收鮮有濟也然則治療之法將何如曰血得溫則流行氣得溫則和緩服餌此傳藥用和平初覺則散腫內

消已潰則排膿斂毒膿盡則去腐內塞惡肉盡則生肌傳痂此
定則也瘡家臟腑生熱熱蒸其血血敗則腐肉肉腐則成膿當
膿血凝聚之時所賴朝夕洗滌以外舒其毒氣纔覺有膿即煖
醋醃熨而破之纔見敗肉即棄藥湯射而去之稍或稽延不反
掌而侵蝕筋骨是必腐敗盡除庶幾真氣得復好肉得生耳而
况癰疽險惡古人以虎口鳩毒喻之一芽初萌炎熨宜散急作
主張殆有甚於拯溺救焚之不可緩也奈何人多玩忽在再成
形潰裂四出往往不救伊誰咎歟大抵癰疽自內發外最不可
服冷藥亦不可傳冷藥但以溫和調治使毒氣自內發出可也
若服冷藥則必至傷動臟腑若傳冷藥則逼令毒氣內行內氣
有虧毒從外入衝心煩燥嘔吃嗽喘以至泄瀉此為內壞殺人
無疑或不隨順療理妄以急瀝已劑行之斂口太速毒氣舒泄
未盡必於其傍復發大疽活血排膿斂毒去腐生新收口人所
共知也孰知諸痛癢瘡皆屬於心心主血脈心通諸竅如

伏神（志）等輩又當佐助於其間抑使病人不得
憂驚嗔怒勞精疲神有觸於心尤關利害五臟六腑所包者一
膜耳人有患疽鑿療兩月新肉已平夜寐中幹者攻擊疾呼驚
觸入心新肉開裂鑿者謂其肉膜已破而後肉開神仙莫救果
非心乎於此又能精加飲食使胃氣有所充和劑救裏使內氣
得所養有諸中形諸外理勢必然切戒癰疽成形以後不得通
利大便上鑿宣毒蓋用（車）（山）（甘）（草）（紫）（草）等類以（乳）（香）（沒）（藥）
佐之若（大）（黃）則不敢輕用也如其有熱即以（赤）（伏）（苓）（麥）（門）（冬）（桑）
（白）（皮）（燈）（心）（草）利其熱於小便之中或以（孟）（勺）（黑）（豆）入（紫）（蘇）（生）（薑）
如豆湯法亦能疏導若夫瘡口熱熱而燥疼却暫用（升）（麻）（山）（豆）
（根）（厚）（黃）（藥）煎湯入（醋）為之熏洗或瘡口斂平尚留一竅經時汁
水不乾者其中必有活虫朽骨當以藥消蝕而盡除之婦人患
此適值月候不行尤當急為調血所謂大寒大熱大渴大吐大
痛狂言無事喜笑鼻衄唇唇赤者不收膿膏血黯膿血腥臭血



流不止小便如淋結硬過月方發硬如石榴不破多日不腫不
疼昏睡不知痛癢患熱恣意取涼沉重痿弱氣乏有項運掉不
心病臉如脂垓貼藥鮮血常流膿如赤白下痢眼小竄視而
白睛青黑膿血大泄而泄腫且堅聲嘶色脫而肢體腫浮氣短
喘促而恍惚嗜腫煩燥時嗽而腹瀉渴甚飲食不下而服藥即
嘔與夫吃逆嗽喘大便泄瀉皆惡證也抑猶有內外之別焉疽
初發來一粒如麻豆許身體即熱患處亦熱腫大而高多生疼
痛破後肉色紅紫此為外發縱使極大用藥有條百無一失自
發疽以來不問小大身體無熱但覺倦怠瘡亦不熱數日之間
漸漸開闊不腫不高不嫩不痛低陷而壞爛肉色紫黑此為內
發廬扁無如之何蓋其未發以前臟腑已先潰爛矣此又善惡
之衡鑑云雖然癰疽治法已條列於前矣究其病源有風有氣
有食有藥毒有勞損而所受不同焉風則多癢氣則多痛食則
發寒熱藥毒則堅硬勞損則瘦弱此外證之為可驗也風氣食

三種易療藥毒勞損二者難醫大槩風毒當驅風氣毒當調氣
食毒當消積勞損當補虛藥毒則**黑豆**利之**甘草****生薑**解之
升砂則**辛血****桑豆**可以為佐登山到頂酌水問源故推明本始
以為瘍醫一髮之助

癰疽證治

灸法癰疽初發小點一二日間急以大蒜頭橫切如錢貼其中
心頓小艾柱灸之五壯而止若形狀稍大以黃稭紙蘸酒全貼
認先乾處為筋脚於先乾處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯
而止**又法**屈指從四圍尋按遇痛處是根就此重按深入自覺
輕快即此灸之更於別處尋灸若或大腫即搗蒜為餅焙乾蘸
法醋炙熱更換頻覆或以熨斗火於蒜餅上熨之更換熱餅頻
熨如覺患處走散即以綿帛覆蓋勿令氣泄俟少間傳藥凡癰
疽長大如龜之形且看頭向上下先灸其前兩脚次灸其尾或
紅筋走緊而長從盡處灸之頻留頭并後兩脚勿灸若盡灸之

不惟火氣壅聚彼毒無所走散又攸入裏也或辨認不明以

白芷三分 漢椒 桑白皮各青 連根葱白拾片

右取新水煎湯入酸醋半盞淋洗少頃其筋自現可以辨認

頭尾

速消方 癰疽發背已發未結已結未潰急以黃明牛皮膠新水

溶令稀稠得所攤在抄紙上貼之良久以軟布二條於醋中

煮熱互換漉出罨在膠紙上蒸熨常要熱氣相接若患處癢乃

藥氣透須忍癢頻蒸熨直至消散或破而膿出將盡即以貫衆

煎湯洗去膠紙用退腫散蠟毒散或水膏等類摻傳或使用按

毒散 隨意急服萬金一醉膏或內消散乳粉托裏散破後以洗

按毒散 癰疽腫結通用能散能潰

南星上等大白者 草烏頭

白芷各半兩 木鱉子仁壹箇研

右細末分兩次法醋入蜜調傳紗貼之

諸毒散

治癰疽腫毒未結則散已結則潰去風排膿

大南星 壹兩

貝母 叁分

白芷

赤小豆

直僵蚕 各半兩

雄黃 貳錢研

右細末初用醋調傳後用蜜水調傳

癰疽宣毒方

諸癰疽已破未破通用

瓜蒌

壹箇去皮剉細

紫車蛾殼

壹箇黃泥和塗土傳

皂角刺

甘草

各貳錢

乳香

輕粉

各半錢

右細末先用老酒貳碗煎瓜蒌瀝清取壹大碗五更煖瓜蒌

酒調上項藥末空心服大便自下惡物如魚涎狀

宣毒膏

瓜蒌

去皮

老雞鬚

壹倍半

右剉酒水等分同煎少頃入

入

乳香

末少許忌意服



癰疽

癰疽

黑牽牛 去皮

右取仁入猪腎中線札濕紙包熟火灰內煨香熟候冷溫酒嚼下

宣毒方

斑猫去殼只好大棗煮後去核包裏斑猫入猪腎中線札

右空心喫猪腎溫酒下

又方 宣散癰疽腫毒

老翁鬚草亦名金銀花忍冬草葉終藤水搗騰其藤左

右花與葉生搗煖酒調服無花只用葉酒和葉烘煖可傳瘡

癰疽托毒排膿治五毒附骨在臟腑裏托出毒氣止

痛內消

蜂房 壹兩

蛇退

穿山甲

油髮並燒黃生有

右為末每服貳錢入乳香末半錢煖酒調下

皂莢散 托毒排膿

川芎 半兩

甘草 壹兩

乳香 壹分

皂莢刺 燒毒生肉

右末每貳錢溫酒調下

膏藥托裏排膿生肌

川芎

當歸

白芍藥 炒

木香

白芷

茯苓 各半兩

人參

辣桂

丁香

甘草 各壹分

右末每貳錢食前米湯調下

癰疽毒入臟腑嘔吐惡食

甘草 半兩

丁香 叁錢半

右剉每服貳錢水煎入麝少許溫服

癰疽腫毒傳藥收腫斂毒排膿

滑蘭根皮 末

紫貝章 末

右二味同搗酒調為膏傳或密水調亦好隨口把毒



血或單用紫貝草亦效

妙勝散收腫欬毒排膿

落地茄花去心

黃蜀葵花去心并蒂日

右為末并水稀調雞羽掃放患處乾則再傳或收毒平散或破潰出膿神效如瘡口開用末摻亦效毒不急澁

消腫散聲疽通用

滑蘭皮

大南星

赤小豆

白芷

薑黃

各壹分白及半分

右細末酒調傳或蜜水醋同調傳

將毒通腫通用

木鱉子

去油

大南星

半夏生

赤小豆

白芷

草烏

陳皮尖

右細末硬則法醋調傳熱燥則蜜水調傳

川烏散腫初發急用

川烏

蜈蚣窠土等分

右細末法醋調傳未結則散已結則潰

疔明沙潰腫排膿

夜明砂

壹兩

辣桂

半兩

乳香

壹分

右細末入乾砂糖半兩研和用井水調膏傳

乳豆治癰疽腫節疼痛入門先用此止痛

綠豆

壹兩

乳香

壹分

竹葉麝香等分

右末酒調傳傘紙貼乾則再傳續後却換消腫排膿藥

星烏治癰疽已結未作穴潰

大南星

草烏頭

辣桂

等分

右末用酒或醋調傳軟白紙貼未穴再用

欬毒傳四圍收毒

南星

赤小豆

白及

等分

右末井水調傳四圍軟帛貼上



癰疽

祖腫毒通用

大南星圓白 半夏生 赤小豆

五倍子 白芷 貝母各貳錢半

右細末蜜醋調傳

黃明牛皮膠以長流水半 號丹壹兩

右候冷收入磁合以雞羽攤於磨上留口如未破傳腫自消

治癰疽腫毒惡瘡排膿止痛收縮筋脚

乳香研 沒藥各壹分 輕粉壹錢

麝半錢 黃蠟貳錢 草麻子仁壹兩

右搗研極細成膏以撫紙拆薄攤藥留眼貼之日二換或純

用

治癰疽發背腫毒

透明硫黃為細末 蕎麥麪各貳兩



右用井花水調和作餅焙乾收下要得碗黃性
和用時再末之入乳香少許井水調厚傳瘡上如乾以雞羽蘸新水潤之
如此至瘡愈方歇痛則不痛不痛則痛神驗

蜀葵 治癰疽腫毒惡瘡

黃蜀葵花

右用鹽摻收入磁器密封經年不壞患處傳之自平自潰

藥 炒碎入宣毒藥中尤驗

皂角 癰疽腫結通用

不蛀皂角

漏尺者無毒去其核

右以法醋煮爛研膏傳之自消

四虎散 治發疽腫硬厚如牛皮按之方痛

大南星

真烏頭

半夏生

狼毒等分

右細末醋蜜調傳留頭出毒氣

癰疽 癰疽發背排膿飲毒

大南星

三分

白及

白芷

赤小豆

半夏

各半兩

木鱉子仁

去油

乳香

各半兩

雄黃

青錢

右細末井水入蜜調傳紗貼

治癰疽腫毒等患

鹽甘石

各半兩

一分細

大南星

半夏

各半兩

五倍子

赤小豆

片薑黃

直僵蚕

貝母

白及

各肆錢

乳香

青錢半

右細末未破者酸醋調傳已潰者清蜜調傳半乾濕只摻若

紅腫多汁

牛黃

研汁調傳仍煎

黃芩

桑白皮湯淋

辟香散

癰疽已結而頭不破用此

直雀屎

青錢

斑猫

去頭足翅

腦

麝

隨意

右細末法醋調少許點在有頭處立破急用前黃連湯洗去

湧泉膏

治癰疽軟而瘡頭不破或已破而瘡頭腫結無膿

癰疽

斑猫 去面足刺瘡

右為末揉和蒜膏似小豆許點在膏藥中佳瘡口處貼之少頃膿出即去藥或用綠藥或白雀屎少許用蠟藥調壹點傳瘡頭軟處亦破須四圍塗藥護之

松精散

治癰疽瘡口小而硬貼膏藥膿不出是為風毒所勝用

赤足蜈蚣

去頭足

全蝎

參枚實全尾者並生用

木香

壹錢

右細末每用壹字摻於膏藥錢上佳瘡口貼如瘡口開闊不硬勿用若是風邪所搏即煎連根葱白五莖次入白芷末半兩少頃憑清淋洗明日又洗仍服不誤

護肌膏

收暈斂毒

大南星

貳兩

明白礬

並生用

白及

雄黃

右細末每半兩二錢取汁調傳瘡暈外搗肉上自外圍而

