

重刊孫真人備急千金要方

二十五



重刊孫真人備急千金要方卷之二十二 疔漏

九漏第一

癰疽附

方八十一首

論一首

灸法十六首

論曰夫九漏之為病比寒熱癰疽在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣也根留於脈而不去者也鼠瘻之本皆根在於臟其末上出於頸腋之下其浮於脈中而未著於肌肉而外為膿血者易去去之奈何曰請從其末引其本可使衰去而絕其寒熱審按其道以手之徐往來以去之其小如麥者一刺知二刺已決其死生奈何曰反其針視其中有赤脈從上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見三脈半一歲半死見三脈二歲死亦脈不下貫瞳子可治

凡項邊腋下先作癰瘻者欲作漏也宜禁五辛酒麪及諸

食凡漏有似石癰累累然作癰子有核在兩頸及腋下
痛不熱治者皆練石散傳其外內服五香連翹湯下之
瘻者治如癰法諸漏結核未破者火針針使著核結中
瘻者何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏三曰螻蛄漏四
漏五曰蚘蛄漏六曰螻蛄漏七曰浮沮漏八曰瘰癧
三轉就漏

六因因治狼漏始發於頸腫無頭有根起於缺盆之
連延耳根腫大此得之憂恚氣上不得下其根在肝作
空青土之商陸為之佐方

空青

蝟腦各貳分

蝟肝壹具乾

芎藭半分

獨活

黃芩

鼈甲

婦人葶藶

商陸

斑蝥

乾薑

地膽

當歸

茴香

礬石

各五分 蜀椒 各四分

右十六味治下篩酒下方寸匕日三服十五日服之

狸骨知母散

治鼠漏如發於頸無頭尾如癰鼠使人寒熱

脫肉此得之食有鼠毒不去其根在胃狸骨主之知母為之佐方

狸骨

知母

桂心

鯪鯉甲

山龜殼

甘草

雄黃

乾薑

各五分

右八味治下篩飲服方寸匕日三仍以蜜和內瘡中與

不瘡先灸作瘡後以藥傳之已作瘡不用灸

地黃膏

治鼠漏瘡瘻復發及不愈出膿血不止方

以不中水猪脂吹咀生地黃內脂中令脂與地黃足相淹和煎六七沸其瘻先用桑灰汁洗去惡汁次以

地黃膏傳上日一易

方鼠漏方

得蛇虺所吞鼠燒末服方寸匕日再不過三服此大

驗但難遇耳并傳瘡中佳

又方

死鼠青鼠中

亂髮如雞子大壹枚

石二味以臘日猪脂煎之令消盡膏成分作二分一分

稍稍塗瘡一分稍稍酒服之瘡鼠子當從瘡中出良

疔子治瘰癧

治蠅蛄漏始發於頸項狀如腫此得之食瓜

菓實毒不去其根在大腸疔子主之桔梗為之佐方

疔子

龍骨各半

附子壹兩蜀椒伯粒桂心

桔梗

乾薑

礬石

獨活

芍藥各壹分

右十味為末以棗二十枚合搗醋漿和丸如大豆

見前



下五丸加至十丸

雄黃解毒散治蜂漏始發於頸瘰癧三四處俱相連以酒
此得之飲流水中有蜂毒不去其根在脾雄黃主之黃芩
為之佐

雄黃

黃芩

各壹兩 蜂房壹員

鼈甲

茵香

吳茱萸

乾薑

各半兩

蜀椒

貳伯粒

石八味治下篩傳瘡口上日一度十日止

礬石防風散

治蚰蟬漏始發於頸初得如傷寒此得之食

中有蚰蟬毒不去其根在腎礬石主之防風為之佐

礬石

防風

知母

雌黃

桃白皮

乾地黄

獨活

青黛

斑猫

白芷

松脂

一作柏脂

芍藥

海藻

當歸

各壹分

白木

蠟皮各肆分 蜀椒 伯耆

右十七味治下篩飲服一錢匕日三

卷石白木散

治蟻螬漏始發於頸下無頭尾如棗核塊累

移在皮中使人寒熱心滿此得之因喜怒哭泣其根在心

卷石主之白木為之佐

卷石

白木

空青

當歸各員分

細辛

壹兩

蠟皮

斑猫

枸杞

地膽

各員分

乾烏腦

參朮二員許

右十味治下篩以酢漿服方寸匕日二病在上側輪卧

在下高枕卧使藥流下

地膽甘草散

治浮沮漏始發於頸如兩指使人寒熱欲臥

此得之因思慮憂適其根在膽地膽主之甘草為之佐

地膽

雄黃

乾薑

續斷

石決明

菴藨根

龍膽各參分

細辛貳分

大黃半分

甘草壹分

右十味治下篩傳瘡日四五度

古人云錄驗無雄黃有硫黃

雄黃方藥圖

治瘰癧滿始發於頸有根初苦痛令人寒熱

此得之因新沐濕結髮汗流於頸所致其根空腎雌黃主之方藥為之佐

雌黃

芍藥

茯苓

續斷

乾地黃

空青

礬石

乾薑

桔梗

蜀椒

恒山

虎腎

狸肉

烏腦

斑猫

礬石

各壹分

附子壹兩

右十七味為末蜜丸如大豆酒服十九日一

瘰癧口正圖治轉脉漏始發於頸灌灌脉轉苦驚惕身振



太熱此得之因驚臥失枕其根在小腸作心斑猫主之

正屬之佐

寒痛

白芷

經膏

大黃

各分

升麻

鍾乳

甘草

防風

地膽

續斷

麝香

麝香

各分

當歸

桂心

白木

麥門冬

各分

當歸

桂心

右十七味為末蜜丸如大豆酒服十九日三勿食菜

旁室百日

外臺無大黃在心上麥門冬白木鍾乳

治九漏方

空青

商陸

知母

狸骨

桔梗

防風

荏子

礬石

黃芩

白芷

芍藥

甘草

雌雄

白木

麝香

九漏

地膽

斑蝥

雄黃

各等分

右十八味為末蜜丸如大豆以酥服二九三十日知四
十日愈六十日平復百日內慎房室一方為散醋服壹

方 蝮皮

半枚

鯨鯉甲

樗雞

各肆枚

蜥蜴

蜈蚣

各壹枚

蜀椒

附子

當歸

蜂房

地榆

桂心

通草

乾漆

牡丹

薏苡人

茯苓子

漏蘆

一作龍膽

龍膽

一作龍骨

上瓜

各叁分

斑蝥

蛇牀子

苦參

大黃

雄黃

蛇蛻皮

蘭

細辛

各壹分

鶴骨

陸分

右二十八味治下篩酒服五分匕以知為度日二服

方 斑蝥

各壹分

蝮皮

真珠

雄黃

各壹分

右四味治下篩酒服半錢匕日三

又方末成鍊松脂填瘡孔令滿日三四度七日瘡有神

又方斑猫貳柒枝雄黃桂心犀角各壹兩

右四味治下篩酒服一錢匕日再服病從小便出

又方馬齒莧陰乾臘月燭燼各等分

右一味為末以臘月猪脂和其瘡先以暖泔清洗淨拭

乾然後以藥傳之旦三

又方乾牛朶乾人朶 各等分

右一味搗先用綿裹瘡上綿上著朶蟲聞朶香即出若

瘡即舉綿去之更別取朶及綿著其上如前蟲盡乃止

又方苦瓠四枚大如拳者各穿一孔如指大置湯中煮十

數沸取一竹筒長一尺一頭內瓠孔中一頭注瘡孔

上冷則易之徧止



治一切漏方

斑猫

肆拾枚

鼓

肆拾枚

元青

貳拾枚

生大豆黃

地膽

各拾枚

蜈蚣

壹并半

犀角

牛黃

各棗核大

右八味為末蜜丸如梧子大飲服二丸須更多作酸漿

粥冷飲之病從小便出尿盆中相視如有蟲形狀又似

膠汁此病出也間日一服飲粥如常小弱者隔三四日

候無蟲出瘡漸瘳特忌油膩一切器物皆須灰洗乃作

食

崔氏云治九漏初服藥少及食明日服二丸至七日其虛悶可煮食薑青菜羹自餘脂膩諸口味菓子之類並不得食人強隔日一服人弱兩三日一服瘳後仍作二十日將息不能將息便不須服

又方

煮鹽花以麪攤病上內鹽花麪匡中厚二寸其下以

桑葉二重藉鹽候冷熱得所可忍冷則無益熱則以

肉一日一度候瘳瘳根株勢消則止若已作瘳者



穉穀爲末粉之

又方 獺北陰白皮三十斤剉碎以水一石煮取一斗去滓煎如糖又取都則上雖雄鼠屎各十四枚燒令汁盡爲末內煎中又溫酒一升投煎中合攪之羸人服五合當有蟲出

又方 霜下瓠花曝乾爲末傳之

又方 擣土瓜根傳之燥則易不限時節

又方 死蛇去皮肉取骨爲末合和封磨上天痛以舌口摩之止

又方 死蛇和臘月猪脂合燒灰爲末內孔中

又方 燒死蜥蜴爲末醋和塗又死蛇灰醋和傳之

又方 故布裹鹽加彈丸大燒令赤爲末酒服

凡漏

又方服白馬桑汁一升

又方水研杏仁服之

又方鹽麩和燒灰傳

治漏作瘡孔方

露蜂房為末臘月猪脂和傳孔上

治漏發心胃以下者方

松脂

武都雄黃

右二味和為塊刀子刮為散飲服一方寸匕日一不瘳

更合

治漏方

殺落鐵屑

狗頭車連齒骨炙

虎糞

鹿皮合毛燒為灰。各等

右四味治下篩以猪膏和內瘡中漬更即易日五六
治一切冷癰方

燒人所吐蛔蟲為灰先用甘草湯洗去瘡惡然後膏
交無不瘳者慎口味

治鼠癰腫核痛未成膿者方

以柏葉傳腫上熬鹽著葉上熨之令熱氣下即消
治風漏及鼠漏方

赤小豆

白欬

黃耆

牡蠣各等分

右四味治下篩酒服方寸匕日二

治螻蛄癰方

先以泔清煮櫛葉取汁洗瘡拭乾次以櫛葉灰內瘡
治蜂癰初生狀如桃而癢搔之則引大如雞子如覆掌者

焚爛對之三日四日不瘥至百日成瘻其狀大如
五寸石黃二寸中生蜂作孔乃有數伯以石硫黃
多少燃燭燒令汗出著瘻孔中須更間見蜂數十蜂
盡乃瘥

治蜂瘻方

人屎蛇蛻灰臘月猪膏和傳之

又方鷄頭灰傳之又方取蜂巢燒灰臘月猪膏和傳孔中

治蟻漏孔容針亦有三四孔者方

蛻皮肝心燒灰為末酒服一錢匕

又方死蛇腹中鼠取臘月猪脂煎候焦去滓傳之

又方取大黃鮓燒研坐土令赤以苦酒浸坐土時合壁土

故熱以黃鮓著壁土上展轉令熱傳瘻上

又方 鯪鯉甲二七枚燒末以猪膏和傳瘡上

又方 半夏一枚搗末以鴨脂和傳瘡上

治瘰癧瘻橫潤作頭狀若舌人形亦作瘰癧方

用雄雞屎燒灰臘月猪脂和封之

治蛇蝎瘻方

牛屎燒灰臘月猪脂和傳之

又方 蛇蝎丸即蛇蝎所食屎也為末傳之

又方 乾牛屎為末傳之瘻即撥却更厚封瘻乃止

又方 熱牛屎塗之數易應有蛇蝎出

治蛇蝎瘻方

雞屎 蛇蝎屎

石一味為末用社猪下頰髓和傳之

