

醫

方

攷

附脈語

六

中國醫學大成第四集

方劑類

醫

方

攷

六

上海大東書局印行

醫方考

明 欽邑 吳 嶴鶴皋原著

鄞縣 曹赤電炳章圈點

卷六

蟲門第六十五

敍曰。爲國者。必欲去夫蠹國之小人。故爲醫者。必欲去夫蠹身之羈蝕。身國不同。理相須也。因著六考以療蟲。君子用之。庶幾乎保安之一策也。

化蟲丸

鶴 风去土 胡 粉炒 苦棟根東引不出土者 檳 柳各一  
蕪 葵 使君子各五分 白 磬枯二錢 五分

量人大小服。一歲兒可五分。

腸胃中諸蟲爲患。此方主之。○經曰。腸胃爲市。故無物不包。無物不容。而所以

靈砂丹

水銀一斤 硫黃四兩

二物於新銚內炒成砂。更入水火鼎內煅煉爲末。糯米糊丸如麻子大。每服三丸。加至五七丸。忌猪羊血、菜豆粉冷滑之物。

腸胃諸蟲。此方主之良。○嘗謂濕熱生蟲。故知濕熱者蟲之天也。是方用硫黃以燥濕。用水銀以驅熱。是奪蟲之天矣。蟲失其天。未有不殺。

蟲藥總考

峴按古方殺蟲。如雷丸、貫衆、乾漆、蠟塵、百部、鉛灰。皆其所常用也。有加附子、乾薑者。壯正氣也。加苦參、黃連者。蟲得苦而安也。加烏梅、訶子者。蟲得酸而軟也。加藜蘆、瓜蒂者。欲其帶蟲而吐也。加芫花、黑丑者。欲其帶蟲而下也。用雄黃、川椒、蛇床、樟腦、水銀、檳榔者。治疥瘡之蟲也。用胡桐淚、蕡菪子、韭子、蟬酥者。治齧齒之蟲也。用川槿皮、海桐皮者。治風癬之蟲者。用青箱子、覆盆葉者。治九竄蟲。

蝕之蟲也。用敗鼓心、桃符板、虎糞骨、死人枕、獮爪、鶴骨者。驅療蟲也。或用桃柳東南枝者。以其得天地春夏長之氣。而假之以爲吾身之助也。或用吳茱萸東引根。或用酸石榴東引根。煎湯吞藥者。一以此物亦能殺蟲。一以東方者生物之始。諸蟲受氣之所也。東引根能引諸藥東行。奪其生生之氣。乃伐根之斧也。

### 藍

泊宅編云。永州通宅聽軍員毛景。得奇疾。每語喉中必有物作聲相應。有道人教之。讀本草藥名。至藍而默然。遂取藍搘汁而飲之。少頃吐出肉塊。長二寸餘。人形悉具。劉思在永州親見其事。千金翼云。藍主疳蝕。則固殺蟲物爾。

### 雷丸

陳正敏遯齋閒覽云。楊勔中年得異疾。每發言應答。腹中有小蟲效之。數年間。其聲寢大。有道士見而驚曰。此應聲蟲也。久不治。延及妻子。宜讀本草。遇蟲不應者。當取服之。勔如言。讀至雷丸。蟲忽無聲。乃頓服數粒。遂愈。

### 檳榔散 石榴根煎

蔡定夫戡之子康積苦寸白蟲。醫者教之以月初三日前先炙豬肉一巒置口中咀嚥其津而勿食。諸蟲聞香爭咂如箭攻攢却以檳榔細末一兩取石榴東引根煎湯調服之。蔡如其言不兩時腹中雷鳴急瀉蟲下如傾以杖挑之皆連綿成串其長幾丈尙蠕蠕能動乃悉置之於火宿患頓愈。

古稱九蟲。一曰伏蟲。長四寸爲羣蟲之長。二曰白蟲。相生至多形長一寸其母長至四五尺。三曰肉蟲。狀如爛杏令人煩悶。四曰肺蟲。其狀如蠶令人欬而聲嘶。五曰胃蟲。狀如蝦蟆令人吐逆嘔噦。六曰弱蟲。狀如瓜瓣令人多唾。七曰赤蟲。狀如生肉令人腸鳴入曰蟻蟲至微細狀如菜蟲居洞腸間居則爲痔漏癰疽諸瘡。九曰蛻蟲。長一尺貫心則殺人又有三尸蟲。狀如大馬尾薄筋依脾而居乃有頭尾皆長三寸又有勞蟲、膈噎蟲、癩蟲、蠭蟲、狐惑蟲未易悉舉醫者推類而治之可也。

## 痔漏門第十六

敍曰察痔漏者瘍醫之事也君子鄙談之然擇疾而療非醫之任者也故考二

方。以大其規。詳論藥物。以要其變。

### 四物湯加黃芩黃柏槐花方

當歸

芍藥

川芎

生地黃

酒黃芩

酒黃柏

炒槐花

內熱痔漏下血者。此方主之。○痔漏。廣腸之毒也。內經曰。因而飽食。經脈橫解。腸癖爲痔。是以痔漏之疾。多見於膏梁富貴之人。而藜藿之腹。未見其多也。一有病根。則勞思便作。飲酒便作。所以然者。內熱而血妄行也。是方也。生地、槐花、黃芩、黃柏。清其熱也。當歸、芍藥、川芎。調其血也。

### 四君子湯

人參

白朮炒

茯苓

甘草炙

年高氣弱。痔血不止者。此方主之。誤服攻痔之藥。致血大下不止而虛脫者。亦此方主之。○血有形之陰也。必賴無形之氣以固之。故年高而氣弱。則血下。久藥損氣。則血下。是方也。人參、白朮、茯苓、甘草。皆甘溫益氣之品也。大氣充盈。足以固有形之血。譬之乾元充溢於兩間。自能舉乎大地。而無傾陷之危者也。

痔漏諸藥總考

崑按古方醫痔漏下血。有用槐角灰者。有用柏葉灰者。有用蝟皮灰者。有用露蜂房灰者。有用牛角腮灰者。有用胡桃灰者。俱以方寸匕酒調下。此皆枯痔之法也。湯液之中。有用防風者。有用秦艽者。有用皂角仁者。有用荆芥、白芷者。此皆責之風熱入藏也。有用芒硝、大黃者。有用檳榔、枳實者。此皆責之實熱可下也。有用胡黃連者。有用酒苦參者。有用石蓮肉者。有用番木鱉者。此皆責之實熱可清也。有用桃仁、紅花者。有用蒲黃、蘇木者。此皆責之瘀血未消也。有用杏仁、麻仁者。用地黃、黃柏者。此皆責其燥金無液也。有用地榆、斬艾者。有用枯龍骨、鹿角霜者。此欲強止其血也。有用象牙、螳螂者。有用人爪、蟹爪者。此欲放出其肛而外施藥以愈之也。有用熏法者。有用洗法者。有用藥坐者。無非枯痔止血之品也。有用插藥者。有用掛線者。無非爛肌去腐之輩也。嗚呼。任醫猶任將。用藥猶用兵。神於兵者。疊石可以爲營。驅牛可以破敵。神於藥者。心解而機自靈。見超而術自神。有不拘拘於紙上之陳言矣。

敍曰。人以弗病爲安。疥瘡雖曰小疾。然流連其癢。弗息其搔。則亦非可觀之度矣。因著六考以主之。庶幾乎無瘡痍也。

防風通聖散

防風 川芎 川歸 黃芩炒  
麻黃去節 連翹 薄荷 石膏  
白朮炒 楮子炒黑 大黃 芒硝  
桔梗 荆芥 白芍藥 滑石

甘草

表有疥瘡。內有實熱。此方主之。○諸痛癆瘡癩。皆屬心火。故表有疥瘡。必裏有實熱。是方也。用防風、麻黃泄熱於皮毛。用石膏、黃芩、連翹、桔梗泄熱於肺胃。用荆芥、薄荷、川芎泄熱於七竅。用大黃、芒硝、滑石、梔子泄熱於二陰。所以各道分消其勢也。乃當歸、白芍者。用之以和血。而白朮、甘草者。用之以調中爾。互考見中風門火門。

玉燭散

川芎

當歸

生地黃

赤芍藥

大黃

甘草

朴硝各等分

疥瘡作痛者。此方主之。○諸痛屬實。實者可瀉。故用朴硝、大黃瀉其實。生地、赤芍涼其血。川芎、當歸和其營。甘草調其衛。是方爲攻下之劑。必形氣病氣兩實者。始可用之。若病氣有餘。形氣不足者。以前方防風通聖散去大黃、芒硝可也。

當歸養血湯加防風連翹方

當歸

防風各一錢

黃耆五錢

連翹二錢

疥瘡有血無膿。搔癢不止者。此方主之。○有血無膿。此表氣不足也。諸癢屬虛者可補。故用當歸、黃耆大補其氣血。乃防風者引歸耆直達於表。二物得之而效愈速也。若連翹者解諸經之客熱而已。此藥服之數劑。諸瘡化毒生膿。又更服之。得膿滿毒盡。則去病根而無溫瘢之患。若膿日久不乾者。去黃耆加白朮、茯苓以燥之。如治爛豆之法則善矣。

十全大補湯

人參

黃耆

白朮

茯苓

熟地黃

甘草等分

桂心少許

當歸

川芎

芍藥

瘡久血氣虛弱。頸面腹背皆瘡者。此方主之。○瘡疥生於手足者爲輕。生於頸面腹背者氣血虛羸之盛。乃小人道長之象。故用人參、黃耆、白朮、茯苓、甘草大補其氣。用當歸、川芎、白芍、熟朮、桂心大補其血。氣血得其補。則腹背之瘡先愈。而君子道長。小人道消矣。脾胃門參苓白朮散亦可酌用。

加品

古方有用苦參、沙參、忍冬花、皂角刺者。此皆治瘡善藥。若依前法。則此輩不用亦愈。必欲用之。苦參宜用酒炒。

疥瘡塗藥總考

古方塗藥。有用蛇床子、川椒、雄黃、樟腦、水銀、檳榔者。有少入人言者。皆殺蟲也。有用木鱉子、大風子者。皆去風也。有用枯礬、硫黃者。爲燥濕也。有用大黃、黃柏、輕粉、鉛粉、黃丹者。爲解熱也。或以柏油塗者。或以麻油塗者。或以豬脂塗者。予少時常自用之。率驗於此而違於彼。今月少愈。再月即發。竟以服藥而瘳。終無

益於塗也。然病淺者間有塗之而愈。故塗藥亦所不廢。

### 暴死門第十六十八

敍曰。幻化之軀不能無死。但曰暴死。則非正命矣。君子順受其正。胡然以非命歸耶。故考方法八條以拯暴死。

#### 六君子湯加天麻方

人參

白朮

茯苓

甘草

半夏

陳皮

天麻

暴死。口噤吐沫。身體溫緩。脈來虛大者。中風暴死也。此方主之。○暴死者。卒然而倒。不省人事也。風燥則筋急。故令口噤。吐沫者。風盛氣湧使然。乃風來潮洶之象。風爲陽邪。故令身體溫緩。脈來虛大者。正氣虛而邪氣盛也。斯時也。主辛散之劑以驅風。則慘慘之氣必絕。非其治也。故用人參、白朮、茯苓、甘草之甘溫者。急因其氣。復用半夏、陳皮之辛利者。以平其沫。天麻之加定風邪爾。

附子

乾薑

人參

甘草

腹痛。額頭黎黑。手足收引。脈來沉下無氣以息者。中寒暴死也。此方主之。○腹痛病因固有數種。但額頭黎黑。手足收引。脈來沉下。則中寒之驗也。所以無氣以息者。呼出主陽。吸入主陰。三陰受其真寒。則病不能吸收。吸亡。則呼不能獨存矣。故令人暴死。寒者溫之。故用附子、乾薑。乃人參、白朮、甘草。所以生其呼吸之氣也。進藥後更着艾灸其關元。此內外交治之法。是證也。有死一日夜而治之復甦者。幸勿因其危而忽之。

### 生脈散加香薷方

人參

麥門冬

五味子

香薷

人本陰虛。復遇暑途。飢困勞倦。暴仆昏絕者。此方主之。○人本陰虛。則陽獨治。復遇暑途。則陽易亢。加之飢困勞倦。則陰益虧。所以暴仆昏絕者。一則陰虛而孤陽欲脫。一則暑邪乘虛而犯神明之府也。故用人參益元而固脫。香薷辟邪而卻暑。麥冬之清。所以扶其不勝之肺。五味之酸。所以斂其欲脫之真。

四君子湯加竹瀝薑汁方

人參

白朮

茯苓

甘草

竹瀝

薑汁

暴死有痰聲者。名曰痰厥。此方主之。○痰厥者。虛陽載痰上逆之名。所以令人暴死者。頑痰塞其清陽呼吸之道也。痰既塞之。氣欲通之。故令喉中有聲。經曰。壯者氣行則愈。怯者着而成病。故用人參、白朮、茯苓、甘草之溫補者以壯氣。佐之竹瀝、薑汁以行痰。

獨參湯

人參二兩去蘆煎

行立之間。暴眩仆絕。喉無痰聲。身無邪熱者。陰虛陽暴絕也。此方主之。○陰陽之在人身。互爲其根而不可離者也。若陰道虧乏。則孤陽無所依附。亦自飛越。故令人暴眩仆絕。過不在痰。故無痰聲。病不因感。故無體熱。斯時也。有形之陰血。不能急生。無形之呼吸。所宜急固。况夫陰生於陽。又太極之妙乎。故以獨參主之。取其爲固元益氣之聖品爾。

五磨飲子

木香

沉香

檳榔

枳實

台烏藥

五件等分。白酒磨服。

暴怒暴死者名曰氣厥。此方主之。○怒則氣上。氣上則上焦氣實而不行。下焦氣逆而不吸。故令暴死。氣上宜降之。故用沉香、檳榔。氣逆宜順之。故用木香、烏藥。佐以枳實。破其滯也。磨以白酒。和其陰也。

火醋熏鼻法

凡感臭穢瘴毒暴絕者名曰中惡。不治卽死。宜燒炭火一杓。以醋沃之。令患人鼻受醋氣。則可復甦。旣甦。以感冒門藿香正氣散主之。

禮拜法

凡遇屍喪。覩古廟。入無人所居之室。及造天地鬼神壇場。歸來暴絕。面赤無語者。名曰尸疰。亦曰鬼疰。卽中祟之謂也。進藥便死。宜移患人東首。使主人焚香。北面禮拜之。更行火醋熏鼻法。則可復甦。否者七竅迸血而死。

凡男婦交感而死。在男子名曰脫陽。在女子名曰脫陰。男子雖死。陽事猶然不委。女子雖死。陰器猶然不閉。亦有夢中脫死者。其陽必舉。陰必泄。尸容有喜色。爲可辯也。皆在不救。

### 痘門第六十九

敍曰。小兒壯熱呵欠煩悶。時發驚悸。或吐或瀉。手足時冷。面頰頸赤。嗽嚏者。爲痘證也。蓋痘出於五藏。由內達外。是以各顯其證。呵欠煩悶。肝之證也。時發驚悸。心之證也。或吐或瀉。手足時冷者。脾之證也。頰赤嗽嚏。肺之證也。錢氏謂獨有腎藏無證。此大不然。若腰痛喜寐。則腎之證矣。五藏之證盡顯者。其痘必多。但顯一二證者。其痘必少。魏氏以痘本於溼火。其言高出前古。雖其主方近於執一。然錄古人一十四方。則示人以變通也可知矣。今世之醫。率以是短之。使諸子者並作於九原。崑遇魏氏。則北面而師之。遇錢陳。則肩隨而已。所以然者。二子之資不及魏也。茲考羣方。則以百家而出入之。初不拘拘於三子矣。

升麻葛根湯

升 麻

葛 根各二錢

白芍藥半錢

甘 草一錢

小兒初間發熱壯盛。爲風寒。爲痘疹。莫能的辨。此方穩當。宜主用之。○表熱壯盛。此邪實於表也。經曰。輕可以去實。故用升麻、葛根以疏表。甘草佐之。可以和在表之氣。芍藥佐之。可以和在表之榮。去其實邪。和其營衛。風寒則解。痘疹則出。誠初間之良劑也。如至四五日。痘中夾疹者。亦此方主之。疹散。只依常法治痘。

參蘇飲

紫 蘇

陳 皮

半 夏

茯 苓

乾 葛

前 胡

桔 梗各一錢

甘 草五分

人 參七分

風寒壯熱。體重頭痛。痰嗽壅盛者。此方主之。○風寒客於外。故用紫蘇、乾葛以發表。痰嗽壅於內。故用半夏、前胡、桔梗、陳皮、茯苓以安裏。邪去之後。中外必虛。人參、甘草急固其虛。此則表和而痘易出。裏和而氣不虛。表裏無失。斯良劑矣。