

139430


閱覽

微積分

中冊

EDWIN E. MOISE 原著

吳森原 徐復 張德新 合譯



校閱者

李新民 徐道寧

東華書局印行

微積分

CALCULUS

中 册

EDWIN E. MOISE 原著

吳森原 徐復 張德新 合譯

校閱者

李新民 徐道寧

東華書局印行



版權所有・翻印必究

中華民國五十九年一月初版

中華民國六十八年四月三版

大學用書 微積分 (全三冊)

中冊 定價 新台幣七十元整

(外埠酌加運費匯費)

譯者 吳森原 徐復 張德新

發行人 卓 鑑 茜

出版者 臺灣東華書局股份有限公司

臺北市博愛路一〇五號

電話：3819470 郵撥：6481

印刷者 中臺灣印刷廠

臺中市公園路三十七號

行政院新聞局登記證 局版臺業字第零柒貳伍號

(58034)

微 積 分

中 冊 目 次

第六章 積分法

6. 1	引 言.....	393
6. 2	自變數與不定積分.....	395
6. 3	導出對數與反正割之積分・代數方法.....	407
6. 4	分部積分法.....	418
6. 5	三角函數幕之積分.....	425
6. 6	代換積分法.....	433
6. 7	代數代換及其選用.....	441
6. 8	代數方法：配方與部分分式.....	449

第七章 定積分

7. 1	弧長問題.....	457
7. 2	定積分定義為樣本和之極限.....	465
7. 3	用圓盤法求體積.....	475
7. 4	用橫截面之一般方法，殼法.....	482
7. 5	旋轉曲面之面積.....	489
7. 6	力矩與形心・ <u>巴蒲斯定理</u>	498
7. 7	瑕積分.....	509

7. 8 連續函數之可積分性 517

第八章 圓錐曲線

- | | |
|----------------------|-----|
| 8. 1 軸之平移..... | 525 |
| 8. 2 楕 圓..... | 530 |
| 8. 3 軸之旋轉・有向法線式..... | 537 |
| 8. 4 雙曲線..... | 543 |
| 8. 5 楕圓幾何學，反射性質..... | 550 |
| 8. 6 一般二次方程式..... | 557 |

第九章 平面上之路線與向量

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 9. 1 質點在平面上之運動..... | 567 |
| 9. 2 參數中值定理； <u>洛斯比特法則</u> | 572 |
| 9. 3 <u>洛斯比特法則</u> 之其他形式..... | 581 |
| 9. 4 極坐標..... | 587 |
| 9. 5 用極坐標表面積..... | 594 |
| 9. 6 路線之長..... | 598 |
| 9. 7 平面之向量..... | 602 |
| 9. 8 自由向量..... | 609 |
| 9. 9 速度，加速度，曲率..... | 616 |
| 9. 10 向量與向量空間之概要..... | 627 |

第十章 數論與部分分式

- | | |
|--------------------------|-----|
| 10. 1 整除性與歐幾里得辗转相除法..... | 629 |
| 10. 2 部分分式法之一推廣..... | 637 |
| 10. 3 一般部分分式法..... | 645 |

附錄 A	邏輯與集合論中之符號	653
附錄 B	函數極限之代數運算	657
附錄 C	數列極限之代數運算	663
附錄 D	積分之導數	666
附錄 E	近似值 $\Delta f \approx df$ 之誤差	670
附錄 F	合成函數之連續性	673
附錄 G	辛浦生法則之誤差	676
附錄 H	函數集合之代數	680
附錄 I	諾斯易斯特定理之證明	683
附錄 J	路線長公式之證明	687
表一	自然三角函數	689
表二	指數函數	690
表三	數之自然對數	691
表四	積分簡表	692
答案選輯		702
英漢名詞索引		710
漢英名詞索引		715


6

積 分 法

6.1 引 言

在 3.7 節中曾覓得解某些型式之面積問題之有效方法。欲求位於連續函數 f 圖形下方由 a 至 b 之面積，曾引用“面積函數”

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$



且知對每一 x , 有

$$F'(x) = D \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

欲計算面積函數，可求(若為可能)另一函數 G ，使

$$G' = f.$$

於是

$$G' = F'.$$

若 $G(a) = 0$, 則對每一 x , $G(x) = F(x)$. 若否, 則令

$$H(x) = G(x) - G(a),$$

於是

$$H'(x) = G'(x) = F'(x), \quad H(a) = 0.$$

故對每一 x ,

$$H(x) = F(x).$$

因而得

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) = H(b) = G(b) - G(a).$$

綜上可知

$$G' = f \Rightarrow \int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a).$$

記號 t 與 G 乃因便於推演而引用者。一旦得知答案, 則以 x 與 F 表之, 似覺更為自然。此即

$$F' = f \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

述為更正式之形式:

定理 1 (積分基本定理 The fundamental theorem of integral calculus).

若 f 連續於 $[a, b]$, 且 $F' = f$, 則

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

當然, 若 f 已知, 欲應用本定理時, 必須求出 F . 此一步驟稱為反微分法 (antidifferentiation). 以後將可得知此種反微分法事實上有多方面之用途; 不僅可用於求解前所述及之面積問題, 並可用於解多種不屬面積問題之重要問題。但此種進一步之應用將於以後討論之。

蓋因欲用此種方法，必須知悉如何計算一函數 F 使其導數為一已知函數 f ；截至目前，僅於相當簡易之情形下，可用試驗之程序求出函數 F ，但若將各種難題推演為反微分問題後，再發現無法解此反微分問題，則將令人沮喪。因此，似以先略費篇幅，學得由已知導數求其函數之有效方法方為善策。

6.2 自變數與不定積分

定義函數之一般方法，乃為對定義域之每一數，寫出一式以表其所對應之函數值。例如寫出

$$f(x) = x^2 \quad (-\infty < x < \infty), \quad g(x) = \sqrt{x} \quad (x \geq 0),$$

即可以定義函數 f 與 g 。在此二式中，文字“ x ”稱為**自變數 (independent variable)**，僅為一種啞文字，表示數所插入之位置。依邏輯而言，啞文字不論以何字代之均無差別。例如書為

$$f(t) = t^2 \quad (-\infty < t < \infty), \quad g(t) = \sqrt{t} \quad (t \geq 0),$$

可以定義與前述完全相同之二函數。若既經決定以 x 表啞文字，則稱 f 為 x 之函數。於是， $g(t) = \cos^2 t$ 表 g 為 t 之函數； $h(\alpha) = \alpha^3 - 1$ 表 h 為 α 之函數等等。

今回至求反微分之問題。由唯一性定理，已知兩函數在一區間內若有相同之導數，則其差為一常數。例如若

$$f'(x) = x^2 \quad (-\infty < x < \infty),$$

則 f 必為形如

$$f(x) = \frac{x^3}{3} + C$$

之一函數，其中 C 為一常數。反之對每一 $\mathbf{C}, \mathbf{D}(x^3/3 + C) = x^2$ 自然成立。故知

$$\{F | F' = x^2\} = \left\{ \frac{x^3}{3} + C \right\}.$$

$F' = f$ 之全部函數所成集通常以

$$\int f(x) dx$$

表之。上式稱為 f 之不定積分 (indefinite integral)。例如

$$\int x^4 dx = \{F | F'(x) = x^4\} = \left\{ \frac{1}{5} x^5 + C \right\},$$

$$\int \cos x dx = \{F | F'(x) = \cos x\} = \{\sin x + C\}$$

等等。任意其他啞文字亦均可表同一事項如下：

$$\int t^4 dt = \{F | F'(t) = t^4\},$$

$$\int \cos t dt = \{F | F'(t) = \cos t\}.$$

上列每種情形，右端之大括弧表形如括弧內所予函數之全部函數所成集。符號 dx (或 dt) 僅指示於敍述函數時，乃以 x (或 t) 作為啞文字。上例中，此一指示似乎並非必須。同樣，書寫

$$\int (3x^3 + 2x^4) dx = \left\{ \frac{3x^4}{4} + \frac{2x^5}{5} + C \right\}$$

時，雖無 “ dx ” 亦可知其所指，蓋因數字常數 2 與 3 乃僅有之常數。但對

$$\int (\alpha x^3 y + \beta x^2 y^2) dx,$$

則 “ dx ” 必不可缺；蓋此乃指示 α, β, y 為常數，而所討論之函數為

$$f(x) = \alpha x^3 y + \beta x^2 y^2.$$

當問題之涵意如此時，其答案顯然為

$$\int (\alpha x^3 y + \beta x^2 y^2) dx = \left\{ \frac{\alpha x^4 y}{4} + \frac{\beta x^3 y^2}{3} + C \right\}. \quad (\text{i})$$

此可與下式比較之：

$$\int (\alpha x^3 y + \beta x^2 y^2) dy = \left\{ \frac{\alpha x^3 y^2}{2} + \frac{\beta x^2 y^3}{3} + C \right\}, \quad (\text{ii})$$

$$\int (\alpha x^3 y + \beta x^2 y^2) d\alpha = \left\{ \frac{\alpha^2 x^3 y}{2} + \beta x^2 y^2 \alpha + C \right\}, \quad (\text{iii})$$

$$\int (\alpha x^3 y + \beta x^2 y^2) d\beta = \left\{ \alpha x^3 y \beta + \frac{\beta^2 x^2 y^2}{2} + C \right\}, \quad (\text{iv})$$

(i) 式中， α, β, y 為常數，且函數為(i)式前所描述之 $f(x)$. (ii) 式中， α, β, x 為常數，且函數為

$$g(y) = \alpha x^3 y + \beta x^2 y^2.$$

(iii) 式中， x, y, β 為常數，且函數為

$$h(\alpha) = \alpha x^3 y + \beta x^2 y^2.$$

(iv) 式類推。

計算不定積分之程序稱為求不定積分 (indefinite integration)，或簡稱之為積分。已知一微分公式，可視需要而適當調整其常數，將已知公式反轉方向而寫出其對應之積分公式。下列每一情形，右邊之公式皆可由左邊之公式導出之。

$$D x^n = n x^{n-1} \quad (n \neq 0),$$

$$D x^{n+1} = (x+1) x^n \quad (n \neq -1),$$

$$D \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n \quad (n \neq -1) \Rightarrow \int x^n dx = \left\{ \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \right\} \\ (n \neq -1),$$

$$D \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}},$$

$$D(2\sqrt{x}) = \frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \{2\sqrt{x} + C\},$$

$$D \sin x = \cos x \Rightarrow \int \cos x dx = \{\sin x + C\},$$

$$D \cos x = -\sin x,$$

$$D(-\cos x) = \sin x \Rightarrow \int \sin x dx = \{-\cos x + C\},$$

$$D \ln x = \frac{1}{x} (x > 0) \Rightarrow \int \frac{1}{x} dx = \{\ln x + C\} \quad (x > 0),$$

$$D e^x = e^x \Rightarrow \int e^x dx = \{e^x + C\}.$$

上述公式自僅爲一些樣本之簡表；前所已知之微分公式遠多於此，故可寫出更多之積分公式。今將此一工作延後，直至能寫出更好且更一般之式時，再列出完整之表。

已知函數 f ，若 u 為另一函數，則 $f(u)$ 為合成函數，以 f 為外側函數而以 u 為內側函數。由連鎖法則，知

$$Df(u) = f'(u)u'.$$

由此得

$$\int f'(u)u'(x) dx = \{f(u(x)) + C\}.$$

例如若

$$f(u) = \sin u, \quad u(x) = x^2 + 1,$$

則

$$\begin{aligned} D[f(u(x))] &= D[\sin(x^2 + 1)] = f'(u)u'(x) = (\cos u)2x \\ &= [\cos(x^2 + 1)]2x. \end{aligned}$$

故

$$\int [\cos(x^2 + 1)]2x dx = \{\sin(x^2 + 1) + C\}.$$

更一般，

$$D \sin u(x) = [\cos u(x)] u'(x),$$

故

$$\int [\cos u(x)] u'(x) dx = \{\sin u(x) + C\}.$$

事實上，上之公式對任意函數均成立。若已知

$$F' = f,$$

因而

$$\int f(x) dx = \{F(x) + C\},$$

則恆可更一般斷言

$$D[F(u(x))] = F'(u(x)) u'(x) = f(u(x)) u'(x),$$

因而

$$\int f(u(x)) u'(x) dx = \{F(u(x)) + C\}.$$

爲簡便計，在此公式中，常將啞文字略去，而以符號 du 表 $u'(x) dx$ 之縮寫。因此

$$\int \cos u du = \{\sin u + C\}$$

一式其意爲對每一可微分之函數 $u(x)$ ，恆得

$$\int [\cos u(x)] u'(x) dx = \{\sin u(x) + C\}.$$

同樣，

$$\int e^u du = \{e^u + C\}$$

一式意爲若 u 為任一可微分之函數，則

$$\int e^{u(x)} u'(x) dx = \{e^{u(x)} + C\}.$$

此式爲真，蓋因

$$De^{u(x)} = e^{u(x)} u'(x).$$

使用不同之啞文字，同樣可將上列積分公式改書爲下列之任意形式：

$$\int e^{u(\theta)} u'(\theta) d\theta, \quad \text{或} \quad \int e^{u(t)} u'(t) dt,$$

等等。但當用一甚長之記號開始描述積分時，常可發現其可用簡式改述之。例如

$$\int e^{x^2+1} 2x dx$$

可改爲

$$\int e^{u(x)} u'(x) dx,$$

其中 $u(x) = x^2 + 1$ 。故

$$\int e^{x^2+1} 2x dx = \int e^u du = \{e^u + C\} = \{e^{x^2+1} + C\}.$$

同樣， $\int [\sin(t^2+1)] 2t dt$ 實爲形如 $\int \sin u du$ 之式。因而

$$\int [\sin(t^2+1)] 2t dt = \int \sin u du = \{-\cos u + C\} = \{-\cos(t^2+1) + C\}.$$

注意上述第三式並未完全解出，蓋因 u 為一函數。欲完成其解，須將函數 u 用啞文字 t 表之。

總括之：

$$F' = f \Rightarrow D[F(u)] = f(u)u',$$

故

$$\int f(x) dx = \{F(x) + C\} \Rightarrow \int f(u(x)) u'(x) dx = \{F(u) + C\}.$$

用縮寫式，以 du 表 $u'(x)dx$ ，得

$$\int f(x) dx = \{F(x) + C\} \Rightarrow \int f(u) du = \{F(u) + C\}.$$

依此一般觀念，可將以前之積分公式表爲更一般化之式。例如最初幾個乃爲

$$\begin{aligned}\int u^n du &= \left\{ \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \right\}, & \int \frac{1}{\sqrt{u}} du &= \{2\sqrt{u} + C\}, \\ \int \cos u du &= \{\sin u + C\}, & \int \sin u du &= \{-\cos u + C\}, \\ \int \frac{1}{u} du &= \{\ln u + C\} \quad (u > 0), & \int e^u du &= \{e^u + C\}.\end{aligned}$$

並可得

$$\begin{aligned}\int [f(x) + g(x)] dx &= \int f(x) dx + \int g(x) dx, \\ \int kf(x) dx &= k \int f(x) dx, \quad k \neq 0,\end{aligned}$$

蓋因

$$D[f+g] = Df + Dg \quad \text{且} \quad D(kf) = kDf.$$

今討論如何於實際問題中應用此種公式。

例題 1. 討論

$$\int (x^2 + 1)^7 x dx.$$

此式雖非完全，但大約形如

$$\int u^7 du.$$

若令 $u(x) = x^2 + 1$ ，則

$$du = u'(x) dx = 2x dx,$$

故得

$$\begin{aligned}\int (x^2 + 1)^7 x dx &= \int \frac{1}{2} (x^2 + 1)^7 2x dx = \int \frac{1}{2} u^7 du \\ &= \left\{ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} u^8 + C \right\} = \left\{ \frac{1}{16} (x^2 + 1)^8 + C \right\}.\end{aligned}$$

核對之：

$$D \left[\frac{1}{16} (x^2 + 1)^8 \right] = \frac{1}{16} \cdot 8(x^2 + 1)^7 \cdot 2x = (x^2 + 1)^7 x.$$

例題 2. 討論

$$\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad (x > 0).$$

前所知而可能適合上式之式僅爲 $\int \cos u du$. 若如此，則可得

$$u(x) = \sqrt{x}, \quad du = u'(x) dx = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx.$$

由此所得之式與所欲得之式間僅有之差異爲乘法常數，因此知可書爲

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx &= \int (\cos \sqrt{x}) \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 \int (\cos \sqrt{x}) \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \\ &= 2 \int \cos u du = \{2 \sin u + C\} = \{2 \sin \sqrt{x} + C\}. \end{aligned}$$

例題 3. 討論

$$\int e^{\cos x} \sin x dx.$$

目前僅有一積分公式含有指數函數：

$$\int e^u du = \{e^u + C\}.$$

若問題適合此式，則必得

$$u(x) = \cos x, \quad du = u'(x) dx = -\sin x dx.$$

在此乘法常數不致引起困難：

$$\begin{aligned} \int e^{\cos x} \sin x dx &= \int -e^{\cos x} (-\sin x) dx = \int -e^u du \\ &= \{-e^u + C\} = \{-e^{\cos x} + C\}. \end{aligned}$$

下面將基於前所已知之微分公式列出目前所能寫出之積分公式。但對 $\int (1/u) du$ 之公式特別加以完整之解說。已予一函數 u ，定義於對每一 x 均有 $u(x) > 0$ 之一定義域。因此

$$D \ln u(x) = \frac{1}{u(x)} Du(x).$$

因僅正數具有對數，故在所論之定義域中必須有 $u(x) > 0$ 。由此可寫為

$$\int \frac{1}{u} du = \{\ln u + C\} \quad (u > 0).$$

而另一方面，即使在定義域中 $u(x) < 0$ ，下式亦完全有意義：

$$\int \frac{1}{u} du.$$

此即求具有導數 $(1/u)u'$ 之函數 f 為有意義。其答案不難求出：若 $u(x) < 0$ ，則 $-u(x) > 0$ 。故 $-u(x)$ 具有對數；且

$$\begin{aligned} D[\ln(-u(x))] &= \frac{1}{-u(x)} D[-u(x)] = \frac{1}{-u(x)} (-u'(x)) \\ &= \frac{1}{u(x)} u'(x). \end{aligned}$$

依此得

$$\int \frac{1}{u} du = \{\ln(-u) + C\} \quad (u < 0);$$

故得載於下表中之 $\int (1/u) du$ 之兩公式。

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \neq 0) \tag{1}$$

$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx \tag{2}$$