





慎微李定著

常用處方集

增訂二版

新醫叢書

杭州新醫書局發行

## 增訂弁言

常用處方集爲已故李定教授平生得意之作，十餘年來斐聲全國，醫界奉爲圭臬。氏於民十八九年間彙輯此書，已有如許豐富之成就，非學驗廣博，曷足臻此。

但學術時有進步，迴顧近十餘年來之新醫藥，尤有長足進展。昔日之認爲豐富完全者，今日則已有不同之評價。除非加以澈底之增補，殊不足以適合今日之需要。爰是之故，爰將本書增入新藥新方，俾使本書內容能與時代並進，不脫節，不落伍。

原書除附編外，共計三十三章；增補後加入化學治療及內分泌各一章，共計三十五章。其中解熱劑章增改爲解熱治瘧劑；止痢劑增改爲治痢劑；補血強壯劑增改爲補血強壯滋補劑；腳氣劑增改爲維生素劑；消毒劑增改爲消毒防腐劑；局部麻醉劑增改爲麻醉劑等。至其他各章亦略有增入。原書處方共計 505 個，增訂後共計 692 個較原書增多 187 個處方。附編中急性中毒及其處置項下增入磺胺類中毒一節。

增入之新藥名詞，大都未經審定，爰採用較爲通用者列入。若干成藥則採用各藥廠之譯名或逕以原名列入。

脫稿之後，校讀一遍，深覺未免有續貂之譏。對於新藥之未經列入者尙多，但多屬於同類製品，學者已可由此而窺其餘。至於其他遺漏之處，恐亦不免，尙望識者不吝指正。

中華民國三十七年一月

新醫同仁研究社謹識

# 常用處方集

## 目錄

第一章	清涼劑	1—3
第二章	解熱治瘧劑	4—15
第三章	健胃劑	16—26
第四章	鎮吐劑	27—29
第五章	催吐劑	30—31
第六章	瀉下劑	32—41
第七章	止瀉劑	42—48
第八章	治痢劑	49—53
第九章	驅蟲劑	54—60
第十章	灌腸劑	61—63
第十一章	胃腸洗滌劑	64—65
第十二章	祛痰劑	66—76
第十三章	鎮咳劑	77—80
第十四章	息喘劑	81—84
第十五章	吸入劑	85—86
第十六章	含嗽劑	87—89
第十七章	強心劑及興奮劑	90—105
第十八章	利尿劑	106—110
第十九章	尿防腐劑	111—115
第二十章	發汗	116—117

第二十一章	止汗	118—120
第二十二章	止血	121—128
第二十三章	補血，滋補，強壯劑	129—145
第二十四章	結核劑	146—153
第二十五章	驅梅毒劑	154—166
第二十六章	鎮痛劑	167—176
第二十七章	催眠劑	177—181
第二十八章	鎮靜劑	182—188
第二十九章	化學治療劑	190—203
第三十章	麻醉劑	204—213
第三十一章	維生素劑	214—220
第三十二章	內分泌劑	221—229
第三十三章	消毒防腐劑	230—239
第三十四章	眼科	240—254
A.	點眼水	240—246
B.	眼軟膏	247—251
C.	眼散布料	252
D.	眼洗滌及電包科	253—254
第三十五章	耳鼻咽喉科方	255—263
A.	耳科方	255—258
B.	鼻科方	259—263
C.	咽喉科方	264—266
第三十六章	皮膚科及生殖器科方	267—288
A.	皮膚病方	267—283
B.	生殖器病科方	284—288

## 附 編

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| (一)處方及處方箋                     | 289—290 |
| (二)處方箋中服法用語                   | 290—293 |
| (三)處方應用拉丁略語註解                 | 293—297 |
| (四)計量及記法                      | 298—299 |
| (五)對於小兒用藥之注意點(用量, 矯<br>味, 劑形) | 300—301 |
| (六)常備藥表                       | 302—310 |
| (七)毒藥表                        | 310—313 |
| (八)劇藥表                        | 313—325 |
| (九)極量對照表                      | 326—335 |
| (十)法定藥名與別名對照表                 | 336—346 |
| (十一)急性中毒及其處置                  | 347—365 |
| A. 急性中毒急救之概要                  | 347—348 |
| B. 急性中毒症候, 急救及治療              | 349—365 |
| (十二)配合禁忌一覽表                   | 366—376 |
| (十三)常用磺胺類藥物劑量表                | 377     |
| 內服藥時間表                        | 378     |

# 常用處方集

## 第一章 清涼劑 *Temperantia*

第 1 方 鹽酸清涼(酸甜)水 *Limonada hydrochlorica.*

稀鹽酸 0.5 *Acid. hydrochloric. dilut.*  
0.5

糖漿 10.0 *Sirup. simpl.* 10.0

餾水 加至 100.0 *Aq. destill.* ad 100.0

右一日量，三回分服。D. S 3 mal in 1 Tage.

主治 各種熱性病。

說明 本劑有清涼，止渴，助消化等作用。稀鹽酸量可增至 0.8—1.0。糖漿可改用橙皮或覆盆子糖漿 *Sirup. Cort. Aurant.*  
*S. Rub. Id.*

清涼水之配製，稀鹽酸之外，可用枸橼酸 *Acid. Citric.* (0.5%) 酒石酸 *Acid-tartaric.* (0.5) 稀磷酸 *Acid. phosphor. dilut.* (1%) 稀硫酸 *Acid. sulfuric. dilut.* (0.5%) 乳酸 *Acid. lactic.* (1%) 製之，而稱之為某酸清涼水，其中稀硫酸性者有止血作用，乳酸性者有止癩作用，可各因其宜而用之。

本方可伍下列諸藥。

1. 苦酞 *Tinct. amar.* 一回量 0.5—2.0
2. 杏仁水 *Aq. Prun. armeniac* 一回量 0.5—1.0



3. 莨菪酞 Tinct. Scopol. 一回量 0.5—1.0
4. 硫酸鎂 Magn. sulfuric. 一回量 5.0—10.0—30.0
5. 紅(葡萄)酒 Vin. rubr. 一回量 10.0—30.0
6. 狄茄令 Digalen 一回量 0.3—1.0—2.0
7. 康吡箭毒酞 Tinct. Strophanth. 一回量 2—10 滴
8. 番木鱈酞 Tinct. Strychn. (Vomicae) 一回量 5—20 滴
9. 波希鼠李流膏 Extract. Cascar. sagrad. fluid. 一回量 1.0—4.0
10. 麥角浸膏 Extract. Secal. Cornut. 一回量 0.05—0.2
11. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—1.0
12. 霹藍密藤 Pyramidon. 一回量 0.1—0.5
13. 鹽酸奎寧 Chinin. hydrochloric. 一回量 0.1—0.5—1.0
14. 阿片酞 Tinct. Opii 一回量 3—10—20 滴

例如熱性病人心機衰弱時可用下方。

## 第 2 方

稀鹽酸	0.5 Acid. hydrochl. dilut.	0.5
狄茄令	1.0 Digalen.	1.0
糖漿	10.0 Sir. simpl.	10.0
餾水	加至 100.0 Ap. dest,	ad 100.0

右一日量，三回分服。D. S. 3 mal in 1 Tage.

主治 各種熱性病人心機衰弱之徵者。

說明 餘可類推，如便秘則伍以硫酸鎂，下痢

則伍以阿片酞是。

清涼水加重碳酸鈉飽和之，則成飽和劑 Saturationes 卽賽耳退兒水 Selterswasser。有矯味，鎮吐，利尿等作用，處方如下。

### 第 3 方 賽耳退兒水 Selterswasser.

沸騰散 (Pulvis acrophorus)

酒石酸	1.5	Acid. tartaric.	1.5
重碳酸鈉	2.0	Natr. bicarbonic.	2.0
糖漿	10.0	Sir. simpl.	10.0
罇水	加至 100.0	Aq. destill.	ad 100.0

右一日量，三回分服。D. S. 3 mal in 1 Tage.

說明 配法先將結晶碳酸鈉與其他所欲加之藥物製成溶液，後加酸類之粉末或溶液，見泡沫發生卽成。酸類用酒石酸或枸橼酸，糖漿可用可不用，不用者曰無糖賽耳退兒水。

本劑可伍下列諸藥。

1. 苦酞 Tinct. amar. 一回量 0.5—2.0
2. 番毛地黃酞 Tinct. Digitalis. 一回量 5—20 滴。
3. 磷酸可待因 Codein. phosphoric. 一回量 0.005—0.02—0.05
4. 碘化鉀 Kal. jodat. 一回量 0.1—0.5—1.0
5. 溴化鉀 Kal. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
6. 溴化鈉 Natr. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
7. 莨菪酞 Tinct. Scopol. 一回量 0.5—1.0
8. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02—0.05

## 第二章 解熱治瘧劑

Antipyretica, et Antimalaria.

## 第4方

安替必林	0.5 Antipyrin.	0.5
乳 糖	0.5 Sacchar. lact.	0.5

右爲一包，頓服。 M. f. pulv No. 1

S. Auf 1 mal z. n.

主治 流行性感胃，肺炎，傷寒，結核，回歸熱，丹毒，以及其他各性熱病。

說明 本方可伍咖啡英 Coffein. 0.05—0.2用之。凡解熱藥二種併用時，其作用增強，副作用減弱，例如安替必林 0.26 阿司必林 0.26 乳糖 0.5 爲一包，其作用較本方強是也。

## 第3方

安替必林	1.0 Antipyrin.	1.0
乳 糖	1.0 Sacchar. lact.	1.0

右混和均分三包， M. f. pulv div. in

一日三回，一回一 part. aeq. No. 3

包。

S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 與前方同，兼治風痺症，頭病，神經痛。

說明 安替必林亦可爲水劑用之。

本方可伍下列諸藥。

1. 咖啡英 Coffein. 一回量 0.05—0.1—0.3
2. 精製樟腦 Camphor. dep. 一回量 0.05—

0.3

3. 薩羅耳 Salol. 一回量 0.3—1.0—2.0
4. 鱒藍密藤 Pyramidon. 一回量 0.1—0.5
5. 非那賽汀 Phenacetin. 一回量 0.3—0.5—1.0
6. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02—0.05
7. 鹽酸海洛因 Heroin. hydrochloric. 一回量 0.002—0.005
8. 磷酸可待因 Codein. phosphoric. 一回量 0.003—0.01—0.05
9. 杜奧他耳 Duotal. 一回量 0.2—0.5

安替必林水劑可伍下列諸藥。

1. 溴化鉀 Kal. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
2. 溴化鈉 Natr. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
3. 杏仁水 Aq. Lauro Cerasi 一回量 0.5—1.0—1.5
4. 安息香酸鈉咖啡英 Caffeine-Natr. benzo- 一回量 0.1—0.5
5. 碘化鉀 Kal. jodat 一回量 0.1—0.5—1.0
6. 硫酸鎂 Magn. sulfuric. 一回量 5.0—10.0—30.0
7. 柳酸鈉 Natr. salicylic. 一回量 0.5—1.0—2.0
8. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5

—2.0

9. 莨菪醇 Tinct. scopel. 一回量 0.5—1.0

## 第 6 方

霹藍密藤 0.3—0.5 Pyramiden. 0.3—0.5

乳 糖 1.0 Sacchar. lact. 1.0

右混和均分三包， M. f. pulv. div. in

一日三回，一回一 part aeq. No. 3

包。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 結核症之消耗熱，流行性感胃，傷寒，  
風痺，頭痛，神經痛諸症。

說明 本品解熱作用，比安替必林強三倍，故  
僅可用其三分之一量。

本方可伍下列諸藥。

1. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5  
—2.0

2. 澱粉酶 Diastase. 一回量 0.1—0.3

3. 杜奧他耳 Duotal. 一回量 0.2—0.5

霹藍密藤亦可製為水劑用之。

## 第 7 方

非那賽汀 0.3—0.5 Phenacetin. 0.3—0.5

右一包量，給同量 f. pulv. D. tal. dos. No. V.

五包，附澱粉囊， ad Capr. amylac.

一日三回。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 結核症發熱，流行性感胃。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—  
1.0

2. 薩羅耳 Salol 一回量 0.5—1.0—2.0
3. 鹽酸海洛因 Heroin. hydrochloric.  
一回量 0.002—0.005
4. 磷酸可待因 Codein. phosphoric.  
一回量 0.005—0.02—0.05
5. 溴化鉀 Kal. bromat. 一回量 0.5—1.0—  
2.0
6. 溴化鈉 Natr. bromat. 一回量 0.5—1.0  
—2.0
7. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5  
—2.0

## 第 8 方

愛爾邦錠

Elbon-Pastillen.

右給一管二十片， D. 1 Originalpackung zu  
每片含1.0，一日三 20. je 1.0

四回，一回一片。 S. 3—4 mal tgl. 1 Stuck.

主治 慢性結核性發熱，肺炎。

## 第 9 方

邁雷汀 0.6 Maretin. 0.6

乳 糖 2.0 Sacchar. lact. 2.0

右混和均分六包， M. f. pulv. div. in

一日三回，一回一 part. aeq. No. 6

包。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver,

主治 流行性感胃，結核症發熱。

## 第 10 方

鹽酸奎寧 0.3—0.5 Chinin. hydrochloric.

0.3—0.5

右爲一包，給同量 f. pulv. D. tal. dos.  
 五包，一日二三回 No. V.  
 ，一回一包，澱粉 S. 2-3mal tgl. 1 Pulver,  
 紙包服或盛膠囊服 in Cblate od. Kapseln.  
 用。 zu nehmen.

## 第 11 方

鹽酸奎寧	1.0	Chinin, hydrochloric.	1.0
餾水	8.0	Aq. destill.	8.0
稀鹽酸	3滴	Acid. hydrochloric. Dil.	
		Gtt III'	

覆盆子糖漿 加至100.0 Sirup. Rub. Id. ad 100.0  
 右混和一日數回， M. D. S. Mehrm. tgl.  
 一回一茶匙。 1 Teelöffel.

## 第 12 方

鹽酸奎寧	3.0	Chinin, hydrochloric.	3.0
麥芽浸膏(餾)	適量	Extract. Malt.	q.s.

右混和爲丸三十粒，ut f. pil. No. 30.  
 服法依示。 S. Nach Verordnung.

## 第 13 方

鹽酸奎寧	2.0	Chinin, hydrochloric.	2.0
阿片酊	0.5	Tinct. Opii	0.5
亞拉伯樹膠漿	50.0	Mucilagin. Gumm. arabic.	50.0

右混和分二回灌腸。 M. D. S. zu 2 Klystieren.

主治 (凡鹽酸奎寧劑) 瘧疾，產褥熱，流行性感胃，敗血症，膿毒症，丹毒，肺炎。

說明 瘧疾於發作前六時間頓服 0.5-1.0-1.5  
 即第十方一至三包，第廿方五至十五丸。

產褥熱，敗血症，丹毒等症，一日二三回，一回三至五丸，流行性感胃，一日六至十丸分服，肺炎亦然，不能內服時，試以灌腸。

奎寧劑，鹽酸奎寧外硫酸奎寧 *Chinin. sulfuric.* 鞣酸奎寧 *Chinin. tannic.* 均為常用，但其作用較弱，故其用量須大，又二烷炭酸奎寧 *Chinin. aethylcarbon.* 即歐奎寧 *Euchinin* 苦味極微，適用於小兒，婦人，神經過敏者。

## 第 14 方

硫酸奎寧	1.0	<i>Chinin. sulfuric.</i>	1.0
柯柯脂	6.0	<i>Ol. Cacao</i>	6.0

右混和為藥栓一個 *ut f. suppos. D. tal.*

，給同量三個，必 *dos. No. 3*

要時一個。

*S. Bei Bedarf. 1 Zäpfchen.*

說明 不能內服奎寧劑時用之。

## 第 15 方

歐奎寧	1.0	<i>Euchinin.</i>	1.0
-----	-----	------------------	-----

右為一包，給同量 *f. pulv. D. tal. dos.*

十包，一日三回， *No. X. S. 3 mal tgl.*

一回一包。 *1 Pulver*

主治 各種熱性病。

說明 鹽酸奎寧服後時見耳鳴，重聽，弱視，等副作用，而本品無之。

## 第 16 方

阿利斯妥欣	1.0	<i>Aristochin.</i>	1.0
-------	-----	--------------------	-----



右爲一包，給同量 f. pulv. D. tal. dos.

六包，一日二三回 No. 6

，一回一包 S. 2—3 mal tgl. 1 Pulver

主治 流行性感胃及其他熱性病。

說明 本品爲奎甯誘導體，無味無臭，且無副作用，而效力亦佳。

下列之 Aethylhydrocuprein 製劑，有謂其作強於奎寧，以之治肺炎及瘧疾者。

- a. 鹽酸奧撥妥欣 Optochin. hydrochloric. 爲白色苦味粉末，用量一回 0.5，一日三回。
- b. 鹽酸雷密琴 Remijin. hydrochloric. 一回量 0.2—0.3 一日三四回，宜食後服。
- c. 鞣酸雷密琴 Remijin. tannic 一回量 0.4，一日三四回，小兒流行性感胃或肺炎，亦多用之，其用量三個月以上小兒一回 0.03—0.05，二至五歲兒，一回 0.05—0.1，六至十二歲兒一回 0.15—0.25。

### 第 17 方

柳酸鈉 0.5—1.0 Natr. salicylic. 0.5—1.0

右爲一包，給同量 D. tal. dos. No X.

十包，一日 2—8 回， S. 2—8 mal tgl

一回一包。 1 Pulver.

主治 各種熱性病各種風痺症，漿液性肋(胸)膜炎，心囊炎，腹膜炎，腦膜炎。

說明 本品有害胃作用，宜加同量之重碳酸鈉，以預防之，亦可製爲水劑，此時加重酸