

國醫萬病自療叢書

傳染病

上海大眾書局印行

中華民國二十二年九月初版



總發行所

上海四馬路

大衆書局

代售處 各省各大書局

編輯者 茹十眉醫生
校訂者 吳克潛醫生
出版社 大衆書局
發行者 大衆書局

▲定價一元四角

外埠酌加
郵費匯費

國醫叢書

傳染病

全一冊

國醫
萬病叢書
自傳染病

例言

一、本書文字淺顯。撰句簡潔。極便一般人士之閱讀。或醫士之參考。

一、本書不侈高深。不論空理。在在以實能應用爲歸宿。一切詭異奇僻不近人情者。俱不錄入。

一、本書分傷寒、霍亂、痢疾、肺癆、天痘、麻疹、喉風、喉痧、大頭瘡、瘴疫、瘴瘻、寒瘻、間日瘧、春溫、夏溫、濕溫、冬溫、鳥癩、白癩等傳染症。非常詳備。

一、本書每病先述病狀。使人人皆得見其病狀而追求其病因。更考其病因而施以治療。則方無不效。病無不除矣。

一、本書各病均有單方。蓋濟急於一時者也。根本治療。尙以參閱處方爲要。

編者識

國醫
萬病自
傳染病目次

A 傷寒症治療法

傷寒太陽證	一
傷寒陽明證	四
傷寒少陽證	七
傷寒太陰證	九
傷寒少陰證	一一
傷寒厥陰證	一二
傷寒動氣	一四
傷寒發狂	一六
傷寒結胸	一七
傷寒痞氣	一九

傷寒血證

二

百合證

二

B 霍亂治療法

二

乾霍亂

二

濕霍亂

二

霍亂後轉筋

二

C 痢疾治療法

二

赤痢

二

白痢

二

赤白痢

二

膿血痢

二

噤口痢

二

休息痢

二

風痢	三八
寒痢	三九
濕痢	四〇
熱痢	四一
虛痢	四二
積痢	四三
久痢	四四
疫痢	四五
蟲疰痢	四五
五色痢	四六
痢疾腹痛	四七
第一期肺癆	四八
D 肺癆病治癆法	四九

第二期肺癆

四九

第三期肺癆

五〇

E. 痘 疗 治 療 法

天痘

五一

水痘

五八

麻疹

六〇

F. 喉 痘 治 療 法

喉風

六三

喉痧

六六

G. 瘡 疫 治 療 法

大頭瘡

六八

瘡 疫

七一

H. 瘡 疾 治 療 法

癰瘡

七二

寒瘡

七四

間日瘧

七六

瘧母

七七

I 溫病治療法

春溫

七八

夏溫

七九

濕溫

八〇

冬溫

八一

J 烏白癩治療法

烏癩

八二

白癩

八四

附錄 傳染病簡療法

傷寒

八五

霍亂

九二

痢疾

九三

肺病

一〇四

痘疹

一〇四

喉病

一〇九

瘧疾

一一〇

瘧疾

一一一

溫病

一一四

醫 藥 療 書 自 傳 染 痘

茹十眉醫士編 門人鄒素玲恭錄

A 傷寒症治療法

傷寒太陽證——傷寒陽明證——傷寒少陽證——傷寒太陰證——傷寒少陰證——傷寒厥陰證——傷寒動氣——傷寒發狂——傷寒結胸——傷寒痞氣——傷寒血證——

百合證

口 傷寒太陽證

【病狀】太陽傷風。則脈陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。齊齊惡寒。漸漸惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔。傷寒則頭痛發熱。身疼腰痛。骨節皆痛。惡風無汗而喘。兩傷風寒則脈浮緊。惡寒發熱。身痛。不汗出而煩燥。入腑則有蓄水蓄血之別。少腹滿。口渴。小便不利者爲蓄水症。少腹硬滿。小便自利者。爲蓄血症。治時失表則風寒化熱。陷入陽明。過汗則陽氣虛者易致亡陽。誤下則病發於陽者成結胸。病發於陰者成痞氣。體弱陽衰者成藏結。

【病因】從霜降以後至春分前。凡有觸冒霜露。體中寒邪。卽病者謂之傷寒。凡風寒客人。必先從太陽入。太陽之上。寒水主之。其經脈從目內眞上額交顴絡腦下項挾脊抵腰。其府爲膀胱。乃受邪第一步。

【治療】傷風宜服桂枝湯。傷寒宜服麻黃湯。風傷兩傷宜大青龍湯。蓄水宜五苓散。蓄血宜桃仁承氣湯。亡陽宜真武湯。結胸宜小陷胸湯。重者大陷胸湯。痞氣詳後傷寒痞氣條。藏結則爲難治之症。

一 桂枝湯

桂枝三錢 白芍藥二錢 甘草一錢

右剉作一帖。入生薑三片。大棗二枚。水煎溫服。須臾啜稀粥一盞。以助藥力。令遍身微汗爲佳。得汗勿再服。

二 麻黃湯

麻黃三錢 甘草六分 杏仁十枚 桂枝二錢

右剉作一帖。入薑三片。葱白二莖。水煎服。如上法。有汗勿再服。

三 大青龍湯

麻黃三錢 桂枝二錢 杏仁一錢半 石膏四錢 甘草一錢
右剉作一帖。入薑三片。棗二枚。水煎服如上法。有汗勿服。

四 五苓散

澤瀉一兩一分 猪苓(去皮) 白朮 茯苓各三分 玉桂(去皮)二分
右五味爲末。白飲服方寸匕。日三服。多飲暖水。汗出即愈。

五 桃仁承氣湯

桃仁五十個(去皮尖) 桂枝二兩(去皮) 大黃四兩 芒硝 甘草(炙)各二兩
右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三服。

六 眞武湯

茯苓 芍藥 生薑各三兩(切) 白朮二兩 附子一枚(泡去皮破八片)
右五味以水八升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三服。

七 小陷胸湯

黃連一兩 半夏半升(洗) 括婁實大者一個

右三味以水六升先煮括婁取三升去滓納諸藥煮取二升去滓分溫三服。

八 大陷胸湯

大黃六兩(去皮) 芒硝一升 甘遂一錢

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓納芒硝一兩沸納甘遂末溫服一升得快利止後服。

傷寒陽明證

【病狀】前額眼眶痕痛。鼻築築而流清。發熱不惡寒。此邪中陽明之經。目燥心煩。汗出惡熱。渴欲飲冷。此熱邪漸入陽明之裏。張目不眠。聲音響亮。口臭氣粗。身輕惡熱。大便閉結。此邪入陽明之腑。邪在經分。過汗或下之。則熱邪搏結而胸悶煩熱。下利後更煩者。此爲虛煩。若陽明素有濕邪。熱入相合。身必發黃。卽陽黃也。

【病因】陽明之上。燥氣主之。其經脈挾鼻絡於目。陽明爲多氣多血之海。乃陽盛之經。其府爲胃。萬物所歸。無所復傳。

【治療】宜服葛根湯以解其表。白虎湯以徹其熱。大承氣湯。小承氣湯。調胃承氣湯等。以酌病之輕重而蕩其實。胸悶虛煩者。宜梔豉湯以輕宣清熱。陽黃者。宜茵陳蒿湯。以清化濕熱。

一 葛根湯

葛根四兩 麻黃三兩（去節） 桂枝二兩（去皮） 芍藥二兩（切） 甘草二兩（炙） 生薑三兩（切） 大棗十二枚（擘）

右七味㕮咀。以水一斗。先煮麻黃葛根。減二升去沫。納諸藥。煮取三升。溫服一升。覆取微汗。不須啜粥。

二 白虎湯

知母六兩 石膏一斤（碎） 甘草二兩 梗米六合

右四味以水一斗。煮米熟。湯成。去滓。溫服一升。日三服。

三 大承氣湯

大黃四兩（酒洗） 厚朴半斤（去皮炙） 枳實五枚（炙） 芒硝三合

右四味以水一斗。先煮二物。取五升。去滓。納大黃取二升。去滓。納芒硝。更上微火。一兩沸。分溫再服。得

下。餘勿服。

四 小承氣湯

大黃四兩 厚朴二兩（去皮炙） 枳實三枚（炙）

右三味以水四升煮。取一升二合。去滓分溫二服。初服湯當更衣。不爾者盡飲之。若更衣者勿服之。

五 調胃承氣湯

大黃四兩（去皮清酒浸） 甘草二兩（炙） 芒硝半斤

右三味咬咀。以水三升。先煮大黃甘草。取一升。去滓納芒硝。更上微火煮令沸。少少溫服。

六 梔子豉湯

梔子十四枚（擘） 香豉四合（搗裹）

右二味以水四升。先煮梔子。得二升半。納豉煮取一升半。去滓分爲二服。溫進。一服得吐者。止後服。

七 茵陳蒿湯

茵陳蒿六兩 梔子十四枚 大黃一兩

右以水一斗。先煮茵陳減六升。入二味煮取三升。去滓分溫三服。小便當利如皂角汁狀。色正赤。一宿

傷寒少陽證

【病狀】頭痛在側。耳聾喜嘔。不欲食。胸脅滿。往來寒熱。小便不利。此爲邪在少陽之經。口苦咽乾。目眩自利。此爲邪在少陽之府。更兼不大便。小腹痛。則爲少陽陽明合病。若熱汗出。頭痛。心下痞硬滿。引脇下痛。乾嘔不惡寒。此表解未和也。

【病因】少陽之上。火氣主之。居於半表半裏之間。而爲陽樞。其經脈行於身側。相火游行。症多熱象。

【治療】邪在經者。宜服小柴胡湯。邪在府者。宜服黃芩湯。少陽陽明合病者。宜用大柴胡湯。表解未和者。宜服十棗湯。

一 小柴胡湯

柴胡半斤 黃芩 人參 甘草各三兩 半夏半升(洗) 生薑三兩(切) 大棗十二枚(擘)
右七味水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。若胸中煩而不嘔。去半夏人參。加

括萎實一枚。若渴者去半夏加人參。合前成四兩半。括萎根四兩。若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩。若脇痞鞭。去大棗加牡蠣四兩。若心下悸。小便不利者去黃芩加茯苓四兩。若不渴外有微熱者去人參加桂三兩。溫覆取微汗愈。若欬者去人參大棗生薑。加五味子半升乾薑二兩。

二 黃芩湯

黃芩 甘草 芍藥各三兩 大棗十二枚

右水一斗。煮取三升。去滓溫服一升。日再夜一服。嘔者加半夏半升。生薑三兩。

三 大柴胡湯

柴胡半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 半夏半斤(洗) 生薑五兩(切) 枳實四枚(炙) 大棗十

二枚(擘) 大黃二兩

右八味以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。溫服一升。日三服。

四 十棗湯

芫花(微炒) 甘遂 大戟(炒)

右等分爲末。別取大棗十枚。煎至半盞。去藥調藥末。強人十錢。弱人半錢。服大便利下去。以粥補之。