

高等学校教学参考书

# 微积分学教程

第二卷 第一分册

Г. М. 菲赫金哥尔茨著

北京大学高等数学教研室译

---

人民教育出版社

高等学校教学参考书

# 微 积 分 学 教 程

第二卷 第一分册

Г. М. 菲赫金哥尔茨著  
北京大学高等数学教研室译

人 民 教 育 出 版 社

本书第二卷根据菲赫金哥尔茨 (Г. М. Фихтенгольц) 所著《微积分学教程》(Курс дифференциального и интегрального исчисления) 第二卷 1951 年版译出。可作为综合大学数学专业教学参考。

## 微 积 分 学 教 程

第二卷 第一分册

---

Г. М. 菲赫金哥尔茨著

北京大学高等数学教研室译

人民教育出版社出版(北京沙滩后街)

人民教育出版社印刷厂印装

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

---

统一书号13012·0108 开本 850×1168 1/32 印张 8 4/16

字数 255,000 印数 77,101—135,100 定价(8)¥0.80

1956年12月第1版 1979年12月北京第10次印刷

# 字 义 索 引

## 二 画

- 二項微分, биномиальный дифференциал 42  
 ~ 的递推公式, приведения формулы для — — 44  
 ~ 的积分法, интегрирование — — 42

## 三 画

- 三角函数, тригонометрические функции  
 ~ 与双曲函数的联系, связь — — с гиперболическими функциями 193  
 ~ 与指数函数表达式的积分法, интегрирование тригонометрических и показательных выражений 64  
 三角替换, тригонометрические подстановки 20

## 四 画

- 分区間的基本叙列, основная последовательность разбиений промежутка 87  
 分部积分法, интегрирование по частям 21  
 双曲线, гипербола 173, 192  
 双曲线函数, гиперболические функции 193  
 双曲替换, гиперболическая подстановка 20  
 双纽线, лемниската 174  
 无穷小元素求和法, суммирование бесконечно малых элементов 225  
 不定积分, неопределённый интеграл 2  
 ~ 表, таблица — — 7  
 ~ 的几何解释, геометрическое истол-

- кование — — 4  
 ~ 的存在, существование — — 109  
 ~ 的性质, свойства — — 3  
 巴若, Барроу 5  
 中值定理, теорема о среднем значении 105  
 广义 ~, обобщённая — — — — 107  
 第二 ~, вторая — — — — 110  
 ~ 与拉格朗日公式的联系, связь с Формулой Лагранжа — — — — 118  
 递推公式, приведения формулы  
 二項微分的 ~, — — для биномиальных дифференциалов 44  
 $\sin^u x \cos^v x$  的积分的 ~, — — для интегралов от  $\sin^u x \cos^v x$ . 66  
 定积分的 ~, — — для определённых интегралов 123  
 区間上的方向, направление в промежутке 100

- 牛顿, Ньютон 5  
 牛顿和莱不尼兹的定理, теорема Ньютона и Лейбница 5  
 心臟线, кардиоида

## 五 画

- 卡大兰常数, постоянная Каталана 158  
 且白雪夫, Чебышев 43  
 可加性, аддитивность  
 弧长的 ~, — длины дуги 165  
 面积的 ~, площади 184  
 体积的 ~, — объёма 199  
 可求积的条件, условие квадратуемости



- 狄銳西勒, Дирихле 119  
 ~ 函数, функция — 97
- ## 八 画
- 阿基米德螺綫, Архимедова спираль 171  
 定了向的区間, ориентированный промежуток 100  
 定积分, определённый интеграл 88  
 ~ 应用的大意, схема применения — 222  
 ~ 的递推公式, приведения формулы для — — 123  
 ~ 的存在条件, условия существования — — 91  
 ~ 的性质, свойства — — 100  
 ~ 的换元公式, формула замены переменной в — — 128  
 ~ 計算的基本公式, основная формула интегрального исчисления — — 117  
 定积分的計算法, вычисление определённых интегралов  
 分部积分法, интегрирование по частям 125  
 用原函数, с помощью первообразной 117  
 用积分和, с помощью интегральных сумм 113  
 波内公式, формула Бонне 112  
 物体, тело  
 ~ 的重心, центр тяжести — 236  
 ~ 靜力矩, статический момент — 236  
 ~ 轉动慣量, момент инерции — 238  
 物体的体积, объём тела 199  
 用断面求 ~, — — по поперечным сечениям 203
- ~ 的可加性, аддитивность — — 199  
 ~ 的存在条件, условие существования — — 200  
 ~ 的积分表达式, выражение интегралом — — 202  
 ~ 视为极限, — — как предел 200  
 欧拉, Эйлер 47  
 ~ 替换, — подстановки или подстановка — 47  
 初始条件, начальные условия, 4  
 环面, тор 227  
 奇函数在对称区間上的积分, интеграл по симметричному промежутку нечётной функции 132  
 空間曲綫的弧长, длина дуги пространственной кривой 181  
 变量的开始值, начальное значение величины 4  
 周期函数在周期区間上的积分, периодическая функция интеграла по периоду 132
- ## 九 画
- 弧长, длина дуги 163  
 ~ 的可加性, аддитивность — — 165  
 ~ 的积分表达式, выражение интегралом — — 166  
 ~ 的微分, дифференциал — — 169  
 星形綫, астроида 170  
 柱面, цилиндрическая поверхность  
 ~ 的重心, центр тяжести — — 237  
 ~ 的面积, площадь — — 217  
 ~ 的靜力矩, статический момент — — 237  
 面积的可加性, аддитивность площадь 184  
 柳維耳, Лиувилль 83

約翰·伯努里, Иоганн Бернулли	86	勒让德, Лежандр	83
		~ 多項式, полиномы —	131
		~ 形式的橢圓积分, эллиптические интегралы в форме —	83
		~ 函数 $F(k, \varphi)$ , $E(k, \varphi)$ , Функции —	84
		$F(k, \varphi)$ , $E(k, \varphi)$	84
		~ 函数 $F(k)$ , $E(k)$ , Функции —	136
		$F(k)$ , $E(k)$	136
		通常积分的近似計算, приближённое вычисление собственных интегралов	144
		通常意义下的定积分, определённый интеграл в собственном смысле	88
<b>十 画</b>			
原函数, первообразная функция	1, 123		
积分正弦, интегральный синус	73		
积分对数, интегральный логарифм	73		
积分余弦, интегральный косинус	73		
积分和, интегральная сумма	88		
上(下) ~, верхняя (нижняя) —	—		
	89		
积分, интеграл			
~ 的上(下)限, верхний (нижний) пределы —	88		
~ 的代数部分分离法, выделение алгебраической части —	58		
~ 的有理部分的分离法, выделение рациональной части —	34		
~ 对于其上(下)限的微分法, дифференцирование — по верхнему (нижнему) пределу	109		
不能表成有限形状的~, не выражающиеся в конечном виде —	27, 43, 73, 75, 83		
积分法, интегрирование			
~ 的法则, правила —	8		
换元(替换)~, — подстановкой	13		
根式的~, — радикальных выражений	40		
有理函数的~, — рациональных выражений	26		
有限形状的~, — в конечном виде	26		
真分式展成部分(简单)分式, разложение на простые правильной дроби	12		
泰乐公式的余項, дополнительный член формулы Тейлора	139		
矩形公式, Формула прямоугольников	144		
~ 的余項, дополнительный член—	150		
		部分(简单)分式, простые дроби	27
		~ 的积分法, интегрирование —	27
		球, сфера	
		半~, полусфера	237
		~ 带, шаровой пояс	215
		笛卡儿叶形綫, Декартов лист	197
		梯形公式, формула трапеции	144
		~ 的余項, дополнительный член —	151
		被积函数, подынтегральная функция	2
		~ 的有理化, рационализация, —	41
		偶函数在对称区間上的积分, интеграл по симметричному промежутку чётной функции	131
		旋輪綫, циклоида	171
		圆内~, гипоциклоида	180
		圆外~, эпициклоида	180
		迴轉面, поверхность вращения	
		~ 的重心, центр тяжести — —	237
		~ 的面积, площадь — —	211
		~ 的静力矩, статический момент —	237

悬链线, цепная линия	170	圆柱弓形体, цилиндрический отрезок	207
~ 的渐伸线, эвольвента — —	174	圆滑的曲面, гладкая поверхность	201
<b>十二画</b>		圆滑的曲线, гладкая кривая	188
莱不尼慈, Лейбниц	86	圆锥, круговой конус	205
莱不尼慈和牛頓的定理, теорема Лейбница и Ньютона	5	线性分式替换, дробно-линейная подстановка	60
费叶 Фейер	119	<b>十五画</b>	
替换(换元), подстановка (замена переменной)	13	黎曼, Риман	88
奥斯特洛格拉得斯基公式, формула Остроградского	36	黎曼(积分)和, Риманова (интегральная) сумма	88
奥斯特洛格拉得斯基关于积分的有理部分分出法, методов Остроградского о выделении рациональной части интеграла	34	蜗线, улитка	173
<b>十三画</b>		<b>十六画</b>	
数 $e$ 的超越性, трансцендентность чисел $e$	140	椭圆, эллипс	172
微分方程, дифференциальное уравнение	241	椭圆积分, эллиптические интегралы	74, 81
~ 的构成, составление — —	249	~ 的模, модуль — —	84
<b>十四画</b>		全 ~, полные — —	136
渐屈线的本性方程, натуральное уравнение эволюты	181	伪 ~, псевдо — —	76
维维亚尼曲线, кривая Вивiani	182	勒让德形式的~, — в форме Лежандра	83
圆内旋轮线, гипоциклоида	180	<b>十七画</b>	
圆外旋轮线, эпициклоида	180	螺旋线, винтовая линия	182
圆的渐伸线, эвольвента круга	171	<b>十八画</b>	
		额尔米特, Эрмит	140
		<b>十九画</b>	
		蓝登变换, преобразование Ландена	134



# 第一分册目录

## 第八章 原函数(不定积分)

- § 1. 不定积分与它的计算的最简单方法 .....1  
251. 原函数(即不定积分)的概念(1) 252. 积分与面积定义问题(4) 253. 基本积分表(7) 254. 最简单的积分法则(8) 255. 例题(10) 256. 换元积分法(13) 257. 例题(17) 258. 分部积分法(21) 259. 例题(23)
- § 2. 有理式的积分 .....26  
260. 在有限形状中积分问题的提出(26) 261. 部分分式与它们的积分(27) 262. 分解真分式为部分分式(29) 263. 系数的确定、真分式的积分(33) 264. 分离积分的有理部分(34) 265. 例题(38)
- § 3. 某些含有根式的函数的积分 .....40  
266. 形状为  $R\left(x, \sqrt[n]{\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}}\right)$  的积分、例题(40) 267. 二项式微分式的积分、例题(42) 268. 递推公式(44) 269. 形状为  $R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$  的表达式的积分、欧拉替换(47) 270. 欧拉替换的几何解释(49) 271. 例题(50) 272. 其他的计算方法(55) 273. 例题(62)
- § 4. 含有三角函数与指数函数的表达式的积分 .....64  
274. 关于  $R(\sin x, \cos x)dx$  的积分(64) 275. 关于表达式  $\sin^n x \cdot \cos^n x$  的积分(66) 276. 例题(69) 277. 其他情形的概述(72)
- § 5. 椭圆积分 .....74  
278. 一般说明及定义(74) 279. 辅助变换(76) 280. 化成标准形式(79) 281. 第一、第二与第三类椭圆积分(81)

## 第九章 定积分

- § 1. 定积分的定义与存在条件 .....85  
282. 处理面积问题的另一方法(85) 283. 定义(87) 284. 达布和数(88) 285. 积分的存在条件(91) 286. 可积函数的种类(93) 287. 可积函数的一些性质(95) 288. 例题及补充(97) 289. 看作极限的下积分与上积分(98)
- § 2. 定积分的一些性质 .....100  
290. 沿定向区间的积分(100) 291. 可用等式表示的一些性质(101) 292. 可用不等式表示的一些性质(103) 293. 定积分看作积分上限的函数(108) 294. 第二中值定理(110)

§ 3. 定积分的计算与变换 .....	113
295. 借助于积分和数的计算(113)	296. 积分学的基本公式(117)
297. 例题(118)	298. 基本公式的另一导出法(122)
299. 递推公式(123)	300. 例题(125)
301. 定积分的换元公式(128)	302. 例题(129)
303. 高斯公式、蓝登变换(134)	304. 换元公式的另一导出法(137)
§ 4. 定积分的一些应用 .....	139
305. 瓦理斯公式(139)	306. 带余项的泰乐公式(139)
307. 数 $e$ 的超越性(140)	308. 勒让德多项式(142)
§ 5. 积分的近似计算 .....	144
309. 问题的提出、矩形及梯形公式(144)	310. 抛物线型补插法(147)
311. 积分区间的分割(149)	312. 矩形公式的余项(150)
313. 梯形公式的余项(151)	314. 辛卜生公式的余项(152)
315. 例题(154)	
<b>第十章 积分学在几何学、力学与物理学中的应用</b>	
§ 1. 弧长 .....	160
316. 引理(160)	317. 曲线上的方向(162)
318. 弧长的定义(163)	319. 弧长的可加性(165)
320. 弧长存在的充分条件及弧长的算法(166)	321. 不定弧; 它的长度的微分(169)
322. 例(170)	323. 平面曲线的本性方程式(176)
324. 例(179)	325. 空间的曲线的弧长(181)
§ 2. 面积与体积 .....	182
326. 面积概念的定义、可加性(182)	327. 面积看作极限(184)
328. 可求积的区域种类(187)	329. 面积的积分表达式(189)
330. 例(191)	331. 体积概念的定义及其特性(199)
332. 有体积的立体的种类(200)	333. 体积的积分表达式(202)
334. 例(205)	335. 迴转面的面积(211)
336. 例(215)	337. 柱面面积(217)
338. 例(219)	
§ 3. 力学与物理学的数量的计算 .....	222
339. 定积分应用的大意(222)	340. 曲线的静力矩与重心的求法(225)
341. 例(226)	342. 平面图形的静力矩与重心的求法(228)
343. 例(229)	344. 力学上的功(230)
345. 例(232)	346. 平面轴基的摩擦力的功(234)
347. 无穷小元素求和的问题(236)	
§ 4. 最简单的微分方程式 .....	241
348. 基本概念、一般方程式(241)	349. 微商的一次方程式、分离变量(242)
350. 问题(245)	351. 关于微分方程式的构成的附注(249)
352. 问题(250)	

## 第八章 原函数(不定积分)

### §1 不定积分与它的計算的最簡單方法

251. 原函数(即不定积分)的概念 在科学与技术的許多問題中, 我們所需要的不是由給定的函数求它的微商, 相反地, 是要由一个函数的已知微商还原出这个函数。在第91目中, 假定已知运动的方程  $s = s(t)$ , 即是, 路程随時間而变化的变化規律, 我們用微分法先得出了速度  $v = \frac{ds}{dt}$ , 然后找出加速度  $a = \frac{dv}{dt}$ 。但实际上, 时常需要解决反面的問題: 給定加速度  $a$  是時間  $t$  的函数,  $a = a(t)$ , 要求确定速度  $v$  与所經路程  $s$  依赖于  $t$  的关系。 这样, 就需要由函数  $a = a(t)$  还原出一个函数  $v = v(t)$ , 它的微商就是  $a$ , 然后, 知道了函数  $v$ , 再求一个函数  $s = s(t)$ , 而它的微商就是  $v$ 。

我們給出下面的定义:

如果在給定的整个区間上,  $f(x)$  是函数  $F(x)$  的微商, 或  $f(x)dx$  是  $F(x)$  的微分

$$F'(x) = f(x) \text{ 或 } dF(x) = f(x)dx^*,$$

那么, 在所給定的区間上, 函数  $F(x)$  叫做  $f(x)$  的原函数或  $f(x)$  的积分。

求一个函数的所有的原函数, 叫做求积分, 这是积分学的问题之一; 可以看出, 这是微分学基本问题的反面问题。

---

\* 在这情形下也可說函数  $F(x)$  是微分表达式  $f(x)dx$  的原函数(或积分)。

**定理** 如果在某一个区間  $\mathcal{R}$  (有穷的或无穷的, 閉的或非閉的) 上, 函数  $F(x)$  是  $f(x)$  的一个原函数, 那么, 函数  $F(x) + C$  也是  $f(x)$  的原函数, 其中  $C$  是任意常数。反过来說, 在区間  $\mathcal{R}$  上  $f(x)$  的每一个原函数可表示成这种形式。

证明只要限于  $\mathcal{R}$  是有穷閉区間  $[a, b]$  的情形就够了。

$F(x)$  与  $F(x) + C$  同是  $f(x)$  的原函数, 这个情形是十分明显的, 因为  $[F(x) + C]' = F'(x) = f(x)$ 。

现在設  $\Phi(x)$  是函数  $f(x)$  的任何一个原函数, 于是在区間  $[a, b]$  上

$$\Phi'(x) = f(x).$$

因为函数  $F(x)$  与  $\Phi(x)$  在所考虑的区間上有相同的微商, 所以它們只相差一个常数[126, 系理]:

$$\Phi(x) = F(x) + C,$$

这就是所要证明的。

由这定理推知, 为要知道給定函数  $f(x)$  的所有的原函数, 只要求出它的一个原函数  $F(x)$  就够了, 因为它們彼此之間只差一个常数項。

由此, 表达式  $F(x) + C$  是微商为  $f(x)$  或微分为  $f(x)dx$  的函数的一般形状, 其中  $C$  是任意常数。这表达式称为  $f(x)$  的不定积分, 用記号

$$\int f(x)dx$$

来表示, 这个記号中已暗含有任意常数。乘积  $f(x)dx$  称为被积表达式, 函数  $f(x)$  称为被积函数。

**例題** 設  $f(x) = x^2$ ; 不难看出, 这个函数的不定积分是

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C.$$

这很容易用反面的演算——微分法——来验证。

我們提醒讀者注意, 在“积分”記号  $\int$  下写的是所要求原函数的微分, 而不是微商 (在我們的例題里是  $x^2 dx$ , 而不是  $x^2$ )。以后在 [282] 中将要闡明, 这样的記法是有历史根据的; 而且它还表現着許多优点, 因

而保留它是十分合理的。

从不定积分的定义直接推出下列的一些性质:

$$1. d\int f(x)dx = f(x)dx,$$

即是, 記号  $d$  与  $\int$ , 当前者位于后者的前面时, 可互相消去。

2. 因为  $F(x)$  是函数  $F'(x)$  的一个原函数, 我們有

$$\int F'(x)dx = F(x) + C,$$

这式子可以改写为

$$\int dF(x) = F(x) + C.$$

由此可見, 在  $F(x)$  前面的記号  $d$  与  $\int$ , 当  $d$  在  $\int$  后面的时候, 也可把它们消去, 但必須在  $F(x)$  后加上一个任意常数。

回到我們一开始就提出来的那个力学問題上, 現在我們可以写

$$v = \int a(t)dt$$

与

$$s = \int v(t)dt.$$

为了明确起見, 假定我們要討論的运动是等加速运动, 例如, 在重力作用下的运动; 这时  $a=g$  (沿鉛垂綫向下的方向为正方向), 并且, 不难了解

$$v = \int g dt = gt + C.$$

我們得到了速度  $v$  的表达式, 在这表达式中, 除時間  $t$  外, 还包含有一个任意常数  $C$ 。在同一时刻, 对于不同的  $C$  的值, 我們將得到速度的不同的值; 因此, 对于問題的完全解决, 我們已有的数据是不够的。为要得出問題的完全确定的解决, 需要知道在某一时刻速度的数值才够。例如, 設已知在  $t=t_0$  时速度  $v=v_0$ ; 我們把这些值代入所求得的速度表达式中

$$v_0 = gt_0 + C,$$

由此

$$C = v_0 - gt_0,$$

現在我們的解就有了完全确定的形状

$$v = g(t - t_0) + v_0.$$

其次，我們求得路程  $s$  的表达式

$$s = \int [g(t - t_0) + v_0] dt = \frac{1}{2} g(t - t_0)^2 + v_0(t - t_0) + C'$$

(用微分法容易验证，原函数可以取这样的形式)。例如，假定在  $t = t_0$  时路程  $s = s_0$  给定，我們就可以确定新的未知常数  $C'$ ；求得  $C' = s_0$  之后，我們便可以写出解的最后的形状

$$s = \frac{1}{2} g(t - t_0)^2 + v_0(t - t_0) + s_0.$$

习惯上称值  $t_0, s_0, v_0$  为量  $t, s$  与  $v$  的开始值。

我們知道，函数  $y = F(x)$  的微商给出对应图形的切线的斜率。因此，可以这样来解释求给定函数  $f(x)$  的原函数  $F(x)$  的问题：要找出一条曲线  $y = F(x)$ ，使它的切线斜率适合给定的变化规律

$$\operatorname{tg} \alpha = f(x).$$

如果  $y = F(x)$  是这些曲线之一，那么，只須把它顺着  $y$  轴作简单的




图 1

平移，便可以得到所有其余的曲线（移动的距离  $C$  是任意的，图 1）。为要从这族曲线得出一条个别的曲线，只需给出（举例来说）这曲线应当通过的一点  $(x_0, y_0)$  就够；开始条件  $y_0 = F(x_0) + C$  就给出  $C = y_0 - F(x_0)$ 。

**252. 积分与面积定义问题** 把原函数解释作曲线图形的面积是更为重要的。因为在历史上原函数概念与面积的确定有极其紧密的联系，所以我们就在这儿来讲述这个问题（这儿只利用平面图形的面积的直觉的表示，而把这个问题的精确提法留到第十章去讲）。

設給定在区間  $[a, b]$  上只取正(或非負)值的連續函数  $y=f(x)$ 。考虑限制在曲綫  $y=f(x)$  下,  $x$  軸上及两纵綫  $x=a$  与  $x=b$  之間的图形  $ABCD$  (图 2); 我們把这类图形叫做 曲綫梯形。想要确定这图形的

面积  $P$  的值, 我們研究 变动图形  $AMND$  的面积的性质, 这变动图形包含在开始纵綫  $x=a$  以及跟区間  $[c, b]$  上任意选出的  $x$  值相对应的纵綫之間。当  $x$  改变时, 这个面积将随之而变, 并且对应于每一  $x$  有它的一个完全确定的




图 2

值, 于是曲綫梯形  $AMND$  的面积是  $x$  的某一函数; 我們用  $P(x)$  表示它。

我們首先提出求 函数  $P(x)$  的微商的問題。为了这个目的, 我們給  $x$  添上某一个(比方說, 正的)改变量  $\Delta x$ ; 此时面积  $P(x)$  将获得改变量  $\Delta P$ 。

以  $m$  及  $M$  分別表示在区間  $[x, x+\Delta x]$  上函数  $f(x)$  的最小值与最大值[84], 并将面积  $\Delta P$  与底为  $\Delta x$ , 高为  $m$  及  $M$  的矩形的面积加以比較。显然

$$m\Delta x < \Delta P < M\Delta x,$$

由此

$$m < \frac{\Delta P}{\Delta x} < M.$$

如果  $\Delta x \rightarrow 0$ , 那么, 由于連續性,  $m$  与  $M$  趋于  $f(x)$ , 因而

$$P'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta x} = f(x).$$

这样, 我們就得到一个有名的定理(通常叫做牛頓-萊不尼慈定理)\*: 变动面积  $P(x)$  对有穷的横坐标  $x$  的微商等于有穷的纵坐标

\* 其实, 这个定理——虽然是在另一种形式里——已为牛頓的老师巴若(Is. Barow)发表过了。

$y=f(x)$ 。

換句話說，变动面积  $P(x)$  是給定函数  $y=f(x)$  的原函数。由于当  $x=a$  时这个原函数变为 0 这一特点，使得它与原函数族中其他的原函数有所不同。因此，如果已知函数  $f(x)$  的任何一个原函数  $F(x)$ ，則按前一目中的定理就有

$$P(x) = F(x) + C,$$

那么，令  $x=a$ ，就容易定出常数  $C$

$$0 = F(a) + C, \text{ 于是 } C = -F(a).$$

最后

$$P(x) = F(x) - F(a).$$

特別地，要求得整个曲綫梯形  $ABCD$  的面积  $P$ ，需要取  $x=b$ ：

$$P = F(b) - F(a).$$

作为例子，我們求界限在抛物綫  $y=ax^2$  下， $x$  軸上及对应于給定横坐标  $x$  的纵坐标之間的图形的面积  $P(x)$  (图 3)；因为抛物綫交  $x$  軸于坐标軸的原点，所以，在这儿  $x$  的开始值为 0。容易找出函数  $f(x)=ax^2$  的原函数： $F(x)=\frac{ax^3}{3}$ 。当  $x=0$  时这个函数恰好变为 0，所以

$$P(x) = F(x) = \frac{ax^3}{3} = \frac{xy}{3}$$

[比較 32, 4]。

由于在計算积分与求平面图形的面积之間有联系，通常习惯于把积分計算本身叫作求积。

为了把以上所讲的全部事实推广到也取負值的函数的情形，只要約定把图形中位于  $x$  軸下面那一部分的面积的值算为負值就行了。

这样，在区間  $[a, b]$  上不管怎样的連續函数  $f(x)$ ，讀者总可以把它的原函数想象成給定函数的图形所划出的变动面积的形式。可是，




图 3



把这个几何的解释就认为是原函数存在性的证明,当然是不可以的。因为面积概念本身还没有根据。

在下章[293]中,我们可以对下面的重要事实给出严格的并且纯粹分析的证明,这个事实就是:在给定区间上的每个连续函数  $f(x)$  都有在这区间上的原函数。这个断言我们现在就加以采用。

在本章中我们只讲连续函数的原函数。如果实际给出的函数有间断点,那么我们将只在它连续的区间上考虑它。因此,承认了上述断言之后,我们就无须每次预先讲明积分是否存在:我们所考虑的积分总是存在的。

**253. 基本积分表** 由微分学中的每个公式,这公式建立着某一函数  $F(x)$  的微商是  $f(x)$ ,可以直接导出相当的积分学中的公式

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

现在选出第 94 目中计算初等函数的微商的那些公式,也选出后来(对于双曲线函数)推出的一些公式,就可作出下面的积分表:

1.  $\int 0 \cdot dx = C.$
  2.  $\int 1 \cdot dx = \int dx = x + C.$
  3.  $\int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C, (\mu \neq -1).$
  4.  $\int \frac{1}{x} dx = \int \frac{dx}{x} = \log |x| + C.$
  5.  $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \int \frac{dx}{1+x^2} = \text{arc tg } x + C.$
  6.  $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \text{arc sin } x + C.$
  7.  $\int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + C.$
- $$\int e^x dx = e^x + C.$$