

中國醫學大辭


R2-61/29:2



医药学院 6102 11020909

現代第一部權威中醫經典
廣大中醫工作者的必備之工具書

主編 謝觀



中醫大辭典

(下卷)

商務印書館
國際有限公司

2004年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中医大辞典 / 谢观编. —北京: 商务印书馆国际有限公司, 2003

ISBN 7 - 80103 - 344 - 2

I . 中... II . 谢... III . 中国医药学 - 词典
IV . R2 - 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 108669 号

ZHONGYI DA CIDIAN

中医大辞典

商务印书馆国际有限公司出版发行

(北京市东城区史家胡同甲24号 邮编: 100010)
(电子信箱: epinter@public3.bta.net.cn)

出版人: 程孟辉

封面设计: 付 强

全国新华书店经销

发行热线: (010) 65598498 电话、传真: 65234023

三河艺苑印刷厂印刷

字数: 3550 千字

开本: 787 × 1092mm 1/32 160 印张

2003 年 10 月北京第 1 版 2004 年 1 月河北第 2 次印刷

印数: 3030 册

定价: 188.00 元

如有印刷质量问题, 影响阅读, 请与我公司联系调换

中國醫學大辭典補遺

一 畫

【一上散】○張潔古方。功用療蠍蟄痛。藥品生半夏。雄黃(另研)各一字。巴豆一個。(去皮研如泥)用法研爲細末和勻敷之。朱丹溪方。功用療疥瘡痛癩。或喜湯火烘洗。鱗蟲蛇牀子(略炒)雄黃(另研)黑狗脊寒水石(另研)白膠香(銅錢熬熔過傾乾石頭上放冷)各一兩。白礬黃連各五錢。吳茱萸三錢。硫黃二錢五分(另研)斑蝥十四枚。(去翅足)用法研爲細末先以蒼耳草或羊不食草藤濃煎湯洗去瘡痂。然後用香油調敷。證治準繩方。○功用療皮膚燥癩生瘡。藥品苦參一兩。白芷。鈇硝。枯礬各五錢。荆芥穗。白芨各三錢。寒水石二兩(煅)用法研爲末油調塗。○功用療疥癬。藥品雄黃熟硫黃。黑狗脊。蛇牀子(炒)各五錢。寒水石六錢。斑蝥(去翅足研碎)三個。用法先以雄黃硫黃寒水石研如粉次入斑蝥和

勻。蛇牀子黑狗脊另爲細末同研勻洗疥癩令湯透去痂油調手中擦熱鼻中嗅二三次擦上可一上卽愈。如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍。如不苦癩加狗脊微癩加蛇牀子瘡孔中有蟲加雄黃喜火炙湯燙加硫黃口臭不止亦可愈。

【二字金】證治準繩方。功用治嬰孩七日外欲成臍風撮口及卒中急慢驚風牙關緊閉。痰涎壅上。藥品蠶(炒去絲)威靈仙(去蘆)各四錢。生明礬二錢。細辛(去葉)一錢。生甘草二錢五分。用法剉焙爲末。每服一字至半分薑汁沸湯調勻以指抹入牙關內。如卒中急慢驚證口噤不開用鹽梅湯調擦上下牙根二處。

【一字神散】婦人良方。功用治胎死或胞破。藥品鬼臼(黃色者去毛研極細如粉不用羅以手指燃之)不拘多少用法每服二錢無灰酒一盞煎至八分通口服。

【一赤散】證治準繩方。功用療損傷敷藥後起疱者。藥品赤石脂大黃石膏(煅)各等分用法研爲細末先以雄黃硫黃寒水石研如粉次入斑蝥和

以稜鍼挑破。然後塗藥。

一抹金證治準繩方。**功用**治小兒遍身生瘡潰爛燥痛。膿汁不乾。**藥品**藜蘆(淨洗焙)蛇牀子(去埃土)紅丹(水飛)各五錢。硫黃赤石脂明白礬(水飛)五倍子(去蟲屑)黃蘗(去粗皮)各二錢五分。輕粉五十帖。(後入)用法曬焙爲末同輕粉在乳鉢再杵匀。用生肥豬膏碎切以瓦鉢和藥末爛杵塗抹患處或清油調塗。

一抹散證治準繩方。**功用**療乾癬不瘥。**藥品**天南星草烏頭各一枚。用法生研細末。羊蹄根搗絞取汁調塗。不過三次即瘥。

一物獨活湯小品方。**功用**治產後中風體虛者。**藥品**川獨活三兩(切細)用法清水三升煮取一升分服。耐酒者亦可酒水煮與白鮮皮合煮之亦得。**一匙金**沈氏尊生書方。**功用**治小兒疹後風及痘後脫癩風。**藥品**白花蛇(去骨刺炒褐色)三分人指甲一分五釐(炒黃色)用法研爲細末用透骨草麻黃各三錢入水酒各半杯煎三沸去渣調下蓋臥微汗。

卽愈。如兒小分作三服。

一捻金蕭存敬方。卽愈風散用古老錢煎湯也。治詳愈風散條。**二**證治準繩方。用法治眼睛痛。**藥品**乳香沒藥黃連雄黃益硝各等分。(一方加片腦麝香各少許)。**功用**研爲細末搐入鼻內。**三**醫宗金鑑方。用法研爲細末搐入鼻內。**四**榔各等分用法研爲細末每服一字蜜水調下。

一粒金李東垣方。**功用**治偏頭風。**藥品**白芷川芎荳蔻(豬肉汁拌勻入膽內懸待陰乾用)玄胡索青黛各一兩。製法共研細末無根水爲丸。用法每用一丸。無根水化開搐入鼻內外以銅錢咬口內出涎。

一粒笑徐氏方。**功用**治一切牙痛浮腫。**藥品**五靈脂麝香各一錢。蟾酥二錢。製法先將二味研末蟾酥烊化作粒如麥子大。用法每用少許嵌於患處痛立止。如虛火牙痛止後接服知藥八味丸。老人服還少丹。生地黃各等分用法搗爛茶清調勻敷貼。

【一勝膏】證治準繩方。功用治癰疽初生。藥品白芷、紫荊皮。用法研爲細末。酒調塗能令內消。

【一筆鉤】卽一筆消。

【一黃散】證治準繩方。功用療打撲傷痕紫黑瘀血流注。有熱者藥品大黃不拘多少。用法研爲末。薑汁調溫敷。

【一塊氣丸】證治準繩方。功用治傷寒心膈膨脹腰痛。欬嗽吐逆風熱閉塞下元虛冷大小便祕脫肛小腸

氣赤白痢婦人一切血氣血昏經脈不通血崩赤白帶下血塊氣血胎前產後諸疾室女經閉小兒驚風

脾積。燭脾藥品官桂玄胡索蓬莪茂。用法煎黃縮砂仁枳實枳殼黑牽牛末檳榔大黃。醋煮雷丸使

君子肉白豆蔻丁香各五錢。芫花酒浸炒香附子。醋浸京三稜泡陳皮去白。胡椒各一兩。糖桂青皮各一兩五錢。川烏頭二錢五分。酒浸炒錫灰。

大麥芽用江子炒熟去江子各四兩。蘿蔔子一兩。用江子炒熟去江子江子一兩去油沈香木香各四兩。阜角八兩去皮醋浸炒。共研末酒煮

米糊爲丸如梧桐子大。用法每服五七丸常服淡薑湯送下。甲傷寒葱白湯下。乙心膈膨脹新汲水下。丙

腰痛牽牛湯下。丁欬嗽烏梅湯下。戊吐逆生薑湯下。

己下元虛冷好酒下。庚風熱便祕井花水豆粉調下。

辛脫肛艾葉湯下。壬小腸氣茴香湯下。癸白痢乾薑湯下。子赤痢甘草湯下。丑婦人血氣血昏當歸酒下。

寅經脈不通紅花當歸煎酒送下。卯血崩燕子泥湯下。辰赤白帶下蔓荆子湯下。巳血塊氣血生薑橘皮煎湯加醋少許送下。午胎前產後吳茱萸一兩黃酒送

下一升煎至二沸送下。未室女經閉紅花當歸煎酒送下。申小兒驚風一歲一丸薄荷湯下。酉脾積使君子一錢。橘皮湯下。戌孕婦不可服忌一切熱物。

服忌一切熱物。

【一煎散】醫宗金鑑方。功用治臟毒之屬於陽證及在

肛門外者藥品當歸尾穿山甲炙研甘草桃仁泥

阜角刺各二錢川黃連一錢五分枳殼炒檳榔天粉烏藥赤芍藥生地黃白芷各一錢玄明粉大黃各三錢紅花五分用法清水二鍾浸一宿次早煎

一滾空腹時服。俟大便行三四次以稀粥補之。

【一滴金】一滴金丸之簡稱。

【一滴金丸】奇效方。**功用**治首風偏正頭風。**藥品**人中白(煅)地龍(曬乾)各等分。**製法**共研細末。羊膽汁爲丸。如芥子大。**用法**每用一丸。新汲水一滴化開滴兩鼻中。

【一醉散】即一醉膏之第一方。

【一醉膏】**證治**準繩方。**功用**治心病。**藥品**香油四兩。無灰酒二碗。楊柳枝二十條。**用法**先將無灰酒香油和勻。用柳條逐條攪一二百下。候香油與酒相入成膏。煎至八分灌之。熟睡迨醒。或吐或下。即安。**二沈氏尊生書方**。**功用**治癰疽。發背。乳癰。初起。**藥品**甘草五錢。沒藥二錢五分。瓜萎一個。(去皮研爛)。**用法**黃酒三碗。煎至一碗半。分溫二服。重者再進一服。以瘡爲度。或加當歸。白芷。乳香。尤妙。如要宣毒。加阜角刺一錢。

【丁尤湯】沈氏尊生書方。**功用**治妊娠惡阻。**藥品**丁香。白朮。人參。甘草。**用法**清水煎服。

【丁泥散】沈氏尊生書方。**功用**治瘡瘍不收口。**藥品**孩兒茶一錢五分。珍珠五分。乳香。沒藥各二分。冰片一分。絲線(燒存性)七分。**用法**共研細末。撒於患處。約厚一文錢。以紙裹縛。如結即已。有水出。再洗。摻。

【丁砂散】瑞竹堂經驗方。**功用**烏髭髮。**藥品**母丁香十五個。鍼砂(醋炒七次)。高茶末各少許。訶子(大者)一個。百藥煎一錢。**製法**研爲細末。清水一大碗。熬數沸。不去渣。貯淨瓷器內。更浸新釘於藥中。尤佳。**用法**每夜臨臥時。溫漿水洗淨鬚髮。用藥水掠之。次早仍以溫漿水洗淨。百日自黑。

【丁香丸】婦人大全良方。**功用**治婦人癥痞結塊。心腹疼痛。**藥品**雄雀糞(炒黃)。鼈甲各一兩。當歸(焙)。硇砂。芫花(醋炒乾)各五錢。巴豆(去皮心油)二分五釐。**製法**共研細末。醋煮麪糊爲丸。如小豆大。**用法**每服三丸。當歸酒送下。

【丁香五套丸】太平惠民和劑局方。**功用**治胃氣虛弱。

三焦痞澀。不能宣行水穀。致成痰飲。結聚胸膈。嘔吐惡心。脹滿不食。常服溫脾順氣。**藥品**丁香(勿見火)木香。青皮。陳皮。(去白)各五錢。南星。(每個切作十數塊。同半夏先用水浸三日。每日易水一次。次用白礬二兩研碎。調入水內。再浸三日。洗淨焙乾。)半夏。

(切破)各二兩。乾薑(泡)白朮。高良薑。茯苓各一兩。**藥品**法研爲末。神麃一兩。大麥蘖二兩。同研取末。打糊爲丸。如梧桐子大。用法每服五十九丸。加至七十九丸。不拘時熟湯送下。

【丁香柿蒂湯】●證治準繩方。**功用**治欬逆。**藥品**丁香。十粒。柿蒂十五枚。**用法**咬咀。清水一盞半。煎至八分。去滓熱服。**●沈氏尊生書方****功用**治胃寒呃逆。**藥品**丁香。柿蒂。人參。茯苓。高良薑。橘皮。半夏。各五錢。甘草二錢五分。生薑七錢五分。**用法**研爲粗末。每服三錢。清水煎服。或調蘇合丸服。**●**

【丁香黃耆散】證治準繩方。**功用**治小兒脾胃虛弱。不能飲食。榮衛傷損。肌體羸瘦。時時下痢。面色青白。**藥品**丁香。蘇黃耆(剉)。吉林人參(去蘆頭)。白朮。當歸。

(洗。焙乾。)鼈甲(塗酥炙黃。去裙襡)各一兩。胡黃連。甘草(炙)各五錢。**用法**搗羅爲細末。每服一錢。清水一盞。加生薑二片。大棗二枚。煎至五分。去滓。食前溫服。

【丁香棟實丸】卽酒煮當歸丸之第一方。

【丁香煮散】●太平惠民和劑局方。**功用**治脾胃虛冷。嘔吐不食。**藥品**丁香(不見火)。紅豆。甘草。乾薑。青皮。川烏頭(去皮)。陳皮。高良薑。胡椒。益智。各等分。**用法**剉散。每服三錢。清水一盞。加生薑三片。煎至六分。入鹽一捏。不拘時服。**●證治準繩方****功用**治反胃呃逆。嘔嘯泄瀉。**藥品**丁香(一作三七粒)。石蓮肉(去心)。各十四枚。北棗七枚。(切碎)生薑七片。黃秫米五勺。

(洗)(一方無北棗)**用法**清水一碗半。煮稀粥。去藥啜粥。**●此倣附子梗米湯之制**。彼用梗米。此用糯米。皆取其直達胃腑。雖其勢稍平。亦是突圍之將。**【七子散】**千金方。**功用**補不足。治丈夫風虛目暗。精氣衰少。令人有子。**藥品**五味子。鍾乳粉。牡荆子。菟絲子。車前子。菥蓂子。石斛。乾地黃。薯蕷。杜仲。鹿茸。遠志。各

八錢。附子。蛇牀子。芎藭。各六銖。山茱萸。天雄。人參。茯苓。黃耆。牛膝。各五錢。桂心。十銖。茺蔚。十一銖。巴戟天。十二銖。用法研爲細末。每服方寸匕。溫酒調下。每日二次。如不知增至二匕。以知爲度。禁如藥法。不能酒者。蜜丸服亦可。

【七生丸】證治準繩方。功用治頭風。痰厥。氣厥。飲厥。傷寒。傷風。頭痛不忍者。藥品川烏頭。草烏頭。天南星。(並去皮)半夏(冷水洗去滑)。川芎。白芷。石膏。各等分。製法並生研細末。韭菜研自然汁爲丸。如梧桐子大。用法每服七丸。加至十九。食後嚼生葱茶送下。一日二次。

【七生湯】沈氏尊生書方。功用止血。藥品生地黃。生荷葉。生藕節。生茅根。生韭菜。各一錢。生薑。五錢。用法共搗取自然汁一碗。濃磨陳京墨同服。

【七味散】千金方。功用治久痢不瘥。藥品黃連。八分。龍骨。赤石脂。厚朴。烏梅肉。各二分。甘草(炙)一分。阿膠。(炙)三分。用法研爲細末。每服二方寸匕。小兒一錢。匕。漿水調下。一日二次。

【七味鴨】驗方。功用治陰虛勞傷。欬嗽痰喘。藥品生地黃。熟地黃。當歸。身茯神。白朮(土炒)。各三錢。川貝母。二錢。地骨皮。四錢。製法用老鴨一隻。去毛。原湯洗淨。去肚雜。不可再見水。將前藥加陳甜酒一碗。生曬醬油三酒杯。同入鴨肚內。縫緊。用瓦蓋。盆盛貯。盆內不可放水。蓋好。以棉紙將盆蓋縫封固。放在鍋內。亦不可放水。鍋蓋蓋好。稻草三斤。打成小草結。對鍋臍慢慢燒之。如鍋太熱。少停再燒。草完鴨爛可食。能飲再加老酒送服。

【七姊妹】卽十姊妹。

【七星丹】提毒丹之別名。

【七星散】證治準繩方。功用治痘瘡乾焦發癢。藥品黃耆。芍藥。各二錢。人參。桂心。各一錢。黑魚一個。用法研爲末。置黑魚腹內。升麻酒煮熟。連藥食之。凡瘡在上焦者食頭。在中焦食身。在下焦食尾。亦驗方也。

【七星劍】七星劍湯之簡稱。

【七液丹】驗方。功用治瘟疫時毒。傷寒。暑風。卒忤。爛喉瘍。證。瘻瘍。諸般痧氣。霍亂吐瀉。瘧痢。諸痢。一切癰疽。

毒瘡。藥品鮮蘿蔔、鮮佩蘭、鮮側柏、鮮霍香、鮮紫蘇、生大黃各三十兩。鮮荷葉九十兩。滑石（飛）三百兩。鬪法逐味打爛取汁。拌滑石逐味拌七次。曬乾收貯。用法每服三錢。小兒減半。熟湯調下。二三次即愈。紅痢。梔子湯下。白痢。薑湯下。痛痢及噤口痢。木香湯下。關於此方有起死回生之功。誠萬病之靈丹。不論男婦老幼胎前產後並可用之。

七棗湯。濟生方。功用治臟腑虛弱。痃瘡時作。或寒多熱少。或但寒者。藥品附子一枚。（炮製以鹽水浸。再炮。如此七次。不浸去皮臍。或以川烏代附子。水調陳壁土爲糊。浸炮七次。）用法分作二服。清水一碗。加生薑七片。大棗七枚。煎至七分。臨發日早溫服。

七葉一枝花。蚤休之別名。

七葉樹。娑羅之別名。

七製固脂丸。驗方。功用補火壯陽。固精種子。保真元。壯筋骨。健脾胃。長精神。除疾病。治命門火虧。下元虛損。耳聾眼花。腰痛腿軟。腎冷精流。陽痿不舉。小便過多。筋骨疼痛。肚腹畏寒。脾胃虛弱。飲食難消。夜多盜汗。

精神疲倦。時愛躺臥。藥品固脂十斤。製法甲。淘米水泡一夜。曬七日。乙。黃藥二斤。熬濃汁。泡一夜。曬七日。丙。杜仲二斤。照前法製。丁。生鹽二斤。照前法製。戊。魚鰓三斤。照前法製。己。核桃肉六斤。照前法製。庚。黑棗糯米各三斤。共煮粥。將固脂磨細末。（忌鐵器）和勻。搗融爲丸。如梧桐子大。用法每服一錢。空腹時淡鹽湯送下。服至一月後加三分。加至二錢爲止。忌食羊血油菜菜油。若陰虛水虧者。早服此丸。晚服六味地黃丸。則水火兼補。不致偏枯。服至半年後方效。

七竊出血。耳目口鼻一齊出血者。治法如下。一。由上虛下竭而致者。最爲危候。宜急用冷水噀其面。婦女則兼分開頭髮。以水噀之。男子則用粗紙數層。冷醋浸透。搭頸門上。血立止。隨以補血湯服之。使血脈歸經。再加調理。或可得生。二。因中毒而致者。宜用刺蝟皮（煅存性）爲末。每服三錢。酒調下。立止。參看九竅出血條。

七釐散。驗方。功用治跌打損傷。瘀血停滯。遍身疼痛。藥品血竭（另研）一兩。乳香（去油）沒藥（去油）紅

花各一錢五分。孩兒茶二錢四分。硃砂(飛)一錢二分。麝香冰片各一分。二釐(一作各三分)。製法研爲細末。瓷瓶密收。蠟封口勿泄。氣愈久愈佳。用法每服七釐(一作一分)。童便或溫酒送下。不可多。孕婦但可外敷。不可內服。

【七寶洗心散】醫宗金鑑方。功用治目眞赤脈。藥品當歸。赤芍藥。黃連。大黃。梔子各一錢。麻黃。荆芥各八分。

用法研爲粗末。清水二盞。煎至一盞去滓。食後溫服。

【七寶湯】證治準繩方。

功用治寒熱往來。藥品防風。

(去蘆)知母。生地黃各五錢。柴胡(去蘆)。秦艽。甘草。(炙)前胡(去蘆)各二錢五分。用法咬咀。每服五錢。

清水一盞半。加入參三寸。煎至七分。熱服。

【功用治

內障橫翳。橫著瞳人中心。起如劍脊。麝蠅犀角(鏤)

羚羊角(鏤)各一兩。胡黃連。車前子。甘草。(炙)石決

明(刮洗。搗研)。丹砂(另研)各五錢。用法除丹砂。決明外。餘粗篩搗。每服三錢匕。清水一盞。煎至七分。去滓。入丹砂末五分。決明末一字。再煎兩沸。用鍼撥翳。

食後溫服。

【九天丹】驗方。功用治爛風眼。製法銅青五倍子。海螵

蛸每用少許。夜臥時點之。早晨不得點。

【九子瘡】瘰癧之生於頸上。一連九個者。治法如下。

●雞蛋一個。淨水煮熟。破爲兩片。去黃。以真麝香一分冰片五分。滲瘡上。從初生第一瘡起。將雞蛋一邊蓋上。外以乾艾一大團燒蛋外。總以瘡大痛爲度。如痛不忍。則將艾暫除。俟痛止再燒。蛋乾再換。每日夜約燒五六次。次日又換新冰麝。仍用新蛋。照前法燒之。再用蒲公英。夏枯草。金銀花各三錢。甘草節一錢五分。水煎服數劑。甚效。●頸下筋繫繫若貫珠。或痛或不痛。此少陽膽汁不充。脾胃虛弱。相火乘虛上僭所致。應補太陰泄少陽。用西黨參。茯苓。生白朮。各三錢。粉甘草。梔皮(薑汁炒)各一錢五分。桑葉(炙)一錢。丹皮二錢。水煎溫服。參看瘰癧條。

蛸明礬白蚯蚓泥薄荷葉。製法共研細末。老薑汁泛丸。如龍眼肉大。用法每用一丸。生薑湯一碗。泡洗患處。次日再洗三四次即愈。

【九仙靈應散】沈氏尊生書方。功用治陰囊溼癰。藥品附子(炮)蛇牀子紫梢花石菖蒲遠志海螵蛸丁香木鼈子各二錢小茴香一錢五分。用法研爲粗末。每用五錢。清水三碗。煎至一碗半。溫洗患處并陰囊。每日二次。留水再溫洗。多洗尤妙。

【九君子湯】即麥門冬湯之第四方。

【九味柴胡湯】證治準繩方。功用治肝經熱毒下注。便毒腫痛。或小腹脅間結核。及肝膽經部分一切瘡瘍。或風毒惡核瘰疬。藥品柴胡(炒)黃芩(炒)各五分。人參梔子(炒)半夏龍膽草(炒)當歸芍藥(炒)各三分。甘草二分。用法清水煎服。腫痛赤色元氣無虧者宜用。潰後腫消痛止者不宜用。

【九物牛黃丸】九精丸之別名。

【九種胃痛丹】驗方。功用治九種胃脘攻痛。藥品川五倍子八兩。洗淨刮去毛曬乾。製法研爲末。生薑汁

泛丸。如萊菔子大。用法每服四五分。痛時生薑湯送下。

【九精丸】證治準繩方。功用治男子爲鬼魅糾纏欲死。驚怖無休者。藥品牛黃(土精一云火精)龍骨(水精)荆實(人精)玄參(玄武精去蘆)赤石脂(朱雀精)玉屑(白虎精)曾青(蒼龍精)空青(天精)雄黃(地精無石者炒)各一兩。製法共研細末。煉蜜爲丸。如小豆大。用法每服一丸。熟湯送下。每日三次。以知爲度。

【九製香附丸】驗方。功用治經水不調。崩漏帶下。胎前產後癥瘕。積聚氣逆血塊。腹痛令人有子。藥品金華香附一斤。製法分作九份。甲酒浸。乙醋浸。丙鹽水浸。①童便浸。②小茴香二兩。煎汁浸。③益智仁二兩。煎汁浸。④萊菔二兩。煎汁浸。⑤丹參二兩。煎汁浸。⑥生薑汁浸。各浸春三夏。一秋三冬七日。同艾絨四兩。用無灰酒煮燥。焙乾研末。酒煮神麪打糊爲丸。如梧桐子大。用法每服四錢。熟湯送下。

【九製硫黃丸】驗方。功用補先天本元。健脾胃壯筋骨。

卻百病。治虛弱齒落陽痿。久服面如童顏。老當益壯。
藥品舶硫黃。(土硫黃不可用) **製法** ①用老白豆腐。將黃研末。用淨砂鍋。以竹籬夾鍋底。籬上蓋豆腐。一層鋪黃一層。疊疊鋪好。入水煮至豆腐黑黃色爲度。用清水漂淨腐渣。再煮二次。每黃一斤。豆腐一斤。或黑豆拌煮亦可。②用大蘿蔔挖空。將黃末入內。蓋緊縛好。慢火煮至蘿蔔黃黑爛爲度。清水漂淨。復煮二次。或蘿蔔切片拌亦可。一黃二蘿蔴。④將鮮紫背浮萍洗淨。拌黃末。煮至黃腐爛爲度。但萍根鬚葉最多。清水漂淨。或打爛取汁拌煮亦可。一黃三萍。⑤用新綠豆揀淘洗淨。以黃末拌煮。至豆爛爲度。清水漂淨。一黃二豆。⑥用石菖蒲或菖蒲洗淨。切小段。拌黃末。入水煮至爛爲度。取汁拌煮更妙。⑦松柏葉各半。洗淨去枝用葉翦碎。拌黃煮至葉爛爲度。清水漂淨。或藕或梨。或藕梨各半。切片同黃煎至藕梨爛爲度。⑧肥豬大腸洗淨氣味。將黃末研細漂淨。裝入大腸兩頭紮緊。勿令走漏。煮至大腸熟爛爲度。清水泡過夜。澄出陰乾。⑨用地黃二兩。全當歸。天門冬。麥門冬。各

一兩。川芎。陳皮。枸杞。杜仲。茯苓。甘草。(炙)前胡。防風。澤瀉。蛇牀子。五加皮。各五錢。每黃一斤。用藥一料。照黃遞加。用清水煎濃。將黃末投入。煎至藥汁乾。起出陰乾。用糯米煮粥拌爲丸。如綠豆大。陰乾。瓷瓶裝收。用法。每服第一月用三分。第二月四分。三月六分。四月八分。五月一錢。每月遞加。至二錢爲度。空腹時鹽湯送下。如恐服久發毒。病愈則止。自無妨礙。忌一切牲畜血及細辛。

【九製黃耆】 **功用**補虛弱。治婦人體虛血崩。及產婦虛證。**藥品**縣黃耆一斤。(洗淨。切片。烘乾) **製法** ①用木通二兩。煎水泡一夜。曬乾。②升麻一兩。照前法製。③牡丹皮二兩。四錢。照前法製。④沙參三兩。五錢。照前法製。⑤玉竹四兩。六錢。照前法製。⑥附子一兩。照前法製。⑦五味子二兩。照前法製。⑧防風二兩。照前法製。⑨蜜糖三兩。拌炒。製完。蒸過七日。**用法** 每服二錢。清水一杯。飯上蒸好。臨食和酒少許服。渣再煎服。

【二丹丸】 **證治**準繩方。功用治健忘。養神定志。和血安

【九轉靈妙丹】 即靈砂丹。

神清中外。華腠理。**藥品**天門冬。(去心)熟地黃。丹參。

各一兩五錢。白茯苓。(去皮)麥門冬。(去心)甘草。各一兩。遠志。(去心)人參。(去蘆)各五錢。**製法**研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。硃砂五錢(研極細)爲衣。用法每服五十九。加至一百丸。空腹時煎愈風湯送下。**難論**此方爲安神清中之劑。

【二仁丸】**證治**準繩方。**功用**治虛人老人風祕。不可服峻藥者。**藥品**杏仁。(去皮尖。炒黃。另研)麻仁。(另研)枳殼。(去瓢。炒赤)诃子。(慢火炒。搗去核)各三十丸。熟湯送下。

【二仙飲】**證治**準繩方。**功用**治諸瘡。**藥品**青蒿。(去梗。五月五日採。曬乾)二兩。桂枝。(去粗皮)五錢。**用法**剉焙爲細末。每服一錢。寒熱未發前。或先隔晚涼酒調下。

【二冬】麥賣冬。天賣冬也。

【二朮二陳湯】**張氏醫通方**。**功用**治肺虛痰食不運。**藥品**二陳湯加生白朮。(薑汁拌。曬)茅山蒼朮。(麻油

拌炒)。**用法**與二陳湯同。

【二母湯】**證治**準繩方。**功用**治肺勞實熱。面目浮腫。欬嗽喘急。煩熱。頰赤。骨節多痛。乍寒乍熱。**藥品**知母。貝母。(去心膜)杏仁。(去皮尖炒)。甜葶苈。(炒)甘草。各五錢(炙)半夏(製)秦艽橘紅各一兩。**用法**研爲末。每服四錢。清水一盞。加生薑五片同煎。不拘時溫服。

【二甘湯】**沈氏尊生書方**。**功用**治胃虛不能納穀。**藥品**生甘草。炙甘草。五味子。烏梅。各等分。**用法**研爲末。每服五錢。加生薑二片。大棗一枚。清水煎服。

【二白丸】**醫壘元戎方**。**功用**治小兒痰溼生蟲。**藥品**白礬一塊(約一兩)。**製法**用生蒸餅裹蒸熟去皮。入輕粉一字或五分爲丸。如梧桐子大。**用法**每服二三十丸。生薑湯送下。

【二石散】**沈氏尊生書方**。**功用**治女勞疸。**藥品**滑石。石膏。各等分。**用法**研爲末。每服方寸匕。大麥汁送下。每日三次。小便大利即愈。如腹滿者不治。

【二妙湯】**驗方**。**功用**治一切風溼癱瘓。筋骨疼痛。**藥品**生甘草。威靈仙。各一斤。**用法**清水一石。將藥煎五六

滾入大缸內。用板凳坐其中。周圍用布圍住。乘熱熏之。待水溫渾身洗透。務使汗出。謹避風寒。即愈。

【二妙蒼蠻散】即二妙散之第一方。

【一味黑錫丹】卽黑錫丹第一方之第二種。

【二和丹】來復丹之別名。

【二和湯】證治準繩方。功用消食扶氣。藥品藿香、香附。

各等分。用法研爲極細末。每服二三錢。滾水放溫調下。

【二花散】證治準繩方。功用治小兒痘疹已出未出。不發不起。隱在皮膚之間。兼治熱證。藥品梅花(陰乾)

一兩。桃花(陰乾)絲瓜(陰乾)各五錢。硃砂(水飛過)二錢。甘草一錢。(去皮火煅)。用法研爲細末。每服五分五釐。痘未出時。蜜湯調下。

【二活散】沈氏尊生書方。功用通經絡。散瘡腫。藥品羌活、獨活、當歸、烏藥、赤芍藥、連翹、金銀花(酒洗)、天花粉、白芷、甘草節各五錢。紅花、蘇木、荆芥、蟬退、葛根各三錢。檀香二錢。用法共研爲末。每服三錢。米湯調下。

湯調下。

【二皇】伏羲神農也。「素問著至教論」著至教。疑於二皇。

【二美散】驗方。功用治臘疥瘡。藥品吳茱萸、硫黃各等分。用法研細如麪粉。照合掌散法摩擦。每日二次。愈後再擦三四日。

【二苓清利飲】沈氏尊生書方。功用補陰。藥品茯苓、豬苓、生地黃、麥門冬、牡蠣澤瀉、甘草、黃芩、黃藥、車前子。用法清水煎服。

【二海丸】證治準繩方。功用治氣癰。藥品海藻、昆布各等分。製法酒洗曬乾。共研末。煉蜜爲丸。如杏核大。用法每服一丸。稍稍嚥汁。又用海藻洗淨切碎。油醋煎熟作常菜食之。

【二萸散】沈氏尊生書方。功用治茄病。藥品吳茱萸、山茱萸、川棟子各一錢。白蒺藜九分。海藻、延胡索、桔梗、青皮各八分。小茴香、五味子各七分。茯苓五分。用法研爲末。每服三錢。米湯調下。

【二參湯】醫宗金鑑方。功用治胃經虛火。牙衄。藥品人參、玄參各等分。用法清水煎。溫服。

【二陳加枳殼湯】證治準繩方。功用和胃。藥品半夏。茯苓。甘草。陳皮。枳殼各等分。用法剉碎。每服三錢。加生薑二片。清水煎服。

【二陳平胃散】沈氏尊生書方。功用治宿食不消。藥品茯苓。陳皮。半夏。甘草。蒼朮。厚朴。山楂。神曲。縮砂仁。草果。枳實。用法。清水煎服。壯實者加木香。檳榔。蓬朮。枳殼。黃連。大黃。香附。當歸。

【二黃膏】證治準繩方。功用治一切腫毒。藥品黃芩。大黃。各等分。用法研爲末。用醋調塗乾以水潤之。

【二龍戲珠】推拿法之一。以右手大食中三指。捏兒肝肺二指。左大食中三指。捏兒陰陽二穴。上捏至曲池爲止。共五次。熱證陰捏重而陽捏輕。實證陽捏重而陰捏輕。再捏陰陽肝肺二指。搖擺二九或三九次。

【二薑丸】證治準繩方。功用治瘧疾。往來寒熱。經久不愈。藥品高良薑。剉片。東壁土炒白薑。剉片。巴豆九粒。去殼同炒微黃。去巴豆各一兩。剝法共研細。

末。續豬膽汁和水煮麪糊爲丸。如麻仁大。硃砂爲衣。用法熱多者。早晨面北。空腹時溫湯送下。寒多者。清

旦面南。空腹時溫酒下。寒熱相停。不拘向南北。陰陽湯下。

【二蠟膏】沈氏尊生書方。功用治臍瘡。下部濕毒瘡。藥

法。菜油四兩。入葱白(連鬚)三個。川椒十四粒。熬至二物色枯去渣。再入白蠟。黃蠟。白礬各二錢。熔化離火。俟沸稍定。入東丹三錢。急急攪勻。倒在碗內。放陰土地上一日夜去火毒。用法先以生礬五六分滾水泡一碗。將瘡洗淨拭乾。將藥塗上如錢厚。以油紙貼外。以粗紙略揉軟蓋上。絹帛縛之。每日一洗一塗。縛紮如法。數日即愈。但瘡雖愈。四邊必多水泡。癢極切不可搔。若搔碎。即又成瘡。故雖愈。仍將藥照舊洗塗。并水泡亦塗在內。如是三四日全愈不癢。

【人生尾】用藥線捆住尾根。漸漸收緊。半月自落。落後多服補陰之劑。以免復發。

【人字草】龍鬚草之別名。

【人乳膏】驗方。功用治血虛火旺。消補兩難者。藥品人乳汁(男用女胎乳。女用男胎乳)。藕汁。白蜜。甜酒原汁。各等分。用法同煎。加童便。熬至滴水成珠。每日空

腹時服半盞。病深者多服。若服寒涼藥則不效。

【人紅丸】驗方。功用治童子虛勞欬嗽吐血燒熱。

人龍二十一條。(童便洗淨瓦上焙乾以黃色爲度。

黑色則不效)紅棗三十個(不破皮飯上蒸熟去皮

核)蘿蔔子一錢五分(炒研末)大熟地五錢(煮爛

成膏)藕粉(自製)一兩五錢川連六分(酒拌炒研

末)製法共搗爲丸如梧桐子大用法每服七丸空

腹時白滾湯送下逐日加增二丸至二十九爲止服至一料全愈大人亦治。

【人參五皮散】驗方。功用治痘後浮腫由於脾氣不行

者。人參大腹皮陳皮桑皮薑皮茯苓皮白朮官桂

麥門冬木香澤瀉車前木通用法清水煎服。

【人參內托散】證治準繩方。功用治瘍瘡潰膿作痛。

人參黃耆當歸川芎厚朴防風桔梗白芷官桂紫草木香甘草用法加糯米一撮清水煎服。

【人參升胃湯】證治準繩方。功用治一日大便三四次。

溏而不多。有時泄瀉腹鳴小便黃。藥品人參陳皮甘草(炙)各一錢黃耆二錢升麻七分柴胡當歸身益

智各五分紅花少許用法清水二盞煎至一盞去滓食前稍熱服。

【人參升麻湯】沈氏尊生書方。功用治妊娠轉胎。

人參升麻各二錢用法清水煎服。

【人參木瓜湯】沈氏尊生書方。功用治妊娠惡阻。

人參木瓜橘紅枇杷葉麥門冬藿香竹茹用法清水煎服。

【人參木香散】證治準繩方。功用治水氣病。藥品人參木香茯苓滑石琥珀海金沙枳殼檳榔豬苓甘草各

等分用法研爲細末每服五錢加生薑三片清水一盞煎至七分不拘時溫服每日三次。

【人參生地黃湯】即參附湯去附子加生地黃。

【人參利膈丸】即開關利膈丸。

【人參快斑散】快斑湯之別名。

【人參豆蔻散】證治準繩方。功用治久瀉不止諸藥無

效者。藥品人參肉豆蔻乾薑厚朴甘草陳橘皮各一

兩川芎桂心荊子北茴香各五錢用法研爲細末每

服三錢清水一小盞加生薑三片大棗一枚煎至六