

力 氏  
靈 驗 本 草

力 嘉 禾 著

北 平

文 化 學 社 出 版

1 9 3 1

力 氏

靈 驗 本 草

力 嘉 禾 著

文 化 學 社 印 行

1 9 3 1

力 氏  
靈 驗 本 草

版權所有  
翻印必究

中 華 民 國 二 十 年 十 月 出 版

一 冊 定 價 4.00

著 者 力 嘉 禾

印 刷 者 文 化 學 社

發 行 者 文 化 學 社  
北 平 和 平 門 前  
電 南 四 五 八 〇

寄 售 處 平 內 外 各 大 書 局

## 序

近代方書如汗牛充棟而求其能洞見癥結惠物利人者百不獲一焉。椒南世兄先師力公軒舉之冢嗣也。椿庭問字早擷靈蘭之華星。槎遠浮更窺元化之秘。一旦懸壺尊爲調手。豈偶然哉。近復出其緒餘從事著述。以力氏靈驗本草用法一書授諸手民。闢方藥之新畦。鎔中西於一爐。宜其剗剗未竟已不脛而走矣。先師奇節偉行非可一一數。他年垂之竹帛。責在史官。獨其切脈之細。運藥之神。更望椒南昆仲發潛闡幽。推揚而褒大之俾。此衰微之醫學得一線之曙光。則此書付梓。先師雖未及躬親校讐。而九京可作。亦當爲之莞而也。庚午小春月汪朝甲擬序。

## 序

吾國言藥之書昉自本草古謂神農本經然漢書藝文志不列其目醫門羣經辯論疑爲張仲景華元化所記迨隋書經籍志列神農本草一作八卷一雷公集註者僅四卷蓋沿梁末陶隱居極尊此書於是註之者多夷攷本經藥目僅三百六十五種唐文皇時增一百一十四種至宋時合新舊藥定爲一千八十二種則非神農之舊可知明李時珍爲本草綱目援據確鑿可謂集其大成矣自是有繆氏之經疏特著藥性之功能並舉其弊而西昌喻氏顧非之新安汪氏祖述二書著本草備要卷帙不繁而采輯甚廣而澉水吳氏以爲雜採諸說無所折衷增減者半晷日從新近今頗盛行於海內是前賢於本草一書其討論攻究已不啻至再至三矣然維以爲用藥之道須先明藥性維先子治醫垂五十年每於趨庭之暇詒不肖以藥性所宜嘗服郭太夫子秋泉先生每於古方藥參加一二味不知者嘗其蛇足而往往得奇效而於古人論藥則深服夢溪筆談之說其言曰夫病有宜補以瀉之者有宜瀉以補之者有宜寒劑而先以熱劑導之者有宜熱劑而先以寒劑從之者有病在上者而治下有病在下者而治上病同而藥異病異而藥同其義至微而其意至廣此言其得藥之性者時詒不肖謹識之維自閩至燕濫廁斯道常引以圭臬於用藥尤加慎私嘗以爲吾國未有精於化驗者果能據本草之所記而一一以科學徵實之則其有益於吾醫學必非鮮淺世苟有志

於是者維願竭其棉薄以成之今則有志而未能逮也醫隱先生與吾家爲四世交先生與維先子則互相推重維甫入故都卽聞先生著有力氏靈驗本草用法一書願未得一讀爲恨庚子夏冢嗣椒南先生示維以此書每條皆分析其性質而系以處方之分量分門別類精確不移蓋于綱目備要各書之外自拔一幟誠爲體用兼備之作竊謂是書出匪特於學者得一南鍼卽維平昔之志願亦可藉此面稍慰也是爲序

後學方行維謹識

---

## 序

近日醫學日益昌明，有疾病，爲化學精製之藥力所不及者，則用天然本草，以補其不足，如最新妙藥 Eumenal 及 Ephedrin 之類，其實卽本草之當歸麻黃也，日本發明新藥，取之本草者至多，吾國每年輸出日本之黃柏川芎茯苓桔梗陳皮之類，累年遞增，而印度學者，創立考證分析研究試驗本草各機關，成效極著，不佞前著用藥要訣一書，經商務印書館代爲付梓，雖牛溲馬勃并蓄兼收，而本草獨付缺如，至爲遺憾，乃乘診餘過庭之暇，請益于嚴君，閱時數月，集種類壹百九拾八方例壹百柒拾貳，積稿成帙，先嚴見背，此稿遂束之高閣，今春同志過從，偶在案頭繙閱，許爲有功實用，慫慂付梓，回憶此書脫稿時，先嚴爲余莞爾而道曰，他日此書付之剞劂，余當爲爾校訂，今已矣，孺慕之餘，約述數言，以誌緣起，大雅宏達，幸賜指教。

力嘉禾<sup>十九</sup> 九，六。

## 緒論

**本草之實驗** 本草之效用，由實驗而來，而實驗之誘因，則由飢驅而起，洪元時代，人民不知耕種畜牧，則採天然本草以爲食，食之或嘔吐，或泄瀉，或現他種症狀，因是本草之效用乃著，此神農之所以嘗百草，始作醫藥，以療民疾也，泄瀉之藥，吾國用大黃，歐西用旃那，嘔吐之藥，吾國用遠志，歐西用攝泥加，遠志與攝泥加，大黃與旃那，名異而質同，蓋歐西之本草，亦由實驗所得，故能不謀而合也，本草之效用由于實驗，既如上述，惟其變化，則頗神秘，如炮製時，受風濕及炎涼之變化，調和時，呈融解或結合之變化，內服時，與消化液接觸之變化，吸收血液時，與病菌抵抗之變化，原因複雜，尙非現代之藥物學者，所能解釋也。

**本草之效用** 本草效用，有絕對治療者，有相對治療者，絕對治療，如腸內患寄生蟲病，以石榴皮煎服是，相對治療者，如熱病頭痛，服白虎湯是。

**本草之用法** 本草外用者，曰局部作用，如大蒜汁除虱，繁縷汁收斂是，內服者，曰吸收作用，如以牛扁止瀉，桔梗止嗽化痰是。



本草之製法 本草分動物植物礦物等類，屬動物及植物者，有以新鮮爲用，有以乾燥爲用，屬礦物者，則就天然之原形爲用。

新鮮本草用法，有剉劑，搗碎劑，鹽浸劑，等。

乾燥本草用法，有煎劑，浸劑，丸劑，舐劑，酒浸劑，醋浸劑，燒灰劑等。

煎劑法有二，(甲)爲不易分解之劑，煎法。將本草研末，加水三百公分，用文火煮，俟水減至半量時，去滓，分次服之，(乙)爲易分解之劑煎法，將本草或切或剉，加水二百公分，用文火煮之，亦以水減半爲度。

浸劑法，凡屬容易分解及揮發之本草，研末，加溫水，熱五分鐘，濾淨服之。

粉劑法，研末，以溫水送服。

丸劑法，研末，加蜂蜜，或米糊，煉成丸形，吞服。

舐劑法，研末，以蜂蜜煉粘物狀，服之。

酒浸劑及醋浸劑法，切末，浸于酒或醋中，置蔭處時，施搖動，經七日，去滓，服之。

燒灰劑法，置釜中，燒成灰形，服之。

本草之用量 藥之效用，每因量之多寡而不同，例如服大黃，少則健胃，多則下瀉，歐西用藥有普通量，最高量，中毒量，致死量之別，又用量之多寡，于藥之種類，性之

差別，年之長幼，時之久暫，或早晚，均有關係，大約其吸收速者，用量宜少，緩者宜多，食前宜少，食後宜多，婦女虛弱年少者用量，宜比男子健強年長者為少，其長久服用，致效力漸減者，曰習慣作用，其繼續服用，致中毒現象者，曰積蓄作用，如吸食阿片，漸致成癮，即其例也，吾國應用本草，無用量之規定，而本草書籍，記載分量之標準，則又今昔懸殊，流弊殊大，茲將用本草分量，列表于下，以資參攷，例如大黃，壯年者，日用一公分，(按百分為比)七歲者，只宜用五公厘(即五十分)，十個月者，只宜用二公厘(即二十分)，餘則類推。

本草用量表

壯年(25—50歲)用藥量按百分為標準			
0—1月	1.25—5.6	1—2歲	25.0—32.5
1—2	5.0—10.0	2—3	32.5—40.0
2—3	10.0—12.0	3—4	40.0—45.0
3—5	12.0—15.0	4—5	45.0—50.0
5—7	15.0—17.0	5—10	50.0—62.5
7—9	17.0—20.0	10—20	62.5—87.5
9—11	20.0—25.0	20—25	87.5—100.0

新 舊 重 量 比 較 表

新 重 量					舊 重 量				
公錢	公分	公厘	公毫		錢	分	厘	毫	絲
3	0	0		等	7	8			
2	0	0		等	5	2			
1	0	0		等	2	6			
	1	0		等		2	6		
	2	0		等		5	2		
	3	0		等		7	8		
	4	0		等	1	0	4		
	5	0		等	1	3	0		
	6	0		等	1	5	6		
	7	0		等	1	8	2		
	8	0		等	2	0	8		
	9	0		等	2	3	4		
	0	1		等			2	6	
	0	2		等			5	2	

0	3		等			7	8	
0	4		等		1	0	4	
0	5		等		1	3	0	
0	6		等		1	5	6	
0	7		等		1	8	2	
0	8		等		2	0	8	
0	9		等		2	3	4	
0	0	1	等				2	6
0	0	2	等				5	2
0	0	3	等				7	8
0	0	4	等			1	0	4
0	0	5	等			1	3	0
0	0	6	等			1	5	6
0	0	7	等			1	8	2
0	0	8	等			2	0	8
0	0	9	等			2	3	4

重量與容量比較表	
重 量	容 量
16000 公 分	2斗3升
1600 公 分	2升3合
160 公 分	2勺3抄

## 古代及近代之用藥量異別

量目	分	字	銖	錢	分	兩	步	斤
古 代			八三 厘拂 三毫	五 分	二 錢			三 十 二 錢
近 代		二 分 五 厘	四 分	一 錢	二 錢 五 分	十 錢		一 百 六 十 錢

---

目 錄

序

緒論

各科病症用方案例

滋養劑

鎮靜劑

解熱劑

強心劑

祛痰劑

催吐劑

健胃劑

驅風劑

通便劑

驅虫劑

利尿劑

調經劑

發表劑

排毒劑

緩和劑

刺戟劑

---

收斂止瀉劑

皮膚劑

變質劑

名稱應用量總覽

古方摘要

醫典摘粹

## 各科病症用方案例

### 熱性病

初期熱性病方例 6.73.77.

感冒方例 6.8.25.32.36.52.123.

止汗，解熱方例 28.29.31.136.137.

解熱方例 37.38.39.40.41.42.43.44.45.48.50.51.53.63.

64.66.67.68.69.70.93.113.123.124.136.137.

瘧疾方例 49.

霍亂方例 102.

中暑方例 102.

### 呼吸器病

慢性呼吸器病方例 1.

氣管枝炎方例 10.11.15.16.60.

肺氣腫方例 10

喘息方例 10.21.33.35.162.

重性呼吸器病感冒方例 11.123.124.

肺炎方例 11.25.60.

慢性肺癆方例 14.16.

胸脇痛方例 26.49.



噎下困難方例 36

咯血方例 61°

咳嗽方例 21, 22, 24, 27, 50, 61, 71, 74, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 108, 136, 137, 162, 166

祛痰方例 40, 43, 52, 57, 69, 70, 71, 74, 81, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 101, 104, 116, 122,

### 循環器病

慢性浮腫方例 3, 77, 78,

心臟病方例 77, 78,

### 消化器病

慢性消化不良方例 1, 6, 10, 87,

腸疝痛方例 4, 20,

胃痛方例 4, 8, 10,

輕症下痢方例 6, 87,

腹瀉方例 6,

腹痛方例 6,

吐酸方例 10,

嘈噓方例 10,

肝硬變方例 20,