



医药学院 610 2 12024467

第一部分收录了常用中药，并配有彩色照片，重点突出了原植物形态、药材、饮片的特征，图文并茂，使读者能够快速地准确地识别与鉴别常用中药。第二部分对常用中药的性味、归经、功效、主治、用法进行了简要说明，并配有照片，对于不同剂型适用于药物的特点进行了介绍，为读者选择和制备简单中药剂型提供帮助。第三部分针对中药使用的常见问题进行了解答，并配有照片，有助于读者正确用药。

厚朴

燥湿，消积，除胀，平喘，用于脘痞吐泻，湿滞伤中，腹胀便秘，食积气滞，痰饮咳嗽。



桔梗


利咽，宣肺，祛痰，用于痰多咳嗽，胸膈不舒，咽喉肿痛，失音，肺病吐血，疮疡脓成不溃。

钩藤

清热平肝，息风止痉，用于肝风内动，眩晕头痛，感冒夹惊，小儿夜啼，高热惊厥，惊风抽搐，妊娠子痫。

人参

大补元气，复脉固脱，益肺补脾，生津安神，养血益智，用于体虚欲脱，肢冷脉微，肺虚喘咳，脾虚食少，内热消渴，津伤口渴，气血亏虚，病后虚羸，惊悸失眠。



金银花

疏散风热，清热解毒，用于痄腮丹痧，风热感冒，热毒血痢，温病发



苦参

清热燥湿，利尿，杀虫，用于湿热泄痢，便血，赤白带下，黄疽尿闭，阴肿阴痒，湿疹，湿疮，疥癣，麻风，皮肤瘙痒。

中草药图鉴

ZHONGCAOYAO TUJIAN

王秀娟·主 编
龚慕辛·执行主编



化学工业出版社



医药学院 610 2 12024467

一部全收载了常用中
药，并配有彩色图片。
点突出了原植物形
态、药材、饮片的特
点，图文并茂，使读者

ZHONGCAOYAO TUJIAN

中草药图鉴

王秀娟 主 编
龚慕辛 执行主编

了介绍，为读者选择和
制备简单中药剂型提供
帮助。第三部分针对中
药使用的常见问题进行
了解答，并配有图片，
有助于读者正确用药。



化学工业出版社

· 北京 ·

本书第一部分收载了常用中药,并配有彩色图片,重点突出了原植物形态、药材、饮片的特征,图文并茂,使读者能够快速、准确地识别与鉴别常用中药。第二部分对常用中药剂型适合于家庭小量制备的方法进行了简单说明,并配有图片,对于不同剂型适于药物的特点进行了介绍,为读者选择和制备简单中药剂型提供帮助。第三部分针对中药使用的常见问题进行了解答,并配有图片,有助于读者正确用药。

图书在版编目(CIP)数据

中草药图鉴/王秀娟主编. —北京:化学工业出版社, 2011.10

ISBN 978-7-122-12233-9

I. 中… II. 王… III. 中草药-图谱 IV. R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第180523号

责任编辑:罗琨 李倩
责任校对:周梦华

装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装:北京瑞禾彩色印刷有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张9¹/₄ 字数204千字 2012年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:39.80元

版权所有 违者必究



编委会

主 编 王秀娟

执行主编 龚慕辛

副 主 编 罗 容 翟永松 章红英

编 委 刘长利 刘仁慧 张春健

图片提供（按拼音排序）

崔 海 高 伟 胡成湘 邝才智 李海亮

李朝霞 刘 进 卢旭然 陆 琦 马 赞

宋颖艳 田 瑞 王宝华 王经雨 王 蕾

王文娟 王 岩 肖剑峰 许利平 张 超

目录



第一章 常用中药的辨识

一、解表药 /2

麻黄 /2

防风 /3

白芷 /4

辛夷 /5

薄荷 /7

菊花 /8

野菊花 /9

二、清热药 /11

石膏 /11

栀子 /11

黄芩 /12

黄连 /14

黄柏 /15

关黄柏 /16

苦参 /17

生地黄 /18

金银花 /19

连翘 /20

牛黄 /21

鱼腥草 /22

白头翁 /23

青蒿 /24

三、泻下药 /26

大黄 /26

番泻叶 /27

牵牛子 /28

四、祛风湿药 /30

威灵仙 /30

木瓜 /31

金钱白花蛇 /32

五、化湿药 /34

苍术 /34

厚朴 /35

草果 /36

六、利水渗湿药 /38

茯苓 /38

车前子 /39

茵陈 /40

冬瓜皮 /41

篇蓄 /42

七、温里药 /44

附子 /44

干姜 /45

肉桂 /46

花椒 /47

八角茴香 /48

八、理气药 /50

枳实 /50

沉香 /51

玫瑰花 /52

九、消食药 /54

山楂 /54

鸡内金 /55

十、驱虫药 /56

使君子 /56

槟榔 /57

十一、止血药 /58

小蓟 /58

槐角 /59

三七 /60

艾叶 /60

十二、活血化瘀药 /62

川芎 /62

丹参 /63

益母草 /64

桃仁 /65

西红花 /66

十三、化痰止咳平喘药 /67

半夏 /67

桔梗 /68

川贝母 /68

胖大海 /69

苦杏仁 /70

白果 /71

十四、安神药 /72

朱砂 /72

远志 /72

合欢皮 /73

十五、平肝息风药 /75

珍珠 /75

赭石 /76

钩藤 /76

天麻 /78

决明子 /79

十六、补虚药 /80

人参 /80

西洋参 /81

党参 /82

黄芪 /83

山药 /84

甘草 /85

鹿茸 /87

杜仲 /88

冬虫夏草 /89

当归 /90

熟地黄 /91

阿胶 /91

麦冬 /92

百合 /93

枸杞子 /94

桑葚 /95

十七、收涩药 /96

五味子 /96

莲子 /96

十八、外用药及其他 /98

血竭 /98



第二章 常用中药剂型的制法

一、制备散剂 /100

散剂介绍 /100

散剂的特点 /100

散剂的制法 /101

贮存 /102

制备注意事项 /102

二、制备丸剂 /103

丸剂的特点 /103

丸剂的分类 /103

水丸的制法 /104

蜜丸的制法 /105

贮存 /107

制备注意事项	/107
三、制备袋泡茶	/108
袋泡茶介绍	/108
袋泡茶的特点	/108
袋泡茶的制法	/108
贮存	/109
制备注意事项	/109
四、煎煮汤剂	/110
汤剂的特点	/110
汤剂的制法	/110
贮存	/110
制备注意事项	/110
汤剂的浓缩和干燥	/113
五、熬炼煎膏剂	/113
煎膏剂介绍	/113
煎膏剂的特点	/113

煎膏剂的制法	/114
贮存	/114
制备注意事项	/115
六、填装胶囊剂	/115
胶囊剂介绍	/115
胶囊剂的特点	/115
胶囊剂的制法	/116
贮存	/117
制备注意事项	/117
七、浸泡药酒	/118
药酒介绍	/118
药酒的特点	/118
药酒的制法	/118
贮存	/122
制备注意事项	/122



第三章 中药的使用注意

一、药品真假识别	/125
什么是真药	/125
什么是假药	/125
如何从批准文号识别假药	/126
如何从包装盒识别假药	/127
如何从生产批号识别假药	/127
如何从药品说明书印刷质量识别假药	/128
如何从药品说明书内容识别假药	/128
如何从厂家联系电话识别假药	/129
如何从厂家防伪标识识别假药	/129
假药外观有什么特点	/130

如何使用全国电码防伪系统识别假药	/132
如何选择药品购买渠道以防止买到假药	/132
假药常见销售方式有哪几种	/133
为什么有些假药吃了“管用”	/133
买到假药怎么办	/133

二、中成药的特殊服法	/134
三、服药饮食禁忌	/140
病证食忌	/140
服药食忌	/141



第一章

常用中药的辨识



一、解表药

以发散表邪、解除表证为主要功效的药物称为解表药。此类药物辛散轻扬，有促进机体发汗、解除表邪的作用，能达到治愈表证、防止疾病转变的目的。解表药除主要用于发汗解表作用外，部分药还有利尿消肿、止咳平喘、透疹、止痛等作用。

麻黄

(1) 功效主治

发汗解表散风寒，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒，喘咳胸闷，风水浮肿。蜜炙麻黄润肺止咳，多用于表证已解，气喘咳嗽。

蜜炙麻黄



生麻黄



● 生麻黄与蜜炙麻黄饮片对比图 ●

(2) 来源

麻黄科植物草麻黄 (*Ephedra sinica* Stapf)、中麻黄 (*Ephedra intermedia* Schrenk et C. A. Mey) 或木贼麻黄 (*Ephedra equisetina* Bge) 的干燥草质茎。

(3) 药材识别

◆ 形状大小

草麻黄呈细长圆柱形，分枝少，直径通常为1~2mm，有的带少量棕色木质茎。中麻黄分枝多，直径通常为1.5~3mm。木贼麻黄



● 草麻黄药材图示形状大小 ●

分枝较多，直径多为1~1.5mm。

◆ 外观特征

草麻黄表面淡绿色至黄绿色，有细纵脊线，触之微有粗糙感。节明显，节间长



● 草麻黄药材图示纵脊线、节和裂片 ●

2 ~ 6cm。节上有膜质鳞叶，长3 ~ 4mm；裂片常为2，较少为3，锐三角形，先端灰白色，反曲，基部联合成筒状，红棕色。

中麻黄节上膜质鳞叶长2 ~ 3mm，裂片常为3，较少为2，先端锐尖。中麻黄断面髓部呈三角状圆形。

木贼麻黄表面无粗糙感，节间长1.5 ~ 3cm，膜质鳞叶长1 ~ 2mm。裂片常为2，较少为3，上部为短三角形，灰白色，先端多不反曲，基部棕红色至棕黑色。断面略显纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色，近圆形。

◆ 质地气味

体轻，质脆，易折断。气微香，味涩、微苦。

◆ 佳品特征

色淡绿或黄绿，内心色红棕，手拉不脱节，味苦涩。

(4) 产地

主产于内蒙古东部科尔沁草原、内蒙古西部毛乌素沙漠及青海、甘肃和新疆地区。尤以新疆、内蒙古资源最为丰富。


防风

(1) 功效主治

解表散风，胜湿止痛，止痉、止泻。用于感冒头痛，风疹瘙痒，风湿痹痛，破伤风。

(2) 来源

伞形科植物防风 [*Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk] 的干燥根。



● 防风植物图示叶片 ●



● 防风植物图示花 ●

(3) 药材识别

◆ 形状大小

长圆锥形或长圆柱形，上部较粗下部渐细，有的略弯曲，长15 ~ 30cm，直径0.5 ~ 2cm。

◆ 外观特征

表面灰棕色，粗糙，有纵皱纹、横向皮孔样突起及点状的细根痕较多。根头部有明显密集的环境，有的环境上残存棕褐色毛状叶基，俗称“蚯蚓头”。



● 防风药材图 ●

断面不平坦，皮部浅棕色，有裂隙，木部浅黄色，占根的绝大部分，俗称“风眼圈”。



● 防风饮片图 ●

◆ 质地气味

体轻，质松，易折断。气特异，味微甘。

◆ 佳品特征

条粗壮，断面皮部颜色浅棕，木部颜色浅黄。

(4) 产地

主产于黑龙江、吉林、内蒙古、河北。辽

宁、山东、山西、陕西等地亦产。以黑龙江西部草甸草原产红条防风为优质道地药材，习称“关防风”。现全国各地均有栽培。

白芷

(1) 功效主治

解表散寒，通窍止痛，燥湿止带，消肿排脓。用于外感风寒，眉棱骨痛，牙痛，鼻塞，鼻渊，白带过多，疮疡肿毒。

(2) 来源

伞形科植物白芷 [*Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f.] 或杭白芷 [*Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var.



● 白芷植物图示植株 ●

formosana (Boiss.) Shan et Yuan] 的干燥根。

(3) 药材识别

◆ 形状大小

长圆锥形，常呈胡萝卜状。长10～25cm，直径1.5～2.5cm。



● 白芷药材图示形状大小 ●

◆ 外观特征

表面灰黄色至黄棕色，光滑，有支根痕，皮孔样横向突起散生，俗称“疙瘩丁”，顶端有凹陷的茎痕。



● 白芷药材图示疙瘩丁 ●



● 白芷药材图示凹陷茎痕 ●

杭白芷上部近方形或类方表，表面灰棕色，较大的皮孔样横向突起较多，排列略成四

纵行，体形圆，具4条棱脊。白芷和杭白芷断面灰白色，显粉性，皮部有大量棕色油点散生，形成层环圆形，棕色。



● 白芷药材断面 ●



● 白芷饮片 ●

◆ 质地气味

质坚实，气芳香，味辛、微苦。

◆ 佳品特征

独支，条粗壮，质硬，体重，粉性足，香气浓郁。

(4) 产地

白芷产于河南长葛、禹县者，习称“禹白芷”；产于河北安国者，习称“祁白芷”；产于浙江、福建、四川等省者，习称“杭白芷”和“川白芷”。此外，湖南、湖北、山西、安徽、山东等地亦产。全国大部分省份都有栽培。

辛夷

(1) 功效主治

散寒解表，宣通鼻窍。用于风寒头痛，流

涕鼻渊，鼻衄。

(2) 来源

木兰科植物望春花 (*Magnolia biondii* Pamp.)、玉兰 (*Magnolia denudata* Desr.) 或武当玉兰 (*Magnolia sprengeri* Pamp.) 的干燥花蕾。



● 望春花植物图示花和叶 ●




● 玉兰植物图示花 ●

(3) 药材识别

◆ 形状大小

长卵形，形似毛笔头，通常长1.2 ~ 4cm，直径0.8 ~ 2cm。基部常有短梗，长约5mm。



● 辛夷药材图1 ●

◆ 特征描述

短梗上有棕色或类白色点状皮孔。苞片2 ~ 3层，每层2片，两层苞片间有小鳞芽，苞片外表面密被灰绿色或灰白色茸毛，内表面棕色，无毛。



● 辛夷药材图2 ●

◆ 质地气味

体轻，质脆。气芳香，味辛凉而稍苦。

◆ 佳品特征

完整，内瓣紧密，无枝梗，香气浓。

(4) 产地

主产于河南、湖北、安徽、浙江、陕西、四川等地。以河南、湖北所产辛夷质量最佳，其中河南省南召县是辛夷的原生地 and 最佳适生区，素有“辛夷之乡”之称。

薄荷

(1) 功效主治

宣散风热，清利头目，透疹，利咽，疏肝行气。用于风热感冒，温病初起，头痛，目赤，咽喉肿痛，口疮，风疹，麻疹，胸闷胁痛。

(2) 来源

唇形科植物薄荷 (*Mentha haplocalyx* Briq) 的干燥地上部分。



● 薄荷植物图示植株 ●



● 薄荷植物图示茎叶 ●



● 薄荷植物图示花 ●

(3) 药材识别

◆ 形状大小

茎呈方柱形，有四棱，对生分枝，长15 ~ 40cm，直径0.2 ~ 0.4cm。



● 薄荷饮片图示茎 ●

◆ 特征描述

表面紫棕色或淡绿色，棱角处有茸毛，节间长2 ~ 5cm；断面白色，髓部常中空。叶对生，有短柄；叶片皱缩卷曲，上表面深绿色，下表面灰绿色，有凹点状腺鳞。



● 薄荷饮片图 ●

◆ 质地气味

质脆。揉搓后有特殊清凉香气，味辛凉。

◆ 佳品特征

叶多，色深绿，气味浓。

(4) 产地

主产于江苏太仓、南通、海门，江西吉安，浙江苕桥、淳安、开化、余杭，安徽六安，河北安国。江苏太仓出产的薄荷质量最佳，被称为“苏薄荷”，行销全国，并为出口商品。

菊花

(1) 功效主治

疏散风热，平肝明目，清热解毒。用于头痛眩晕，风热外感，眼目昏花，目赤肿痛，疮痈肿毒。

(2) 来源

菊科植物菊 (*Chrysanthemum morifolium* Ramat) 的干燥头状花序。药材按产地和加工方法不同，分为亳菊、滁菊、贡菊、杭菊。



● 菊植物图示植株 ●



● 菊植物图示花 ●



● 菊植物图示花和叶 ●

(3) 药材识别

◆ 形状大小

亳菊呈圆筒形或倒圆锥形，有时稍压扁略呈扇形，直径1.5 ~ 3cm，离散。

贡菊呈不规则球形或扁球形，直径1.5 ~ 2.5cm。

杭菊呈扁球形或碟形，直径2.5 ~ 4cm，常数个连成片。

滁菊呈不规则球形或扁球形，直径

1.5 ~ 2.5cm。

◆ 特征描述

亳菊舌状花数层，雌性，位于外围，类白色，劲直上举，纵向折缩，散生金黄色腺点；管状花较多，位于中央，常被舌状花遮盖，黄色，顶端5齿裂。



● 亳菊药材图 ●

贡菊舌状花白色或类白色，斜升，上部反折，边缘稍内卷而皱缩，通常无腺点；管状花较少，外露。



● 贡菊药材图 ●

杭菊舌状花黄色或类白色，平展或微折叠，彼此粘连，通常无腺点；管状花较多，外露。



● 杭菊药材图 ●

滁菊舌状花类白色，不规则扭曲，内卷，边缘皱缩，有时可见淡褐色腺点；管状花大多隐藏。

◆ 质地气味

体轻，质柔润，干时松脆。气清香，味甘、微苦。

◆ 佳品特征

花朵完整，颜色新鲜，气清香，梗少。

(4) 产地

亳菊主产于安徽省亳州市；贡菊主产于安徽省黄山市歙县；杭菊主产于浙江省桐乡市和江苏省盐城市射阳县；滁菊主产于安徽省滁州市；祁菊主产于河北省保定市安国县；怀菊主产于河南省武陟县。多栽培。

野菊花

(1) 功效主治

清热解毒。用于目赤肿痛，痈肿疮疖，眩晕头痛。

(2) 来源

菊科植物野菊 (*Chrysanthemum indicum*)



二、清热药

以清解里热为主要功效的药称为清热药。清热药药性寒凉，具有清热泻火、燥湿、凉血、解毒及清退虚热等作用。此类药物主要用于表邪已解、里热炽盛而无积滞的里热病证，如外感热病，高热烦渴，湿热泻痢，温毒发斑，痈肿疮毒及阴虚发热等证。

石膏

(1) 功效主治

清热泻火，止渴除烦，收敛生肌。用于肺热喘咳，高热烦渴，胃火牙痛，疮疡不敛。

(2) 来源

硫酸盐类矿物硬石膏族石膏，主要成分为含水硫酸钙（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）。

(3) 药材识别

◆ 形状大小

纤维状的集合体，呈长块状、板块状或不规则块状。



1cm

● 石膏药材图 1 ●

◆ 特征描述

白色、灰白色或淡黄色，有的半透明。纵断面有绢丝样光泽。



1cm

● 石膏药材图 2 ●

◆ 质地气味

体重，质软，气微，味淡。

◆ 佳品特征

色白，块大，质松脆，纵断面如丝，无夹层，无杂石。

(4) 产地

主产于湖北省应城。

栀子

(1) 功效主治

清热解毒，利湿，凉血，泻火，除烦；外