

大衆讀物
(飼養知識)

六畜平安書

編 著

蘇北新華書店印行

大衆讀物

(飼養知識)

六畜平安書

若望編

目錄

一 牛病防治法

- 一、若要使好牛，一月一碗油！……………（一）
- 二、治牛拉稀、脖子腫……………（一）
- 三、健胃藥……………（二）
- 四、治牛瘟的幾個土方……………（二）
- 五、牛瘟血清……………（六）
- 六、柳樹寄治牛拉稀黑糞病……………（八）
- 七、牛痘……………（八）
- 八、牛腿前後跛……………（八）
- 九、治牛方子十六種……………（一〇）
- 十、牛病的治療與預防……………（一四）

二 羊病防治法

（一九）

一、羊疥癬·····	(一九)
二、羊痘·····	(二〇)
三、羊傳染性胸膜肺炎·····	(二一)
四、羊喀喀病(即羊肺炎或氣管炎)·····	(二二)
五、治羊拉稀、吐酸水的辦法·····	(二二)
六、羊口瘡·····	(二二)
七、羊腦蟲(羊虻)·····	(二三)
八、預防羊瘟的一種藥方·····	(二四)
九、治羊吐血、拉黑水·····	(二四)
十、治羊痢土方·····	(二四)

三 馬和驢病防治法····· (一九)

一、治驢馬拉稀·····	(一九)
二、驢、馬肚痛·····	(三一)
三、治牲口長蛆·····	(三一)
四、馬鼻疽·····	(三三)

五、鞍黃·····	(三四)
六、篩子黃·····	(三四)
七、慢陰黃·····	(三四)
八、拐黃·····	(三五)
九、皮內黃·····	(三五)
十、黑寒風和血黃·····	(三五)
十一、水結·····	(三五)
十二、預黃·····	(三六)
十三、草結·····	(三六)
十四、肺炎·····	(三六)
十五、留火·····	(三七)
十六、疥瘡·····	(三七)
十七、口蹄疫·····	(三八)
十八、驢的幾種病的治法·····	(三九)

四 豬病防治法····· (四一)

一、猪瘟.....	(四一)
二、猪肺病.....	(四三)
三、猪丹毒.....	(四三)
四、猪炭疽病.....	(四四)
五、小猪拉稀.....	(四四)
六、拉乾屎.....	(四五)
七、軟骨病.....	(四五)
八、喉症.....	(四五)
九、疹子.....	(四五)
十、癬疥.....	(四五)
十一、黑牙風.....	(四五)
十二、瘤眼.....	(四六)
十三、消化不良.....	(四六)
十四、長虱子.....	(四六)
十五、幾個有效的猪病便方.....	(四六)

十六、五要……………(四七)

十七、八禁……………(四八)

十八、治猪病土方七種……………(四九)

五 雞病防治法……………(五一)

一、鷄瘟……………(五一)

二、雞白喉……………(五二)

三、白痢……………(五三)

四、雞赤痢……………(五四)

五、雞胃……………(五四)

六、雞軟脚病……………(五四)

七、下軟皮蛋……………(五五)

八、牛皮癬……………(五五)

九、治鷄瘟的辦法……………(五五)

六 家畜瘟疫的預防……………(五六)

七 餵豬須知

- 一、買豬的要求……………(六一)
- 二、趕豬……………(六二)
- 三、豬窩……………(六四)
- 四、豬食……………(六五)
- 五、餵豬與管理……………(六七)
- 六、母豬生小豬……………(七〇)

八 用蟲養雞新法子

(七四)

九 買牲口常識

(七六)

買牲口先看口……………

(七六)

毛色……………

(七七)

從頭至尾(看長樣)……………

(七七)

明病暗病……………

(八〇)

十 趕牲口和餵牲口

(八二)

一 牛病防治法

一 若要使好牛、一月一碗油

每年清明的時候及牛耕地的季節，每月給耕牛灌一碗青油。大牛十二兩，小牛八兩。有清瀉腸胃、預防疾病、保護健康的功用。

二 治牛拉稀、脖子腫

病狀：拉黃色稀糞，有時帶膿血，或是像雞蛋清一樣的東西，有的還腫脖子，不吃草，病久了就瘦弱而死。

治法：用芒硝三兩、鹽一兩、辣子末一錢，用溫水調和灌下。大牛一次灌完，小牛一次灌一半。

如果拉血膿的，第二天，可以再灌百分之一的石灰水一兩和米湯一碗。（石灰水製法：一錢石灰，加水十兩，浸一夜，用其上面的清水。）

過一天，再灌一服健胃藥。（藥方見下面）

腫脖子的地方，可以用大針或錐子燒紅，扎破腫的地方，讓黃水流盡就好了。

三 健胃藥

牲口如果消化不良，不好好吃草，可以灌以下的健胃藥。這些東西，都是比較容易找到的，分量如下：

藥名	牛	馬、驢	羊
薑末	一兩	五錢	三錢
辣子	五錢	五錢	一錢
草子	二兩	一兩	五錢
木龍子	五錢	三錢	三錢
酒麴	四兩	四兩	二兩
鹽	一兩	一兩	一兩

以上各藥混合，用溫水調和灌下，一次三分之一，三天灌完。

四 治牛瘟的幾個土方

第一種病症：一得病不吃草，不反芻，出氣很粗，精神不正常，兩耳下垂，

這是第一期，約有一天到三天的時間。第二期病症加重，如加上拉黑水屎，非常腥氣難聞，立臥不安，哼哼出聲，這樣一天至三天，牛就快死了。牛死後解剖開來看，心臟膨脹很大，肺潰爛，肺上起膿泡，百葉乾的很硬，斧頭都搗不爛，大腸上有黑紅血點。這種病在第一期能治好，第二期就不好治了。

治法：（一）用半斤或十兩青油煉紅，用一點頭髮剪碎放在油裏炸過，等油冷後，再用二三牙蒜搗碎放在油內，灌進牛肚，可生效。楊春生的牛就是這樣治好的。（二）二分麝香三分艾（端午艾最好），用一點燒酒混合起來（燒酒不可太多，剛點煙麝香艾就夠了），放在碗內，用火點着在牛鼻子上燻。燻的時候，牛鼻上可蓋一草帽，防止烟氣走漏；燻後再用一分麝香、半碗冷開水，灌進牛肚，可生效。

第二種病症：第一時期：牛得病不吃草，不反芻，精神不正常，這樣的病情也有一天一夜的時間；第二時期：病況加重，拉黑稀糞，有腥味，二嘴角有白沫，舌頭和嘴唇有些破爛，牛臥下不起，這樣的情況有二天；第三時期：嘴唇爛得很厲害，出氣很臭，喘氣緊促，這種病情也有二天的樣子。這樣的病在第一期、第二期能治好，第三期就治不好了。牛死後剖開來看，肚內充滿黑血，肝肺青黑。

，心很大（炸開了）。

治法：（一）在得病三天，用四兩青油煉紅，等它冷了，再用二頭蒜搗碎，用一碗酸菜湯、一錢大煙合起來，灌進牛肚，即能生效。（二）用一升大煙乾桃皮，（即大煙葫蘆頭）放三碗水，熬成一碗，再用五兩青油煉紅放冷，和幾張黃表燒成灰（這並不是迷信，因有收斂作用），合起來灌進牛肚，隔二三天再灌一次，也能生效。

第三種病症：第一期不吃草，不反芻，臥下不起，出氣很粗，瞪眼睛，肚脹，這樣一天到三天的樣子；第二期原病未退，口角上流白沫，嘴出涎水，拉黑水帶膿，這情形也二三天；危險期五六天，過七八天就不要緊了。病牛死後剖開看，腥氣很大，腸子發綠，腸內充滿白沫和黑水。

治法：（一）把番瓜切碎，多用點水熬成瓜湯，灌進牛肚。（二）用青油半斤至十兩煉紅放冷後再用一頭蒜搗碎，和幾張黃表灰混合起來，灌進牛肚。（三）用青油一斤煉紅，再用小米（壳米）半斤，在涼水內洗七次，蒜一頭搗碎，三樣東西混合在一起，一次灌進牛肚，灌時最好中午，天越熱越好。（四）這病還可預防，預防方法，把牛吃的料用酸菜湯泡過餵牛。

第四種病症：第一期出氣很粗，精神不正常，耳朵冰冷，吃草很少；第二期不吃草，還少許吃些水和料，出氣很粗；第三期拉黑黃稀屎，似乎想吃草，但吃不進；第四期，拉黑色稀屎，眼中落淚，大聲地哼，臥下不起；第五期，全身發抖而死。死後剖開看，腹內黃水很多，百葉僵硬，有青水。

治法：（一）用黃表幾張燒成灰，二分到三分洋煙燒乾搗碎，二三牙蒜搗爛，五兩或六兩青油（香油也行）煉紅，二兩灶炕內燒熟了的焦土碾成灰，以上五種混合起來，灌進牛肚；第二天再用燒酒四兩，用火燒過，和四兩煉紅放冷的青油合在一起灌進牛肚，即能生效。（二）用柳葉寄搗碎，和熟青油十兩合在一起，灌進牛肚，也能生效。（三）預防法：用酸菜湯泡料。

第五種病症：第一期不吃草，出氣很粗；第二期，拉黑稀屎；死後心肺發黑。

治法：四分洋煙同肥皂沫泡在一起，一次灌進牛肚。

第六種病症：第一期，全身發熱，脫毛，時間二三天；第二期，全身起疙瘩，時間四五天；第三期，疙瘩變膿泡，時間七八天；第四期，膿泡發爛，流黃水。這種病如不醫治，病牛半月就死。

治法：將椿樹、杏樹、桑樹，剝去老黑根皮的嫩根皮合在一起，熬成湯，灌進牛肚，即可生效。

以上幾種牛瘟治法，都要使用得早。由此希望有牛瘟的地區的同志，特別是養牛的農戶，要經常細心的看牛，一發現牛有病，要立即治，否則遲了是治不好的。

（附：上列土方中有用大烟，如找不着，可向藥舖買大烟葫蘆頭（又名米壳）不過用量要加多。）

五 牛瘟血清

病源：是一種濾過性毒，存在病牛血裏、組織、分泌物（如鼻涕）及排洩物中（尿尿）。

傳染的道路：健康的牛，若是接觸了病牛的血液、分泌物、排洩物，吃病牛吃剩草，或和病牛同飲水，就可以感染得病；餵病牛的人再餵好牛，也能使好牛傳染。

一切反芻的獸牛、羊、鹿、駱駝，都能得牛瘟病，馬、驢、騾、狗、貓、兔

、鳥類和人不能傳染。

病狀：本病特點是高溫及粘膜充血（可看眼皮和嘴唇）。

從得病以後三天到九天，一切和健康牛一樣（潛伏期），此後才顯露出病狀來。最初發高燒，自攝氏表三十九度到四十一度以上；食慾反芻減退，到完全停止；眼膜發炎（生眼屎）；口內脣發生白色小點潰瘍，小點多了結成小塊潰瘍；流口水，便秘；以後瀉痢不止，加雜有腸粘膜及膿血。瀉痢開始後，體溫很快下降，二、三天就死，或轉成慢性。

屍體剖驗：胆脹大，真胃幽門部充血，重瓣胃乾結……

治法：治療用高度免疫血清，施行皮下、肌肉或靜脈注射，有特效。

預防法：平時要使牛欄保持清潔和較好的陽光，春後，要使牛屋通風，一旦發現牛瘟，把病牛隔離。在傳染的地區，給沒病的牛注射血清疫苗，同時，沒有發生牛瘟的地區，注射牛瘟疫苗。絕對不要貪便宜買死牛肉吃。

附：牛瘟血清和疫苗

牛瘟血清：是治療牛瘟的特效藥。採取經過高度免疫的健牛的血液，分離出來的血清，給病牛皮下、肌肉或靜脈注射。治療效率：據統計達百分之八十五以

上。就是說，一百隻病牛，可治好八十五隻。現在山東還沒有實驗免疫血清，最好由農業推進所試製。

六 柳樹寄治牛拉稀黑糞病

陝甘寧邊區有一個勞動英雄×××同志，曾用柳樹寄（寄生在老柳樹上的寄生枝）熬水來灌活他自己的一隻病牛和他隣家一隻病牛，這兩隻牛都害了很厲害的拉稀黑糞的病，糞臭的厲害，過去治不好的病，現在用柳樹寄熬水，灌好了。有同樣的病牛，可試治一下。

此外，用柳樹寄搗碎和熟青油十兩合在一起，灌進牛肚，可治好牛拉稀黑尿的症。

七 牛痘

病狀：不能吃草，瀉稀糞（黑色）發展嚴重時肛門哆開，鼻尖乾燥有龜裂。

治法：用白麵炒一斤，燒酒半斤，油與米汁拌勻服上。

八 牛腿前後跛

在一九四五年夏，莒南蛟山區一帶，許多耕牛得了一種奇怪的病，牛停止倒

沫，先跛前腿，後跛後腿，先從一邊跛腿，不吃草，不喝水，起坐不安。

後由小坊前老農研究治法，結果完全治好。治法如下：

用白糖四兩，蜂蜜四兩，野槐樹根（中藥名苦參）不拘多少，水十五斤，先把野槐樹根和水放在鍋裏煮沸後，把水舀在盆裏，再加上蜂蜜白糖攪拌好，待水不很熱時，給病牛灌飲。灌完了以後，將病牛牽在屋裏，用棉單披在牛身上，再去煮一鍋開水，裏面要加上一些雜樹頭子，等水煮沸後，把水舀在盆裏，用飯帚洒在牛身上，看見牛鼻出了汗，就不再洒水，等牛身解了汗，牽在外邊，這樣治療以後，兩天以內不要給牠喝涼水。

在魯中萊蕪、蒙陰一帶發生的牛瘟，其病狀爲起初不出汗，耳尾發涼，腿跛，次日腿即不能走，不倒沫，後經魯中行署馬號班長王恆第，將其祖傳祕方治病，結果牛瘟完全好了。其藥方如下：

用香油四兩（豆油花生油亦可）熬熟，用高粱酒五兩燙熱，倒在油裏，再把將軍（獨角大屎克郎，藥舖裏有）一個至三個（看病輕重）焙乾研細，攪在油裏，涼到不燙手時，給牛灌下去，牽着蹣蹣，不要飲開水，要飲溫開水，或用綠豆熬水飲下最好，這樣兩三天牛就可好。

