



中国气象灾害年鉴

(2012)

中国气象局



气象出版社
China Meteorological Press

中国气象灾害年鉴

(2012)

中国气象局



内 容 简 介

本年鉴是中国气象局主要业务产品之一。全书共分为六章,第一章重点描述和分析 2011 年重大气象灾害和异常气候事件及其成因;第二章按灾种分析年内对我国国民经济产生较大影响的干旱、暴雨洪涝、热带气旋、冰雹和龙卷风、沙尘暴、低温冷冻害和雪灾、雾、雷电、高温热浪、酸雨、农业气象灾害、森林草原火灾、病虫害等发生的特点、重大事例,并对其影响进行评估;第三、四章分别从月和省(区、市)的角度概述气象灾害的发生情况;第五章分析 2011 年全球气候特征、重大气象灾害及其成因;第六章介绍 2011 年中国气象局防灾减灾重大事例。本年鉴附录给出气象灾害灾情统计资料和月、季、年气候特征分布图以及港澳台地区的部分气象灾情。本年鉴比较全面地总结分析了 2011 年我国气象灾害特点及其影响,可供从事气象、农业、水文、地质、地理、生态、环境、保险、人文、经济、社会其他行业以及灾害风险评估管理等方面的业务、科研、教学和管理决策人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国气象灾害年鉴. 2012 / 中国气象局编著. —北京:
气象出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-5029-5556-4

I. ①中… II. ①中… III. ①气象灾害-中国-2012-年鉴
IV. P429-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 204942 号

出版发行:气象出版社

地 址:北京市海淀区中关村南大街 46 号

总 编 室:010-68407112

网 址:<http://www.cmp.cma.gov.cn>

责任编辑:张 斌

封面设计:王 伟

印 刷:北京天成印务有限责任公司

开 本:889 mm×1194 mm 1/16

字 数:374 千字

版 次:2012 年 10 月第 1 版

定 价:120.00 元

邮政编码:100081

发 行 部:010-68409198

E-mail: qxcbs@cma.gov.cn

终 审:周诗健

责任技编:吴庭芳

印 张:14.75

印 次:2012 年 10 月第 1 次印刷

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等,请与本社发行部联系调换

序 言

气象灾害是指由气象原因直接或间接引起的,给人类和社会经济造成损失的灾害现象。20世纪90年代以来,在经济发展、财富增加、全球气候变暖背景下,气象灾害呈明显上升趋势,对经济社会发展的影响日益加剧,给国家安全、经济社会、生态环境以及人类健康带来了严重威胁。随着我国社会经济发展进程的加快,气象灾害的风险越来越大,影响范围也越来越广。因此,必须把加强防灾减灾作为重要的战略任务,不断提高气象服务水平,改进服务手段,加强气象灾害的监测、分析、预警能力和水平,为我国经济社会可持续发展提供科技支撑。

气象灾害信息是气象服务的重要组成部分,也是气象灾害预测与评估的基础资料。中国气象局立足于为经济社会发展提供优质服务,为适应提高防灾抗灾能力、保护人民生命财产安全和构建和谐社会的需求,发挥气象部门优势,从2005年开始组织国家气候中心、国家气象中心、中国气象科学研究院、国家气象卫星中心以及各省(市、区)气象局共同编撰出版《中国气象灾害年鉴》。《中国气象灾害年鉴》为研究自然灾害的演变规律、时空分布特征和致灾机理等提供了宝贵的基础信息,为开展自然灾害风险综合评估、科学预测和预防气象灾害提供了有价值的参考。

2011年,区域性、阶段性气象灾害发生频繁。华北、黄淮出现近41年来最重秋冬连旱;长江中下游出现近60年来最重冬春连旱,6月初旱涝急转,发生暴雨洪涝灾害;西南出现近60年来最重夏秋旱;华西和黄淮9月秋汛明显;华南南部10月发生较重暴雨灾害;强降水造成北京、南京等部分大城市发生严重内涝;5月上旬江淮和江南、6月西北及华北南部至江淮、8月南方大部持续高温,多地高温破历史纪录;台风“纳沙”、“梅花”影



中国气象灾害年鉴

响范围广、致灾程度较重。总体来看,2011年我国未出现大范围持续性严重干旱和流域性洪涝灾害,低温冰冻和雪灾、局地强对流、热带气旋灾害较轻。全国因气象灾害及其次生、衍生灾害导致受灾人口约4.3亿人次,因灾死亡失踪1199人,农作物受灾面积3000多万公顷,绝收面积290多万公顷,直接经济损失3030多亿元。2011年气象灾害直接经济损失超过1990—2010年的平均水平,因灾死亡或失踪人数明显少于常年。综合来看,2011年中国气象灾害为正常偏轻年份。

《中国气象灾害年鉴(2012)》系统地收集、整理和分析了2011年我国所发生的干旱、暴雨洪涝、台风、冰雹和龙卷风、沙尘暴、低温冷冻害和雪灾等主要气象灾害及其对国民经济和社会发展的影响,还收录了港澳台地区的部分气象灾情及全球重大气象灾害;给出全年主要气象灾害灾情图表、主要气象要素和天气现象特征分布图。希望通过本年鉴对2011年气象灾害的总结分析,能为有关部门加强防灾减灾工作和减少气象灾害损失提供帮助。

中国气象局副局长

许如峰

编写说明

一、资料来源

本年鉴气象资料和灾情数据来自我国各级气象部门的气象观测整编资料、天气气候情报分析、气象灾情报告、气候影响评估报告,以及民政部、水利部、农业部、国土资源部、国家统计局等有关部门提供的信息材料。某区域同一熟农作物多次遭受干旱、洪涝、风雹等灾害,在统计全年受灾面积时,不重复计算;在统计全年人员伤亡、经济损失时,则进行累计统计。

二、气象灾害收录标准

1. 干旱

指因一段时间内少雨或无雨,降水量较常年同期明显偏少而致灾的一种气象灾害。干旱影响到自然环境和人类社会经济活动的各个方面。干旱导致土壤缺水,影响农作物正常生长发育并造成减产;干旱造成水资源不足,人畜饮水困难,城市供水紧张,制约工农业生产发展;长期干旱还会导致生态环境恶化,甚者还会导致社会不稳定进而引发国家安全等方面的问题。

本年鉴收录整理的干旱标准为一个省(自治区、直辖市)或约5万平方千米以上的某一区域,发生持续时间20天以上,并造成农业受灾面积10万公顷以上,或造成10万以上人口生活、生产用水困难的干旱事件。

2. 暴雨洪涝

指长时间降水过多或区域性持续的大雨(日降水量25.0~49.9毫米)、暴雨以上强度降水(日降水量大于等于50.0毫米)以及局地短时强降水引起江河洪水泛滥,冲毁堤坝、房屋、道路、桥梁,淹没农田、城镇等,引发地质灾害,造成农业或其他财产损失和人员伤亡的一种灾害。

本年鉴收录整理的暴雨洪涝标准为某一地区发生局地或区域暴雨过程,并造成洪水或引发泥石流、滑坡等地质灾害,使农业受灾面积达5万公顷以上,或造成死亡人数10人以上,或造成直接经济损失1亿元以上。

3. 热带气旋

指生成于热带或副热带海洋上伴有狂风暴雨的大气涡旋,在北半球作逆时针方向旋转,在南半球作顺时针方向旋转。它在围绕自己中心旋转的同时,不断向前移动,其形状像旋转的陀螺边行边转。热带气旋主要是依靠水汽凝结时释放的潜热而形成和发展起来的。其强度以中心附近最大平均风力划分为热带低压(中心附近最大平均风力6~7级)、热带风暴(中心附近最大平均风力8~9级)、强热带风暴(中心附近最大平均风力10~11级)、台风(中心附近最大平均风力12~13级)、强台风(中心附近最大平均风力14~15级)、超强台风(中心附近最大平均风力16级或16级以上)。热带气旋尤其是达到台风强度的热带气旋具有很强的破坏力,狂风会掀翻船只、摧毁房屋和其他设施,巨浪能冲破海堤,暴雨能引发山洪。



本年鉴收录整理的热带气旋标准为中心附近最大平均风力大于等于 8 级,在我国登陆或虽未登陆但对我国有影响,并造成 10 人以上死亡,或造成直接经济损失 1 亿元以上的气旋。

4. 冰雹和龙卷风

冰雹是指从发展强盛的积雨云中降落到地面的冰球或冰块,其下降时巨大的动量常给农作物和人身安全带来严重危害。冰雹出现的范围虽较小,时间短,但来势猛,强度大,常伴有狂风骤雨,因此往往给局部地区的农牧业、工矿企业、电讯、交通运输以及人民生命财产造成较大损失。龙卷风是一种范围小、生消迅速,一般伴随降雨、雷电或冰雹的猛烈涡旋,为破坏力极强的小尺度风暴。

本年鉴收录整理的冰雹和龙卷风标准为在某一地区出现的风雹过程,使农业受灾面积 1000 公顷以上,或造成 2 人以上死亡,或造成直接经济损失 1000 万元以上。

5. 沙尘暴

指由于强风将地面大量尘沙吹起,使空气浑浊,水平能见度小于 1000 米的天气现象。水平能见度小于 500 米为强沙尘暴,水平能见度小于 50 米为特强沙尘暴。沙尘暴是干旱地区特有的一种灾害性天气。强风摧毁建筑物、树木等,甚至造成人畜伤亡;流沙埋没农田、渠道、村舍、草场等,使北方脆弱的生态环境进一步恶化;沙尘中的有害物及沙尘颗粒造成环境污染,危害人们的身体健康;恶劣的能见度影响交通运输,并间接引发交通事故。

本年鉴收录整理的沙尘暴标准是沙尘暴以上等级,并且造成直接经济损失超过 10 万元以上的沙尘天气过程。

6. 低温冷(冻)害及雪(白)灾

低温冷(冻)害包括低温冷害、霜冻害和冻害。低温冷害是指农作物生长发育期间,因气温低于作物生理下限温度,影响作物正常生长发育,引起农作物生育期延迟,或使生殖器官的生理活动受阻,最终导致减产的一种农业气象灾害。霜冻害指在农作物、果树等生长季节内,地面最低温度降至 0°C 以下,使作物受到伤害甚至死亡的一种农业气象灾害。冻害一般指冬作物和果树、林木等在越冬期间遇到 0°C 以下(甚至 -20°C 以下)或剧烈降温天气引起植株体冰冻或丧失一切生理活力,造成植株死亡或部分死亡的现象。雪灾指由于降雪量过多,使蔬菜大棚、房屋被压垮,植株、果树被压断,或对交通运输及人们出行造成影响,造成人员伤亡或经济损失的现象。白灾是草原牧区冬春季由于降雪量过多或积雪过厚,加上持续低温,雪层维持时间长,积雪掩埋牧场,影响牲畜放牧采食或不能采食,造成牲畜饿冻或因而染病、甚至发生大量死亡的一种灾害。

本年鉴收录整理的低温冷冻害及雪灾的标准为影响范围 1 万平方千米以上并造成农业受灾面积 1000 公顷以上,或造成 2 人以上死亡,或死亡牲畜 1 万头(只)以上,或造成经济损失 100 万元以上。

7. 雾和霾

雾指近地层空气中悬浮的大量水滴或冰晶微粒的乳白色的集合体,使水平能见度降到 1 千米以下的天气现象。霾指大量极细微的干尘粒等均匀地游浮在空中,使水平能见度小于 10 千米的空气普遍浑浊现象。霾使远处光亮物体微带黄、红色,使黑色物体微带蓝色。雾霾使能见度降低会造成水、陆、空交通灾难,也会对输电、人们日常生活等造成影响。

本年鉴收录整理的雾霾标准为影响范围 1 万平方千米以上,持续时间 2 小时以上;并因

雾霾造成 2 人以上死亡,或造成经济损失 100 万元以上。

8. 雷电

雷电是在雷暴天气条件下发生于大气中的一种长距离放电现象,具有大电流、高电压、强电磁辐射等特征。雷电多伴随强对流天气产生,常见的积雨云内能够形成正负的荷电中心,当聚集的电量足够大时,形成足够强的空间电场,异性荷电中心之间或云中电荷区与大地之间就会发生击穿放电。雷电导致人员伤亡,建筑物、供配电系统、通信设备、民用电器的损坏,引起森林火灾和仓储、炼油厂、油田等燃烧甚至爆炸,并且严重威胁航空航天等运载工具的安全。

本年鉴所收集整理的雷电灾害事件标准为雷击死亡 3 人及以上,或者死亡和受伤 4 人及以上,或者直接经济损失超过 100 万元的雷击事件。

9. 高温热浪

本年鉴将日最高气温大于或等于 35℃ 定义为高温日;连续 5 天以上的高温过程称为持续高温或热浪天气。高温热浪对人们日常生活和健康影响极大,使与热有关的疾病发病率和死亡率增加;加剧土壤水分蒸发和作物蒸腾作用,加速旱情发展;导致水电需求量猛增,造成能源供应紧张。

本年鉴收录整理的高温热浪标准为对人体健康、社会经济等产生较大影响的高温热浪过程。

10. 酸雨

pH 值小于 5.6 的雨水、冻雨、雪、雹、露等大气降水称为酸雨。酸雨的形成是大气中发生的错综复杂的物理和化学过程,但其最主要因素是二氧化硫和氮氧化物在大气或水滴中转化为硫酸和硝酸所致。酸雨的危害包括森林退化;湖泊酸化,导致鱼类死亡,水生生物种群减少;农田土壤酸化、贫瘠,有毒重金属污染增强,粮食、蔬菜、瓜果大面积减产;使建筑物和桥梁损坏,文物遭受侵蚀等。

本年鉴按照大气降水 pH 值 ≥ 5.6 为非酸性降水、 $4.5 \leq \text{pH 值} < 5.59$ 为弱酸性降水、pH 值 < 4.5 为强酸性降水的标准对酸雨基本情况进行分析和整理。

11. 农业气象灾害

农业气象灾害是指不利的气象条件给农业生产造成的危害。农业气象灾害按气象要素可分为单因子和综合因子两类。由温度要素引起的农业气象灾害,包括低温造成的霜冻害、冬作物越冬冻害、冷害、热带和亚热带作物寒害以及高温造成的热害;由水分因子引起的有旱害、涝害、雪害和雹害等;由风力异常造成的如大风害、台风害、风蚀等;由综合气象要素引起的农业气象灾害,如干热风、冷雨害、冻涝害等。此外,广义的农业气象灾害还包括畜牧气象灾害(如白灾、黑灾、暴风雪等)和渔业气象灾害等。

本年鉴所收集整理的农业气象灾害标准为对农作物生长发育、产量形成造成不利影响,导致作物减产、品质降低、农田或农业设施损毁等影响较大的灾害过程或事件。

12. 森林草原火灾

指失去人为控制,并在森林内或草原上自由蔓延和扩展,对森林草原生态系统和人类带来一定危害和损失的森林草原火灾。

本年鉴收录整理的标准为造成森林草原受灾面积 100 公顷以上或造成人员伤亡、或造成经济损失 100 万元以上的森林草原火灾。



13. 病虫害

病虫害是农业生产中的重大灾害之一,指虫害和病害的总称,它直接影响作物产量和品质。虫害指农作物生长发育过程中,遭到有害昆虫的侵害,使作物生长和发育受到阻碍,甚至造成枯萎死亡;病害指植物在生长过程中,遇到不利的环境条件,或者某种寄生物侵害,而不能正常生长发育,或是器官组织遭到破坏,表现为植物器官上出现斑点、植株畸形或颜色不正常,甚至整个器官或全株死亡与腐烂等。

本年鉴收录整理的病虫害标准为与气象条件相关、受灾面积 100 万公顷以上的病虫害。

三、港澳台地区灾情

全国气象灾情统计数据未包含香港、澳门和台湾地区,港澳台地区的部分灾情见附录 6。

目 录

序 言

编写说明

概 述 1

第一章 重大气象灾害和气候事件及气候异常成因分析 5

1.1 重大气象灾害和异常气候事件 /5

1.2 主要异常气候事件成因分析 /7

第二章 气象灾害分述 10

2.1 干旱 /10

2.2 暴雨洪涝 /17

2.3 热带气旋 /23

2.4 冰雹与龙卷风 /30

2.5 沙尘暴 /41

2.6 低温冷冻害和雪灾 /45

2.7 雾和霾 /49

2.8 雷电 /57

2.9 高温热浪 /62

2.10 酸雨 /67

2.11 农业气象灾害 /70

2.12 森林草原火灾 /74

2.13 农业病虫害 /78



第三章 每月气象灾害事记 81

- 3.1 1月主要气候特点及气象灾害 /81
- 3.2 2月主要气候特点及气象灾害 /82
- 3.3 3月主要气候特点及气象灾害 /84
- 3.4 4月主要气候特点及气象灾害 /86
- 3.5 5月主要气候特点及气象灾害 /88
- 3.6 6月主要气候特点及气象灾害 /89
- 3.7 7月主要气候特点及气象灾害 /91
- 3.8 8月主要气候特点及气象灾害 /93
- 3.9 9月主要气候特点及气象灾害 /95
- 3.10 10月主要气候特点及气象灾害 /97
- 3.11 11月主要气候特点及气象灾害 /98
- 3.12 12月主要气候特点及气象灾害 /100

第四章 分省气象灾害概述 103

- 4.1 北京市主要气象灾害概述 /103
- 4.2 天津市主要气象灾害概述 /105
- 4.3 河北省主要气象灾害概述 /107
- 4.4 山西省主要气象灾害概述 /108
- 4.5 内蒙古自治区主要气象灾害概述 /110
- 4.6 辽宁省主要气象灾害概述 /112
- 4.7 吉林省主要气象灾害概述 /114
- 4.8 黑龙江省主要气象灾害概述 /116
- 4.9 上海市主要气象灾害概述 /118

- 4.10 江苏省主要气象灾害概述 /120
- 4.11 浙江省主要气象灾害概述 /122
- 4.12 安徽省主要气象灾害概述 /124
- 4.13 福建省主要气象灾害概述 /127
- 4.14 江西省主要气象灾害概述 /129
- 4.15 山东省主要气象灾害概述 /131
- 4.16 河南省主要气象灾害概述 /133
- 4.17 湖北省主要气象灾害概述 /135
- 4.18 湖南省主要气象灾害概述 /137
- 4.19 广东省主要气象灾害概述 /139
- 4.20 广西壮族自治区主要气象灾害概述 /141
- 4.21 海南省主要气象灾害概述 /143
- 4.22 重庆市主要气象灾害概述 /146
- 4.23 四川省主要气象灾害概述 /147
- 4.24 贵州省主要气象灾害概述 /150
- 4.25 云南省主要气象灾害概述 /152
- 4.26 西藏自治区主要气象灾害概述 /155
- 4.27 陕西省主要气象灾害概述 /156
- 4.28 甘肃省主要气象灾害概述 /158
- 4.29 青海省主要气象灾害概述 /160
- 4.30 宁夏回族自治区主要气象灾害概述 /162
- 4.31 新疆维吾尔自治区主要气象灾害概述 /163



第五章 全球重大气象灾害概述	166
5.1 基本概况 /166	
5.2 全球重大气象灾害分述 /166	
5.3 主要气象灾害事件成因分析 /170	
第六章 防灾减灾重大气象服务事例	172
6.1 南方低温雨雪冰冻气象服务 /172	
6.2 北方冬麦区干旱气象服务 /173	
6.3 长江中下游干旱及早涝转折气象服务 /173	
6.4 深圳大运会气象服务 /174	
6.5 “梅花”台风气象服务 /175	
6.6 其他重大气象服务 /176	
附 录	177
附录 1 气象灾情统计年表 /177	
附录 2 主要气象灾害分布示意图 /183	
附录 3 气温特征分布图 /196	
附录 4 降水特征分布图 /201	
附录 5 天气现象特征分布图 /208	
附录 6 香港、澳门、台湾部分气象灾害选编 /210	
附录 7 2011 年国内及国外十大天气气候事件 /213	
Summary	214

概 述

2011 年,中国平均年降水量 556.8 毫米,比常年偏少 9.1%,为 1951 年以来最少(图 1);冬春夏降水偏少,秋季偏多,其中春季偏少 24.8%,为 1951 年以来最少。中国年平均气温 9.3℃,较常年偏高 0.5℃,是 1997 年以来连续第 15 年高于常年值,但较 2010 年偏低 0.2℃(图 2);冬季气温偏低,春夏秋均偏高,夏季气温为 1951 年以来历史同期第三高。




图 1 1951—2011 年全国平均年降水量历年变化图(毫米)




图 2 1951—2011 年全国年平均气温历年变化图(°C)

2011 年,中国未出现大范围持续性严重干旱和流域性洪涝灾害,低温冰冻和雪灾、局地强对流和热带气旋灾害较轻。但华北和黄淮、长江中下游、西南地区阶段性干旱严重;长江中下游 6 月暴雨洪涝、华西和黄淮等地秋汛、华南南部 10 月暴雨灾害较重,强降水造成北京、南京等城市发生严重内涝。

据统计,2011 年全国因气象灾害及其次生、衍生灾害导致受灾人口约 4.3 亿人次,因灾死亡失踪 1199 人,农作物受灾面积 3000 多万公顷,绝收面积 290 多万公顷,直接经济损失 3030 多亿元(图

3)。总体来看,2011 年气象灾害造成的直接经济损失超过 1990—2010 年的平均水平,因灾死亡或失踪人数明显少于常年,2011 年中国气象灾害为正常偏轻年份。




图 3 1990—2011 年全国气象灾害直接经济损失直方图(亿元)

图 4 给出 2011 年全国主要气象灾害在各项损失指标中所占比例。其中干旱在“受灾人口”、“受灾面积”和“绝收面积”上所占比例最高,分别为 47.0%、50.1%和 51.2%,暴雨洪涝在“死亡人口”、“倒塌房屋”和“直接经济损失”上所占比例最高,分别为 61.5%、87.2%和 41.6%。




图 4 2011 年全国主要气象灾害各项损失指标比例图

与 2010 年相比,2011 年全国气象灾害造成的死亡人数、直接经济损失、农作物受灾面积均偏少。分灾种比较,2011 年干旱和热带气旋直接经济损失较 2010 年显著偏重,暴雨洪涝(含滑坡、泥石流)的直接经济损失偏轻,局地强对流以及低温冷冻害和雪灾的直接经济损失略少于 2010 年(图 5 左);暴雨洪涝(含滑坡、泥石流)、局地强对流、低温冷冻害和雪灾造成的死亡人数造成的死亡人数都较 2010 年偏少,其中暴雨洪涝(含滑坡、泥石流)偏少明显(图 5 右)。

2011 年主要气象灾害概述:

干旱 2011 年,中国农作物受旱面积 1630 多万公顷,较 1990—2010 年平均值偏少,较 2010 年略偏多,属干旱灾害偏轻年份(图 6)。但 2011 年区域性和阶段性干旱严重,主要有华北黄淮地区秋冬连旱,长江中下游地区的冬春连旱以及西南地区夏秋连旱。




图5 2011年全国主要气象灾害直接经济损失(左)和死亡人数(右)与2010年比较图




图6 1990—2011年全国干旱受灾面积直方图(万公顷)

暴雨洪涝(及其引发的滑坡和泥石流) 2011年,中国未出现流域性严重暴雨洪涝灾害,但长江中下游6月暴雨洪涝、华西和黄淮等地秋汛、华南南部10月暴雨灾害比较严重;强降水造成北京、南京、武汉等大城市发生城市内涝;贵州、陕西等省局地滑坡、泥石流等次生灾害较重、新疆春季融雪型洪水多发。2011年,全国暴雨洪涝受灾面积690多万公顷,低于1990—2010年平均水平,明显少于2010年;死亡失踪人口和直接经济损失较1990—2010年平均值偏少,暴雨洪涝灾害属于偏轻年份。




图7 1990—2011年全国暴雨洪涝受灾面积直方图(万公顷)

热带气旋(台风) 2011年,在西北太平洋和南海共有21个热带气旋(中心附近最大风力 ≥ 8 级)生成,较常年(27个)偏少6个。其中7个登陆中国,登陆个数接近常年(7.1个)。初台登陆时间和末台登陆时间均比常年偏早;6月热带气旋登陆频繁,登陆个数占全年登陆总数的43%;登陆地

点分散,以西北路径为主。登陆热带气旋造成 28 人死亡(含失踪),直接经济损失 237.1 亿元,死亡人数和直接经济损失都少于 1990—2010 年平均水平,死亡人数为 1990 年以来第二少。总体而言,2011 年热带气旋灾害损失较常年偏轻(图 8)。




图 8 1990—2011 年全国热带气旋直接经济损失和死亡人数直方图

局地强对流(大风、冰雹、龙卷及雷电等) 2011 年,中国平均强对流日数 30.0 天,比常年同期偏少,为 1961 年以来历史同期第三少。全年因局地强对流灾害共造成 331.2 万公顷农作物受灾,直接经济损失 318.2 亿元,受灾面积和直接经济损失较 2010 年偏多。7 月 13—19 日,陕西省 33 个县(市、区)先后遭受风雹灾害,造成较重经济损失。

低温冷冻害及雪灾 2011 年,中国因低温冷冻灾害和雪灾共造成农作物受灾面积 444.7 万公顷,接近 1990—2010 年平均值,直接经济损失 289.9 亿元,较 1990—2010 年平均值偏小,为低温冷冻灾害及雪灾正常偏轻年份。年初,南方部分地区出现低温雨雪冰冻灾害;2 月中旬西藏遭受严重雪灾;初春,贵州、广西和湖南遭遇较重低温连阴雨。

沙尘暴 2011 年春季,中国北方地区平均沙尘日数为 1.7 天,比常年同期偏少 3.9 天,为 1961 年以来历史同期第三少。2011 年,我国共出现沙尘天气过程 8 次,较常年(19.2 次)偏少,也较 2001—2010 年同期平均值(12.7 次)偏少。其中强沙尘暴和沙尘暴共 4 次,仅为 2001—2010 年平均值(8 次)的一半,为 2000 年以来第二少。首次沙尘天气过程发生时间为 3 月 12 日,是 2001 年以来最晚的一年。沙尘天气影响总体偏轻。4 月 28—30 日的沙尘暴天气过程影响 11 个省(区、市),是 2011 年影响中国范围最广的一次过程。