

清华大学出版社“十二五”规划教材

高等农林院校大学数学系列教材

应用概率论 与数理统计

主 编	张海燕		
副主编	王学会	张文辉	张振荣
主 审	赵翠萍		



清华大学出版社

013028172

021
374

高等农林院校大学

应用概率论 与数理统计

主 编 张海燕
副主编 王学会 张文辉 张振荣
主 审 赵翠萍



021
374

清华大学出版社
北 京



北航

C1637404

内 容 简 介

本书内容包括随机事件及其概率、一维随机变量及其分布、多维随机变量及其分布、随机变量的数字特征、数理统计的基本知识简介、参数估计、假设检验、方差分析与回归分析等,并介绍了使用 MATLAB 软件做统计计算的基本方法。

本书强调基本概念的阐释,语言表达简洁易懂,难度适宜.可作为高等院校非数学专业本科生的概率论与数理统计教材,也可供具有相当数学基础(初等微积分知识及部分线性代数知识)的读者自修之用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

应用概率论与数理统计/张海燕主编.--北京:清华大学出版社,2013.4

(高等农林院校大学数学系列教材)

ISBN 978-7-302-31178-2

I. ①应… II. ①张… III. ①概率论—高等学校—教材 ②数理统计—高等学校—教材
IV. ①O21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 311912 号

责任编辑:石磊 赵从棉

封面设计:傅瑞学

责任校对:赵丽敏

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:13.75

字 数:298 千字

版 次:2013 年 4 月第 1 版

印 次:2013 年 4 月第 1 次印刷

印 数:1~3500

定 价:24.00 元

产品编号:038023-01

前言

本教材是“科技部创新方法专项资助——科学思维、科学方法在高等学校教学创新中的应用与实践”的子课题“农林专业数学课程应用案例研究”(项目编号:2009IM010400-1-49)的研究成果,是清华大学出版社“十二五”规划教材。

概率论与数理统计是定量研究随机现象统计规律性的一门数学学科。

概率论起源于17世纪中叶,最初是为了解答博弈问题,直到20世纪才建立起严格的学科体系。目前概率论的思想和数理统计方法越来越广泛地被人们所采用。概率论不仅在工业、农业等自然学科中有广泛的应用,在管理科学、医学及社会科学中也有广泛的应用。

概率论与数理统计的概念较为抽象、公式较为繁杂,学起来有一定难度。学生在学习该课程时,要正确理解基本概念和原理,能熟练运用基本方法。农科院校本科生教学计划中数学学时、特别是用于概率论与数理统计教学的学时较少,学生微积分基础参差不齐,需要根据学生程度编写一本适合农科院校教学计划的概率论与数理统计教材,以适应农科院校“扩招”后教学的需要,切实提高教学质量。本教材删去了较长的理论证明,尽量多作直观解释,同时增加了部分应用案例以及一些典型例题和习题讲解,努力做到有助于学生理解基本概念和基本原理。在全书最后增加一章“MATLAB软件的使用”,以引导学生尝试使用数学工具解决实际问题。

参加本教材编写工作的人员均为天津农学院的教师,他们是:张海燕(第1,4,5章)、王学会(第2,3章)、张文辉(第7,8章)和张振荣(第6,9章),孙丽洁编录了附表,赵翠萍审阅了全书,张海燕完成了全书的统稿工作。

天津农学院基础科学系及教材科的领导及教师在本教材的出版过程中给予了周到的服务和大力协助,在此一并致谢!

由于时间仓促,编者水平有限,不妥之处,殷切地盼望同行和读者批评指正。

编者

2013年2月于天津

目 录

绪论	1
第 1 章 随机事件及其概率	2
1.1 随机事件	2
1.1.1 随机试验	2
1.1.2 随机事件与样本空间	3
1.1.3 事件间的关系与运算	3
1.2 随机事件的概率	6
1.2.1 古典概率	6
1.2.2 几何概率	8
1.2.3 概率的统计定义	8
1.2.4 概率的公理化定义	9
1.2.5 概率的性质	10
1.3 条件概率	11
1.3.1 条件概率与乘法公式	11
1.3.2 全概率公式	12
1.3.3 贝叶斯公式	13
1.4 事件的独立性	15
1.4.1 事件独立性的概念	15
1.4.2 独立试验概型	17
习题 1	18
第 2 章 一维随机变量及其分布	21
2.1 一维随机变量的概念	21
2.2 随机变量的分布函数	22
2.3 离散型随机变量	23
2.3.1 离散型随机变量及其概率分布	23
2.3.2 常见的离散型随机变量	26

2.4	连续型随机变量	30
2.4.1	连续型随机变量及其概率密度	30
2.4.2	常见的连续型随机变量	32
2.5	随机变量函数的分布	39
2.5.1	离散型随机变量函数的分布	39
2.5.2	连续型随机变量函数的分布	41
习题 2		42
第 3 章	多维随机变量及其分布	44
3.1	多维随机变量及其分布	44
3.1.1	二维随机变量的概念及其分布	44
3.1.2	二维离散型随机变量	45
3.1.3	二维连续型随机变量	47
3.1.4	几种重要的二维连续型随机变量	48
3.1.5	n 维随机变量	49
3.2	边缘分布与相互独立性	50
3.2.1	边缘分布函数	50
3.2.2	二维离散型随机变量的边缘分布	50
3.2.3	二维连续型随机变量的边缘分布	52
3.2.4	随机变量的相互独立性	53
3.3	二维随机变量函数的分布	55
3.3.1	二维离散型随机变量函数的分布	55
3.3.2	二维连续型随机变量函数的分布	56
习题 3		59
第 4 章	随机变量的数字特征	61
4.1	随机变量的数学期望与方差	61
4.1.1	离散型随机变量的数学期望与方差的定义	61
4.1.2	常用的离散型随机变量的数学期望与方差	62
4.1.3	离散型随机变量函数的数学期望	64
4.1.4	连续型随机变量的数学期望与方差的定义	65
4.1.5	常用连续型随机变量的数学期望与方差	66
4.1.6	连续型随机变量函数的数学期望	68
4.2	随机变量的数学期望和方差的性质	69
4.2.1	随机变量的数学期望的性质	69

4.2.2 随机变量的方差的性质	70
4.3 二维随机变量的期望与方差	72
4.4 随机变量的其他数字特征	73
4.4.1 协方差	73
4.4.2 相关系数	74
4.4.3 矩	77
4.4.4 协方差矩阵	77
4.5 大数定律和中心极限定理	77
4.5.1 大数定律	78
4.5.2 中心极限定理	79
习题 4	80
第 5 章 样本及统计量	83
5.1 总体与样本	83
5.1.1 总体与样本	83
5.1.2 样本分布函数	84
5.2 统计量及其分布	85
5.2.1 统计量的定义	85
5.2.2 统计量的分布	86
5.2.3 几种重要的统计量的关系	88
习题 5	89
第 6 章 参数估计	90
6.1 点估计	90
6.1.1 参数估计原理	90
6.1.2 点估计的概念	90
6.1.3 矩估计方法	91
6.1.4 极大似然估计方法	93
6.1.5 估计量的评选标准	96
6.2 区间估计	98
6.2.1 一个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的情况	99
6.2.2 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的情况	102
6.2.3 单侧置信区间	104
习题 6	106

第 7 章 假设检验	109
7.1 假设检验的基本问题	109
7.1.1 假设问题的提出	109
7.1.2 假设的表达式	110
7.1.3 假设检验的一般步骤	110
7.1.4 两个相关问题的说明	111
7.2 单个正态总体的参数假设检验	112
7.2.1 关于总体均值 μ 的检验	112
7.2.2 总体方差 σ^2 的检验 (χ^2 -检验)	114
7.3 两个正态总体的参数检验	116
7.3.1 两个正态总体均值的参数检验	116
7.3.2 两个正态总体方差的差异性检验	119
7.4 非参数假设检验	120
7.4.1 χ^2 -拟合优度检验	120
7.4.2 列联表检验	121
习题 7	123
第 8 章 方差分析和回归分析	126
8.1 单因素方差分析	126
8.1.1 数学模型	127
8.1.2 构造检验的统计量	127
8.2 双因素方差分析	131
8.2.1 无交互作用的双因素方差分析	132
8.2.2 有交互作用的双因素方差分析	134
8.3 一元线性回归	138
8.3.1 参数 β_0, β_1 的估计	138
8.3.2 假设检验	139
8.3.3 利用回归方程进行估计和预测	141
8.4 可化为一元线性回归的情形	143
8.5 多元线性回归分析	143
8.5.1 数学模型	143
8.5.2 参数 $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ 的估计值	144
8.5.3 假设检验	145
习题 8	147

第 9 章 MATLAB 软件的使用	150
9.1 MATLAB 软件概述	150
9.1.1 MATLAB 的特点	150
9.1.2 MATLAB 的启动	151
9.1.3 MATLAB 集成视窗环境	151
9.1.4 MATLAB 的退出	152
9.2 MATLAB 变量及运算	152
9.2.1 常量与变量	152
9.2.2 数组的建立	153
9.2.3 数组操作	155
9.2.4 数组的基本运算	157
9.2.5 语句流程和控制	159
9.3 关于概率分布的计算	160
9.4 参数估计函数	162
9.4.1 函数 moment 的用法	162
9.4.2 函数 mle 的用法	162
9.4.3 区间估计函数	163
9.5 假设检验函数	167
9.5.1 一个正态总体在方差已知的条件下,求均值的假设检验	167
9.5.2 一个正态总体在方差未知的条件下,求均值的假设检验	168
9.5.3 一个正态总体在方差未知的条件下,求方差的假设检验	169
9.5.4 两个正态总体在方差已知的条件下,求总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的 假设检验	170
9.5.5 两个正态总体在方差未知但相等的条件下,求总体均值 差 $\mu_1 - \mu_2$ 的假设检验	171
9.5.6 两个正态总体在方差未知的条件下,求两总体方差是否 相等的假设检验	172
9.6 回归分析和方差分析函数	173
9.6.1 一元线性回归分析	173
9.6.2 多元线性回归分析	175
9.6.3 可化为线性回归的曲线回归	176
9.6.4 单因素方差分析	176

9.6.5 双因素方差分析·····	178
习题 9 ·····	181
习题答案·····	183
附录 A 常用分布表·····	193
参考文献·····	209

绪 论

人类在观察自然和生产经营活动中,经常会遇到一些随机现象.例如,中央电视台心连心艺术团某日要到某地进行慰问演出,届时当地的天气有可能是晴天、多云或是阴天、有雨;某商场最近购进了100件新式服装,一个月内能售出多少件?某生产企业参加一次出口商品交易会,展会期间所能得到的订货金额是多少?我国人均国民生产总值达到世界中等发达国家平均水平需要多少年,等等.概率论与数理统计(统称为随机理论)就是人类在研究这类随机现象的过程中创立起来的数学学科.

与传统数学(如微积分)不同,传统数学只研究变量之间的对应关系(函数),随机理论的研究对象是随机变量,主要研究随机变量的取值规律.在多个(有限或无穷多个)随机变量的情况下,还要研究这些随机变量之间的相互依赖关系.随机变量是随机理论中最为重要的概念之一,随机理论也是由随机变量的理论构成的.

概率论是整个随机理论的理论基础,它不仅研究随机现象的基本规律,还通过引入随机变量来刻画和描述随机现象,并在此基础上研究随机变量的规律性.数理统计则是通过观测试验数据,根据建立在概率论基础上的统计原理,对试验数据进行分析、整理,进而对所研究的随机现象进行推断和预测.

随着科学技术的发展和社会的进步,随机理论已逐步渗透到自然科学和社会科学的各个领域,在工农业生产、科学研究、经营管理、质量控制、环境监测和抗险救灾等方面都发挥着越来越重要的作用.

随机事件及其概率

1.1 随机事件

1.1.1 随机试验

自然界和社会上发生的现象是多种多样的. 有一类现象, 在一定条件下必然发生(或必然不发生), 例如, 向上抛一石子必然下落; 在常温常压条件下, 将水冷却到 0°C 以下, 水就会结冰. 这类现象称为确定性现象. 另一类现象, 具有偶然性, 在个别试验中呈现出不确定性, 在大量的重复试验中, 又具有统计规律性, 我们称之为随机现象.

例 1.1 抛掷一枚均匀硬币, 落地后可能正面向上, 也可能反面向上.

例 1.2 某射手向同一目标连续射击 5 次, 目标被击中的次数可能是 0, 1, 2, 3, 4, 5 中的任何一个数.

例 1.3 甲、乙二人进行 3 次定点投篮比赛, 比分也会出现多种结果.

例 1.4 某急救中心在一个工作日内收到的求助信号, 可能是任何一个非负整数.

以上各例描述的都是随机现象, 也是自然界中普遍存在的一种现象. 它们的共同特点是试验结果的不确定性. 人们经过长期观察和深入研究发现, 在随机现象表现的这种不确定性背后, 却隐藏着内在的规律性. 虽然在一次试验之前, 人们无法准确预测究竟会出现哪种结果, 但在相同条件下进行重复试验时, 其结果却呈现出明显的统计规律性. 概率论与数理统计正是研究和揭示随机现象的统计规律性的一门数学学科.

我们将通过随机试验来研究随机现象.

我们把试验作为一个广泛的术语, 它包括各种各样的科学试验, 甚至对某一事物的某一特征的观察也认为是一种试验. 下面举一些例子来说明:

E_1 : 掷一枚硬币, 观察正面 H、反面 T 出现的情况.

E_2 : 掷一枚骰子, 观察其出现的点数.

E_3 : 记录电话交换台一分钟内接到的呼唤次数.

E_4 : 袋中装有红、白两色的球各若干, 从袋中任取一球, 观察其颜色.

E_5 : 一射手进行射击, 直到击中目标为止, 观察其射击的情况.

E_6 : 在一批灯泡中,任意抽取一只,测试其寿命.

以上6个试验的例子,其共同的特点是:试验可能结果不止一个,例如, E_1 有两种可能的结果, E_2 有6种可能的结果, E_6 可能的结果无穷多;试验前不能确定哪一个结果会出现,并且可以在相同的条件下重复进行试验.

我们将具有以下3个特征的试验称为随机试验,简称试验,常用 E 表示.

- (1) 可以在相同的条件下重复进行;
- (2) 每次试验的可能结果不止一个,并且能事先明确试验的所有可能结果;
- (3) 进行试验之前不能确定哪一个结果会出现,但试验结束时能确定出现的结果.

1.1.2 随机事件与样本空间

随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的样本空间,记为 Ω .样本空间的元素,即 E 的每个结果,称为样本点.

下面写出了1.1.1节中试验 $E_i (i=1,2,\dots,6)$ 的样本空间 Ω_i .

$$\Omega_1: \{H, T\}.$$

$$\Omega_2: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

$$\Omega_3: \{0, 1, 2, \dots\}.$$

$$\Omega_4: \{\text{白色}, \text{红色}\}.$$

$$\Omega_5: \{+, -+, --+, \dots\}, \text{这里“+”表示击中,“-”表示没有击中.}$$

$$\Omega_6: \{t \mid t \geq 0\}.$$

随机试验 E 的结果称为随机事件(即样本空间 Ω 的子集),简称事件.一般用大写英文字母 $A, B, C, \dots$ 表示.

由一个样本点组成的单点集,称为基本事件(不能再分解的事件).由若干基本事件组合而成的事件称为复合事件.

例如 E_2 中,事件“点数1”是由一个样本点组成的,它是 E_2 的基本事件;如事件“点数2”,“点数3”, $\dots$,“点数6”都是基本事件.而出现偶数点,出现素数点都不止含有一个样本点,是复合事件而不是基本事件.

样本空间 Ω 包含所有的样本点,它是 Ω 自身的子集,在每次试验中它总是发生的,称为必然事件.在每次试验中都不发生的事件称为不可能事件,不可能事件也是 Ω 的子集,通常用 $\emptyset$ 表示.

例如 E_2 中,点数不大于6的事件是必然事件;点数大于6的事件是不可能事件.

1.1.3 事件间的关系与运算

设试验 E 的样本空间为 $\Omega, A, B, A_k (k=1, 2, \dots)$ 是 E 的事件.

1. 包含与相等

若事件 A 发生必将导致事件 B 发生, 则称事件 A 为事件 B 的子事件, 记为 $A \subset B$. 或称事件 B 包含事件 A . 可用图 1.1 来直观地说明, 图中矩形表示样本空间 Ω , 圆 A 与圆 B 分别表示事件 A 与事件 B , 事件 B 包含事件 A .

若事件 B 包含事件 A , 且事件 A 也包含事件 B , 则称事件 A 与事件 B 相等, 记为 $A=B$.

2. 事件的和(或并)

事件 A 与事件 B 至少有一个发生, 这一事件称为事件 A 与事件 B 的和(或并), 记为 $A \cup B$, 如图 1.2 阴影部分所示.




图 1.1




图 1.2

类似地, 事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中至少有一个发生的事件称为事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的和事件, 记为 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, 简记为 $\bigcup_{i=1}^n A_i$.

3. 事件之差

事件 A 发生而事件 B 不发生的事件称为事件 A 与事件 B 的差事件, 记为 $A-B$. 如图 1.3 中阴影部分所示. 不难看出 $A-B=A-AB$.

4. 事件之积(或交)

事件 A 与事件 B 同时发生的事件称为事件 A 与事件 B 的积事件, 记为 $A \cap B$ 或 AB . 如图 1.4 阴影部分所示.




图 1.3




图 1.4

类似地可定义事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的积事件: $\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$.

5. 事件互不相容(或互斥)

若事件 A 与事件 B 不能同时发生, 即 $AB = \emptyset$, 则称事件 A 与事件 B 为互斥事件, 也称事件 A 与事件 B 互不相容. 基本事件是互不相容的. 图 1.5 直观地表示了事件 A 与事件 B

是互不相容的.

对于互不相容事件的和 $A \cup B$, 记作 $A+B$.

一般地, 若一组事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 中任意两个都互斥, 称这组事件两两互斥.

6. 互为对立事件(或逆事件)

若事件 A 与事件 B 互斥, 且其和事件为必然事件, 即 $AB = \emptyset$, 且 $A+B = \Omega$, 则称事件 A 与事件 B 是互为对立事件. 记为 $B = \bar{A}$ 或 $A = \bar{B}$. 如图 1.6 所示.




图 1.5




图 1.6

由以上定义可知: 对立事件一定互斥, 而互斥事件未必对立.

易见: $A-B = A-AB = A\bar{B}$, 这在以后的概率计算中十分有用.

7. 互斥事件完备组

设 Ω 为某随机试验 E 的样本空间, 如果一组事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足下列条件:

① $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 即 $A_i A_j = \emptyset (i \neq j)$; ② $A_1 + A_2 + \dots + A_n = \Omega$; 则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为样本空间 Ω 的一个互斥事件完备组, 或称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为样本空间 Ω 的一个剖分.

8. 事件之间的运算规则

与集合的运算类似, 事件之间的运算满足下列规则.

- (1) 交换律: $A \cup B = B \cup A, AB = BA$;
- (2) 结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (AB)C = A(BC)$;
- (3) 分配律: $(A \cup B)C = (AC) \cup (BC), (AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$;
- (4) 德摩根(De Morgan)律: $\overline{A \cup B} = \bar{A}\bar{B}, \overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$;
- (5) 包含律: $A \subset A \cup B, B \subset A \cup B; AB \subset A, AB \subset B$;
- (6) 吸收律: $A \cup \Omega = \Omega, A \cup \emptyset = A; A\Omega = A, A\emptyset = \emptyset$;
- (7) 重叠律: $A \cup A = A, AA = A$;
- (8) 对立律: $A\bar{A} = \emptyset; A \cup \bar{A} = \Omega$.

例 1.5 设 A, B, C 为任意三个事件, 试用 A, B, C 的运算关系表示下列各事件: ①三个事件中至少一个发生; ②没有一个事件发生; ③恰有一个事件发生; ④至多有两个事件发生; ⑤至少有两个事件发生.

解 ① $A \cup B \cup C$;

② $\overline{ABC} = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$;

$$\textcircled{3} \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC;$$

$$\textcircled{4} (A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC) + (\overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C}) + \overline{A}\overline{B}\overline{C} = \overline{A}\overline{B}\overline{C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C};$$

$$\textcircled{5} A\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}BC \cup ABC = AB \cup BC \cup AC.$$

1.2 随机事件的概率

研究随机现象,不仅要知道它可能出现哪些事件,更重要的是要知道各种事件出现的可能性大小,以揭示这些事件的内在统计规律.因此,我们需要一个能够刻画事件出现可能性大小的数量指标,通常地,我们把用来刻画事件 A 出现可能性大小的数量指标称为事件 A 的概率,记为 $P(A)$.

1.2.1 古典概率

一般地,若随机试验 E 满足以下两个条件:

(1) 有限性. 试验的结果只有有限个,即试验产生有限个基本事件.

(2) 等可能性. 每个结果出现的可能性都相同,即每次试验中各个基本事件出现的可能性相同,则称随机试验 E 为古典概型.

定义 1.1 设随机试验 E 是含有 n 个基本事件的古典概型,事件 A 包含 k 个基本事件,则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{\text{事件 } A \text{ 包含的基本事件数}}{\text{样本空间中所含的基本事件总数}} = \frac{k}{n}.$$

在古典概型下定义的事件的概率为古典概率.

性质 1 对古典概率,有① $0 \leq P(A) \leq 1$; ② $P(\Omega) = 1, P(\emptyset) = 0$; ③ 若 A 与 B 互斥,则 $P(A+B) = P(A) + P(B)$.

例 1.6 盒子里有 10 只球,其中 6 只白球,4 只红球.现从盒子里任取一球,问取到白球的概率是多少?

解 设 A 表示“任取一球为白色”的事件,则有 $P(A) = \frac{3}{5}$.

例 1.7 书架上有 15 本书,其中 5 本精装书,10 本平装书.现随机地抽取 3 本,求至少抽到一本精装书的概率.

解一 设 A 表示“随机抽取的 3 本书中至少有一本精装书”的事件, $A_i (i=1, 2, 3)$ 表示“3 本书中恰有 i 本精装书”的事件 ($i=1, 2, 3$), 则有 $A = A_1 + A_2 + A_3$, 所以

$$P(A) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = \frac{C_5^1 C_{10}^2}{C_{15}^3} + \frac{C_5^2 C_{10}^1}{C_{15}^3} + \frac{C_5^3}{C_{15}^3} = \frac{67}{91}.$$

解二 $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{C_{10}^3}{C_{15}^3} = \frac{67}{91}.$

例 1.8 袋中有 10 只球,其中 6 只白球,4 只红球.从袋中任取球两次,每次取一只.考