




医药学院 610212044362

CHINESE HERBAL MEDICINE COMMONLY USED
IN THE ORIGINAL COLOR ILLUSTRATIONS OF PLANTS

常用中草药汇编

原植物彩色图鉴

主 编 邱文清



中医古籍出版社



医药学院 610212044362


CHINESE HERBAL MEDICINE COMMONLY USED
IN THE ORIGINAL COLOR ILLUSTRATIONS OF PLANTS

常用中草药汇编

原植物彩色图鉴

主 编 邱文清

副主编 郑 冉



中



中医古籍出版社

祛风寒湿药



灯笼草（伸筋草）

*Palhinhaeacernua(L.)
FrancoetVasc.*

基源 原植物

伸筋草为石松科植物灯笼草的干燥全草。主茎直立（基部有次生匍匐茎），高30~100cm，上部多分枝，小枝细弱，有时顶端呈弯钩形。叶密生，螺旋状排列，线状钻形，顶端芒刺状，全缘，通常向上弯曲。孢子囊穗小，单生于小枝顶端，无柄，长圆形或圆柱形，成熟时下指；孢子叶覆瓦状排列，阔卵圆形，顶端急狭，长渐尖头，边缘流苏状，顶端芒刺状。孢子囊近圆形。孢子钝三角形至三角状圆形，有不规则的拟网状饰纹。

生境分布 生于海拔150~1100米的湿润酸性土壤中。分布于我国长江以南各省区。

采收加工 夏、秋二季茎叶繁茂时连根拔起，晒干。

性状鉴别 本品茎略呈扁方柱形，具棱，表面灰黄白色或灰青色，密被白色茸毛。叶皱缩卷曲，展平后呈卵圆形，先端尖，基部楔形或微心形，近全缘或有不规则疏粗齿，暗绿色或黄绿色，两面具白色茸毛；齿长叶柄。花萼，淡黄绿色，薄纸质，半透明，被有柔毛，内有暗黄绿色浆果，近圆形。气微，味甘。

性味功能 味苦，辛，性温。有散风祛寒，除湿消肿，舒筋活络的功能。

主治用法 用于风寒湿痹、关节酸痛，皮肤麻木，四肢软弱，水肿，跌打损伤。用量9~12g。外用适量捣敷患处。



现代研究

1. 化学成分 本品根含有有机酸、氨基酸、黄酮苷、酚类及糖类。叶含绿原酸。果实含丰富的胡萝卜素。此外，尚含无定形的苷、鞣质、还原糖等。

2. 药理作用 本品有抗癌及抗微生物作用。

应用

1. 风痹筋骨痛：伸筋草9g，水煎服。
2. 关节酸痛：伸筋草、大血藤各9g，虎杖根、水煎服。
3. 带状疱疹：伸筋草研粉，麻油调成糊状，涂患处。
4. 手足麻痹：伸筋草、丝瓜、大活血，水、酒各半，煎服。患处。

石松（伸筋草）

*Lycopodium japonicum
Thumb*

基源 原植物

伸筋草为石松的全草。别名：筋骨草、过山龙。多年生草本。主茎下部状卧。随处生根，营养枝为多回分叉。叶小，多列密生。叶线状钻形，顶端芒状，螺旋状排列，全缘或微锯齿。孢子枝从第二或第三年营养枝上生出，高出营养枝。孢子囊穗棒状，有柄，单生或2~6个着生于孢子枝上部；孢子叶卵状三角形，边缘有不规则锯齿，孢子囊肾形，淡黄褐色，有密网纹及不突起。孢子期6~8月。

生境分布 生于疏林及溪边酸性土壤中。分布于吉林、内蒙古、陕西、新疆、河南、山东及长江以南各省、自治区。

采收加工 夏、秋季茎叶繁茂时连根拔起，除去泥土、杂质，舒筋活络的功能。

性状鉴别 本品匍匐茎呈细圆柱形，略弯曲，其下有黄白色细根。直立茎作二叉分枝。叶密生茎上，螺旋状排列，皱缩弯曲，红形或针形，黄绿色至淡黄棕色，无毛，称端芒状，全缘，易碎断。质柔软，断面皮部浅黄色，木部类白色。无臭，味淡。

性味功能 味微苦、辛。性湿，有祛风寒，除显消肿，舒筋活络的功能。

炮制 除去杂质，洗净，切短段，干燥，筛去灰屑。

主治用法 用于风寒湿痹，关节酸痛，肢体麻木，四肢软弱，水肿，跌打损伤。用量3~12g。外用适量，捣敷患处。



现代研究

1. 化学成分 本品全草含石松碱、棒石松碱、石松灵碱等生物碱，香荚兰酸、阿魏酸、伸筋草醇石松醇、石松宁等三萜化合物。

2. 药理作用 本品水浸剂对由皮下注射枯草浸剂引起发热之家兔有降温作用；石松碱适当剂量能升高麻醉猫血压。

应用

1. 风痹筋骨不舒：伸筋草9~50g，水煎服。
2. 关节酸痛：伸筋草9g，虎杖根15g，大血藤9g，水煎服。

华山松（油松节）

Pinus armandi Franch.

基源
原植物

油松节为松科植物华山松的枝干结节。
高大乔木。枝条平展，树冠柱状塔形；针叶5针一束。雄球花黄色，卵状圆柱形，基部鳞片集成穗状，排列较疏松。球果圆锥状长卵圆形，黄色或褐黄色；中部种鳞近斜方状倒卵形，鳞盾近斜方形或宽三角状斜方形，先端钝圆或微尖；种子黄褐色、暗褐色或黑色，倒卵圆形。花期4~5月，球果第二年9~10月成熟。

生境分布

生于气候温凉而湿润的山地。分布于陕西、甘肃、山西、河南、贵州、四川、云南及西藏。

采收加工

冬季采收，锯取后，晒干。

性味功能

味苦，性温；有祛风湿，止痛的功能。

主治用法

用于关节疼痛，屈伸不利。用量9~15g。



应用

1. 脚转筋疼痛挛急者：油松节50g，乳香3.3g，慢火炒焦，研细，每服3.3~6.6g，热木瓜酒调下。
2. 大骨节病：油松节7.5kg，蘑菇0.75kg，红花0.5kg，加水50kg，煎至25kg，过滤，加白酒5kg。
3. 水田皮炎：油松节、艾叶适量，制成松艾酒精，涂抹患处。
4. 风湿性关节炎、腰腿痛：油松节，制成注射液，肌肉注射。

四 祛风湿药

马尾松（松花粉，油松节）

Pinus massoniana
Lamb.

基源

松花粉为松科植物马尾松的干燥花粉；油松节为其瘤状节或分枝节。

原植物

高大常绿乔木。树冠宽塔形或伞形。针叶两针一束，稀三针一束，细柔；横切面树脂道4~8个；叶鞘初呈棕色，后渐变成灰黑色，宿存。雄球花淡红棕色，圆柱形，弯垂，聚生于新枝下部苞腋，穗状；雌球花单生或2~4个聚生于新枝近顶端。球果卵圆形或圆锥状卵圆形，绿色，成熟时棕色；种子长卵圆形。花期4~5月。生于山地。分布于淮河流域及长江流域各地以及福建、广东、云南等省。

生境分布

采收加工

松花粉：春季花刚开时，采摘花穗，晒干，收集花粉。油松节：全年均可采收，以冬季为多，锯取后晒干。

性味功能

味甘，性温。松花粉有燥湿，收敛止血的功能。油松节有祛风湿，止痛的功能。

主治用法

松花粉用于湿疹，黄水疮，皮肤糜烂，脓水淋漓，外伤出血；尿布性皮炎。外用适量。油松节用于关节疼痛，屈伸不利。用量9~15g。



应用

同油松。

附注：松香，松针也药用。松香：味苦，性温。有生肌止痛，燥湿杀虫的功能。

油松（松花粉，油松节）

Pinus tabulaeformis Carr.

基 源 松花粉为松科植物油松的干燥花粉；油松节为油松的瘤状节或分枝节。

原 植 物 常绿乔木。叶二针一束，粗硬。叶鞘褐色，宿存。球果卵球形，开裂，在树上宿存数年不落。种鳞的鳞盾肥厚，扁菱形或菱状多角形，横脊明显，鳞脐凸起。种子卵形或长卵形。花期4~5月，球果次年9~10月成熟。

生境分布 生于山地。分布于全国大部分省区。

采收加工 松花粉：春季花开时，采摘花穗，晒干，收集花粉。油松节：全年均可采收，以冬季为多，锯取后晒干。

性状鉴别 本品呈扁圆节段状或呈不规则的片状或状，短粗细不一。表面黄棕色、灰棕色或红棕色，稍粗糙，有时带有棕色至黑棕色油脂斑，或有残存的栓皮。质坚硬而重。横断面木部淡棕色，心材色稍深，可见有同心环纹，有时可见散在棕色小孔状树脂道，显油性；髓部小，淡黄棕色，纵断面纹理直或斜，不均匀。有松节油香气，味微苦辛。

性味功能 味甘，性温。松花粉有燥湿，收敛止血的功能。松节有祛风湿，止痛的功能。

炮 制 劈成薄片或小块。

主治用法 松花粉用于湿疹，黄水疮，皮肤糜烂，脓水淋漓，外伤出血；尿布性皮炎。3~6g，外用适量。油松节用于关节疼痛，屈伸不利。用量9~15g。



现代研究

1. 化学成分 本品含有纤维素、木质素、树脂及少量挥发油，挥发油主要成分为 α -和 β -蒎烯及樟烯、二戊烯等。另含熊果酸、异海松酸。

2. 药理作用 本品有镇痛、抗炎作用；其提取的酸性多糖有抗肿瘤作用；其提取的多糖类物质、热水提取物和酸性提取物都具有免疫活性。

应用

1. 风湿骨痛：松节、当归、鸡骨草各12g，半枫荷30g，熟地15g。水煎服。
2. 胃及十二指肠溃疡：松花粉3.3g，冲服。
3. 外伤出血：松花粉，外敷伤口。
4. 婴儿湿疹：松花粉、炉甘石粉各3g，熟鸡蛋黄三个，油调成膏，涂敷患处。

云南松（松香，松节）

Pinus yunnanensis Franch.

基 源 松香为松科植物云南松的树干中松油脂，蒸馏后所得树脂；其瘤状节或分枝，为松节。

原 植 物 乔木。针叶3针一束，稀2针一束，先端尖，边缘具细锯齿。雄球花圆柱状腋生，聚成穗状。球果栗褐色，圆锥状长卵圆形，有短梗；中部种鳞有短刺；种子褐色，卵圆形或倒卵形，微扁。花期4~5月，球果第二年9~10月成熟。

生境分布 生于山地。分布于广西、贵州、四川、云南、西藏东部等省区。

采收加工 松香：松油脂，经蒸馏后所得固体树脂。松节：全年均可采收，锯取后晒干。

性味功能 味苦，性温。松香有生肌止痛，燥湿杀虫的功能。松节：具祛风湿，止痛的功能。

主治用法 松香用于痈肿恶疮，疥癣，湿疹等。油松节：用于关节疼痛，屈伸不利。用量9~15g。



应用

1. 慢性骨髓炎，骨结核：松香、樟脑、血竭、银朱、铅粉、石膏、冰片、蓖麻子。捣成膏状，外敷患处。
 2. 小儿湿疹：松香、煅石膏、枯矾、雄黄、冰片，加凡士林。调成软膏，涂于患处，用纱布包扎，隔日擦1次。
- 附注：其花粉、松针也可药用。





四祛风湿药

金钱松（土荆皮） *Pseudolarixamabilis* (Nelson)Rehd.

基 源 土荆皮为松科植物金钱松的根皮或近根树皮。

原 植 物 高大落叶乔木。茎干直立，枝轮生，平展；叶在长枝上螺旋状散生，在短枝上 15~30 片簇生，呈辐射状。叶线形，先端尖，基部渐狭。花单性，雌雄同株；雄花柔荑状，下垂，黄色；雌球花单生短枝顶端，苞鳞大于珠鳞。球果卵圆形，种翅稍厚。花期 4~5 月。果期 10~11 月。

生境分布 喜生于向阳处。分布于江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖南及湖北、广东等省区。

采收加工 多于 5 月剥取根皮或近根树皮，晒干。

性味功能 味辛，性温，有毒。有祛湿止痒的功能。

主治用法 外用用于手脚癣，神经性皮炎，湿疹，癬痢头。外用适量。浸醋或酒涂擦或研末调敷。



应用

1. 头癣：土荆皮 30g，地榆末 12g，烧酒浸七天，蘸酒搽患处。
2. 阴囊湿疹：土荆皮 6g，浸白酒 1~2 天，外搽患处。
3. 神经性皮炎，湿疹：土荆皮研粉，以醋调敷患处。
4. 癣疥、皮肤真菌：土荆皮酒浸或水煎，洗敷患处。

山胡椒 *Lindera glauca*(Sieb.et Zucc.)Bl.

基 源 樟科植物山胡椒的根、树皮、叶及果实入药。

原 植 物 灌木或小乔木。叶互生，近革质，宽椭圆形或狭卵形，全缘，被灰白色柔毛。伞形花序腋生，每总苞内有 3~8 花；雄花梗密被白色柔毛；花被片 6，黄色，椭圆形；雌花花被片 6，黄色。果实近球形，黑褐色。花期 3~4 月，果期 7~8 月。

生境分布 生于山坡，林缘或路边。分布于山西、陕西、甘肃、河南、四川及华东、中南等省区。

采收加工 根、树皮全年均可采，切片晒干。叶夏季采。果实秋季采摘，晒干。

性状鉴别 本品干燥根呈圆锥形，支根为圆柱形，弯曲而略扭转，多有支根。外表面灰棕色至灰黄色，有不规则而纵长的隆起和纵沟。栓皮较松，易于脱落。质坚硬，不易折断，折断面不平坦；横切面射线极纤细，微带芳香，味苦，皮部较木质部更苦。

性味功能 根味辛，性温。有祛风活络，利湿消肿的功能。树皮味苦，性寒。有清热收敛的功能。叶味辛，性平。有清热解毒，收敛止血的功能。果实味辛，性热。有温中健胃，祛风的功能。

主治用法 根用于风湿痹痛，劳伤失力，感冒，扁桃腺炎，咽炎，浮肿。树皮用于烫伤。叶用于疮疖，外伤出血。果实用于胃痛，气喘。用量，根 30~60g。树皮、叶外用适量。果实 30~60g。



现代研究

1. 化学成分 本品果实含挥发油，油中主要成分为罗勒烯、 α -及 β 蒎烯、樟烯、龙脑等成分。种子中含脂肪酸，如癸酸、月桂酸、硬脂酸、棕榈酸等。
2. 药理作用 本品有抗病原微生物作用，体外试验山胡椒挥发油对常见的 14 种革兰阳性和阴性细菌均有不同程度的抗菌作用。

应用

1. 烫伤：山胡椒树皮研粉或煨存性研粉，调敷患处。
2. 外伤出血：山胡椒叶研粉，麻油调敷。
3. 中风：山胡椒果实、黄荆子，共研碎，开水冲服。

金粟兰

Chloranthusspicatus(Thunb.)Makino

基 源
原 植 物

为金粟兰科植物金粟兰的干燥全株。
别名：珠兰、鱼子兰。半直立或稍披散灌木，高30~100cm。茎节膨大。单叶对生；叶柄基部多少合生；托叶细小；叶倒卵状椭圆形，先端短尖，基部宽楔形，边缘有钝齿，齿尖有一腺体。穗状花序顶生，少有腋生，数条排成圆锥花序，小花黄绿色，极香；雌雄花成对生于苞腋内，苞片近三角状；无花被；雄蕊3，肉质，黄色；子房下位。核果。花期7~8月。

生境分布

多为栽培。分布于福建、广东、四川、云南等省区。

采收加工

夏季采收全株，晒干。

性状鉴别

全株长30~60cm。茎圆柱形，表面棕褐色；质脆，易折断，断面淡棕色，纤维性。叶棕黄色，椭圆形或倒卵状椭圆形，长4~10cm，宽2~5cm；先端稍钝，边缘具圆锯齿，齿端有一腺体；叶柄长约1cm。花穗芳香。气微，味微苦涩。

性味功能

味辛、甘、微涩，性温。有祛风除湿，接筋骨，止痛止血的功能。

主治用法

用于感冒，风湿关节疼痛，跌打损伤，刀伤出血。用量15~30g。

现代研究

1. 化学成分 本品花含顺式茉莉酮酸甲酯、顺式-β-罗勒烯、β-蒎烯等。根中含有金粟兰内酯A、C，异莰术呋



喃二烯和银线草呋喃醇。

2. 药理作用 暂无。

应用

1. 风湿疼痛，跌打损伤：金粟兰100g，泡酒服。
2. 癫痫：金粟兰50g，水煎服。
3. 刀伤出血：鲜金粟兰适量，捣烂敷伤口处；或干品研末撒敷伤口处。

绵毛马兜铃（寻骨风）

*Aristolochia mollissima*Hance

基 源

寻骨风为马兜铃科植物绵毛马兜铃的干燥全草。

原 植 物

别名：巡骨风、白毛藤。多年生攀援状半灌木，全株密被白色绵毛。叶互生，卵状心形或卵圆形，先端短尖或钝圆，基部心形，全缘。花腋生，花下部具叶状苞片，花被管弯曲呈烟斗状，内侧黄色，喉部紫色。蒴果椭圆形，室间6开裂，黑褐色。种子多数，扁平。花期5~7月，果期9~10月。

生境分布

生于山地、路旁、田边及山坡向阳草丛中。分布于陕西、山西、河南、山东及长江以南各省区。

采收加工

夏、秋或五月开花前采收，晒干，扎成小把。

性状鉴别

本品根茎呈细圆柱形，多分枝，长短不一；表面棕黄色，有细纵纹及节，节处有须根，有的有芽痕；质韧，断面黄白色，有放射状纹理。茎细长，淡绿色，密被白柔毛。叶互生，叶片展平后呈卵圆形或卵状心形，先端钝圆或短尖，基部心形，两面密被白柔毛，全缘，脉网状。气微香，味苦而辛。

性味功能

味苦，性平。有祛风，活络，止痛的功能。

炮 制

除去杂质，洗净，切段，干燥。

主治用法

用于风湿痹痛，关节酸痛。用量9~15g，水煎服或浸酒。

现代研究

1. 化学成分 本品根茎含有尿囊素、马兜铃内酯和绵毛马兜铃内酯等。茎叶含马兜铃酸A和D、β-谷甾醇、挥发



油等。

2. 药理作用 本品有抗肿瘤作用，其所含的挥发油及总生物碱对大鼠蛋清性关节炎有明显的预防作用。

应用

1. 风湿性、类风湿性关节炎：寻骨风15g，水煎服。
2. 骨痛：寻骨风9g，水煎服或嚼服。
3. 钩蚘皮炎：寻骨风50g，水煎洗患处。
3. 疟疾：寻骨风，放饭上蒸出汁，发疟前二小时服。
4. 风湿关节痛：寻骨风120g，白酒500g，浸泡1个月，每日服2次。或寻骨风粗粉加水煎煮，加蔗糖制成寻骨风糖浆，每日服。



地枫皮

Illicium difengpi K. I. B. et K. I. M.

基 源

为八角科植物地枫皮的树皮或枝皮。

原 植 物

别名：钻地枫、风榔、矮丁香。常绿灌木，高1~3m；全株具芳香气味。树皮灰棕色。叶3~5聚生枝顶或节上；叶厚革质，有光泽，倒披针形至长椭圆形，先端短渐尖，基部楔形，全缘，无毛；密布褐色油点。花红色或紫红色，腋生或近顶生；花被片15~20，宽卵形，下凹，肉质；雄蕊多数；心皮12~13枚。聚合果由9~11果组成，果顶端喙细尖，常内弯。种子扁卵形，黄色，光亮。花期4~5月，果期8~9月。生于石灰岩山的石缝中或疏林下。分布于广西西南部及南部。

生境分布

采收加工

春、秋二季剥取树皮或枝皮，晒干。

性状鉴别

本品呈卷筒状或槽状，长5~15cm，直径1~4cm，厚0.2~0.3cm。外表面灰棕色至深棕色，有的可见灰白色地衣斑，粗皮易剥离或脱落，脱落处棕红色。内表面棕色或棕红色，具明显的纵细皱纹。质松脆，易折断，断面颗粒状。气微香，味微涩。

性味功能

味涩、微辛，性温；有小毒。有祛风除湿、行气止痛的功能。

炮 制

除去杂质，洗净，打碎，晒干。

主治用法

用于风湿性关节炎、腰肌劳损等症。用量6~9g。



现代研究

1. 化学成分 本品含挥发油，油中成分有： α -和 β -蒎烯、樟烯、1,8-桉叶素、芳樟、樟脑等。
2. 药理作用 暂无。

应用

1. 小儿急性脓胸：地枫皮复方，加热外敷患处。
2. 蜈蚣咬伤：地枫皮，研粉酒调外涂患处。
3. 风湿性关节炎、腰肌劳损：地枫皮9g。水煎服。

牛扁

Aconitum barbatum Pers. var. *puberulum* Ledeb.

基 源

为毛茛科植物牛扁的干燥根。

原 植 物

别名：曲芍、扁桃叶根、翻叶莲。多年生草本，有直根。茎有反曲的短柔毛。基生叶1~5片，和下部茎生叶有长柄；叶圆肾形，两面有短伏毛，三全裂，中央裂片菱形，在中部3裂，二回裂片有窄卵形小裂片。总状花序，密生反曲的短柔毛；萼片5，花瓣状，黄色，花瓣2，有长爪；雄蕊多数；心皮3，离生。果长约8mm。花期8~9月，果期9~10月。

生境分布

生于山地林中或林边草地。分布于河北、山西、陕西、山西、甘肃等省。

采收加工

春、秋采挖根，洗净晒干。

性状鉴别

本品根圆锥形，长10~15cm，中部直径2~4cm。表面暗棕色，外皮脱落处深棕色，粗糙，略显网纹；根头部常有多数根茎聚生，其下根分数股，每股有几个裂生根，互相扭结成辫子状。质轻而松脆，易折断，断面不平坦，木心淡黄褐色。气微，味苦、微辛。

性味功能

味苦，性温。有毒。有祛风止痛，止咳，平喘，化痰的功能。

主治用法

用于慢性支气管炎，腰脚痛，关节肿痛；外用用于疥癣，淋巴结结核。用量3~6g。外用适量。



现代研究

1. 化学成分 本品根含刺乌头碱、毛茛叶乌头碱、牛扁碱、北方乌头碱、北方乌头定碱、牛扁宁碱、牛扁定碱等。
2. 药理作用 暂无。

应用

1. 风湿性关节炎、类风湿关节炎，腰腿痛：牛扁，研末，白酒浸2日，擦涂患处。
2. 疥癣：牛扁适量，水煎，洗敷患处。
3. 慢性支气管炎：牛扁6g，炙甘草4g。水煎服。



四 祛风湿药

伏毛铁棒锤（雪上一枝蒿）

Aconitum brachypodum Diels

基 源

原 植 物

雪上一枝蒿为毛茛科植物伏毛铁棒锤的块根。别名：短柄乌头、铁棒锤、三转半。多年生草本。块根成对，棕色，长圆柱形至长圆锥形。茎直立，下部无毛，上部密被短柔毛。叶互生，茎下部叶果期枯萎，茎生叶密生于中部以上，叶3深裂，裂片再二至三回羽状深裂，小裂片线形，无毛。总状花序顶生；花序轴密生反曲短柔毛，花蓝紫色，盔瓣船形，侧瓣宽倒卵形，下片斜长圆形，被短柔毛；蜜叶2，无毛，有长爪。果长圆形，长约1.5cm，无毛。花期8~9月，果期9~10月。

生境分布

生于高山草丛中。分布于甘肃、四川西南、云南西北、青海等省地区。

采收加工

秋末冬初采挖块根，晒干。

性状鉴别

本品块根圆柱形，长6~8cm，直径1~1.5cm。表面棕色，光滑，具少数侧根。断面乳白色。

性味功能

味苦、辛，性温，有大毒。有祛风，镇痛的功能。

炮 制

同“铁棒锤”

主治用法

用于风湿疼痛，跌扑损伤。用量25~50mg。本品有剧毒，应在医师指导下服用。

现代研究

1. 化学成分 本品块根含乌头碱，3-乙酰乌头碱，欧乌头碱、伏毛铁棒锤碱、新乌宁碱、伏毛铁棒锤精等。
2. 药理作用 本品具有镇痛、抗炎、局部麻醉和解热作用；有致心律失常作用。



应用

1. 跌扑损伤，风湿关节炎：雪上一枝蒿，浸酒，外擦。
2. 腰肌劳损，坐骨神经痛：雪上一枝蒿，注射液，局部或穴位注射。

乌头（附子，草乌）

Aconitum carmichaeli Debx.

基 源

原 植 物

附子为毛茛科植物乌头子根；草乌为其干燥母根。

原 植 物

块根2个连生。叶互生，革质，卵圆形，掌状三裂几达基部，两侧裂片再2裂，中央裂片菱状楔形，上部再3浅裂，边缘有粗齿或缺刻。总状花序窄长；花青紫色，盔瓣盔形，侧瓣近圆形；雄蕊多数；心皮3~5，离生。果长圆形。花期6~7月，果期7~8月。

生境分布

生于山地、丘陵地、林缘。分布于辽宁、河南、山东、江苏、安徽、浙江、江西、广西、四川等地区。

采收加工

附子：采挖后，除去母根。草乌：除去子根，晒干。

性状鉴别

干燥的子根，圆锥形。表面灰褐色，有细的纵皱纹，顶端有凹陷的芽痕，侧边常留有自母根摘离的痕迹，下端尖，周围有数个瘤状隆起的支根，习称“钉角”。质坚实，难折断，断面外层褐色，内面为灰白色，粉性，横切面有一多角形环纹。无臭，味辛辣而麻舌。干燥的母根，呈瘦长的圆锥形，或带有残余的茎秆。表面棕褐色，皱缩不平，或有锥形的小瘤状侧根，并具割去附子后遗留的痕迹。质坚实，断面粉白色或微带灰色，横切面可见多角形的环纹。无臭，味辛辣而麻舌。均以个匀、肥满、坚实、无空心者为佳。

性味功能

附子：味辛，性大热。有回阳救逆，补火助阳，温中止痛，逐风寒湿邪的功能。草乌：味辛，性温。有大毒。有祛风除湿，温经止痛，麻醉的功能。



炮 制

取净乌头，大小分开，用水浸泡至内无干心，取出，加水煮沸4~6h(或蒸6~8h)，至取大个及实心者切开内无白心、口尝微有麻舌感时，取出，晾至六成干或闷润后切厚片，干燥。

主治用法

附子用于亡阳虚脱，肢冷脉微，阳痿，宫冷，阴寒水肿，寒湿痹痛。草乌用于风寒痹痛，关节疼痛，心腹冷痛，麻醉止痛。本品有毒，需炮制后用，用量1.5~4.5g。

现代研究

1. 化学成分 乌头含有多种生物碱，如次乌头碱、新乌头碱、乌头碱、川乌碱甲、塔拉胶等。
2. 药理作用 本品有镇痛、抗炎、镇静、解热、局麻作用。还有强心和降压作用。

应用

1. 风湿性关节炎、类风湿关节炎，腰腿痛：制草乌6g，制川乌、制何首乌各15g，追地风、千年健各9g，白酒浸2日，内服。
2. 大骨节病：生草乌，水煮3小时，取出晒干，研粉，制成10%酒剂。



黄花草头（关附子）

Aconitum coreanum
Rap.

基 源

关附子为毛茛科黄花草头的干燥块茎。

原 植 物

别名：山喇叭花、乌拉花。多年生草本。块根倒卵形或纺锤形，二个连生在一起。叶互生，3~5掌状全裂，裂片再二回羽状分裂，最终裂片线形，先端锐尖。总状花序顶生，花萼淡黄色，内带紫色网纹；灰瓣帽状，侧瓣扁圆形；花瓣退化为蜜腺。果3~5，被白毛。种子在棱处具翅。花期8~9月，果期10月。

生境分布

生于荒山坡的灌木丛或高草丛边。分布于东北及河北、河南、山东等省。

采收加工

9~10月挖取块茎，洗净，晒干。

性状鉴别

母根长圆锥形，表面灰棕色，有纵皱纹、沟纹及横长突起的根痕，顶端有茎基。子根呈卵形或椭圆形，长1.5~3.5cm，直径0.6~2cm，表面棕黄色，有细纵纹，顶端有芽痕。质坚硬，断面类白色，粉性，中柱部分导管呈星点状。气微，味辛辣麻舌。

性味功能

味辛，大温，有小毒。有祛风痰，逐寒温，镇痉的功能。

炮 制

拣净杂质，洗净，晒干。

主治用法

用于中风痰壅，口眼歪斜，偏头痛，破伤风，淋巴结结核，痈肿。毒性大，一般炮制后使用，3~6g；外用生品适量捣烂，熬膏或研末以酒调敷患处。

现代研究

1. 化学成分 本品含乌头碱、关附素A~H等。



2. 药理作用 本品有抗心律失常和抗炎镇痛作用。

应用

1. 中风口眼斜，关附子、石膏、全蝎（去毒）各1g。研粉，热酒调服。
2. 破伤风：关附子、天麻、羌活、白芷、防风。研粉，热酒调服。
3. 疯犬咬伤：关附子研粉，搽伤处。

露蕊乌头

Aconitum gymnanthum Maxim.

基 源

为毛茛科植物露蕊乌头的干燥根。

原 植 物

别名：罗砧巴。一年生草本，具直根。茎常分枝，有短柔毛。基生叶1~6，具长柄；叶宽卵形，三全裂，裂片细裂，小裂片狭卵形，全缘或生1~3牙齿。总状花序具花6~16，疏生柔毛；小苞片生花梗上部或与花邻接，条形，有时下部的叶状；萼片5，蓝紫色，具长爪，上萼片船形；花瓣2，爪粗，瓣片扇形，具纤毛，距极短；雄蕊多数；心皮6~13。果长0.8~1.2cm。生于草坡或村边草地。分布于青海、甘肃、四川、西藏等省区。

生境分布

生于草坡或村边草地。分布于青海、甘肃、四川、西藏等省区。

采收加工

夏秋季采挖根，晒干。

性味功能

味辛，性温。有大毒。有驱风镇痛的功能。

炮 制

去净泥土、枯叶，切段，晒干。

主治用法

用于风湿麻木，关节疼痛。用量1.5~4.5g。

现代研究

1. 化学成分 本品根含盐酸阿替新、塔拉胺、露乌碱、甲基露乌碱。

2. 药理作用 本品的根可用于治关节疼痛。花可用于治麻风。叶内服驱虫；碾末撒布，治疥癣。



应用

1. 风湿性关节炎、类风湿关节炎：露蕊乌头，酒浸一周，调敷患处。
2. 麻疯：露蕊乌头花，水煎服。
3. 疥癣：露蕊乌头叶，研末，撒敷患处。



四 祛风湿药

瓜叶乌头

Aconitum hemsleyanum Pritz.

基 源

原 植 物

毛茛科植物瓜叶乌头的干燥块根作草乌入药。别名：藤乌头、羊角七。多年生草本，茎缠绕，无毛，多分枝；根圆锥形，深棕色，有纵皱纹及须根痕。茎中部的叶片五角形，3深裂至距基部8mm以上处，叶中央裂片梯状菱形，先端尖，3浅裂，上部边缘具粗牙齿。花序有2~12花，萼片5，蓝紫色，盔瓣高盔形，具短喙；花瓣2，无毛；雄蕊多数；心皮5。果花期8~9月，果期9~10月。

生境分布

生于山地灌丛或林中。分布于四川、湖北、江西北部、浙江、安徽、河南、陕西等地区。

采收加工

性状鉴别

6月至8月上旬采挖根，晒干。

干燥的块根，一般呈圆锥形而稍弯曲，形如乌鸦头。顶端平圆，中央常残留茎基或茎基的残痕，表面暗棕色或灰褐色，外皮皱缩不平，有时具短而尖的支根，习称“钉角”。质坚，难折断，断面灰白色，粉性，有曲折的环纹及筋脉小点。无臭，味辛辣而麻舌。

性味功能

味辛，性温。有大毒。有祛风除湿，温经止痛，麻醉的功能。

炮 制

制草乌：取净草乌，用凉水浸漂，每日换水2~3次，至口尝仅稍留麻辣感时取出，同甘草、黑豆加水共煮，以草乌熟透；内无白心为度，然后除去甘草及黑豆，晒至六成干，闷润后切片，晒干。

主治用法

用于风寒痹痛，关节疼痛，心腹冷痛，麻醉止痛。炮制后用，用量1.5~4.5g。



现代研究

1. 化学成分 乌头各部分含生物碱，其中主要成分为乌头碱。乌头碱水解后生成乌头原碱、醋酸及苯甲酸。叶中还含肌醇及鞣质。
2. 药理作用 本品有镇痛、抗炎、镇静、解热、局麻作用。还有强心和降压作用。

应用

同乌头。

北乌头(草乌, 草乌叶)

Aconitum kusnezoffii Reichb.

基 源

原 植 物

草乌为毛茛科植物北乌头的干燥块根；其叶为草乌叶。

原 植 物

别名：草乌、五毒根。多年生草本。块根倒圆锥形，暗黑褐色。茎下部叶具长柄，花时常枯萎。茎中部叶五角形，基部心形，3裂。花序分枝，小苞片线形。萼片5，紫蓝色，外面几无毛；上萼片盔形。花瓣2。雄蕊多数；心皮4~5。果。种子有膜质翅。花果期7~9月。

生境分布

生于山地、丘陵、林下。分布于河北、山东、山西、安徽、湖北、湖南、陕西、四川、贵州、云南等省区。

采收加工

草乌：秋季茎采挖，除去须根，干燥。草乌叶：夏季叶茂，花未盛开时采收，除去杂质，干燥。

性状鉴别

性味功能

部分地区作草乌用，同“瓜叶乌头”。

味辛，性热。有大毒。有祛风除湿，散寒，温经止痛，去痰，消肿，麻醉的功能。草乌叶：有清热，解毒，止痛的功能。

炮 制

主治用法

同“瓜叶乌头”。

用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛，麻醉止痛。用量1~1.2g。炮制后用。草乌叶用于热病发热，泄泻腹痛，头痛，牙痛。用量1~1.2g。

现代研究

1. 化学成分 同“瓜叶乌头”。
2. 药理作用 同“瓜叶乌头”。



应用

1. 受寒吐泻，突然大汗，肢冷，虚脱：制草乌、干姜各6g，炙甘草4g。水煎服。
2. 心腹冷痛，食少便溏，畏寒肢冷，浮肿：制草乌、肉桂、干姜各3g，炒白术9g。水煎服。

铁棒锤

Aconitum pendulum Busch

基源 原植物

为毛茛科植物铁棒锤的干燥块根。
别名：八百棒、铁牛七、雪上一枝蒿。多年生草本。块根倒圆锥形。叶宽卵形，3全裂，裂片细裂，末回裂片条形。总状花序长密生伸展的黄色短柔毛；萼片5，花瓣状，淡黄绿色，稀紫色，外面有短毛，上萼片浅盔状或船状镰刀形；花瓣2，藏于灰萼下，呈钩状弯曲；雄蕊多数；心皮5。果有毛，种子多数。花期8~9月，果期9~10月。

生境分布

生于高山山坡草丛或林边。分布于陕西、甘肃、青海、河南、四川及云南等地。

采收加工 性状鉴别

秋季采挖块根，去须根及泥沙，晒干。

本品干燥根呈圆柱状或近纺锤形；表面灰棕色或黑褐色，稍粗糙，有纵皱或细密纹理，先端有芽痕或茎基残痕。基部略尖，通体有粗细不等似“钉角”的支根。质硬，不易折断，断面灰白色。气微，味涩略苦，且有持久的麻舌感。味苦，辛，性温。有大毒。有祛风除湿，散瘀止血，消肿拔毒的功能。

性味功能

炮制

用清水浸漂7日，每日换水2次，待中心软透后切片，置蒸笼中蒸2~3小时，取出晒干，再用熟猪油拌炒后入药，或用湿纸包裹煨透，去纸，浸入童便中一昼夜，取出漂净晒干。

主治用法

用于风湿关节疼痛，腰脚痛，跌打损伤；淋巴结核，痈疮肿毒。用量0.06~0.15g。研粉凉开水送服；外用适量，研粉敷或磨汁或煎水洗患处。

现代研究

1. 化学成分 本品块根含雪乌碱、次乌头碱、3-乙酰乌头



碱、乌头碱等。

2. 药理作用 本品镇痛、抗炎、局部麻醉和解热作用；有致心律失常作用。

应用

1. 风湿性、类风湿关节炎，腰腿痛：铁棒锤0.06g，白酒浸2日，内服。
2. 跌打损伤：铁棒锤适量，研粉，浸酒，擦洗患处。
3. 痈疮肿毒：铁棒锤适量。研粉，敷贴患处。
4. 淋巴结核：铁棒锤适量。水煎，擦洗患处。



四 祛风湿药

松潘乌头（金牛七）

Aconitum sungpanense Hand.-Mazz.

基源 原植物

金牛七为毛茛科植物松潘乌头的干燥块根。
别名：火烟子、千锤打。多年生草本。块根近圆柱形。茎缠绕，长达1.5m。叶五角形，3全裂，中央裂片卵状菱形，渐尖，近羽状浅裂，有缺刻状牙齿，侧生裂片不等2深裂。总状花序有花2~9朵花，萼片5，花瓣状，淡蓝紫色，外面无毛或疏生短毛，上萼片盔状，喙不明显；花瓣2，有长爪；雄蕊多数；心皮3~5。果5。花期8~9月，果期9~10月。

生境分布

生于山地灌丛。分布于山西南部，陕西、甘肃、宁夏、青海东部及四川西部等地。

采收加工

秋季采挖块根，去须根及泥沙，用甘草水浸泡，炒后用。

性状鉴别

部分地区作草乌用，同“瓜叶乌头”。

性味功能

味苦，辛，性温。有大毒。有祛风止痛，散瘀止血，消肿拔毒的功能。

炮制

同“瓜叶乌头”。

主治用法

用于跌打损伤，风湿关节疼痛，腰脚痛；外用痈疮肿毒。用量0.06~0.15g。研粉凉开水送服；外用适量，研粉敷或磨汁或煎水洗患处。

现代研究

1. 化学成分 同“瓜叶乌头”。
2. 药理作用 同“瓜叶乌头”。



应用

1. 风湿、类风湿关节炎：金牛七0.06g，白酒浸2日。
2. 跌打损伤：金牛七适量，以酒醋磨汁，擦涂患处。
3. 痈疮肿毒：金牛七适量。研粉，敷贴患处。
4. 淋巴结核：金牛七适量。水磨汁涂擦患处。

芹叶铁线莲(驴断肠)

Clematisae
thusifolia Turcz.基源
原植物

驴断肠为植物芹叶铁线莲的干燥全草。
别名：驴断肠、透骨草、白拉拉秧。半木质藤本。茎及枝条疏生短柔毛，后变无毛。羽状复叶对生；羽片3~5对，又三回羽裂，末回裂片倒披针形或披针状条形。聚伞花序腋生，具1~3花，花黄白色；苞片叶状；萼片4，窄卵形，边缘密生短绒毛；无花瓣；雄蕊多数；心皮多数。瘦果倒卵形而扁，长约2mm，羽状花柱长约1cm。花期6~8月，果期8~9月。

生境分布

生于山坡，路边及灌丛中。分布于东北、华东及陕西、甘肃、青海等省、自治区。

采收加工

夏季采收全草，晒干。

性状鉴别

本品茎细长盘绕，表面灰黄绿色至红棕色，有明显的纵线棱，断面灰白色。节稍膨大，叶对生，叶为3~4回羽状复叶，叶片常破碎脱落；完整叶叶柄较短，裂片细小，倒披针形或披针状条形，全缘。叶柄及羽轴常卷曲。气微香而特异，味淡。

性味功能

味辛，性温。有祛风利湿，解毒止痛的功能。

主治用法

用于风湿筋骨痛，下肢浮肿，痈疽肿毒。用量3~9g；外用适量，煎水洗或捣烂外敷。

现代研究

1. 化学成分 本品花、叶含槲皮素、山柰酚等黄酮类成分。
2. 药理作用 暂无。



应用

1. 风湿关节炎：驴断肠 500g，煎水熏洗患病关节。
2. 痈疽肿毒：鲜驴断肠适量，捣烂，涂敷患处。
3. 下肢浮肿：驴断肠，切碎，入白酒炖服。

威灵仙

Clematischinensis Osbeck

基源
原植物

为毛茛科植物威灵仙的根及根茎。
别名：老虎须。攀援藤本。根丛生，细长圆柱形。根茎圆柱形，淡黄色，皮部脱落呈纤维状。叶对生，1回羽状复叶；小叶5，狭卵形或三角状卵形，先端尖，基部宽楔形，全缘，主脉3条。圆锥花序顶生或腋生，总苞片线形，密生细毛，萼片4或5，花瓣状，白色或绿白色，外生白色毛；雄蕊多数；子房及花柱上密生白毛。瘦果扁狭卵形，有短毛，花柱宿存，延长成白色羽毛状。花期5~6月。果期6~7月。

生境分布

生于山坡林边或灌丛中。分布于全国大部分省区。

采收加工

秋季采挖根及根茎，晒干或切段晒干。

性状鉴别

根茎呈柱状；表面淡棕黄色；顶端残留茎基；质较坚韧，断面纤维性；下侧着生多数细根。根呈细长圆柱形，稍弯曲；表面黑褐色，有细纵纹，有的皮部脱落，露出黄白色木部；质硬脆，易折断，断面皮部较广，木部淡黄色，略呈方形，皮部与木部间常有裂隙。气微，味淡。

性味功能


味辛、咸，性温。有祛风湿，通经络，止痛的功能。

炮制

威灵仙：拣净杂质，除去残茎，用水浸泡，捞出润透，切段，晒干。酒灵仙：取威灵仙段，用黄酒拌匀闷透，置锅内用文火微炒干，取出放凉。

主治用法

用于风湿痹痛，关节不利，四肢麻木，跌打损伤，骨哽咽喉，扁桃体炎，黄疸型肝炎，丝虫病；



外用于牙痛，角膜溃烂。用量6~10g；外用适量。

现代研究

1. 化学成分 本品主要含威灵仙苷、威灵仙新苷、白头翁素等，又含以常春藤皂苷元和齐墩果酸为苷元的多种皂苷等。
2. 药理作用 本品具有镇痛、利胆、抗菌、对抗组织胺的兴奋及利尿作用。还有引产作用，能松弛平滑肌，对鱼骨刺有软化作用，并使局部肌肉松弛，促使骨刺脱落。

应用

1. 腮腺炎：鲜威灵仙，捣烂，米醋浸3日，涂敷患处。
2. 急性黄疸型肝炎：威灵仙9g研粉，鸡蛋1个，麻油煎后服。
3. 关节炎：威灵仙，切碎，入白酒炖服。
4. 扁桃体炎：鲜威灵仙，水煎当茶饮。

铁线莲

Clematis florida Thunb.

基源 原植物

为毛茛科植物铁线莲的干燥根及全株。
别名：山木通、铜脚灵仙、威灵仙、金包银。
木质藤本，疏被短毛。茎褐色或红褐色，有条纹。叶对生，为二回三出至羽状复叶，最终小叶有短柄；叶卵形至卵状披针形，全缘或具1~2裂片，下面疏生短毛；小脉明显。花单生腋生；花梗长，中部以下有一对苞片，苞片无柄，卵形；花被6，白色，平展；雄蕊多数；心皮多数，离生。瘦果。花期8~9月。

生境分布

生于丘陵，山坡及灌丛中。分布于江苏、浙江、湖南、湖北、广西、广东等省。

采收加工

秋、冬季采收茎藤，扎成小把，晒干。

性状鉴别

茎藤细长圆柱形，常缠绕，表面黄棕或紫棕色，有6条纵棱，节膨大。叶对生，二回三出复叶，小叶片狭卵形或卵状披针形，全缘或具1~2裂片。花单生，较大，直径约5cm，黄白色。气微，味微苦。根茎呈不规则圆柱形，棕褐色，其两侧和下方生有少数粗壮的根，长约25cm，直径2~3mm。表面棕褐色，有明显的纵纹。折断面不甚平坦，木部较大，纤维性，可见导管小孔。气微，味淡。

性味功能

味辛，性温。有利尿，理气通便，活血止痛的功能。

炮制

同“威灵仙”。

主治用法

用于小便不利，腹胀，便秘；外用于关节肿痛，虫蛇咬伤。用量9~15g。外用适量，鲜叶加酒或食盐捣烂外敷患处。



现代研究

1. 化学成分 本品根含常春藤皂苷元。
2. 药理作用 同“威灵仙”。

应用

1. 小便不利：铁线莲、通草各9g。水煎服。
2. 关节肿痛：鲜铁线莲叶，加酒或食盐捣烂外敷患处。
3. 虫蛇咬伤：铁线莲，研细末，外敷伤处。

大叶铁线莲（威灵仙）

Clematishera cleifolia DC.

基源 原植物

威灵仙为毛茛科植物大叶铁线莲的根及全株。
别名：木通花。直立粗壮草本及灌木。主根木质化，棕黄色。茎密生白色糙绒毛。三出复叶，亚革质或厚纸质，卵圆形至圆形，顶端短尖，基部圆形或楔形，边缘有粗锯齿，聚伞花序顶生或腋生，被糙绒毛，花杂性，雄花与两性花异株；花萼蓝紫色，萼片4枚，反卷部分增宽。瘦果卵圆形，两面凸起，红棕色，花柱比状，宿存。花期8~9月，果期10月。

生境分布

生于山坡沟谷、林边及路旁的灌丛中。分布于湖南、湖北、陕西、河南、安徽、浙江、江苏等省区。

采收加工

秋、冬季采收茎藤，扎成小把，晒干。

性状鉴别

本品根粗大，木质化；表面棕黄色。茎圆柱形，下段茎木化，上段茎草质，黄绿或绿褐色，具纵棱。叶对生，完整叶为三出复叶，先端小叶较大，宽卵形，先端短尖，基部楔形，不分裂或3浅裂，边缘有粗锯齿，具柄；侧生小叶近无柄，较小。聚伞花序顶生或腋生，花梗粗壮有白色糙毛，花淡蓝色。气微，味微苦。

性味功能

味辛，性温。有利尿，理气通便，活血止痛，祛风除湿，解毒消肿的功能。

炮制

切段，晒干。

主治用法

用于风湿关节痛，结核性溃疡。



现代研究

1. 化学成分 花和叶含槲皮素、山柰酚等黄酮类化合物。
2. 药理作用 同“威灵仙”。

应用

同棉团铁线莲。



四 祛风湿药

CHANGYONGZHONGCAOYAO
HUI BIAN

棉团铁线莲（威灵仙）

*Clematish
exapetala*Pall.

基 源 威灵仙为毛茛科植物棉团铁线莲的干燥根及根茎。

原 植 物 直立草本。叶对生，1~2回羽状全裂，裂片基部再2~3裂，先端锐尖或凸尖，网脉突出。聚伞花序腋生或顶生，3花。萼片6，白色，展开，密被棉毛。雄蕊多数；心皮多数。瘦果，倒卵形，被柔毛，宿存花柱长2.2cm，羽毛状。花期6~8月，果期8~9月。

生境分布 生于草地、林缘、沟谷。分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃东部、山东。

采收加工 秋季采挖，除去泥沙，晒干。

性状鉴别 根茎呈短柱状，长1~4cm，直径0.5~1cm。根长4~20cm，直径0.1~0.2cm；表面棕褐色至棕黑色；断面木部圆形。

性味功能 味辛、微苦，性温。有祛风除湿，通络止痛的功能。

炮 制 同“威灵仙”。

主治用法 用于风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利，跌打损伤。用量6~9g。

现代研究

1. 化学成分 根中含白头翁素、谷甾醇、肉豆蔻酸及 α 、 β -亚油酸等。
2. 药理作用 同“威灵仙”。



应用

1. 风湿性关节炎：威灵仙、苍术各9g，制草乌4.5g。水煎服。
2. 急性扁桃体炎：鲜威灵仙6g，水煎服或当茶饮。
3. 黄疸型急性传染性肝炎：威灵仙9g，研粉，鸡蛋1个，菜油煎食。
4. 风湿四肢、腰背酸痛，关节曲伸不灵活：威灵仙水煎，冲黄酒少许服。

黄花铁线莲

*Clematisintricata*Bunge

基 源 为毛茛科植物黄花铁线莲的干燥全株。

原 植 物 别名：狗断肠。木质藤本。茎细弱，近无毛，有细纵棱。叶对生，二回羽状复叶，通常5羽片，有长柄；羽片三出，有较长小叶柄，最终小叶披针形或窄卵形，不分裂或下部具1~2小裂片，边缘疏生齿牙或全缘，灰绿色，无毛。聚伞花序腋生，常具3花，花梗细长；花萼钟形，淡黄色，萼片4，边缘有短柔毛；雄蕊多数；心皮多数，离生。瘦果扁卵形。花期8~9月。

生境分布 生于山坡草地及灌丛中。分布于华北地区及陕西、甘肃、青海、宁夏等省区。

采收加工 夏、秋季采收全草，晒干；或摘叶晒干。

性状鉴别 本品多捆扎成把，长10~15cm。茎细，直径1~3mm，表面黄绿色至灰绿色，有明显的纵纹；节稍膨大。叶对生，2回羽状复叶，多破碎，完整的小叶披针形或狭卵形，全缘或有疏牙齿。茎质脆，易折断。气微，味淡。

性味功能 味辛，性温。有祛风除湿，解毒，止痛的功能。

炮 制 去净杂草，晒干。

主治用法 用于风湿筋骨疼痛，疮疖肿毒。用量3~9g。外用适量，水煎洗或捣烂外敷患处。

现代研究

1. 化学成分 暂无。
2. 药理作用 暂无。



应用

1. 风湿筋骨疼痛：鲜黄花铁线莲适量，捣烂外敷患处。
2. 疮疖肿毒：鲜黄花铁线莲叶，加酒或食盐捣烂外敷患处。
3. 虫蛇咬伤：黄花铁线莲，水煎洗；研细末，外敷伤处。



绣球藤（川木通）

Clematis montana
Buch.-Ham.

基 源 原 植 物

川木通为毛茛科植物绣球藤的干燥茎藤。
别名：白木通、三角枫、山铁线莲。多年生木
质藤本。茎圆柱形，有纵条纹，小枝有短柔毛；
老时外皮脱落。三出复叶，数叶与花簇生或对
生；小叶卵形、宽卵形至椭圆形，边缘有缺刻
状锯齿，顶端3浅裂，两面疏生短柔毛。花
1~6朵与叶簇生；萼片4，开展，白色或外面
带淡红色，长圆状倒卵形，外面疏生短柔毛，
内面无毛。瘦果扁，卵形或卵圆形，无毛。花
期4~6月，果期7~10月。

生境分布

生于林边、灌丛、沟旁。分布于陕西、宁夏、
甘肃、江西、安徽、福建、湖北、湖南、广西、
四川、贵州、云南等省区。

采收加工

春秋两季采收茎藤，除去粗皮，晒干或趁鲜切
片晒干。

性状鉴别

茎呈圆柱形，长短不一，直径1~3cm，表面
黄绿色至暗紫红色，具纵沟及核脊，近无毛，
有的外皮呈纵向撕裂；节部膨大，有叶痕及枝
痕。质硬脆易折断，断面纤维状，有放射状纹
理及导管孔，髓部黄白色或黄绿色，有空隙。
气微，味微苦。

性味功能

味淡、苦，性寒。有清热利尿、通经下乳的功能。

炮 制

未切片者，略泡，润透，切薄片，晒干。

主治用法

用于水肿、淋病、小便不通、关节痹痛，经闭
乳少。用量3~6g。



现代研究

1. 化学成分 本品叶含以齐墩果酸为苷元的绣球藤皂苷A、B。还含无羁萜， β -香树脂醇， β -谷甾醇， β -谷甾醇- β -D-葡萄糖苷等。
2. 药理作用 本品主要有利尿作用，在增加尿量的同时，钾、钠、氯的排出也有显著增加。

应用

1. 水肿，脚气：川木通6g，猪苓、泽泻、桑白皮各9g。水煎服。
2. 心火旺，心烦失眠，口舌生疮：川木通、生地、淡竹叶各3g，甘草梢6g，水煎服。
3. 尿道炎，膀胱炎：川木通6g，车前子、赤茯苓、蓄各9g。水煎服。

辣蓼铁线莲（威灵仙）

Clematis flammula DC. var. *mandshurica* Ohwi (*Clematis mandshurica* Rupr.)

基 源 原 植 物

为毛茛科植物辣蓼铁线莲的干燥根及根茎。
别名：东北铁线莲。攀缘藤本。一回羽状复叶，
小叶片全缘，近革质，卵形至披针状卵形，
不微凹。花序较长而挺直，长达25cm，花梗
近无毛或稍有短柔毛；萼片外面除边缘有皱
毛外，其余无毛或稍有短柔毛。地上部干后
不变黑。花直径约1.5~2cm。瘦果黄褐色。
花期6~8月，果期7~9月。

生境分布

生于山坡灌木丛中，木林下或林边。分布于
东北及内蒙古、山西等地。

采收加工

秋季采挖，除去茎叶、须根及泥土，晒干或
切段晒干。

性状鉴别

根茎呈柱状，长1~11cm，直径0.5~2.5cm。
根多数，细长密集如马尾状；表面棕黑色或
棕褐色，有多数明显的细皱纹；断面皮部白色，
木心近圆形，较细小。

性味功能

味辛、咸，性温。有祛风湿，通经络，止痛
的功能。

炮 制


同“威灵仙”。

主治用法

用于风湿痹痛，关节不利，四肢麻木；外用于
跌打损伤，牙痛，角膜溃烂。用量6~10g；
外用适量。

现代研究

1. 化学成分 同“威灵仙”。
2. 药理作用 同“威灵仙”。



应用

1. 风湿四肢、腰背酸痛，关节曲伸不灵活：威灵仙水煎冲黄酒少许服。或配独活、当归、寄生各9g。水煎服。
2. 风湿痹痛，关节不利：威灵仙、苍术各9g，制草乌4.5g。水煎服。

柱果铁线莲

Clematisuncinata Champ. ex Benth.

基源
原植物

为毛茛科植物柱果铁线莲的干燥根及叶。
别名：铁脚威灵仙、黑木通、一把扇。常绿藤本。一至二回羽状复叶对生，小叶3~9，薄革质，窄卵形，先端渐尖，基部宽楔形，全缘，下面被白粉。聚伞圆锥花序，腋生，花序基部及小花梗上均有一对窄披针形苞片；花被片4，白色，顶端急尖，边缘有短柔毛；无花瓣；雄蕊多数；心皮多数，离生。瘦果圆柱状，先端锥尖，果皮光滑无毛，羽毛状花柱长达2cm。花期8~9月。

生境分布

生于山坡、路旁。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广西、广东及贵州等省区。

采收加工

夏、秋季采收根及叶，分别晒干。

性状鉴别

本品根茎呈不规则块状，黄褐色，上端残留木质茎基，下侧丛生多数细根。根细长圆柱形，长约8~16cm，直径约1~4mm，略弯曲，表面棕褐色或棕黑色，有细纵纹。质坚脆易折断，皮部与木部易脱离，断面平坦，类圆形，皮部灰黄色，木部黄白色。根茎质较坚韧，断面不平坦，纤维性。气微弱，味微苦。

性味功能

味辛，性温。有祛风除湿，舒筋活络，镇痛的功能。

炮制

拣净杂质，除去残茎，用水浸泡，捞出润透，切段，晒干。

主治用法

根用于风湿筋骨疼痛，牙痛，骨鲠喉。用量9~15g。叶外用于外伤出血。外用适量，水煎洗或捣烂外敷患处。



现代研究

1. 化学成分 本品含有白头翁素、白头翁内酯；三萜皂苷：铁线莲苷A、A'、B、C；香豆精类、山奈酚等黄酮类及生物碱、甾醇、糖类、氨基酸、挥发油、树脂等成分。
2. 药理作用 本品具有降血糖作用；抗利尿、抗菌作用和降血压作用。

应用

1. 风湿筋骨疼痛：鲜柱果铁线莲适量，捣烂外敷患处。或柱果铁线 15g，水煎服。
2. 疮疖肿毒：鲜黄花铁线莲叶，加酒或食盐捣烂外敷患处。
3. 外伤出血：柱果铁线莲，研细末，外敷伤处。或鲜叶捣烂敷患处。

还亮草

Delphiniumanthriscifolium Hance

基源
原植物

为毛茛科植物还亮草的全草。
别名：飞燕草、鱼灯苏。一年生草本。茎少毛或被白色丝状柔毛，基部带紫色，上部常双叉分枝。叶三角窄卵状或菱状卵形，一至三回羽状分裂，一回裂片斜卵形，中央小叶先端长渐尖，二回裂片窄卵形或披针形，仅浅裂或不分裂。总状花序，2~15花，花序轴有反曲的微柔毛；花淡紫红色，左右对称；小苞片生花梗中部或基部，条形；花萼5片，椭圆形；路细长柱状；花瓣2，瓣片不等裂；退化雄蕊2，无毛，瓣片斧形，2深裂；雄蕊多数；心皮3，离生，子房被毛。果长10~16mm，顶端花钩曲状。

生境分布

生于丘陵、低山草地或林中。分布于江苏、江西、河南、广西、广东及四川等省区。

采收加工

夏、秋季采收全草，晒干。

性状鉴别

本品长圆锥形，表面棕黄色至黑褐色，具细密纵纹，支根较多；根头密集叶柄残基；断面黄色。茎断面中空，纤维性。叶灰绿色，展平后，为二至三回羽状复叶；叶片菱状卵形或三角状卵形，两面疏被短柔毛；总状花序；小苞片披针状线形，多碎落，紫色，被短柔毛；花瓣紫色，斧形。有蓇葖果，种子扁球形，有横膜翅。气微，味辛、苦。

性味功能


味辛，性温。有毒。有祛风通络的功能。

炮制

洗净，切段，鲜用或晒干。

主治用法

用于中风半身不遂，风湿筋骨疼痛。外用用于痛



疮。用量3~6g。外用鲜草适量捣烂敷患处。

现代研究

1. 化学成分 本品含洋翠雀碱，洋翠雀康宁，洋翠雀枯生碱，翠雀胺等生物碱；花含洋槐苷等黄酮苷；谷甾醇，豆甾醇，等甾酮类，又含固定油，类脂等成分。
2. 药理作用 本品具有解痉作用和杀虫作用，并有肌肉毒性作用。

应用

1. 积食胀满，潮热：还亮草6g，麦芽12g。水煎，冲红糖服。
2. 疥癬癩痢：鲜还亮草捣汁涂患处或水煎洗。