

2017年

全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书(护师)

护理学(师)考试 押题密卷

主编◎尹安春

中国医药科技出版社



医药卫生答题榜

2017年全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书（护师）

护理学（师）考试押题密卷

主 编 尹安春

编 者 尹安春

郭慧芳

贾立红

张淑萍

纪 楠

彭丽丽

陈 雪

马方方

邵芙玲

张 颖

高秀宏

张 楠

修士会

王克勤

王淑艳

大连医科大学附属第一医院

大连医科大学附属第一医院

大连医科大学附属第一医院

北京市第六医院

北京市第六医院

中日友好医院

北京妇产医院

中国人民解放军空军总医院

中国人民解放军空军总医院

朝阳市第二医院

朝阳市中心医院

大连市万卷图书馆

朝阳市中心医院

朝阳市第二医院

朝阳市第二医院

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书紧扣2017年护理学(师)考试新大纲,由专家精心编写而成,共包括六套全真模拟试卷,每套试卷分为基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力四部分,全面把握考试趋势,精准预测考题,使考生做到提升解题能力,夺取高分。

本书除供参加护理学(师)考试的考生使用外,还可供专科、本科、全日制和成人教育护理学专业的学生在临床教学、实习教学环节使用。

图书在版编目(CIP)数据

护理学(师)考试押题密卷/尹安春主编. —北京:中国医药科技出版社,2017.1
2017年全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书. 护师
ISBN 978-7-5067-8896-0

I. ①护… II. ①尹… III. ①护理学-资格考试-习题集 IV. ①R47-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第311857号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787×1092mm¹/₁₆

印张 15

字数 291千字

版次 2017年1月第1版

印次 2017年3月第2次印刷

印刷 三河市腾飞印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-8896-0

定价 35.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前言

为贯彻原人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神,自2001年起全国卫生专业初、中级技术资格以考代评工作正式展开。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘任相应技术职务的必要依据。

全国卫生专业技术资格考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一大纲、统一命题、统一评分标准。由人力资源和社会保障部(以下简称“人社部”)、国家卫生和计划生育委员会(以下简称“卫生计生委”)共同组织实施,参加卫生专业技术资格考试成绩合格者,由各省、自治区、直辖市人事(职改)部门颁发人社部统一印制,人社部、卫生计生委用印的专业技术资格证书。该证书在全国范围内有效。各地在颁发证书时,不得附加任何条件。聘任专业技术职务所需的其他条件按照国家有关规定办理。经国家或有关部门批准的医疗卫生机构内,从事医疗、预防、保健、药学、护理、其他卫生技术专业工作的人员均可报考。护理学专业考试分为护理学(师)、护理学(中级)两个层次。

无论是护理学专业从事教学工作的教师、处于学习中的学生,还是已经工作的护理专业人员,在实际的教学或工作中,都迫切需要实用性强、有针对性、能够突出考试重点和难点的试题,以方便备考、检测知识点的掌握情况。

本书作者经过深入研究考试规律,紧扣2017年护理学(师)考试大纲,编写了适合考生应试需要的、实用的试卷6套,每套题中包含基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力4个部分,每部分各100道题,全面覆盖考试大纲的知识点,方便读者复习、模拟考试使用。同期出版的还有《护理学(师)考试10日通关特训》《护理学(师)考试高频考点随身记》,建议配合使用。

由于本书涉及内容广泛,虽经全体编者反复修改,但由于水平和能力有限,难免有不妥之处,恳请广大读者多提宝贵意见。

编者
2016年8月

目 录

押题密卷一	1	专业实践能力	139
基础知识	1	押题密卷五	149
相关专业知识	9	基础知识	149
专业知识	18	相关专业知识	158
专业实践能力	27	专业知识	168
押题密卷二	37	专业实践能力	178
基础知识	37	押题密卷六	188
相关专业知识	45	基础知识	188
专业知识	54	相关专业知识	196
专业实践能力	64	专业知识	205
押题密卷三	74	专业实践能力	214
基础知识	74	押题密卷一参考答案	225
相关专业知识	83	押题密卷二参考答案	227
专业知识	92	押题密卷三参考答案	229
专业实践能力	102	押题密卷四参考答案	231
押题密卷四	112	押题密卷五参考答案	233
基础知识	112	押题密卷六参考答案	235
相关专业知识	120		
专业知识	130		

押题密卷一

基础知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 引起呼吸衰竭最常见的诱因是 ()。
A. 呼吸道感染 B. 过度劳累
C. 胸部手术 D. 药物中毒
E. 长期吸烟
- 急性心肌梗死所致心律失常发生率最高的时间为急性心肌梗死后 ()。
A. 24 小时内 B. 1~2 天
C. 3~7 天 D. 2 周以内
E. 1 个月以内
- 在突发公共卫生事件中，与护理伦理规范不符的是 ()。
A. 奉献精神 B. 协作精神
C. 自身安全为重 D. 敬业精神
E. 科学精神
- 引起风湿性心脏瓣膜病的主要病原菌是 ()。
A. 肺炎链球菌
B. 乙型溶血性链球菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 厌氧杆菌
E. 流感嗜血杆菌
- 支气管扩张的痰液特征是 ()。
A. 血性痰液
B. 大量黏液样痰
C. 黄色脓性痰
D. 大量的脓性痰，痰液静置后出现分层现象
E. 大量脓臭痰
- 糖尿病最常见的神经病变是 ()。
A. 中枢神经病变 B. 神经根病变
C. 运动神经病变 D. 自主神经病变
E. 周围神经病变
- 下列有助于鉴别急、慢性肾衰竭的项目是 ()。
A. 蛋白尿的程度 B. 血尿程度
C. 高血压的程度 D. 肾脏大小
E. 酸中毒的程度
- 阑尾炎腰麻术后体位 ()。
A. 去枕平卧 6 小时 B. 清醒后半卧位
C. 低坡半卧位 D. 头高脚低位
E. 右侧卧位
- 最常见的妊娠合并心脏病是 ()。
A. 风湿性心脏病 B. 妊高征性心脏病
C. 先天性心脏病 D. 围生期心脏病
E. 心肌炎
- 急性白血病患者突然出现高热的主要原因是 ()。
A. 代谢亢进 B. 白血病细胞浸润
C. 严重贫血 D. 化疗过敏反应
E. 感染
- 老年男性尿潴留最常见的原因是 ()。
A. 尿道狭窄 B. 膀胱结石
C. 膀胱肿瘤 D. 良性前列腺增生

E. 膀胱结核

12. 下列属于浸润性突眼特征的是()。

- A. 瞬目减少
- B. 眼裂增宽
- C. 常有异物感
- D. 上眼睑挛缩
- E. 双眼近视物时, 辐辏不良

13. 下列小儿运动发育中哪项正常()。

- A. 5个月时抱起能抬头
- B. 8个月稳坐且会爬
- C. 9个月可扶站片刻
- D. 10个月能独自走稳
- E. 15个月能跑及倒退走

14. 破伤风患者在应用镇静药后集中采取护理措施的目的是()。

- A. 提高工作效率
- B. 增强治疗护理效果
- C. 减少播散机会
- D. 减少刺激引起的抽搐
- E. 防止交叉感染

15. 类风湿关节炎最基本的病理损害是关节的()。

- A. 滑膜炎症
- B. 软骨炎症
- C. 腔腺增大
- D. 骨质疏松
- E. 腔腺变窄

16. 长期饮酒致肝硬化的机制是()。

- A. 引起门静脉扩张
- B. 直接损伤肝细胞
- C. 阻碍胆汁流动
- D. 减少蛋白吸收
- E. 收缩肝内血管

17. 以下有关在体液平衡中的叙述错误的是()。

- A. 细胞内液约为体重的40%
- B. 细胞外液约为体重的20%
- C. 组织间液约为体重的15%
- D. 血浆约为体重的5%
- E. 它们之间是非动态平衡

18. 新生儿肺透明膜病的病因是()。

A. 母亲患有糖尿病

B. 肺内液体过多

C. 剖宫产和异常分娩

D. 肺表面活性物质缺乏

E. 缺氧

19. 高钾血症患者应用钙剂的作用是()。

- A. 防止低钙
- B. 对抗钾对心肌的抑制作用
- C. 防止抽搐
- D. 防止昏迷
- E. 减低毛细血管通透性

20. 在局麻药中加入少量肾上腺素的适应证是()。

- A. 高血压患者
- B. 指或趾末端手术
- C. 发热患者
- D. 甲状腺功能亢进症患者
- E. 心脏病患者

21. 婴幼儿最常见的贫血是()。

- A. 铅中毒性贫血
- B. 营养性混合性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 营养性缺铁性贫血
- E. 慢性溶血性贫血

22. 小儿发生生理性贫血的时期是()。

- A. 生后2~3个月
- B. 生后2~5个月
- C. 生后4~7个月
- D. 生后8~10个月
- E. 生后10~12个月

23. 闭合性损伤造成腹腔内出血的常见原因是()。

- A. 肠管破裂
- B. 肠系膜损伤
- C. 实质脏器破裂
- D. 腹膜后血肿
- E. 膀胱破裂

24. 国际上通用的肿瘤“TNM”分期法, 其中的“N”表示()。

- A. 原发肿瘤
- B. 骨转移
- C. 肝转移
- D. 肺转移

- E. 区域淋巴结转移
25. 患者面容晦暗, 口唇微绀, 两面颊呈淤血性发红, 考虑为 ()。
- A. 急性面容
B. 甲状腺功能亢进面容
C. 病危面容
D. 满月面容
E. 二尖瓣面容
26. 肾盂肾炎最常见的感染途径是 ()。
- A. 淋巴管蔓延
B. 上行感染
C. 外伤
D. 血行感染
E. 邻近器官炎症的蔓延
27. 新生儿缺氧缺血性脑病的病因是 ()。
- A. 低血糖
B. 低血钾
C. 低血钙
D. 围生期窒息
E. 维生素 K 缺乏
28. 休克患者的神志意识变化可反映 ()。
- A. 组织缺氧程度
B. 血容量变化情况
C. 心排量变化情况
D. 脑部血液灌流情况
E. 周围血管阻力变化情况
29. 关于房颤心电图特征说法正确的是 ()。
- A. 窦性 P 波规律出现, 频率 > 100 次/分, P-P 间隔 < 0.5 秒
B. 窦性 P 波或 R-R 间隔长短不一, 相差 > 0.13 秒
C. 窦性 P 波消失, 代之以大小及规律不一的 f 波, QRS 波群形态正常
D. QRS 波群与 T 波消失, 呈完全无规律的波浪状曲线
E. 心室率通常在 250 ~ 365 次/分
30. 肾病综合征最常见的并发症是 ()。
- A. 呼吸道感染
B. 高血压
C. 急性肾衰竭
D. 低血容量性休克
E. 血栓形成
31. 不属于肝性脑病发病诱因的是 ()。
- A. 腹泻
B. 安眠药
C. 上消化道出血
D. 低蛋白饮食
E. 感染
32. 面部“危险三角区”疖的危险是 ()。
- A. 易引起眼球后感染
B. 易引起颅内海绵窦炎
C. 易形成败血症
D. 易形成痈
E. 易扩散为急性蜂窝织炎
33. 下列因素中, 最有可能导致粘连性肠梗阻的是 ()。
- A. 肠系膜栓塞
B. 阑尾炎手术后
C. 肠套叠
D. 低钾血症
E. 肠扭转
34. 抗休克治疗中体现体表灌流情况的标志是 ()。
- A. 血压
B. 心率
C. 皮肤温度、色泽
D. 尿量
E. 脉率
35. 常温下大脑缺血缺氧持续时间超过多少分钟即可造成不可逆性伤害 ()。
- A. 1 ~ 3 分钟
B. 4 ~ 6 分钟
C. 7 ~ 9 分钟
D. 10 ~ 12 分钟
E. 13 ~ 15 分钟
36. 急性脓胸最主要的致病菌是 ()。
- A. 厌氧菌
B. 链球菌
C. 大肠埃希菌
D. 肺炎双球菌
E. 金黄色葡萄球菌
37. 下列哪一项疾病不会出现吸气性呼吸困难 ()。
- A. 喉癌
B. 肺气肿
C. 支气管炎
D. 喉头水肿
E. 气管异物

38. 自发性气胸常继发于()。
- A. 肺结核 B. 细菌性肺炎
C. 支气管哮喘 D. 支气管扩张症
E. 支气管肺癌
39. 风湿性心脏瓣膜病最常侵犯的瓣膜是()。
- A. 二尖瓣及三尖瓣
B. 二尖瓣及主动脉瓣
C. 三尖瓣及主动脉瓣
D. 二尖瓣及肺动脉瓣
E. 主动脉瓣及肺动脉瓣
40. 慢性鼻窦炎的主要病因是()。
- A. 幽门螺杆菌感染 B. 消炎药物
C. 烟酒过度 D. 暴饮暴食
E. 胆汁反流
41. 新生儿, 胎龄 35 周, 出生体重 2000g, 按新生儿分类应属于()。
- A. 足月儿 B. 足月小样儿
C. 正常体重儿 D. 低出生体重儿
E. 极低出生体重儿
42. 原发性下肢静脉曲张的病因主要是()。
- A. 下肢浅静脉壁薄弱
B. 妊娠
C. 盆腔内肿瘤
D. 下肢深静脉阻塞
E. 下肢深静脉瓣膜功能不全
43. 婴儿生后持续青紫, 该婴儿最可能患有()。
- A. 房间隔缺损 B. 室间隔缺损
C. 肺动脉狭窄 D. 法洛四联症
E. 动脉导管未闭
44. 引起甲状腺功能亢进症的主要因素是()。
- A. 病毒感染 B. 理化因素
C. 自身免疫 D. 手术创伤
E. 遗传因素
45. 下列物质中诱发肝性脑病的主要是()。
- A. 尿素 B. 谷氨酰胺
C. NH_3^- D. NH_3
E. NH_4^+
46. 关于急性上呼吸道感染的描述, 错误的是()。
- A. 普通感冒常有高热、畏寒
B. 普通感冒以鼻咽部症状为主
C. 急性病毒性喉炎以声音嘶哑为主
D. 急性病毒性咽炎以咽部发痒和烧灼感为主
E. 细菌性咽、扁桃体炎时扁桃体常有黄色渗出物
47. 小儿原发性肾病综合征临床上血栓形成以下列哪种最常见()。
- A. 肺静脉血栓 B. 肺动脉血栓
C. 脑动脉血栓 D. 下肢静脉血栓
E. 肾静脉血栓
48. 应用破伤风抗毒素(TAT)治疗破伤风的机制是()。
- A. 杀灭破伤风杆菌
B. 解痉
C. 中和游离破伤风毒素
D. 破坏与神经结合的毒素
E. 提高人体免疫力
49. 婴幼儿易出现肝、脾、淋巴结等骨髓外造血, 其原因是()。
- A. 缺乏红骨髓
B. 骨髓造血器官功能活跃
C. 骨髓造血功能尚不成熟
D. 缺乏黄骨髓, 造血储备能力很小
E. 红骨髓过多, 造血储备能力很大
50. 全身麻醉的临床表现不包括()。
- A. 意识丧失 B. 运动障碍
C. 反射活动减弱 D. 痛觉消失
E. 肌肉松弛

51. 由脾破裂出血引起的休克属于 ()。
- 低血容量性休克
 - 创伤性休克
 - 感染性休克
 - 过敏性休克
 - 心源性休克
52. 妊娠合并重症病毒性肝炎, 服用广谱抗生素的目的是 ()。
- 消除体内感染病灶
 - 控制肝炎
 - 防止 DIC
 - 抑制大肠埃希菌、减少氨的生成
 - 预防感染
53. 肝性脑病最常见的原因是 ()。
- 原发性肝癌
 - 病毒性肝炎后肝硬化
 - 严重胆道感染
 - 酒精性肝炎后肝硬化
 - 药物性肝炎后肝硬化
54. 下列关于葡萄胎的说法, 正确的是 ()。
- 病因尚不清楚
 - 是一种恶性病变
 - 多为部分性葡萄胎
 - 常侵入肌层, 发生远处转移
 - 病理特点为滋养细胞增生, 间质内血管增生明显
55. 冠状动脉粥样硬化性心脏病发生心绞痛的原因是 ()。
- 坏死心肌刺激
 - 酶的活性增高
 - 心肌缺氧
 - 低血压
 - 神经功能失调
56. 患者, 女性, 因全身关节痛, 面有蝶形红斑, 查血抗 Sm 抗体 (+), 确诊为系统性红斑狼疮, 医嘱避免日光直射, 病室紫外线消毒时应回避, 外出穿长袖上衣及长裤, 戴帽或撑伞遮阳。其原因是 ()。
- 紫外线可致雌激素作用增强
 - 紫外线是本病重要诱因
 - 紫外线直接破坏细胞
 - 紫外线加重关节滑膜炎
 - 紫外线直接损害骨髓
57. 患者, 女性, 误服有机磷农药约 100ml, 不久后出现昏迷, 双瞳孔缩小, 呼吸困难, 满肺湿啰音, 其原因是 ()。
- 动眼神经兴奋
 - 迷走神经持久兴奋
 - 急性气管炎
 - 急性胃炎
 - 急性肺炎
58. 患者, 男性, 64 岁, 突发急性广泛心肌梗死, 咳大量粉红色泡沫痰, 其咳嗽病因是 ()。
- 急性气胸
 - 急性肺气肿
 - 肺囊肿
 - 急性肺水肿
 - 肺不张
59. 患者, 女性, 63 岁。主诉右上腹部持续性疼痛伴阵发性加剧, 向右后肩背放射, 伴恶心呕吐, 出现寒战、高热, 黄疸呈间歇性变化, 首先应考虑为 ()。
- 急性胰腺炎
 - 胆总管结石
 - 胆囊结石
 - 病毒性肝炎
 - 高位化脓性阑尾炎
60. 患者, 32 岁, 初产妇, 宫内孕 39 周。于昨日晚感觉腹部一阵阵发紧, 每半小时一次, 每次持续 3~5 分钟; 今天早上孕妇感觉腹部疼痛, 每 5~6 分钟一次, 每次持续 45 秒左右。该孕妇的情况是 ()。
- 出现规律宫缩
 - 属于孕妇紧张造成的宫缩, 尚未临产
 - 属于先兆临产

- D. 进入第一产程
E. 进入第二产程
61. 患者, 女性, 第一胎产后未复经, 哺乳期妊娠。产科检查: 子宫底于脐上1指, 估计孕周为()。
- A. 16周末 B. 20周末
C. 24周末 D. 28周末
E. 32周末
62. 患者, 女性, 20岁。1年前无明显诱因出现双手指间关节肿痛, 保暖后缓解, 未治疗。1周前双手指间关节肿痛加重, 伴双膝关节疼痛、双下肢肌肉疼痛及足跟疼痛, 行走困难, 面部出现红斑而入院。血液检查: 血细胞沉降率(血沉) 80mm/h, 白细胞总数 $3.9 \times 10^9/L$, 红细胞计数 $3.4 \times 10^{12}/L$ 。血红蛋白 100g/L。免疫学检查: IgG 增高, C_3 、 C_4 均降低, ANA (+), RF (-)。尿蛋白(++), 24小时尿蛋白定量 0.50g (正常为 0~0.15g)。该患者最可能的诊断为()。
- A. 类风湿关节炎
B. 急性肾盂肾炎
C. 系统性红斑狼疮
D. 风湿性关节炎
E. 干燥综合征
63. 患儿, 跌倒后手掌着地, 诉肘部疼痛, 摄片为肱骨髁上骨折, 其骨折的原因是()。
- A. 直接暴力 B. 间接暴力
C. 肌拉力 D. 骨骼疾病
E. 疲劳性骨折
64. 患者, 男性, 36岁, 胸部损伤, 多根肋骨多处骨折, 出现反常呼吸, 主要是因为()。
- A. 疼痛 B. 血胸
C. 肋间神经损伤 D. 气胸
E. 胸壁软化
65. 新生儿出生体重 2800g, 身长 50cm, 面色红润, 哭声响亮, 一般情况好, 现母乳喂养, 该新生儿开乳时间是()。
- A. 生后即可喂母乳
B. 生后 6 小时喂母乳
C. 生后 12 小时喂母乳
D. 生后 2 小时喂母乳
E. 生后 8 小时喂母乳
66. 患者, 女性, 26岁, 孕 7 个月余。今日晨起突发畏寒, 发热, 测体温 39℃, 伴发热、乏力, 恶心、呕吐, 下腹坠痛, 排尿时有烧灼感, 门诊查血常规示白细胞计数和中性粒细胞计数均升高, 尿常规见白细胞管型。该患者可能的诊断为()。
- A. 急性肾炎 B. 下尿路梗阻
C. 急性肾盂肾炎 D. 慢性肾炎
E. 肾病综合征
67. 患者, 男性, 52岁。近年出现左小腿发凉, 间歇性跛行。应考虑为()。
- A. 脉管炎坏疽期
B. 下肢大隐静脉曲张
C. 下肢小隐静脉曲张
D. 脉管炎局部缺血期
E. 脉管炎营养障碍期
68. 婴儿, 4个月, 母乳喂养, 家长述说已添加鱼肝油、米面糊, 现应指导家长再添加的辅食为()。
- A. 饼干 B. 碎肉末
C. 面片 D. 馒头
E. 鱼泥
69. 患者, 男性, 35岁, 原发性肝癌患者, 某日突然出现腹部剧烈疼痛及腹膜刺激征, 首先应考虑()。
- A. 上消化道出血 B. 肝性脑病
C. 肝癌结节破裂 D. 肝癌合并胆囊炎
E. 肝癌腹膜转移
70. 患者, 女性, 35岁, 剖宫产术后 3 天, 左下肢肿胀, 疼痛, 经检静脉造影确诊

- 为静脉血栓；患者主诉是肢体疼痛，其中导致肢体疼痛的主要原因是（ ）。
A. 动脉痉挛，肢体淤血，缺氧
B. 动脉痉挛，肢体缺血，缺氧
C. 静脉痉挛，肢体缺血，缺氧
D. 静脉痉挛，肢体淤血，缺氧
E. 动静脉痉挛，肢体淤血，缺氧
71. 患儿，女，8个月，单纯羊乳喂养。为预防营养性巨幼红细胞性贫血的发生，建议其饮食中应增加叶酸，下列含叶酸较多的食物是（ ）。
A. 蛋类 B. 瘦肉
C. 海产品 D. 干果类
E. 新鲜绿叶蔬菜
72. 患者，男性，60岁。近来出现进行性排尿困难，尿后滴沥，其最可能的原因为（ ）。
A. 前列腺癌 B. 尿道狭窄
C. 前列腺增生 D. 膀胱结石
E. 输尿管结石
73. 患者，女性，29岁。孕33周。触诊胎头在腹部右侧，胎臀在腹部左侧，胎心在脐周听到。胎先露为（ ）。
A. 枕先露 B. 肩先露
C. 面先露 D. 足先露
E. 臀先露
74. 患者，男性，45岁。患门静脉高压症多年，拟行分流术，术前灌肠禁用肥皂水，是防止（ ）。
A. 碱中毒 B. 肝性脑病
C. 肝衰竭 D. 术后腹胀
E. 术后腹泻
75. 患者，男性，41岁，搬运工人。两个月前无明显诱因出现腰背部疼痛，休息时症状减轻，劳累时加重。3天前，腰部扭伤后疼痛加剧并向左下肢放射。检查：腰部外观正常，弯腰活动受限，第4、5腰椎棘突上和棘突间有压痛，直腿抬高试验阳性。此患者最可能的诊断是（ ）。
A. 腰椎结核
B. 急性腰扭伤
C. 腰椎间盘突出症
D. 腰肌筋膜炎
E. 腰椎管狭窄症
76. 患者，女性，28岁。G₁P₁，自然分娩1男婴，体重3.5kg，胎盘娩出后半小时内阴道出血500ml，色红。查看胎盘完整，见有血管中断于胎膜边缘，其出血原因最可能是（ ）。
A. 胎膜残留 B. 胎盘剥离不全
C. 子宫收缩乏力 D. 软产道损伤
E. 宫颈裂伤
77. 患者，男性，73岁，突发剧烈头痛、呕吐，迅即昏迷，下列哪项可鉴别患者是脑出血还是蛛网膜下腔出血（ ）。
A. 体温高低
B. 白细胞多少
C. 是否有意识障碍
D. 是否有肢体瘫痪
E. 脑脊液是否血性
78. 新生儿，15天，足月顺产，出生体重3.1kg，母乳喂养，护士在进行新生儿访视时，其家长咨询小儿佝偻病的知识（ ）。
A. 坚持母乳喂养
B. 坚持日光浴
C. 坚持母乳喂养，4个月左右开始加蛋黄、鱼泥
D. 早期补充钙剂
E. 及时补充维生素D
79. 患者，男性，32岁。拟行阑尾切除术，术前常规禁食的时间是（ ）。
A. 4小时 B. 6小时
C. 8小时 D. 12小时
E. 15小时

80. 患者, 女性, 25 岁。因被车撞伤, 烦躁不安, 脉快, 收缩压正常, 脉压小, 面色苍白, 出冷汗, 考虑是 ()。
- A. 疼痛引起 B. 休克早期
C. 休克期 D. 精神紧张引起
E. 休克晚期
81. 患者, 女性, 35 岁。近 1 个月来发现乳头有鲜血流出, 但乳房内并无明显肿块触及, 亦无痛, 可考虑为 ()。
- A. 乳房纤维腺瘤
B. 乳腺炎症
C. 乳管内乳头状瘤
D. 乳房囊性增生病
E. 乳腺癌
82. 患者, 男性, 46 岁, 患乙肝 10 年。今进食后突然呕血 600ml。查体: 右上腹部压痛, 腹水征 (+), 肝质硬, 体积变小, 边缘锐利, 表面有小结节。该患者呕血最可能的原因是 ()。
- A. 应激性溃疡
B. 消化性溃疡
C. 肝癌结节破裂出血
D. 急性糜烂性胃炎
E. 食管-胃底静脉破裂
83. 患者, 女性, 29 岁。婚后 4 年, 性生活正常, 未避孕, 未孕, 月经正常。经检查男方精液正常, 女方宫颈糜烂, B 超检查子宫黏膜下肌瘤, 双附件正常, 基础体温双向。该患者不孕的原因可能是 ()。
- A. 子宫内膜异位症
B. 子宫肌瘤
C. 无排卵
D. 黄体发育不全
E. 黄体萎缩不全
84. 患者, 女性, 44 岁, 胆石症患者。今餐后 1 小时突发恶心、呕吐, 腹痛, 抽搐。腹痛位于上腹正中, 为持续性刀割

样, 阵发性加剧, 向腰背部呈带状放射, 弯腰抱膝可使疼痛减轻。查血淀粉酶 680U/L。该患者抽搐的原因最可能是 ()。

- A. 低血糖 B. 低血钙
C. 高血糖 D. 高血钾
E. 低血氯

二、以下提供若干组考题, 每组考题共用 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(85~87 题共用备选答案)

- A. 贫血重而出血轻
B. 贫血与出血相一致
C. 贫血轻而出血重
D. 有贫血而无出血
E. 无贫血而有皮下出血

85. 缺铁性贫血 ()。

86. 特发性血小板减少性紫癜 ()。

87. 慢性再生障碍性贫血 ()。

(88~89 题共用备选答案)

- A. 患肢痛
B. 血栓闭塞性脉管炎
C. 胆道结石疼痛
D. 腰肌劳损
E. 坐骨神经痛

88. 属于内脏性疼痛的疾病是 ()。

89. 属于损伤性疼痛的疾病是 ()。

(90~91 题共用备选答案)

- A. 衔接 B. 下降
C. 俯屈 D. 内旋转
E. 复位

90. 能够使枕额径变为枕下前凶径的动作是 ()。

91. 能够使胎头的矢状缝和中骨盆及出口前后径一致的动作是 ()。

(92~95 题共用备选答案)

- A. 利巴韦林或板蓝根
- B. 青霉素
- C. 红霉素
- D. 制霉菌素
- E. 异烟肼+链霉素

92. 支原体肺炎多选用 ()。

93. 肺炎链球菌肺炎首选 ()。

94. 急性上呼吸道感染 ()。

95. 原发复合征 ()。

(96~98 题共用备选答案)

- A. 月经量增多
- B. 不规则阴道流血
- C. 接触性出血

D. 下腹痛伴恶心、呕吐

E. 痛经

96. 黏膜下肌瘤的主要症状 ()。

97. 卵巢囊肿蒂扭转的主要症状 ()。

98. 子宫内膜异位症的主要症状 ()。

(99~100 题共用备选答案)

A. 给予镇静剂

B. 行剖宫产术

C. 立即人工破膜

D. 静脉滴注缩宫素

E. 等待产程自然进展

99. 不协调性宫缩乏力的首要处理措施为 ()。

100. 明显头盆不称的处理措施为 ()。

相关专业知识

一、以下每一道考试题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 高血压危象可首选的治疗药物是 ()。

- A. 硝普钠
- B. 利尿剂
- C. 硝酸甘油
- D. 甘露醇
- E. 美托洛尔

2. 反映肝损伤最敏感的指标为 ()。

- A. 血清蛋白
- B. 血清总胆红素
- C. 天冬氨酸氨基转移酶 (AST)
- D. 丙氨酸氨基转移酶 (ALT)
- E. 碱性磷酸酶 (ALP)

3. 急腹症诊断未明确前，下列治疗措施错误的是 ()。

- A. 灌肠通便，观察大便的性质
- B. 严密观察生命体征的变化
- C. 定时检查腹部体征的发展

D. 慎用吗啡类止痛剂

E. 非手术治疗期间病情未见好转，甚或加剧者，需剖腹探查

4. 诊断宫颈癌最可靠的方法是 ()。

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 碘试验
- C. 氮激光肿瘤固有荧光诊断法
- D. 阴道镜检查
- E. 宫颈活组织检查

5. 下列哪项是缺铁性贫血的表现 ()。

- A. 牙龈出血
- B. 发热伴大量出汗
- C. 骨骼疏松
- D. 毛发无光泽及反甲
- E. 皮肤紫癜

6. 心跳、呼吸骤停后出现较早的临床表现是 ()。

- A. 意识突然丧失
- B. 面色苍白
- C. 瞳孔散大
- D. 反射消失

- E. 血压测不出
7. 脓毒症做血的细菌培养最佳取血时间是()。
- A. 用过抗生素后
B. 寒战高热时
C. 出现新的转移脓肿时
D. 在无新的转移脓肿时
E. 无寒战高热时
8. 对开放性损伤进行清创术的时限,一般不得超过伤后的()。
- A. 1~2 小时 B. 3~5 小时
C. 6~8 小时 D. 9~10 小时
E. 11~16 小时
9. 下列哪项是经确诊需及时手术治疗的肠梗阻()。
- A. 肠套叠 B. 粘连性肠梗阻
C. 麻痹性肠梗阻 D. 肠扭转
E. 蛔虫性肠梗阻
10. 前置胎盘孕妇,产科检查的结果()。
- A. 子宫大小符合妊娠月份,胎方位清楚,先露高浮,胎心可正常或异常
B. 子宫比妊娠周数大,胎方位清楚,先露高浮,胎心正常或异常
C. 子宫比妊娠周数大,胎方位不清楚,先露高浮,胎心率多异常
D. 子宫比妊娠周数小,胎方位清楚,先露高浮,胎心可正常或异常
E. 子宫比妊娠周数小,胎方位不清楚,先露高浮,胎心率多正常
11. 阻塞性肺气肿患者,训练腹式呼吸的方法以下哪项不妥()。
- A. 取立位,吸气时尽力挺腹,胸部不动
B. 呼气时腹内陷,尽量将气呼出
C. 用口吸气,用鼻呼气要求缓呼深吸,不可用力
D. 吸与呼之比为 1:2 或 1:3
E. 每日锻炼两次,每次 10~20 分钟,每分钟 7~8 次
12. 对心源性水肿患者实施的护理措施要点中,以下哪项不妥()。
- A. 应用排钾利尿剂期间,注意血压的变化
B. 保持皮肤清洁、干燥,防止破损和感染
C. 限制钠盐的摄入
D. 老年患者输液速度不可太快
E. 保持患者身心休息,减轻心脏负荷
13. 二尖瓣狭窄患者,左心房肥大时心电图异常主要表现在()。
- A. P 波 B. Q-T 间期
C. T 波 D. S-T 段
E. QRS 波
14. 阻塞性肺气肿的病因及发病机制不包括()。
- A. 由哮喘发展而来
B. 冷空气刺激
C. 病毒感染
D. 长期吸烟
E. 抗胰蛋白增多
15. 在急性肾衰竭患者少尿期或无尿期,需紧急处理的电解质失调是()。
- A. 低钠血症 B. 低氯血症
C. 低钙血症 D. 高镁血症
E. 高钾血症
16. 慢性肺心病长期氧疗,每日持续吸氧时间应超过()。
- A. 5 小时 B. 9 小时
C. 10 小时 D. 11 小时
E. 15 小时
17. 下列关于羊水栓塞的处理,错误的是()。
- A. 纠正呼吸循环衰竭
B. 抗过敏
C. 抗生素预防感染

- D. 防止凝血功能障碍
E. 等待自然分娩
18. 造成肺部感染的因素与下列哪项无关 ()。
A. 寄生于呼吸道的细菌
B. 空气中的细菌
C. 患者免疫功能低下
D. 误吸入口、咽分泌物
E. 黏附于纤维支气管镜上的细菌
19. 关于 X 线摄影检查前的准备, 错误的是 ()。
A. 充分暴露摄影部位
B. 摄片时要屏气
C. 急腹症摄片前应清理肠道
D. 创伤患者摄片时尽量少搬动
E. 危重患者摄片必须有临床医护人员监护
20. 休克患者的体位最好是取 ()。
A. 半卧位 B. 低半卧位
C. 中凹位 D. 下肢抬高 30°
E. 侧卧位
21. 治疗特发性血小板减少性紫癜应首选 ()。
A. 甲状腺素 B. 雌激素
C. 糖皮质激素 D. 胰岛素
E. 醛固酮
22. 下列不符合枕骨大孔疝表现的是 ()。
A. 剧烈头痛
B. 反复呕吐
C. 呼吸骤停发生早
D. 可有瞳孔改变
E. 意识改变出现早
23. 急性感染性多发性神经根神经炎, 血清免疫球蛋白显著增高的是 ()。
A. IgA B. IgM
C. IgG D. IgD
E. IgE
24. 细菌感染后血常规的检查表现为 ()。
A. 血白细胞计数升高, 其他无异常
B. 血白细胞计数升高, 中性粒细胞增多
C. 血白细胞计数偏低, 中性粒细胞减少
D. 血白细胞计数正常, 中性粒细胞减少
E. 血白细胞正常或偏低, 淋巴细胞比例升高
25. 支气管扩张患者在施行体位引流时, 错误的护理是 ()。
A. 引流在晚间睡前进行
B. 根据病变部位选择体位
C. 引流时鼓励患者深呼吸
D. 引流时间每次 30 分钟以上
E. 引流完毕后给予漱口
26. 十二指肠溃疡患者上腹部疼痛的典型节律是 ()。
A. 进食 - 疼痛 - 缓解
B. 进食 - 缓解 - 疼痛
C. 缓解 - 疼痛 - 进食
D. 疼痛 - 进食 - 缓解
E. 疼痛 - 进食 - 疼痛
27. 新生儿出生后体重下降, 能恢复到出生时体重的时间是在出生后 ()。
A. 1~2 天 B. 4~6 天
C. 7~10 天 D. 10~14 天
E. 15~20 天
28. 脊髓半切征是指 ()。
A. 损伤平面以下同侧肢体的运动和深感觉丧失, 对侧肢体的痛觉和温度觉丧失
B. 损伤平面以下同侧肢体的痛觉和温度觉丧失, 对侧肢体的运动和深感觉丧失
C. 损伤平面以下的感觉、运动及反射功能完全丧失

- D. 会阴皮肤鞍状感觉消失,括约肌功能及性功能障碍
- E. 损伤平面以下的感觉、运动及反射功能部分丧失
29. 甲状腺功能亢进症患者出现下列哪项表现时,护士应警惕甲状腺危象(甲亢危象)的发生()。
- A. 怕热,多汗,常有消瘦
- B. 甲状腺弥漫性、对称性肿大
- C. 情绪不稳,多言好动
- D. 高热,体温 $>39^{\circ}\text{C}$,心率增快,140~240次/分
- E. 食欲亢进,大便次数增多
30. 急性心肌梗死和心绞痛的疼痛主要区别是()。
- A. 心肌梗死痛程度重,持续30分钟以上
- B. 心绞痛疼痛重,持续35分钟以上
- C. 疼痛的部位不同
- D. 疼痛的性质不同
- E. 诱因不同
31. 结节性甲状腺肿患者的颈部肿块特点是()。
- A. 质地较硬
- B. 表面不平
- C. 边界不齐
- D. 随吞咽上下移动
- E. 双侧弥漫性肿大
32. 下列不符合肾炎性肾病辅助检查结果的是()。
- A. 血浆总蛋白明显降低
- B. 尿蛋白定性(+++)~(++++)
- C. 尿内大量白细胞
- D. 血清补体降低
- E. 血胆固醇增高
33. 与尖锐湿疣有关的病毒是()。
- A. 风疹病毒
- B. 腮腺炎病毒
- C. 带状疱疹病毒
- D. 人乳头瘤病毒
- E. 人类免疫缺陷病毒
34. 淋病首选的治疗药物是()。
- A. 青霉素
- B. 头孢菌素
- C. 制霉菌素
- D. 红霉素
- E. 链霉素
35. 大面积烧伤患者早期需大量输液,根据面积计算出的液量(不包括生理需要量)第1天第1个8小时输入该量的()。
- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 2/3
- E. 3/5
36. 女性不孕最常见的病因为()。
- A. 输卵管因素
- B. 慢性宫颈炎
- C. 子宫黏膜下肌瘤
- D. 阴道炎
- E. 子宫内膜异位症
37. 急性肺水肿的痰液是()。
- A. 红色泡沫样痰
- B. 粉红色泡沫样痰
- C. 暗灰色泡沫样痰
- D. 棕色泡沫样痰
- E. 铁锈色泡沫样痰
38. 关于系统性红斑狼疮患者的皮肤黏膜表现,下列哪项除外()。
- A. 蝶形红斑
- B. 口腔溃疡
- C. 雷诺现象
- D. 蜘蛛痣
- E. 网状青斑
39. 严重的低渗性缺水可补给()。
- A. 3%高渗性盐水
- B. 10%葡萄糖注射液
- C. 林格液
- D. 等渗性盐水