

发掘推广中草药

< 內 部 资 料 >

沈 阳 药 学 院
革 命 委 員 会 教 育 革 命 組

一 九 七 〇 年 九 月

发掘推广中草药

我院参加“辽宁省中草药新医疗法
展览会”中草药资料汇编

(内部资料)

沈阳药学院
革命委员会教育革命组

1970年9月

目 录

第一部分

甘枋散.....	1
复方甘枋散.....	1
复方甘壳散.....	1
健胃散.....	1
复方氢氧化铝散.....	2
止痢散.....	2
复方止泻散.....	3
嗓子痛散.....	3
老牛肝炭粉.....	3
消肿散.....	4
水调散.....	4
湿疹撒布散.....	4
止痢颗粒剂.....	5
黄柏地榆浸膏.....	5
委陵菜浸膏.....	5
黄豆馏油软膏.....	6
黄水疮药膏.....	6
发癣膏.....	7
滴耳油.....	7
五味子藤酊.....	8
复方缬草酊.....	8
抗炎1号注射液.....	8

抗炎 2 号注射液.....	9
抗炎 3 号注射液.....	10
复方独活 1 号注射液.....	11
复方独活 2 号注射液.....	11
复方独活 3 号注射液.....	12
复方防风 1 号注射液.....	13
复方防风 2 号注射液.....	13
复方防风 3 号注射液.....	14
白芷注射液.....	15
复方元胡注射液.....	16
复方地龙注射液.....	16
半夏注射液.....	17
复方黄芪注射液.....	18
703 注射液.....	19
704 注射液.....	19
盐酸黄连素注射液.....	20
复方地榆注射液.....	20
紫草注射液.....	21
大黄注射液.....	22

第二部分

白屈菜.....	23
辽宁省白屈菜资源概况.....	23
白屈菜的制剂与应用.....	25
白屈菜全碱的提取和精制.....	29
草乌.....	30
辽宁省草乌资源概况.....	30

草乌的制剂与应用.....	33
口服生草乌后的毒性反应.....	39
草乌地上部分生物硷予试验.....	40
猪胆汁.....	41
猪胆汁的制剂与应用.....	41
猪胆汁对中草药注射剂的助溶试验.....	47
“六八一”口服新制剂.....	50
“681—6”粉的制法.....	51
“681—6”粉的质量标准.....	52
“681—6”片的生产.....	53
“681—6”粉和“681—6”片试制的根据.....	54

第 一 部 分

甘 楞 散

处 方：甘草1.0 煅瓦楞子4.0

制 法：共研细粉

用途与用法：主治胃及十二指肠溃疡。饭前或痛时服，每次3克，日服3次。

复 方 甘 楞 散

处 方：甘草1.0 煅瓦楞子4.0 曼陀罗叶粉0.5

制 法：先将甘草与瓦楞子共研细粉后，再按逐渐稀释法与曼陀罗叶粉研匀。

用途与用法：同甘楞散。

复 方 甘 壳 散

处 方：甘草1.0 鸡蛋壳(焙黄)4.0 曼陀罗叶粉0.5

制 法：先将甘草与鸡蛋壳共研细粉后，再按逐渐稀释法与曼陀罗叶粉研匀

用途与用法：作用与用途同甘楞散。但疗效较好，特别对高酸性胃炎及溃疡病疗效更显著。每次3克，日服3次。

健 胃 散

处 方：焦苍术1.0 蒲公英1.0 谷芽1.0 罗卜
籽1.0 苞米棒炭0.5

制 法：分研细粉，按处方量混匀。

用途与用法：治慢性胃炎，消化不良。饭前服，每次3克，

日服2—3次。

说明：用于数例病人，有一定效果。

病例：赵××，女，17岁。肚痛，医生诊断为慢性胃炎，服莨菪片无效。服此药8次即癒。

复方氢氧化铝散

处方：氢氧化铝凝胶干粉0.5克 681—6粉0.5克
焦苍术0.3克 曼陀罗叶粉0.1克

制法：将焦苍术研细粉与其余三种药粉混匀。

用途与用法：治胃及十二指肠溃疡，胃酸过多症及慢性胃炎等。每次一剂，日服3次。

说明：①广泛应用，效果较好。

②“681—6”粉制法见“六八一”口服新制剂。

病例：唐××，男，40岁。胃溃疡穿孔做切除术后一年多，又吐酸水，胃痛，用此药后症状迅速消失。

止痢散

处方：翻白草450克 秦皮300克 黄柏300克

制法：将翻白草、秦皮全部及黄柏200克共水煎二次，合并煎液，用文火浓缩成膏状，将剩100克黄柏研粉加入膏中，拌匀，低温焙干，研细粉。

用途与用法：治肠炎、痢疾。每次服1—2克，日服3次。

说明：①用于50多例病人，效果显著。

②所用翻白草为蔷薇科植物。potentilla discolor Bge.翻白委陵菜。

病例：徐××，女，3岁。腹痛，腹泻，一天5—10次，便中有浓血，粘液，有明显里急后重症状，服此药

两天（每服1.5克，日服3次）即癒。

复方止泻散

处 方：黄柏地榆浸膏1克 活性炭1克 曼陀罗叶粉0.5克

制 法：先将黄柏地榆浸膏与活性炭共研匀后再与曼陀罗叶粉按逐渐稀释法研匀。

用途与用法：主治泄泻。每次服一剂，日服三次。

说 明：①用于数例病人，效果较好。对儿童消化不良引起的泄泻也有较好的效果。

②黄柏地榆浸膏制法见第5页。

嗓子痛散

处 方：山豆根 5.0 桔梗 5.0 马勃 1.0

制 法：分研细粉，按处方量混匀。

用途与用法：治扁桃腺炎、咽喉肿痛。每次服3克，日服3次。

说 明：用于10多例病人，疗效较好。

老牛肝炭粉

处 方：老牛肝（为寄生在柳树上的蘑菇状“多孔蕈”）

制 法：将老牛肝切片，炒炭存性，研细粉。

用途与用法：治功能性子宫出血。每次服1钱，日服2次，红糖作引，黄酒冲服。

说 明：用于10多例病人，多数有效，有的疗效显著。

病 例：李××，女，45岁。去年9月患崩漏症，服此药两天（每服5克，日服两次）即癒。今年5月崩漏症复发，先用维生素K₃，半日内注射4支，又用仙鹤草素2支，麦角1支，都只能暂时止血2—4小

时。第二天用此药，每服5克，日服2次，当天流血量减少，两天后血止疮癒。

消 肿 散

处 方：羊蹄根 1.8 煤 1.5 黄柏 1.2

制 法：分研细粉，按处方量混匀。

用途与用法：治瘀血肿胀。醋调，外敷患处。

说 明：用于数十例病人，效果较显著。

病 例：庞 ×，男，38岁。腿被马车碰撞后肿痛不能行走，用此药2次即癒。

水 调 散

处 方：黄柏 煅石膏 各等量

制 法：分研细粉，混匀。

用途与用法：治一切疮疖及无名肿毒。未破者，水调敷患处，破口者，用麻油调敷。

说 明：广泛应用，疗效很好。

湿 疹 撒 布 散

处 方：黄柏地榆浸膏 10% 冰片 2% 滑石粉加至 100%

制 法：将黄柏地榆浸膏与滑石粉拌匀，再将冰片溶于少量酒精中后，加入搅匀。

用途与用法：收敛、吸湿、止痒。用于溢液较多的湿疹及小儿臀红。撒布患处。

说 明：用于数例小儿臀红及各种湿疹病人，吸湿、止痒效果显著。

止痢颗粒剂

处 方：委陵菜10克 秦皮5克 黄柏5克

制 法：将委陵菜、秦皮切细，加水共煎，过滤，滤液浓缩成糖浆状（以加入黄柏粉拌和后成硬度适宜的软材为度），将黄柏研细粉，加于上述浸膏中，充分拌和使成软材，压过10号筛，干燥后再过10号筛，筛除细粉，即得均匀的颗粒。

用途与用法：治肠炎、痢疾。每次服一剂，日服3次。小儿酌减。

说 明：①广泛应用，疗效较显著。

②由于部分中草药熬成浸膏，体积缩小，制成颗粒剂后便于小儿服用。

黄柏地榆浸膏

处 方：黄柏、地榆 各等量

制 法：将黄柏、地榆分别用水煎煮三次，滤去药渣，将两种药液合并，浓缩成稠膏，加淀粉适量，干燥粉碎即得。

用途与用法：消炎收敛。用法见复方止泻散。

说 明：本品黄柏中所含黄连素与地榆中所含鞣质结合成黄连素鞣质盐，在肠道中分解成游离的黄连素与鞣质，分别起杀菌消炎及收敛作用。

委陵菜浸膏

处 方：委陵菜（全草）2000克 黄柏粉适量 制成浸膏500克

制 法：将委陵菜切细，加水浸没煎煮一小时，过滤，收集

药液。同法将药渣重复处理一次。将两次药液合并，加热浓缩成稠膏状，加入少量黄柏粉吸干后再烘干，研粉过筛，最后用黄柏粉调至500克。

用途与用法：主治痢疾、肠炎。每次服2—4克，日服三次。

说明：①此方应用时间较短，但疗效较好。

②所用委陵菜为蔷薇科植物*Potentilla chinensis* Ser.全草。

黄 豆 馏 油 软 膏

处 方：黄豆馏油20克 凡士林加至100克。

制 法：取黄豆馏油置于磁碗中，将凡士林分次加入，与黄豆馏油混匀，制成100克软膏。

用途与用法：对湿疹、神经性皮炎、干癣等皮肤病有收敛消炎作用。涂布患处，每日一次。

说明：①广泛应用，效果较好。

②黄豆馏油系将黄豆用土法干馏而成。

黄 水 疮 药 膏

处 方：黄柏、白藓皮、核桃楸树皮浸膏（200%）50克
枯矾10克 胆矾2克 羊毛脂 适量 凡士林加至100克

制 法：将枯矾、胆矾分研细粉，与浸膏研匀，加羊毛脂适量（以全部吸收浸膏混合物为度）研和，再加凡士林至100克，调匀。

用途与用法：治黄水疮。洗净患处，擦干，涂药。

说明：①治疗数例病人，疗效显著。

②黄柏、白藓皮、核桃楸树皮各等量熬成200%浸膏。

③胆矾为含结晶水的硫酸铜 ($\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)。

发 癬 膏

处 方：硬脂酸铜 10 % 水扬酸 5 % 石碳酸 4 %
二甲基亚砷 10 % 凡士林 10 % 液体石蜡
加至 100 %

制 法：取硬脂酸铜，加液体石蜡适量，加热溶解后，加入水扬酸、石碳酸、二甲基亚砷及凡士林，研匀，再加液体石蜡至 100%，研匀。

用途与用法：治发癬。将头发剃去，洗净，擦干，涂敷患处。

说 明：①治疗多例病人。有一例患者患发癬10年多，用过多种癬药无效。涂用此药后治愈。

②水扬酸也可用苯甲酸代替。

③硬脂酸铜制法：取肥皂61.2克，切细，加水适量溶解成肥皂液，在水浴上加热。取硫酸铜 24.9 克，加水适量溶解后，徐徐加于上述热肥皂液中，不断搅拌（混合液中发生复分解反应，析出硬脂酸铜沉淀），过滤，沉淀物反复用热水冲洗（除去残余硫酸铜），在30℃以下干燥即可。

滴 耳 油

处 方：柿蒂 5 个 明矾 10 克 冰片 1 克 甘油酒精
精 (1:1) 适量

制 法：将柿蒂焙干，研成粗粉，加甘油酒精适量，微热浸渍，过滤，滤液置研钵中，加入明矾研磨溶解。另取冰片，加少量酒精溶解后，加入上述混合液中，再加甘油酒精至 100 毫升，混匀，纱布过滤即成。

用途与用法：治慢性中耳炎。滴入耳内，一日 2—3 次。

说明：①治疗多例病人，疗效较显著。

②最好用新鲜柿蒂晒干。

五味子藤酊

处方：五味子藤 20 克 酒精（40%）适量 制成酊剂 100 毫升

制法：将五味子藤研成粗粉，置于有盖容器中，加入酒精适量，密盖，常常振摇，浸渍三天，倾取上清液，用布过滤，药渣用力压榨，使浸出液完全压出，合併滤液，放置 24 小时，过滤，再自滤器上添加 40% 酒精，使成 100 毫升。

用途与用法：镇静、强壮。治神经衰弱等。每次服 5—10 毫升，日服 3 次。

说明：此方用五味子藤代五味子用，二者疗效相同。

复方缬草酊

处方：缬草根 20 克 五味子 5 克 酒精（40%）适量 制成酊剂 100 毫升

制法：按浸渍法制备，具体作法同五味子藤酊。

用途与用法：镇静。用于癔病、神经衰弱等。每次服 10 毫升，日服 3 次。

说明：广泛应用，效果较好。

抗炎 1 号注射液

处方： 牛蒡子	30 克
山豆根	90 克

黄 柏 90 克

升 麻 45 克

制成注射液 127.5毫升

制 法：先将山豆根、黄柏、升麻切片，与牛蒡子一起加水浸没，按常法共煎两次，合併两次煎液，过滤，文火浓缩成膏状，稍冷后加入三倍量95%酒精，搅匀，放置一夜，过滤，滤液回收酒精，加蒸馏水调整体积至127.5毫升，加入0.25%（克/毫升）量的盐酸普鲁卡因粉及，5滴吐温—80，过滤，分装，100°C/30'灭菌。

用途与用法：清热解毒，抗菌消炎。主治咽喉肿痛，扁桃腺炎，支气管炎等上呼吸道感染等症。也可用于各种发疹性疾患、痛肿、急性热病等。肌肉注射，每次2毫升。也可做喷雾剂用。

说 明：经广泛应用，效果较好，但注射局部有较强痛感，连续注射时可见减轻。

抗 炎 2 号 注 射 液

处 方：葱白（鲜） 20克

大蒜（鲜） 40克

制成注射液 100毫升

制 法：将上述两种鲜药捣碎，立即用水蒸气蒸馏，收集馏液100毫升，加入0.5%（克/毫升）量的盐酸普鲁卡因及3-5滴吐温—80，搅匀，过滤，分装，100°C/30'灭菌。

用途与用法：治流感及流感引起的合併感染、支气管炎、肺炎等。肌肉注射，每次2毫升，每日3次。

说 明：用于多例病人，效果很好。对小儿效果更好。今春××大队流感流行期间，大量应用此药。凡轻度肺

内感染，注射此药2—4次，即可控制，对缩短流感病程起了很大作用，节省了大量抗菌素。

抗 炎 3 号 注 射 液

处 方：	紫皮大蒜	40克
	葱 白	20克
	委陵菜	40克
	新鲜猪胆汁	2 毫升
	制成注射液	100毫升

制 法：将去皮紫皮大蒜，葱白捣烂，用水蒸气蒸馏法收集馏液85毫升。将新鲜胆汁浓缩至半量，放冷，使充分沉淀，过滤，滤液加2—3倍量95%酒精，搅拌放置，过滤，滤液回收酒精，加于葱蒜馏液中，应得澄明液。另将委陵菜煎煮2—3次，合并煎液，过滤浓缩成糖浆状，用95%酒精处理至无沉淀为止，过滤，滤液回收酒精，加入上述澄明液中，混匀，蒸馏水加至100毫升，用4%氢氧化钠调PH至8.5，过滤，分装，100°C/30'灭菌。

用途与用法：清热，消炎，止痢。用于气管炎、感冒、肠炎等。肌肉注射，每次2—3毫升，每日1—2次。

说 明：用于30多例病人，疗效较好。一般注射此药2—3天，症状消失痊愈。

病 例：陈××，女，1岁。大便中有血有脓，发烧，体温38.5°C。注射此药两天（每次2毫升，每日2次）后痊愈。

史××，女，2岁。患气管炎，经常犯病，有时有

肺内感染。最近气管炎复发，气喘，发热。注射此药5次（每次2毫升，每日2次）痊愈。

复方独活1号注射液

处 方：柴 胡 150克
独 活 100克
细 辛 50克
制成注射液 300毫升

制 法：将以上三种药共研粗粉，加水浸泡1小时，用水蒸汽蒸馏，收集第一次馏液1200毫升，所得馏液再次蒸馏，收集第二次馏液300毫升，加入注射用氯化钠0.8克，搅拌使溶解，过滤，分装，100°C/30'灭菌。

用途与用法：解热镇痛。肌肉注射，每次2毫升。穴位注射，0.1—0.5毫升。

说 明：用于100多例病人，对感冒、流感、上呼吸道感染等解热镇痛效果较好。对神经性疼痛也有效。

病 例：刘××，女，58岁。右侧头面部阵发性疼痛三年多，经各地多处治疗无效。近几个月来，疼痛加重，夜间不能入睡，医生诊断为三叉神经痛。穴位注射此药，立即止痛，注射三天痊愈。

复方独活2号注射液

处 方：独 活 100克
防 风 45克
白 芷 25克
柴 胡 25克

细 辛 5克

制成注射液 100毫升

制 法：将以上五种药分别研粗粉，加水浸泡一小时，用水蒸汽蒸馏，收集第一次馏液 400 毫升，所得馏液再次蒸馏，收集第二次馏液 100 毫升，加苯甲醇 2 毫升，加3—5滴吐温—80，过滤，分装，100℃/30' 灭菌。

用途与用法：治风寒感冒、头痛、周身痛等。肌肉注射，每次 2—3 毫升。

说 明：广泛应用，效果较好。

复方独活 3 号注射液

处 方：独 活 100克

防 风 45克

柴 胡 25克

细 辛 5克

安替匹林 5克

制成注射液 100毫升

制 法：将独活、柴胡、细辛分别研粗粉，混合后加水浸泡1小时，用水蒸汽蒸馏，收集第一次馏液 400 毫升，所得馏液再次蒸馏，收集第二次馏液75毫升，备用。将防风研成粗粉，加水浸没，浸泡 1 小时后，煎煮1小时，过滤，药渣再加水煎煮两次，过滤，合并三次滤液，浓缩成糖浆状，加2—3倍量95%酒精，搅匀，放置使沉淀全部析出，过滤，滤液回收酒精，过滤，滤液浓缩至25毫升，过滤，滤液加于上述馏液中，得100毫升，搅匀，加安替匹林，加苯甲醇 2 毫升，加 1 毫升吐温—80，过滤，分装，100℃/30' 灭菌。