

中医古籍珍本集成

(续)

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强
总主编○周仲瑛于文明

综合卷

景岳全书

④

攻也○病欲吐者不可下嘔多雖有陽明證不可攻之此嘔

总策划 ○ 王国强

总主编 ○ 周仲瑛 于文明

常务副总主编 ○ 王旭东

中医古籍珍本集成

(续)

综合卷

景岳全书

④

主编 ○ 虞 舜 王旭东
编者 ○ (按汉语拼音排序)

卞雅莉 黄晶晶 石历闻 王旭东 温雯婷

吴昌国 奚飞飞 衣兰杰 虞 舜 张雷强

湖南科学技术出版社

岳麓书社

中 医 古 籍 珍 本 集 成

◎本书出版得到国家古籍整理出版专项经费资助

◎『十一五』、『十二五』国家重点图书出版规划

◎教育部、科技部、国家中医药管理局重点立项



《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

王 李 姜 岚

秘书○王跃军 喻峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○**裴沛然** 张灿珮 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 **王洪图**

分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 **彭怀仁** 施杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序)高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李显 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林 楠 陆 翔 沈澍农 王 键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞 舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞 舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张 继 李崇超 朱若霖 陈 隋

学术秘书○衣兰杰 杨 萌 奚飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱 丽

成 员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈 劼 晏婷婷 于莉英

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 曾菴訂

產育類

滑胎 三十二

妊娠滑胎之法惟欲其坐草之期易而且速而難易之由則在血之盈虛不在藥之滑利蓋血多則潤而產必易血虧則澀而產必難故於未產之前但宜以培養氣血爲主而預爲之地如四物湯滑胎煎五福飲小營煎八珍湯之類卽皆滑胎之要藥若不知此而過用滑利等物或產期未近無火無滯而妄用清火行氣沉降苦寒等藥必皆暗戕營氣走泄真陰多致血虧氣陷反爲臨期大害若果肥盛氣實者則紫蘇飲

保生無憂散滑胎枳殼散之類皆可擇用

催生 三三三

凡妊娠胎元完足彌月而產熟落有期非可摧也所謂催生者亦不過助其血氣而利導之耳直待臨期乃可用脫花煎或滑胎煎隨證加減主之或經日久產母困倦難生俱宜服滑胎煎以助其氣血令兒速生其有氣虛無力艱於傳送者必用獨參湯隨多隨少接濟其力皆為催生要法若期未至而妄用行氣導血等劑以為催生亦猶摘方苞之萼擷未人之苗下

一臨盆將產腹痛已甚凡催生之藥無如脫花煎少用肉桂五七分為最穩最妙若氣虛無力者加人參二三錢虛甚者任意加用之

一催生若水血下多子道乾澀難出者宜用滑利之物如豬脂

油蜜酥油葱白葵子牛乳滑石榆白皮之類以潤之以濟急之法也

滑胎催生論外方

達生散 婦四十一

生化湯 婦四十二

加味芎歸湯 婦四十四 難產 良方當歸湯 婦五滑胎催生

經驗滑石散 婦五二胎乾難產 佛手散 婦四一

穩婆 二三四

產婦臨盆必須聽其自然弗宜摧逼安其神志勿使驚慌直待
花熟蒂圓自當落矣所以凡用穩婆必須擇老成忠厚者預
先囑之及至臨盆務令從容鎮靜不得用法摧逼余嘗見有
穩婆性急者恐顛此失彼因而勉強試湯分⑦之指之逼
之使下致致頭身水順而手足先出或橫或倒爲害不小若
未有緊陣不可令其動手切記切記又或有生息不順及雙

胎未下之類但宜穩密安慰不可使產母聞知恐驚則氣散愈難生息又嘗見有好詭之婦故爲呻吟之聲或輕事重報以顯已能以圖酬謝因致產婦驚疑害尤非細極當慎也立齋醫按載一穩婆云止有一女於分娩時適當巡街侍御行牌取我視其內室分娩女爲此驚嚇未產而死後見侍御吏以威顏分付迨視產母胎雖順而頭偏在一邊此時若以手入推正可保順生因畏其威不敢施手但回稟云此是天生天化非人力所能因是子母俱不能救由此觀之可見產時當用靜鎮自然而一毫驚恐疑畏有不可使混於其間者

產要 一五

凡孕婦臨月忽然腹痛或作或止或一二日或三五日胎水少來但腹痛不密者名曰美胎非當產也又有一月前或半月前忽然腹痛如欲產而不產者名曰試月亦非產也凡此腹

痛無論胎水來與不來俱不妨事但當寬心候時可也若果欲生則痛極連腰乃將產也蓋腎繫於腰胞繫於腎故耳又試捏產母手中指本節跳動卽當產也此時兒逼產門穀道挺迸水血俱下方可坐草試湯瓜熟蒂懸此乃正產之候也一產婦腹痛未甚且須寬心行動以便兒身舒轉如腰腹痛甚有產之兆卽當正身仰臥或起坐舒伸務宜安靜從容待兒轉身向下其產必順而且易最不宜預爲驚擾入手以致產婦氣怯胞破漿乾使兒轉身不易則必有難產之患

一產婦初覺欲生便須惜力調養不可用力妄施恐致臨產乏力若男方轉身而用力太早則多致橫逆須待順而臨門一逼自下若時候未到用力徒然

一臨產房中不宜多人喧嚷驚擾宜閉戶靜以待生

一將產時宜食稠軟白粥勿令饑渴以乏氣力亦不宜食硬冷

難化之物恐產時乏力以致脾虛不能消化則產後有傷食之病

一產婦產室當使溫涼得宜若產在春夏宜避陽邪風是也產在秋冬宜避陰邪寒是也故於盛暑之時亦不可衝風取涼以犯外邪又不宜熱甚致令產母頭疼面赤亦不宜人衆若熱氣薰蒸亦致前患其或有熱極煩渴而血暈血溢者亦可少與凉水暫以解之然亦不可多用若冬末春初餘寒尚盛產室不可無火務令下體和煖衣被亦當溫厚庶不爲寒氣所侵可免胎寒血滯難產之患且產後胎元既落氣血俱去乘虛感邪此時極易故不可不慎

凡富貴之家過於安逸者每多氣血壅滯常致胎元不能轉動此於未產之先亦須常爲運動庶使氣血流通胎易轉則產亦易矣是所當預爲留意者

一妊娠將產不可磨卜問神如巫覡之徒哄嚇謀利妄言凶險
禱神祇保產婦聞之致生疑懼大憂慮則氣結滯而不順多
至難產所宜戒也

一產時胞漿未下但只穩守無妨若胞漿破後一二時長不生
卽當服催生等藥如脫花煎滑胎煎或益母丸之類蓋漿乃
養兒之生漿乾不產必其胎元無力愈遲則愈乾力必愈乏
所以速宜催之

一產婦與酒不可多而致醉凡產前醉則乏力而四肢不用產
後酒多恐引入血分四肢致後日有動血及四肢無力髓骨
痠痛之患

六逆產 三六

一橫生者以兒方轉身產母用力逼之太早故致兒身未順而
先露手臂但令母安然仰臥穩渡以手徐推兒臂下體令其

正直復以中指摸其肩膊使臍帶攀繫卽生○二倒生者因
兒未及轉身產母努力故令兒先露足令母正臥以手徐推
足入良久仍推兒身徐候轉正近門卽生○三偏生者因兒
未順生路產母努力逼兒頭偏一邊雖若露頂實額角也亦
照前法推正卽生若兒頂後骨偏拄穀道傍以手從外後位
輕輕托正卽生○四礙產者兒身雖順門路雖正但不能下
乃因胎轉時臍帶絆肩而然令產母仰臥以手輕推兒向上
乃用中指按兒兩肩理順臍帶卽生○五坐產者因兒將產
其母疲倦久坐椅褥抵其生路而然須用手巾一條拴繫高
處令產母以手攀之輕輕屈足舒伸以開生路兒卽順生○
六盤腸產者臨產母腸先出子產而腸未收故曰盤腸產古
法以醋水各半盞默然嚙產母面背則收一法以單麻子四
十九粒研爛塗母頭頂待腸收上急洗去俗以水嚙面背驚

之而腸亦收但恐驚則氣散反致他疾戒之

一方治橫逆產難令產母仰臥以小針刺兒手脚心三五次用鹽擦之手脚卽縮上轉身卽生

一方治盤腸產以牛耳爲末用少許搐鼻中腸自上

又方用大紙撚以蘇油潤滲點著吹滅以烟薰產婦鼻中腸卽上

又方腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之腸卽上

胞破產難 三七

凡產婦胎未順而胞先破者其因有二蓋一有母質薄弱胞衣不固因兒轉動隨觸而破者此氣血之虛也一有兒身未轉以坐草太早用力太過而胞先破者此舉動之傷也若胞破從而水血乾產路澀則兒難下宜急用大料四物湯或五物煎脫花煎滑胎煎五福飲當歸湯之類助其氣血并濃煎葱

湯薰洗產戶使其煖而氣達則自當順下若持久力乏血已耗涸則甚危矣當用八珍湯料一斤益母草四兩水數碗煎熟不時飲之亦有得生者或以黃芪芍歸數斤以大釜煎藥氣氤氳滿室使產母口鼻俱受其氣亦良法也○大抵產難之證多患於鬱悶安佚富貴之家治法雖云胎前清氣產後補血然不可拘泥若脾胃不健氣血不充必當預爲調補不然臨產必多患難

一產難經日不下別無危證者宜用脫花煎催之極妥極妙

一醫宿客店治店婦臨產數日不生下體俱冷無藥甚窘令取椒橙菜茱萸共煎湯一盆令產婦以小凳坐盆內薰洗良久小腹皆煖氣溫血行遂產

一方以紫菀煎湯薰洗大抵遇嚴寒時月產久傷冷氣血必凝此薰洗之法亦要法也外以淋湯內以羊肉湯必效

一方令產婦以自己髮稍含於口中令其惡心作嘔卽下亦治胞衣不出

胞衣不出三八

胞衣不出有以氣血疲弱不能傳送而停閣不出者其證但見無力而別無痛脹治當補氣助血宜速用決津煎或滑胎煎保生無憂散局方黑神散之類主之○有以惡露流入胞中脹滯不出者蓋兒既脫胞帶必下墜故胞在腹中形如仰葉仰則盛聚血水而脹碍難出惟老成穩婆多有識者但以手指頂其胞底以使血散或以指摸上口攀開一角使惡露傾瀉則腹空自落矣○又一法以木婦頭髮攪入喉中使之作嘔則氣升血散胞軟亦自落矣凡胎胞不出者多死授以此法甚效○若血滲胞中停蓄既久而爲脹爲痛或喘或急則非逐血破血不可也宜速用奪命丹或用失笑散以熱酒調