

中国科学院华南植物园
中山大学
深圳市得道健康管理有限公司

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主 编 叶华谷 曾飞燕 廖文波 叶育石 第四辑 (十六—二十) (十八)



化学工业出版社

中国科学院华南植物园
中山大学
深圳市得道健康管理有限公司

中国药用植物

主 编 叶华谷 曾飞燕 廖文波 叶育石
CHINESE MEDICINAL PLANTS
第四辑(十六—二十)
(十八)



化学工业出版社

· 北京 ·

本书以图文结合的形式,收录我国野生及栽培的药用植物共197种(包括亚种、变种及变型),主要从植物资源利用的角度,介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等,有些种类还有附方。为了安全起见,在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样,提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国药用植物.十八/叶华谷等主编. —北京:化学工业出版社,2016.10
ISBN 978-7-122-27793-0

I. ①中… II. ①叶… III. ①药用植物—介绍—中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第181595号

责任编辑:李 丽
责任校对:宋 夏

装帧设计:百彤文化传播

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)
印 装:北京方嘉彩色印刷有限责任公司
889mm×1194mm 1/32 印张13 字数500千字 2017年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址:<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:79.00元

版权所有 违者必究

本书编写人员

主 编: 叶华谷 曾飞燕 廖文波 叶育石

副主编: 孙尚传 黄志海 熊秉红 吴林芳 张慧晔

编写人员(按姓氏笔画排序):


于 慧	王发国	孔华清	付 琳	叶华谷	叶育石
全 健	刘 冰	刘 念	朱 强	孙尚传	李书渊
李如良	李泽贤	李海涛	李巧玲	张 征	张丽霞
张忠廉	张慧晔	陆颂规	杜怡枫	吴林芳	肖 波
邹 滨	陈玉笋	陈巧明	陈海山	卓书斌	杨 毅
杨科明	林汝顺	林锦锋	易思荣	郑 珺	金慧英
侯惠婵	倪静波	夏 静	秦新生	莫 伟	莫结丽
曹洪麟	曹照忠	黄 娅	黄志海	符同浩	曾飞燕
曾宪禹	童毅华	廖文波	管志斌	管燕红	翟俊文
熊秉红					

摄 影: 王 斌 张丽霞 叶华谷 叶育石 李海涛 管燕红
谭运洪 张忠廉 徐安顺

本书承

“中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项(CZBZX-1)、财政部战略生物资源科技支撑运行专项(KSCX2-YW-Z-1004)、植物园国家标准体系建设与评估(Y421051001)、植物园迁地保护植物编目及信息标准化(2009FY120200)”出版。





前 言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类按拉丁名首字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物197种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《中华本草》《云南中药资源名录》《西双版纳药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

五加	<i>Acanthopanax gracilistylus</i>	2
白筋花	<i>Acanthopanax trifoliatus</i>	4
毛麝香	<i>Adenosma glutinosum</i>	6
球花毛麝香	<i>Adenosma indianum</i>	8
赤杨叶	<i>Alniphyllum fortunei</i>	10
筋藤	<i>Alyxia levinei</i>	12
当归	<i>Angelica sinensis</i>	14
金鱼草	<i>Antirrhinum majus</i>	16
芹菜	<i>Apium graveolens</i>	18
百两金	<i>Ardisia crispa</i>	20
小紫金牛	<i>Ardisia cymosa</i>	22
月月红	<i>Ardisia faberi</i>	24
灰色紫金牛	<i>Ardisia fordii</i>	26
走马胎	<i>Ardisia gigantifolia</i>	28
郎伞树	<i>Ardisia hanceana</i>	30
虎舌红	<i>Ardisia mamillata</i>	32
莲座紫金牛	<i>Ardisia primulaefolia</i>	34
九节龙	<i>Ardisia pusilla</i>	36
罗伞树	<i>Ardisia quinquegona</i>	38
雪下红	<i>Ardisia villosa</i>	40
猪毛蒿	<i>Artemisia scoparia</i>	42
假马齿苋	<i>Bacopa monnieri</i>	44
金盏银盘	<i>Bidens biternata</i>	46
三叶鬼针草	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>radiata</i>	48

狼把草	<i>Bidens tripartita</i>	50
百能葳	<i>Blainvillea acmella</i>	52
台北艾纳香	<i>Blumea formosana</i>	54
千头艾纳香	<i>Blumea lanceolaria</i>	56
大头艾纳香	<i>Blumea megacephala</i>	58
柔毛艾纳香	<i>Blumea mollis</i>	60
竹叶柴胡	<i>Bupleurum marginatum</i>	62
猪肚木	<i>Canthium horridum</i>	64
辣椒	<i>Capsicum annuum</i>	66
山石榴	<i>Catunaregam spinosa</i>	68
胡麻草	<i>Centranthera cochinchinensis</i>	70
风箱树	<i>Cephalanthus tetrandrus</i>	72
海杧果	<i>Cerbera manghas</i>	74
金叶树	<i>Chrysophyllum lanceolatum</i> var. <i>stellatocarpon</i>	76
中粒咖啡	<i>Coffea canephora</i>	78
大粒咖啡	<i>Coffea liberica</i>	80
流苏子	<i>Coptosapelta diffusa</i>	82
两色金鸡菊	<i>Coreopsis tinctoria</i>	84
秋英	<i>Cosmos bipinnata</i>	86
黄秋英	<i>Cosmos sulphureus</i>	88
胡萝卜	<i>Daucus carota</i> var. <i>sativa</i>	90
东南长蒴苣苔	<i>Didymocarpus hancei</i>	92
小叶眼树莲	<i>Dischidia nummularia</i>	94
酸藤子	<i>Embelia laeta</i>	96
当归藤	<i>Embelia parviflora</i>	98
白花酸藤果	<i>Embelia ribes</i>	100
厚叶白花酸藤子	<i>Embelia ribes</i> var. <i>pachyphylla</i>	102
网脉酸藤子	<i>Embelia rudis</i>	104
瘤皮孔酸藤子	<i>Embelia scandens</i>	106


长叶酸藤子	<i>Embelia undulata</i>	108
多脉酸藤子	<i>Embelia vestita</i>	110
齿叶吊钟花	<i>Enkianthus serrulatus</i>	112
一年蓬	<i>Erigeron annuus</i>	114
狗牙花	<i>Ervatamia divaricata</i> cv. <i>Gouyahua</i>	116
海南狗牙花	<i>Ervatamia hainanensis</i>	118
药用狗牙花	<i>Ervatamia officinalis</i>	120
光叶丁公藤	<i>Erycibe schmidtii</i>	122
刺芫荽	<i>Eryngium foetidum</i>	124
华泽兰	<i>Eupatorium chinense</i>	126
佩兰	<i>Eupatorium fortunei</i>	128
土丁桂	<i>Evolvulus alsinoides</i>	130
大丁草	<i>Gerbera anandria</i>	132
宽叶鼠麴草	<i>Gnaphalium adnatum</i>	134
鼠麴草	<i>Gnaphalium affine</i>	136
秋鼠麴草	<i>Gnaphalium hypoleucum</i>	138
细叶鼠麴草	<i>Gnaphalium japonicum</i>	140
多茎鼠麴草	<i>Gnaphalium polycaulon</i>	142
田基黄	<i>Grangea maderaspatana</i>	144
天星藤	<i>Graphistemma pictum</i>	146
匙羹藤	<i>Gymnema sylvestre</i>	148
紫背三七	<i>Gynura bicolor</i>	150
白子菜	<i>Gynura divaricata</i>	152
三七草	<i>Gynura japonica</i>	154
蔓三七草	<i>Gynura procumbens</i>	156
常春藤	<i>Hedera nepalensis</i>	158
金草	<i>Hedyotis acutangula</i>	160
耳草	<i>Hedyotis auricularia</i>	162
鼎湖耳草	<i>Hedyotis effusa</i>	164
牛白藤	<i>Hedyotis hedyotidea</i>	166
粗毛耳草	<i>Hedyotis mellii</i>	168

松叶耳草	<i>Hedyotis pinifolia</i>	170
阔托叶耳草	<i>Hedyotis platystipula</i>	172
纤花耳草	<i>Hedyotis tenelliflora</i>	174
粗叶耳草	<i>Hedyotis verticillata</i>	176
短梗幌伞枫	<i>Heteropanax brevipedicellatus</i>	178
幌伞枫	<i>Heteropanax fragrans</i>	180
醉魂藤	<i>Heterostemma alatum</i>	182
中华天胡荽	<i>Hydrocotyle chinensis</i>	184
肾叶天胡荽	<i>Hydrocotyle wilfordi</i>	186
羊耳菊	<i>Inula cappa</i>	188
旋覆花	<i>Inula japonica</i>	190
纤细苦苣菜	<i>Ixeridium gracile</i>	192
窄叶小苦苣	<i>Ixeridium gramineum</i>	194
龙船花	<i>Ixora chinensis</i>	196
刺楸	<i>Kalopanax septemlobus</i>	198
莴苣	<i>Lactuca sativa</i>	200
稻槎菜	<i>Lapsana apogonoides</i>	202
斜基粗叶木	<i>Lasianthus attenuatus</i>	204
粗叶木	<i>Lasianthus chinensis</i>	206
日本粗叶木	<i>Lasianthus japonicus</i>	208
榄绿粗叶木	<i>Lasianthus japonicus</i> var. <i>lancilimbus</i>	210
大头囊吾	<i>Ligularia japonica</i>	212
日本女贞	<i>Ligustrum amamianum</i>	214
女贞	<i>Ligustrum lucidum</i>	216
中华石龙尾	<i>Limnophila chinensis</i>	218
石龙尾	<i>Limnophila sessiliflora</i>	220
长蒴母草	<i>Lindernia anagallis</i>	222
狭叶母草	<i>Lindernia angustifolia</i>	224
泥花草	<i>Lindernia antipoda</i>	226
母草	<i>Lindernia crustacea</i>	228
红骨草	<i>Lindernia montana</i>	230

旱田草	<i>Lindernia ruellioides</i>	232
南烛	<i>Lyonia ovalifolia</i>	234
短梗大参	<i>Macropanax rosthornii</i>	236
鲫鱼胆	<i>Maesa perlaris</i>	238
人心果	<i>Manilkara zapota</i>	240
牛奶菜	<i>Marsdenia sinensis</i>	242
水晶兰	<i>Monotropa uniflora</i>	244
羊角藤	<i>Morinda umbellata</i>	246
华腺萼木	<i>Mycetia sinensis</i>	248
乌檀	<i>Nauclea officinalis</i>	250
团花	<i>Neolamarckia cadamba</i>	252
薄柱草	<i>Nertera sinensis</i>	254
少花水芹	<i>Oenanthe benghalensis</i>	256
水芹	<i>Oenanthe javanica</i>	258
卵叶水芹	<i>Oenanthe javanica</i> subsp. <i>rosthornii</i>	260
西南水芹	<i>Oenanthe linearis</i>	262
蛇根草	<i>Ophiorrhiza japonica</i>	264
短小蛇根草	<i>Ophiorrhiza pumila</i>	266
隔山香	<i>Ostericum citriodorum</i>	268
臭鸡矢藤	<i>Paederia foetida</i>	270
鸡矢藤	<i>Paederia scandens</i>	272
毛鸡屎藤	<i>Paederia scandens</i> var. <i>tomentosa</i>	274
田七	<i>Panax pseudoginseng</i> var. <i>notoginseng</i>	276
黄瓜菜	<i>Paraixeris denticulata</i>	278
香港大沙叶	<i>Pavetta hongkongensis</i>	280
紫花前胡	<i>Peucedanum decursivum</i>	282
白花前胡	<i>Peucedanum praeruptorum</i>	284
异叶茴芹	<i>Pimpinella diversifolia</i>	286
山榄	<i>Planchonella obovata</i>	288
南山花	<i>Prismatomeris connata</i>	290
翅果菊	<i>Pterocypsela indica</i>	292

长叶鹿蹄草	<i>Pyrola elegantula</i>	294
海南萝芙木	<i>Rauvolfia verticillata</i> var. <i>hainanensis</i>	296
白杜鹃	<i>Rhododendron mucronatum</i>	298
多花茜草	<i>Rubia wallichiana</i>	300
接骨草	<i>Sambucus chinensis</i>	302
接骨木	<i>Sambucus williamsii</i>	304
薄片变豆菜	<i>Sanicula lamelligera</i>	306
直刺变叶菜	<i>Sanicula orthacantha</i>	308
防风	<i>Saposhnikovia divaricata</i>	310
鹅掌藤	<i>Schefflera arboricola</i>	312
穗序鹅掌柴	<i>Schefflera delavayi</i>	314
球序鹅掌柴	<i>Schefflera pauciflora</i>	316
六月雪	<i>Serissa japonica</i>	318
白马骨	<i>Serissa serissoides</i>	320
虾须草	<i>Sheareria nana</i>	322
鸡仔木	<i>Sinoadina racemosa</i>	324
少花龙葵	<i>Solanum americanum</i>	326
牛茄子	<i>Solanum capsicoides</i>	328
假烟叶	<i>Solanum erianthum</i>	330
白英	<i>Solanum lyratum</i>	332
乳茄	<i>Solanum mammosum</i>	334
水茄	<i>Solanum torvum</i>	336
马铃薯	<i>Solanum tuberosum</i>	338
花叶滇苦菜	<i>Sonchus asper</i>	340
白花茛	<i>Styrax faberi</i>	342
野茉莉	<i>Styrax japonicus</i>	344
芬芳安息香	<i>Styrax odoratissimus</i>	346
栓叶安息香	<i>Styrax suberifolius</i>	348
越南安息香	<i>Styrax tonkinensis</i>	350
薄叶山矾	<i>Symplocos anomala</i>	352
假桂乌口树	<i>Tarenna attenuata</i>	354

通脱木	<i>Tetrapanax papyrifer</i>	356
破子草	<i>Torilis japonica</i>	358
窃衣	<i>Torilis scabra</i>	360
龙珠	<i>Tubocapsicum anomalum</i>	362
乌饭树	<i>Vaccinium bracteatum</i>	364
鼠刺乌饭树	<i>Vaccinium iteophyllum</i>	366
茄叶斑鸠菊	<i>Vernonia solanifolia</i>	368
短序莢蒨	<i>Viburnum brachybotryum</i>	370
水红木	<i>Viburnum cylindricum</i>	372
莢蒨	<i>Viburnum dilatatum</i>	374
宜昌莢蒨	<i>Viburnum erosum</i>	376
南方莢蒨	<i>Viburnum fordiae</i>	378
吕宋莢蒨	<i>Viburnum luzonicum</i>	380
珊瑚树	<i>Viburnum odoratissimum</i>	382
蝴蝶戏珠花	<i>Viburnum plicatum</i> var. <i>tomentosum</i>	384
球核莢蒨	<i>Viburnum propinquum</i>	386
如意草	<i>Viola hamiltoniana</i>	388
长萼堇菜	<i>Viola inconspicua</i>	390
山牡荆	<i>Vitex quinata</i>	392
蔓荆	<i>Vitex trifolia</i>	394
参考文献	396
拉丁名索引	397
中文名索引	399





五 加

Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith

【别名】五加皮、南五加皮、刺五加、刺五甲

【基原】来源于五加科五加属五加 *Acanthopanax gracilistylus* W. Smith [*Eleutherococcus gracilistylus* (W. W. Smith) S. Y. Hu] 的根和树皮入药。

【形态特征】灌木。直立或蔓生，高2~3m；枝有刺，稀无刺。叶为掌状复叶，有3~5小叶，小叶卵形至倒披针形，长2.5~6cm，宽1~2.5cm，边缘具细齿；侧脉4~6对；托叶不存在或不明显。花两性，稀单性异株；伞形花序或头状花序通常组成复伞形花序或圆锥花序；花梗无关节或有不明显关节；萼筒边缘有5~4小齿，稀全缘；花瓣5片，稀4片，在花芽中镊合状排列；雄蕊5枚，花丝细长；子房5~2室；花柱5~2枚，离生、基部至中部合生，或全部合生成柱状，宿存。果实球形或扁球形，直径5~7mm，有5~2棱；种子的胚乳均一。花期4~8月；果期6~10月。

【生境】生于山坡阳处的疏林中。

【分布】浙江、福建、江西、湖南、湖北、广西、广东、贵州、云南、四川、陕西、山西等省区。

【采集加工】夏秋季采收，根或树皮晒干。

【性味功能】味辛，性温。祛风除湿，强筋壮骨。

【主治用法】治风湿性关节炎，腰腿酸痛，半身不遂，跌打损伤，水肿。用量9~15g。

【附方】治风湿关节痛：五加皮15g，苍术、秦艽、豨莶草各9g，老鹳草12g，水煎服或泡酒服。



白筋花

Acanthopanax trifoliatum (Linn.) Merr.

【别名】白筋、白筋根、三叶五加、三加皮、刺三加

【基原】来源于五加科五加属白筋花 *Acanthopanax trifoliatum* (Linn.) Merr. [*Eletherococcus trifoliatum* (Linn.) S. Y. Hu] 的全株入药。

【形态特征】灌木。高1~7m; 枝软弱铺散, 常依持他物上升, 老枝灰白色, 新枝黄棕色, 疏生下向刺; 刺基部扁平, 顶端钩曲。叶有小叶3, 稀4~5; 叶柄长2~6cm, 有刺或无刺, 无毛; 小叶片纸质, 稀膜质, 椭圆状卵形至椭圆状长圆形, 稀倒卵形, 长4~10cm, 宽3~6.5cm, 顶端尖至渐尖, 基部楔形, 两侧小叶片基部歪斜, 两面无毛, 或上面脉上疏生刚毛, 边缘有细锯齿或钝齿, 侧脉5~6对, 明显或不甚明显, 网脉不明显; 小叶柄长2~8mm, 有时几无小叶柄。伞形花序3~10个、稀多至20个组成顶生复伞形花序或圆锥花序, 直径1.5~3.5cm, 有花多数, 稀少数; 总花梗长2~7cm, 无毛; 花梗细长, 长1~2cm, 无毛; 花黄绿色; 萼长约1.5mm, 无毛, 边缘有5个三角形小齿; 花瓣5片, 三角状卵形, 长约2mm, 开花时反曲; 雄蕊5枚, 花丝长约3mm; 子房2室; 花柱2枚, 基部或中部以下合生。果实扁球形, 直径约5mm, 黑色。花期8~11月; 果期9~12月。

【生境】生于山坡林缘、溪河两岸的灌丛中或村边路旁等处。

【分布】我国华南、华中、华西等省区。

【采集加工】夏秋季采收, 全株切段晒干。

【性味功能】味苦、涩, 性凉。清热解毒, 祛风除湿, 散瘀止痛。

【主治用法】治黄疸, 肠炎, 胃痛, 风湿性关节炎, 腰腿痛。外用治跌打损伤, 疮疖肿毒, 湿疹。用量30~60g。外用适量, 鲜根、叶捣烂敷或煎水洗患处。

【附方】

1. 治风湿骨痛: 白筋花根、半枫荷、黑老虎、异形南五味藤、大血藤各15g, 炖猪骨服。

2. 治湿疹: 白筋花(全株)、水杨梅、小果倒地铃(全草)各适量。煎水外洗, 后用干粉敷患处, 每日2次。