

中医古籍珍本集成

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

方书卷

千金翼方 ①

不足盛陰氣不脈輕身不老能化金銅生蜀中山谷及越嶲

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

方书卷

千金翼方

①

主编○王 键

副主编○陆 翔 王旭光 王 付

编者○(按汉语拼音排序)

晁利芹 程传浩 程 新 邓 勇 范欣生 郭凤鹏 郭瑞华 黄 辉 李传行 李 芸 刘 宾

龙旭阳 陆 翔 潘晓丽 钱婷婷 邵 雷 沈澍农 司胜林 宋洪伟 陶 静 万四妹 王 付

王剑锋 王 键 王金利 王松涛 王晓东 王旭光 吴承艳 杨 环 姚建平 叶 亮 张德林

张丰聪 张 欢 张延武 张 业 赵东丽 郑 攀

湖南科学技术出版社
岳麓书社

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学
顾问委员会

总顾问○裘沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图
分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华
副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

秘书○王跃军 喻峰

千金翼方卷第十

寒下

太陰病狀第一

辨證

太陰之爲病腹滿吐食不下之在裏時腹自痛^②宜下堅結

太陰病脉浮可發其汗

太陰中風四肢煩疼陽微陰澀而長爲欲愈

太陰病欲解時從亥盡丑

自利不渴者屬太陰其藏有寒故也當溫之宜四逆輩

傷寒脉浮而緩手足溫是爲繫在太陰太陰當發黃小便自

利利者不能發黃至七八日雖煩暴利十餘行必自止所以

自止者脾家實腐穢當去故也

本太陽病醫下之因腹滿時痛爲屬太陰桂枝加芍藥湯

主之其痛重加大黃湯主之方

枳枝陸

芍藥陸

生薑陸

甘草陸

大棗陸

右伍味以水柒升煮取叁升去滓分溫叁服

加大黃湯方

大黃陸

右於前方中加此大黃貳兩即是

人無陽證脉弱其人續自便利設當行大黃為藥者減之其

人胃氣弱易動故也

少陰病狀第二

四拾伍證方壹拾陸首

少陰之為病脉微細但欲寐

少陰病欲吐而不煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰虛

故引水自救小便白者少陰病形悉具其人小便白者下

焦虛寒不能制溲故白也夫病其脉陰陽俱緊而反汗出

為陽屬少陰法當咽痛而後吐利

少陰病欬而下利譫語是爲被火氣劫故也小便必難爲強責少陰汗也

少陰病脉細沈數病在裏不可發其汗

少陰病脉微不可發其汗無陽故也陽已虛^⑩中弱^⑪澀者復不可下之

少陰病脉緊者至七八日下利其脉暴微手足反溫其脉緊反去此爲欲解雖煩下利必自愈

少陰病下利若利止惡寒而踰手足溫者可治

少陰病惡寒而踰時自煩欲去其衣被不可治^⑫

少陰中風其脉陽微陰浮爲欲愈

少陰病欲解時從子盡寅

少陰病八九日而一身手足盡熱熱在膀胱必便血

少陰其人吐利手足不逆反發熱不死脉不足者冬其少

壯

少陰无但厥無汗強發之必動血未知從何道出或從口鼻目出是爲下厥上竭爲難治

少陰病惡寒踈而利手足逆者不治

少陰病下利止而眩時時自冒者死

少陰病其人吐利躁逆者死

少陰病四逆惡寒而踈其脉不至其人不煩而躁者死

少陰病六七日其息高者死

少陰病脉微細沈但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日自利

後煩燥不得卧寐者死

少陰病始得之反發熱脉反沈者麻黃細辛附子湯主之

麻黃

貳兩
去節

細辛

兩

附子

壹枚炮去
皮破八片

上三味以水貳斗先煮麻黃減壹升去上沫內諸藥煮取

三升去滓溫服一升^{①⑦}

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無證故微發汗方

麻黃

二兩
去節

附子

一枚

①⑧
炮去皮破八片

甘草

二兩
炙

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧者黃連阿膠湯主之方

黃連

四兩

黃芩

一兩

芍藥

二兩

雞子黃

二枚

阿膠

三挺

右五味以水六升先煮三味取二升去滓內膠烱^{①⑨}盡內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

小

得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

少

身軀痛手足寒骨節痛脉沈者附子湯主之方

附子

二枚炮去皮破八片茯苓三兩

人參二兩

白朮

四兩

芍藥

三兩

右五味以水八升煮取三升去滓分溫三服

少陰病下利便膿血桃花湯主之

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利不止而便膿血者

以桃花湯主之方

赤石脂

一斤半

乾薑

一兩

粳米

一升

右三味以水七升煮米熟湯成去滓溫取七合內赤石脂

末一方寸匕²¹一服止餘勿服

少陰病下利便膿血者可刺

少陰病吐利手足逆煩躁欲死者茱萸湯主之

明門陽

少陰病下利咽痛貪滿心煩猪膚湯主之方

猪膚 斤

右壹味以水壹斗煮取五升去滓内白蜜壹升白粉五合熬香和令相得温分六服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差可與桔梗湯方

甘草^②

右壹味以水叁升煮取壹升半去滓温服七合日再服

桔梗湯方

桔梗 一大枚^② 甘草 二兩

右貳味以水叁升煮取壹升去滓分温再服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出苦酒湯主之方

雞子

壹枚去黃內好上苦酒於殼中

半夏

洗破如棗核十四枚

右貳味内半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令

沸去滓少少含嚥之不差更作三劑愈

小 病咽中痛半夏散及湯方

半夏

桂枝

甘草

右參味等分各異搗合治之白飲和服方寸匕日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩方寸匕更煮三沸下火令小冷少少含嚥之半夏有毒不當散服^②

少陰病下利白通湯主之方

附子

壹枚生去皮破八片乾薑

一兩

葱白

四莖

右參味以水參升煮取壹升去滓分溫再服

少陰病下利脉微服白通湯利不止厥逆無脉乾煩者白通加猪膽汁湯主之方

猪膽汁

一合

人尿

五合

右參味內前湯中和令相得溫分再服若無膽亦可用服湯脉暴出者死微續者生

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重

痛而利此爲有水氣其人或欬或小便不利或下利或嘔玄武湯主之方

茯苓

芍藥

生姜

各半兩切

白朮

貳兩

附子

壹枚炮去

右伍味以水捌升煮取參升去滓溫服柒合欬者加伍味子半升細辛壹兩乾薑壹兩小便自利者去茯苓下利者去芍藥加乾薑貳兩嘔者去附子加生薑是前爲半斤利不止便膿血者宜桃花湯

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反惡寒其人面赤或腹痛或乾嘔或咽澀或利止而脉不出通脉四逆湯主之方

甘草

貳兩炙

附子

大者壹枚生去皮破捌片

乾薑

叁兩強人可肆兩

右叁味以水參升煮取壹升貳合去滓分溫再服其脉即省愈面赤者加葱白九莖腹痛者去葱加芍藥貳兩嘔

如加生薑貳兩咽痛者主芍藥加桔梗壹兩利止脉不出者^子桔梗加人參貳兩病皆與方相應者乃加減服之少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或洩利下重四逆散主之方

甘草^炙

枳實^炙

柴胡

芍藥^{各拾}

右肆味搗為散^散飯和服方寸匕日參服欬者加五味子乾薑各伍分兼主利悸者加桂伍分小便不利者加茯苓伍分腹中痛者加附子壹枚炮洩利下重者先以水伍升煮薤白三升取二升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升半分溫再服

少陰病不利六七日欬而嘔渴心煩不得眠猪苓湯主之^方

陽明門

少陰病得之二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯³³

少陰病吐利清水色青者心下必痛口乾燥者可下之宜承氣

湯柴胡一云大

少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯方見承氣中

少陰病其脈沈者當溫之宜四逆湯

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之

手足寒脈弦遲此胃中實不可下也當遂吐之若膈上有

寒飲乾嘔者不可吐當溫之宜四逆湯方見陽明門

少陰病下利脈微澀者即嘔汗者必數更衣反少當溫其上

灸之陰一云灸厥陰五拾壯

厥陰病狀第三伍拾陸證方柴胡

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食其甚者則欲

吐光下之不肯止

陰中風其脈微浮為欲愈不浮為未愈

陰病欲解時從丑盡卯

厥陰病渴欲飲水者與水飲之即愈

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

傷寒先厥後發熱而利者必止見厥復利

傷寒始發熱六日厥反九日而下利厥利當不能食今反能

食恐爲除中^⑤食之黍餅^⑥不發熱者知胃氣尚在必愈恐暴

熱來出而復去也後日脈之其熱續在期之旦日夜半愈

所以然者本發熱六日厥反九日復發熱二日并前六日

亦爲九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脈之數

其熱不罷此爲熱氣有餘必發癰膿

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲爲寒與黃芩

湯復除其熱腹中冷當不能食今反能食此爲除中必死

傷寒先厥發熱^⑦下利必自止而反汗出咽中強痛其喉爲痺^⑧