



普通高等教育“十三五”规划教材

概率论与数理统计

(第二版)

王炳章 吕文 主编



科学出版社

普通

划教材

概率论与数理统计

(第二版)

王炳章 吕文 主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书系统地介绍了概率论与数理统计的基本概念、基本理论和基本方法。主要包括随机事件及其概率、随机变量及其分布、多维随机变量及其分布、随机变量的数字特征、极限定理、样本和抽样分布、参数估计、假设检验及方差分析与回归分析等内容。

本书可作为高等学校非数学类理工科各专业及经济管理类各专业的概率论与数理统计课程的教材，也可作为相关专业教师、工程技术人员或具备微积分基础的读者学习概率论与数理统计的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

概率论与数理统计/王炳章, 吕文主编. —2 版. —北京: 科学出版社,
2017. 8

普通高等教育“十三五”规划教材
ISBN 978-7-03-054115-4

I. ①概… II. ①王… ②吕… III. ①概率论-高等学校-教材 ②数理统计-高等学校-教材 IV. ①O21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 191791 号

责任编辑: 王 静 / 责任校对: 彭 涛
责任印制: 白 洋 / 封面设计: 陈 敬

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>



保定市中画美凯印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 7 月第一版 开本: 720×1000 1/16

2017 年 8 月第二版 印张: 14 1/4

2017 年 8 月第九次印刷 字数: 285 000

定价: 29.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

第二版前言

本书自 2009 年 7 月出版以来,除了作为本校非数学类理工科各专业及经济管理类各专业学习概率论与数理统计课程的教材以外,也被其他一些院校所采用,取得了良好的效果. 但一本好的教材只有在反复教学实践的基础上不断修改,才能日臻完善.

借本书再版的机会,作者根据数年的教学实践和对本书第一版多年的试用,对原书的部分内容作了适当的修订,改写了部分章节的内容,补充了近年来硕士研究生入学考试屡屡涉及的帕斯卡分布,增补了比较实用的方差分析理论与方法,使全书的内容更为系统和完善.

本次修订,虽然工作十分认真和细致,但囿于编者的水平,书中难免会有许多不妥或疏漏,诚望各位读者不吝指正.

编 者

2017 年 4 月

第一版前言

在高等学校非数学类理工科专业及经济管理类专业的课程体系中,概率论与数理统计一直是具有重要地位的数学基础课。进入 21 世纪以来,我国的高等教育有了突飞猛进的发展,高等学校的教材建设工作也取得了令人瞩目的成就。随着计算机技术的广泛应用以及数学软件的普及,应用数学的理论与方法在其他学科和其他领域的应用日益广泛并日臻成熟起来。这些无疑对高等学校的数学基础课程的教材建设提出了新的要求。在这种形势下,作者以教育部数学与统计学教学指导委员会最新修订的《工科类本科数学基础课程教学基本要求》与《经济管理类本科数学基础课程教学基本要求》中对概率论与数理统计部分所做的规定为指导,结合作者多年来的教学实践经验,编写了这本概率论与数理统计课程的教材。在本书编写过程中,作者力求使全书具有清晰易懂的语言表述和轮廓鲜明的内容结构,以增强本书的可读性。同时始终遵循在系统地介绍基本概念和清楚地阐述基本理论的基础上,强调基本方法的训练和重视培养学生的基本能力这样的原则来安排和统筹概率论与数理统计的各部分内容。在各章的例题及课后习题的选择上,安排了一定数量的具有应用意义的题目,这使全书不仅具有系统规范的教学内容和相对严密的理论体系,也较好地体现了概率统计理论的应用性强的特点。

本书共分八章,包括随机事件及其概率、随机变量及其分布、多维随机变量及其分布、随机变量的数字特征、极限定理、样本和抽样分布、参数估计和假设检验等内容,其中第 1~5 章和第 9 章由王炳章编写,第 6~8 章由吕文编写,全书由王炳章负责统稿。

讲授全书约需 60 学时,这对于经济管理类本科专业是必需的。对于工科类本科专业,若只讲授《工科类本科数学基础课程教学基本要求》规定的前 8 章内容,则只需 54 学时。但如果学时充分,作者建议讲授全书。因为第 9 章的线性回归分析是非常有实用价值的内容,不仅经济管理类专业学生的一些专业课程(如计量经济学)要以回归分析理论为基础,理工类专业的学生在毕业后的实际工作中或考取研究生后继续深造时有时也会用到这部分知识。

试读结束: 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com

本书可作为高等学校非数学类理工科各专业及经济管理类各专业的概率论与数理统计课程的教材,也可作为相关专业教师、工程技术人员或具备微积分基础的读者学习概率论与数理统计的参考书.

由于编者水平有限,加之时间较为仓促,书中难免存在不妥甚至错误之处,诚恳希望各位读者批评指正.

编 者

2009年3月1日

目 录

第二版前言

第一版前言

第1章 随机事件及其概率	1
1.1 随机试验和样本空间	1
1.2 事件的运算和关系	3
1.3 古典概型与几何概率	7
1.4 概率的公理化定义	13
1.5 条件概率	16
1.6 事件的独立性	22
习题 1	25
第2章 随机变量及其分布	29
2.1 随机变量与分布函数	29
2.2 离散型随机变量	31
2.3 连续型随机变量	40
2.4 随机变量函数的分布	49
习题 2	53
第3章 多维随机变量及其分布	56
3.1 二维随机变量的分布	56
3.2 边缘分布	62
3.3 条件分布	67
3.4 随机变量的独立性	71
3.5 多维随机变量函数的分布	74
习题 3	79
第4章 随机变量的数字特征	83
4.1 随机变量的数学期望	83
4.2 随机变量的方差	90
4.3 协方差和相关系数	95

4.4 随机变量的矩	100
习题 4	101
第 5 章 极限定理.....	104
5.1 大数定律	104
5.2 中心极限定理	108
习题 5	110
第 6 章 样本和抽样分布.....	113
6.1 总体和样本	113
6.2 抽样分布	118
习题 6	125
第 7 章 参数估计.....	128
7.1 矩估计和极大似然估计	128
7.2 估计量的优良性	136
7.3 区间估计	139
习题 7	147
第 8 章 假设检验.....	149
8.1 参数假设检验的问题与方法	149
8.2 正态总体参数的假设检验	152
8.3 单侧假设检验	161
8.4 总体分布的假设检验	164
习题 8	167
第 9 章 方差分析与回归分析.....	170
9.1 单因素方差分析	170
9.2 一元线性回归	174
9.3 多元线性回归	182
习题 9	184
部分习题答案.....	187
参考文献.....	196
附表.....	197

第1章 随机事件及其概率

概率论是研究随机现象的统计规律性的一门数学学科.

在自然界和人类社会中,人们会遇到各种各样、形形色色的现象.这些现象大体上可以分为两类.其中一类是可以预言其结果的,即在保持条件不变的情况下,重复试验或观察,其结果总是确定不变的.这类现象称为**决定性现象**.例如,在标准大气压下,纯水加热至 100°C 必然开始汽化;又如,在不受外力作用下,物体将保持原有的运动状态(匀速直线运动或静止)不变;再如,在空中抛掷一枚硬币,硬币必将落至地面等都是决定性现象.决定性现象也称为必然现象.另一类现象是不能预言其结果的,即在保持条件不变的情况下,重复试验或观察会得到不同的结果.换句话说,就个别的试验或观察而言,它时而出现这种结果,时而出现那种结果,呈现出一种偶然性.这种现象称为**随机现象**或**偶然现象**.例如,掷一枚硬币,落地后是出现正面还是反面,试验前是无法预知的;又如,用同一把尺子多次测量一个物体的长度,所得结果彼此总是略有差异;同样地,在射击方面,同一门炮向同一目标发射多发同种炮弹,弹落点也不尽相同;再如,从某一生产线上用同一种工艺生产出来的灯泡的寿命也有差异;等等.随机现象比比皆是,随处可见.然而概率论以外的数学学科或自然科学都只研究决定性现象的规律,在概率论出现之前,几乎从未涉足随机现象领域.概率论即是为研究随机现象的规律性而诞生的一门数学学科.

1.1 随机试验和样本空间

尽管随机现象在一次试验或观察中其结果不可把握,呈现出一种偶然性(或随机性),但在多次重复试验或观察时,它却呈现出明显的规律性.为了研究随机现象的规律需要进行试验.概率论中通常讨论具有以下特点的试验:

- (1) **可重复**: 试验可以在相同的条件下多次重复进行.
- (2) **多结果**: 试验有多个可能结果,这些结果试验前是已知的.
- (3) **随机性**: 每次试验将会出现哪个结果试验前是无法预知的.

具备上述三个特点的试验称为**随机试验**,简称为**试验**.

下面是试验的一些例子.

E_1 ——掷一颗骰子,观察落地时出现的点数;

E_2 ——掷两枚硬币,观察正、反面出现的情况;

E_3 ——记录一段时间内,某部电话收到的呼叫次数;

E_4 ——从一批灯管中任取一只, 观察无故障运行时间;

E_5 ——同一门炮向同一目标进行多次射击, 观察弹落点;

E_6 ——在南美洲地区, 观测地震发生时震源的精确位置.

这些试验都具有上述(1)~(3)的性质, 所以都是随机试验.

如上所述, 随机试验有多个可能的结果. 我们称随机试验 E 的所有可能结果组成的集合为 E 的样本空间(或基本事件空间), 记为 Ω . 称样本空间中的每个元素(即试验 E 的每个可能结果)为 E 的样本点, 用 ω 表示. 即 $\Omega = \{\omega | \omega \text{ 是随机试验 } E \text{ 的样本点}\}$. 而称由单个样本点组成的集合为基本事件.

例 1.1 写出随机试验 $E_i (i=1, 2, \dots, 6)$ 的样本空间.

解 E_1 有 6 个样本点, 即出现 1 点, 出现 2 点, …… 出现 6 点. 故 E_1 的样本空间为 $\Omega'_1 = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$, 其中 ω_i 表示出现 i 点. 或简单地表示成 $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

同样, E_2 的样本空间为 $\Omega_2 = \{(T, T), (T, F), (F, T), (F, F)\}$, 其中 (T, F) 表示第一枚硬币出现正面, 第二枚硬币出现反面, 等等.

E_3 的样本空间为 $\Omega_3 = \{0, 1, 2, \dots\}$.

E_4 的样本空间为 $\Omega_4 = \{x | x \geq 0\}$, 其中 x 为任一灯管的无故障运行时间.

在 E_5 中, 选定平面直角坐标系, 用 (x, y) 表示弹落点的坐标, 从而 E_5 的样本空间为 $\Omega_5 = \{(x, y) | -\infty < x, y < +\infty\}$.

对于 E_6 , 用和 E_5 同样的方法, 可以确定 E_6 的样本空间为

$$\Omega_6 = \{(h, \varphi, \theta) | h \geq 0, |\varphi| \leq 90^\circ, |\theta| \leq 180^\circ\},$$

其中 h 为震源的深度, φ 为震源的纬度, θ 为震源的经度.

在研究随机试验时, 不仅要考虑由试验的单个样本点所表示的结果(即每个基本事件)是否会发生, 也要考察由多个样本点组成的集合所表示的结果是否会发生. 这种结果称为复合事件. 无论是基本事件还是复合事件, 它们在试验中是否会发生, 都带有随机性, 所以都称为随机事件, 简称为事件, 一般用 A, B, C, \dots 表示. 随机事件是概率论中最基本的概念.

例 1.2 在随机试验 E_1 中, A = “出现 2 点”, B = “出现 2 点或 5 点”, C = “出现奇数点”, D = “出现偶数点”, E = “点数 < 4 ”, F = “点数 ≤ 3 ”, G = “点数 > 6 ”, H = “点数 < 7 ”, 等都是随机事件, 因为它们都可表示为某些样本点的集合. 例如, $D = \{2, 4, 6\}$, $F = \{1, 2, 3\}$, 等等. 其中, 只有 A 是基本事件, 而除了 A 与 G 之外, 其他都是复合事件.

在任何随机试验中都有两个特殊的事件值得注意, 一个是每次试验都会发生的事件, 称为必然事件, 如上面例 1.2 中的事件 H . 另一个是每次试验都不会发生的事件, 称为不可能事件, 如上面例子中的事件 G . 必然事件与不可能事件可以说不是随机事件, 但我们仍然把它们看作随机事件, 这将会有问题的讨论带来方便.

在上面的讨论中,值得注意的是:

(1) 随机试验 E 的任一事件都对应于 E 的样本空间 Ω 的一个子集.

基本事件是由单个样本点构成的集合,复合事件是由多个样本点构成的集合.因为不可能事件不含有任何样本点,所以不可能事件对应于空集 \emptyset .而必然事件是由所有的样本点构成的集合,所以必然事件对应于全集 Ω (即样本空间).

(2) 样本点 ω 属于事件 A ($\omega \in A$) 与事件 A 发生是等价的,即:

$$\omega \in A \Leftrightarrow A \text{发生}.$$

因为样本点 ω 表示试验的结果,若试验结果 $\omega \in A$,则表示事件 A 发生了;反之,若事件 A 发生了,显然也必有试验结果 $\omega \in A$.

例如,在上面掷一颗骰子的试验 E_1 中,事件 $B = \{2, 5\}$,显然, $2 \in B$,因此当掷骰子出现点数 2 时,事件 B 发生了;反之,若事件 B 发生了,则试验结果 ω 只能是 2 或 5.而无论 ω 是 2 还是 5,都有 $\omega \in B$.

同样,样本点 ω 不属于 A ($\omega \notin A$) 与事件 A 不发生也是等价的:

$$\omega \notin A \Leftrightarrow A \text{不发生}.$$

1.2 事件的运算和关系

如上所述,一个随机试验 E 联系着多个随机事件,这些随机事件都是试验 E 的样本空间的子集.因此,像集合之间的关系和运算一样,我们也可以讨论事件之间的关系和运算,讨论如何用简单事件表示复杂事件,为研究复杂事件的规律性作准备.

1.2.1 事件的运算

设 E 是随机试验, Ω 是 E 的样本空间, A, B, C 及 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是 E 的随机事件.

1. 事件的和

事件“ A 与 B 至少有一个发生”称为事件 A 与 B 的和,记为 $A \cup B$.即

$$A \cup B = \{\omega \mid \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B\}.$$

一般地,事件“ A_1, A_2, \dots, A_n 至少有一个发生”称为这 n 个事件的和,记为 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$,简记为 $\bigcup_{i=1}^n A_i$.类似地,事件的和也可以推广至可列无穷多个事件的场合,称事件“ $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 中至少有一个发生”为这可列个事件的和,记为 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$.

例如,在例 1.2 中,我们有 $A \cup C = \{1, 2, 3, 5\}$, $C \cup D = \Omega$.

2. 事件的积

事件“ A 与 B 同时发生”称为事件 A 与 B 的积,记为 $A \cap B$ 或 AB . 即

$$AB = \{\omega \mid \omega \in A \text{ 且 } \omega \in B\}.$$

一般地,事件“ A_1, A_2, \dots, A_n 同时发生”称为这 n 个事件的积,记为 $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ 或 $A_1 A_2 \dots A_n$,简记为 $\bigcap_{i=1}^n A_i$. 类似地,事件的积也可以推广至可列无穷多个事件的场合,称事件“ $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 同时发生”为这可列个事件的积,记为 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$.

例如,在例 1.2 中,我们有 $C \cap D = \emptyset$, $B \cap D = A$.

3. 事件的差

事件“ A 发生而 B 不发生”称为事件 A 与 B 的差,记为 $A - B$. 即

$$A - B = \{\omega \mid \omega \in A \text{ 且 } \omega \notin B\}.$$

例如,在例 1.2 中,我们有 $B - C = A$, $E - C = A$.

1.2.2 事件的关系

1. 包含关系

若事件 A 发生必然导致事件 B 发生,即 $\omega \in A \Rightarrow \omega \in B$,则称事件 A 含于事件 B ,或称事件 B 包含事件 A ,记为 $A \subset B$ 或 $B \supset A$. 这时事件 A 的样本点一定都在事件 B 中.

易见

$$A \subset B \Leftrightarrow AB = A \cup B = B.$$

在例 1.2 中, A =“出现 2 点”含于 B =“出现 2 点或 5 点”,即 $A \subset B$. 若事件用样本点的集合表示,则 $A = \{2\}$, $B = \{2, 5\}$. 显然也有 $A \subset B$.

2. 相等(等价)关系

若 A 发生一定导致 B 发生,同时 B 发生也一定导致 A 发生,则称事件 A 与 B 相等(或等价),记为 $A = B$. 即

$$A = B \Leftrightarrow A \subset B \text{ 且 } B \subset A.$$

在例 1.2 中,事件 E =“点数小于 4”与事件 F =“点数小于或等于 3”相等,即 $E = F$.

3. 互不相容(互斥)关系

若事件 A 与 B 不可能同时发生, 即有 $AB = \emptyset$, 则称事件 A 与 B 互不相容(或互斥).

一般地, 如果 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 两两互不相容, 则称它们互不相容, 即

$$A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 互不相容} \Leftrightarrow A_i A_j = \emptyset, \quad i \neq j.$$

同样, 如果可列个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互不相容, 则称它们互不相容.

在例 1.2 中, 事件 A 与 C 是互不相容的. 任意一个试验的所有基本事件也是互不相容的.

我们约定, 若事件 A 与 B 互不相容, 则它们的和记为 $A+B$, 若 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 互不相容, 则它们的和记为 $A_1+A_2+\dots+A_n$ 或 $\sum_{i=1}^n A_i$, 即当用符号“+”或“ \sum ”表示事件的和时, 隐含了参与求和的事件是互不相容的.

4. 对立(互逆)关系

若事件 A 与 B 有且仅有一个发生, 则称 A 与 B 为对立事件(或互逆事件). 即

$$A \text{ 与 } B \text{ 对立} \Leftrightarrow A \cup B = \Omega \text{ 且 } AB = \emptyset.$$

这时也称 A 是 B 的对立(逆)事件, 或 B 是 A 的对立(逆)事件, 记为 $A=\bar{B}$ 或 $B=\bar{A}$. 显然有 $\bar{\bar{A}}=A$.

事件的对立关系与事件的减法运算有密切的关系. 一方面, 一个事件 A 的对立事件实际上就是样本空间 Ω 与事件 A 的差, 即有

$$\bar{A} = \Omega - A.$$

另一方面, 事件 A 与 B 的差总是等于 A 与 B 的对立事件的乘积, 即总有

$$A - B = A\bar{B}.$$

在例 1.2 中, 事件 C 与 D 是相互对立的, 即 $C=\bar{D}$ 或 $D=\bar{C}$.

若用平面上一矩形区域表示样本空间 Ω , 矩形区域内的点表示样本点, 两个小圆分别表示事件 A 和事件 B , 则事件间的关系和运算可以用几何图形直观地表示出来. 这种图称为维恩(Venn)图. 图 1.1 给出了 $A \subset B, A \cup B, A \cap B, A - B, \bar{A}$ 以及 $AB = \emptyset$ 的维恩图.




图 1.1

熟悉集合论的读者会发现,上面介绍的事件之间的运算和关系与集合之间的运算和关系是完全类似的.为了帮助大家更好地理解这些概念,现将集合论的有关结论与事件的运算和关系的对应情况列于表 1.1 中.

表 1.1

符 号	集 合 论	概 率 论
Ω	全集	样本空间或必然事件
\emptyset	空集	不可能事件
ω	集合的元素	试验的结果(样本点)
$\omega \in A$	ω 是集合 A 的元素	事件 A 发生
$A \cup B$	集合 A 与 B 的并集	A 与 B 的和(A 与 B 至少一个发生)
$A \cap B$	集合 A 与 B 的交集	A 与 B 的积(A 与 B 同时都发生)
$A - B$	集合 A 与 B 的差集	A 与 B 的差(A 发生而 B 不发生)
$A \subset B$	A 是 B 的子集	A 含于 B(A 发生导致 B 发生)
$A = B$	集合 A 与 B 相等	事件 A 与事件 B 相等
\bar{A}	集合 A 的补集	A 的对立事件
$AB = \emptyset$	集合 A 与 B 不相交	A 与 B 互不相容

1.2.3 事件的运算法则

事件的运算法则与集合之间的运算法则是类似的,我们列出如下:

- (1) 交换律: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$;
- (2) 结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;
- (3) 分配律: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$;
 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$;

(4) 德摩根(De Morgan)对偶律: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

分配律和对偶律都可以推广至有限个或可列个事件的情形. 例如, 对于分配律, 有

$$\begin{aligned} (\bigcup_{i \in I} A_i) \cap B &= \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B), \\ (\bigcap_{i \in I} A_i) \cup B &= \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B), \end{aligned}$$

其中 I 是有限指标集或可列指标集.

例 1.3 对同一目标连续射击三次, 记

$$A_i = \{\text{第 } i \text{ 次击中目标}\}, \quad i = 1, 2, 3.$$

$$B_j = \{\text{恰好有 } j \text{ 次击中目标}\}, \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

$$C_k = \{\text{至少有 } k \text{ 次击中目标}\}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

则有

$$B_0 = \overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3},$$

$$B_1 = \overline{A_1} \overline{A_2} A_3 + \overline{A_1} A_2 \overline{A_3} + A_1 \overline{A_2} \overline{A_3},$$

$$B_2 = A_1 A_2 \overline{A_3} + A_1 \overline{A_2} A_3 + \overline{A_1} A_2 A_3,$$

$$B_3 = A_1 A_2 A_3.$$

$$C_0 = B_0 + B_1 + B_2 + B_3 = \Omega,$$

$$C_1 = B_1 + B_2 + B_3 = A_1 \cup A_2 \cup A_3,$$

$$C_2 = B_2 + B_3 = A_1 A_2 \cup A_2 A_3 \cup A_3 A_1,$$

$$C_3 = B_3 = A_1 A_2 A_3.$$

1.3 古典概型与几何概率

如上所述, 随机事件在一次试验中可能出现, 也可能不出现, 呈现出随机性. 但在多次重复试验或观察时, 它却呈现出明显的规律性. 人们在大量的重复试验中发现, 随机现象的发生是有规律的, 随机事件出现的可能性大小也是能够计量的. 研究随机现象的目的, 就是要获得随机现象各种可能结果发生的可能性大小的度量. 对于一个随机事件 A , 用一个数 $P(A)$ 表示事件 A 发生的可能性的大小, 这个数就称为事件 A 的概率. 因此, 概率即是随机事件发生可能性大小的度量. 研究随机现象时, 只讨论它可能出现什么结果价值不大, 而指出各个结果(事件)出现的概率则具有更大的意义.

1.3.1 古典概型

在讨论一般的随机现象之前, 先讨论一种最简单的随机现象.

定义 1.1 设随机试验 E 的样本空间 Ω 是只含有 n 个样本点的有限集合, A 是由其中 m 个样本点组成的随机事件. 如果 Ω 中的每个样本点的出现具有等可能性, 则称

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{事件 } A \text{ 的有利场合数}}{\text{样本点总数}} \quad (1.1)$$

为事件 A 的概率, 其中事件 A 的有利场合是指 A 所含有的基本事件. 按等可能性的假定容易理解上述定义的合理性.

这种随机现象在概率论发展的初期首先受到注意, 得到了较多的讨论和研究. 一般把这类随机现象的数学模型称为**古典概型**, 而其中概率的定义(1.1)式称为**概率的古典定义**. 古典概型在概率论中占有重要的地位, 对它的讨论有助于直观地理解概率论的基本概念.

例 1.4 掷一颗均匀对称的骰子, 分别求下列事件的概率:

(1) A = “出现 6 点”; (2) B = “出现偶数点”.

解 样本空间为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 由于骰子是均匀对称的, 因此各个样本点出现的概率相等. 故此试验可看作古典概型. 因为 $A = \{6\}$, 于是由古典概率的定义有 $P(A) = \frac{1}{6}$; 而 $B = \{2, 4, 6\}$, 故事件 B 的概率为 $P(B) = \frac{3}{6} = 0.5$.

例 1.5 一部四册的文集随机地放到书架上去, 问各册自左向右或自右向左恰成自然顺序的概率是多少?

解 这本四册的文集在书架上共有 $4! = 24$ 种不同的排列方式, 由于文集是随机地放到书架上去的, 因此这 24 种排列中出现任意一种的可能性都相同, 因此这是古典概型问题. 其有利场合有两种, 即自左向右或自右向左恰成 1, 2, 3, 4 顺序. 因此所求概率为 $\frac{2}{24} = \frac{1}{12}$.

例 1.6 用 0, 1, 2, …, 9 共 10 个数字中的任意两个组成一个两位数的字码(可重复使用), 求字码和为 3 的概率.

解 这是古典概型问题. 样本空间中共有 $10 \times 10 = 100$ 个样本点, 而有利场合有四种: 03, 12, 21, 30. 因此所求概率为 $\frac{4}{100} = 0.04$.

例 1.7 一枚均匀对称的骰子抛掷两次, 事件 A 表示“点数和为 10”, B 表示“点数和为 12”, C 表示“第一次出现奇数点”, 试求事件 A, B, C 的概率.

解 样本空间共含有 $6 \times 6 = 36$ 个样本点, 即 $\Omega = \{(i, j) | i, j = 1, 2, \dots, 6\}$. 而每个样本点 (i, j) 出现的可能性相同, 这是古典概型问题. 因为 $A = \{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}$, 故 $P(A) = 3/36 = 1/12$. 同样可以求出, 点数和为 12 的概率 $P(B) = 1/36$. 不难看出事件 C 含有 18 个基本事件, 即事件 C 的有利场合为 18 种, 因此

$$P(C) = 18/36 = 0.5.$$

在例 1.7 中,若取样本空间 $\Omega' = \{2, 3, 4, \dots, 12\}$, 即一切两次抛掷的点数之和,则会得出 $P(A) = P(B) = 1/11$ 的错误结果. 出现错误的原因是样本空间 Ω' 中各样本点的出现不具有等可能性,因此不能用古典概型方法计算事件的概率. 类似例子还有抛掷两枚均匀对称的硬币,若选取样本空间 $\Omega'' = \{\text{两个正面}, \text{一正一反}, \text{两个反面}\}$, 则会得出出现两个正面的概率是 $1/3$ 的错误结果. 出现错误的原因同样是样本空间 Ω'' 中各样本点的出现不具有等可能性,因此不能用古典概型方法计算事件的概率. 为了应用古典概型解决问题,正确的样本空间应当取为 $\Omega = \{(\text{正, 正}), (\text{正, 反}), (\text{反, 正}), (\text{反, 反})\}$, 因此出现两个正面的概率应是 $1/4$. 所以在解决这一类概率问题时,如何选取正确(即具有等可能性)的样本空间是重要的.

下面研究产品的抽样问题. 产品抽样通常有以下两种不同的方式:(a)每次任取一件,观察后放回箱中,再进行下一次抽取. 这种抽取方式称为有放回抽样;(b)每次任取一件,观察后不放回,在剩余的产品中进行下一次抽取. 这种抽取方式称为无放回抽样.

例 1.8(抽样检验) 假设箱中有 100 件外形相同的同批产品,其中 40 件为不合格品,其余 60 件为合格品. 现分别用有放回及不放回两种抽样方式从这批产品中随机地进行 3 次抽样,问其中恰有两次抽到不合格品的概率是多少?

解 显然这是古典概型问题. 记 A 为事件“3 次取样恰有两次取到不合格品”.

(1) 有放回抽样:此时,样本点总数为 $n=100^3$,事件 A 的有利场合数 $m=C_3^2 \times 40^2 \times 60$,故

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_3^2 \times 40^2 \times 60}{100^3} = 0.288.$$

(2) 无放回抽样:此时,样本点总数 $n=100 \times 99 \times 98$,而有利场合数 $m=C_3^2 \times 40 \times 39 \times 60$,故

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_3^2 \times 40 \times 39 \times 60}{100 \times 99 \times 98} = 0.289,$$

或

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_{40}^2 C_{60}^1}{C_{100}^3} = 0.289.$$

一般说来,采用有放回抽样或无放回抽样计算事件的概率时,结果是不一样的. 特别,当被抽取对象的数目较少时,差异会比较大;但当被抽取对象的数目较大,而抽取的数目又较少时,按照两种抽样方式所计算的概率数值相差不大. 这一事实已由本例的计算结果清楚地显示出来.