

影印
文淵閣

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第七五八冊

北京出版集團公司
北京出版社

本冊目次

欽定四庫全書

子部
醫家類
普濟方卷之二十一

普濟

方(二二)

明朱橚撰……………一

普濟方卷之二十一	明朱橚撰
經脈諸病門	
一 通利	
夫有夫病則有父子孫婦姑之疾者及明婦諸症大綱不	
大端之條條為大者一綱綱之至重也凡如求子者失	
宗夫婦有疾者傳世者之憂惟方綱治經內外和平則	
夫婦人皆方者矣普濟方之方者為婦女之方也陰	
生有法者乃為方也經水不調也經水之合三情夫婦陰血	
充足則精氣神血調和諸陰內外均陽精氣至陰血盛	
主精調養此內外均而陰合陽和而女體以長陽者陰	
和乃乃物成乃為方也經水不調也經水之合三情夫婦	
二 八新製滋陰丸三十而年者三十二而年者五而二十	
而年者三而年者皆然經水不調而年者而年者而年	
僅完經水不時早洩早洩而年者而年者而年者而年	

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百三十六

詳校官八醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣張魯秀

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六 明 周王朱櫨 撰

妊娠諸疾門

胎嗣 附論

夫有夫婦則有父子婚姻之後必求嗣續故聖人謂不
孝有三無後為大者言嗣續之至重也凡欲求子當先
察夫婦有無勞傷故害之屬依方調治便內外和平則
夫婦人樂有子矣 素問云天地者萬物之父母也陰
陽者血氣之男女也有夫婦則有父母婚姻之後則有
生育生育者人倫之本也且男女之合二情交暢陰血
先至陽精後衝血開聚精陰外陽內陽精先至陰血後
生精開聚血陽外陰內陰含陽胎而女形成矣陽含陰
胎而男形成矣若夫受形之異者男女必當其年男子
二八精氣溢瀉必三十而娶女子二七天癸至必二十
而嫁欲其二氣充實然後交合交而孕孕而育育而壽
儻若婚嫁不時真氣早泄未完而傷是以交而不孕孕

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

而不育而不壽者多矣以此觀之男女婚嫁貴乎及時夫婦貴乎益壯則易於受形也且父少母老生女必羸母壯父衰生男必弱誠有斯理或男子真精氣不濃婦人血衰而氣旺是謂夫病婦疹皆使人無子治療之法女子當養血抑氣以減喜怒男子益腎生精以節嗜欲依方調治陰陽平和則婦人易有子矣 又曰無子者蓋有三焉一者墳墓不嗣二者夫婦年命相尅三者夫病婦疹皆令無子若是墳墓不嗣年命相尅此二者非藥能

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

二

益若夫病婦疹須用藥餌乃能有効也然婦挾疾無子皆由勞傷血氣生病或月經閉澀或崩泄帶下致陰陽之氣不和經血不行乖候故無子也診其右手關後尺脉浮浮則為陽陽脉絕無子也尺脉為濡中年得此為絕產也少陰脉如浮緊則絕產後惡寒尺寸俱微弱者則絕產也又有因將攝失宜飲食不節乘風取冷或傷過度致冷風之氣乘其經血結於子臟結冷故令無子也 凡婦人二三十而無子經血如常或有時經血不

調者乃陰不升而陽不降此上下不得交通有所滯礙

不能為用故也可用獨聖散瀉訖寒痰三二升後用導水丸禹攻散泄三五行或十餘行單用無憂散泄十行處寒熱虛實用之次服葱白粥三五日胃氣宜通腸中得實可服玉燭散更服白朮散茯苓之類降火益水既濟之道當不數月而有孕成胎內經曰婦人有癰痔遺溺嗑乾諸證須服妙藥針灸亦終不能孕蓋衝脉腎脉任脉有此病故不孕也 婦人所以無子者衝任不足腎

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

三

氣虛寒也內經云女子二七天癸至任脉通太衝脉盛陰陽和故能有子若衝任不足腎氣虛寒不能繫胞故令無子亦有本於夫病婦疹者當原其所因而調治之要之男服七子散女服紫石門冬丸及坐導藥盪胞湯無不有子也

方

秦椒丸

出聖惠方

治婦人斷緒生來未產盪滌臍臟使玉

門受紫精子臟風虛冷氣致陰陽二氣不能和合故

今久無子

秦椒 白朮各三沙參 露蜂房 鼠婦 桃仁

卷栢 細辛 白殭蠶 牡蒙 石斛 甘草

蕪荑各一牛膝 人參 芍藥 牡丹皮 大黃

桔梗 栢子仁 桂心 玄參 白薇 茯苓

天雄各十黃芪 五味子 當歸 白芷 蟾蜍

白欬 乾薑各一澤蘭 乾地黄 芎藭各一水蛭各一

乾漆 白石英 附子各二鍾乳二兩水蛭七枚

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

紫石英 蘇布叩復頭七尺 蟲蟲一百枚

右為細末蜜為丸如梧桐子大酒服日再稍加至二

十九若有所去如豆汁鼻涕此是病出覺有異日即

停一方無鼠婦

栢子仁丸出聖 治婦人子臟虛冷產後續斷無子多

時

栢子仁 澤蘭 防風去蘆 當歸剉碎 白石英細研

水蛭飛 厚朴去麁皮塗生 熟乾地黄 牛膝去苗各

杜仲去麁皮炙 乾薑炮製 紫石英細研水 川椒去目

及閉口者微 甘草炙微赤 細辛 白朮 蕪荑

桂心 赤石脂細研 人參去蘆 石斛去根 桔梗去蘆

肉蓯蓉 白芷 龍骨 五味子 白芍藥 藁

本 防葵 白茯苓 鍾乳粉二兩 獨活 秦朮

黃芪各一

右為末入研藥料多研令勻煉蜜和丸梧桐子大每

服三十九丸空心晚溫酒下

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

白薇丸出聖 治婦人子風臟虛積冷經絡不調面無

血色肌肉消瘦不能飲食及帶下久無子

白薇 細辛 防風 人參 秦朮 秦椒 白

欬一云 桂心 牛膝 蕪荑 沙參 芍藥 五

味子 白殭蠶 牡丹 蟾蜍各一 乾漆 栢子

仁 乾薑 卷栢 附子 芎藭各十 桃仁 紫

石英各一 鍾乳 乾地黄 白石英各三 鼠婦各

水蛭 蟲蟲各十 吳茱萸十八 蘇布叩復頭一尺

右為末蜜為丸如梧桐子大酒服十五九日再稍加至三十九當有所去小覺有異即停服

又方 出千金方一名白薇丸 治久無子或斷緒上熱下冷百病

皆治之

白薇 乾地黄 乾薑 車前子 蜀椒 紫石

英 藁本 石膏 菴蘭子 卷柏 各三銖 澤蘭

赤石脂 白龍骨 遠志 麥門冬 茯苓 太

乙餘糧 各三兩 當歸 芎藭 蛇床子 白芷 覆

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六

盆子 桃仁 人參 各一兩半 桂心 蒲黃 各二兩半 細辛

三橘皮兩

右為末蜜和為丸如梧桐子大酒服十五九日再漸

增以知為度亦可至五十九慎猪鷄生冷酢滑魚蒜

驢馬牛肉等覺有娠即停三月正擇食時可食牛肝

及心至四月五月不用

廣膚丹 出御藥院方 治久無子息

黃芪 剉細一兩半 人參 上黨者去苗 川續斷 剉 澤蘭葉 去熟枝

地黃 焙 牡丹皮 淨 延胡索 白芍藥 川芎 白

薇 嫩鹿茸 煅去毛酥酒炙乾另研稱 白茯苓 去皮常歸去苗洗切焙乾 防風 去苗尾葉本葉 丹皮

乾肉蓯蓉 酒浸軟切焙乾 華細辛 去苗葉土細搗羅過 蓬莪茂 京三稜 二味和白麵細搗羅過

以上各一兩 乾薑 炮製一兩半 木香 山茱萸 肉

桂 去麋皮各半兩 黑附子 炮製去皮臍二錢 甘草 剉炒 覆盆子 去枝各

兩二

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一粒空心食前

細嚼溫酒下日進三服有孕住服昔有人常服此藥

而生七男以此常合與人服而皆應也

白薇丸 療百病斷絕緒產

白薇 細辛 厚朴 椒 炒出汗 桔梗 鱉甲 炙各五分

防風 大黃 附子 炮 石硫黃 研各六分 人參 桑上

寄生 各四分 半夏 牡蒙 白殭蠶 續斷 秦朮

紫苑 杜蘅 牛膝 蟲蟲 去翅足熬 水蛭 紫石英

研 朴硝 桂心 鍾乳 當歸 各八分

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六

右擣篩蜜丸空心服溫酒下如梧桐子大十五九日

二漸加至三十九不吐不利忌生冷油膩餵生血物

大莧生葱生菜猪肉冷水粘食陳臭

紫石門冬丸

出聖惠方

治婦人久無子及數經墮胎皆因

衝任之脉虛損胞內宿寒疾病經水不時暴下不止

月內再行或月後子宮臟積冷虛羸百病崩漏帶下

三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小腹急重小便白濁

以上疾症皆令孕育不成以至絕嗣不孕此藥並能

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六

主療常服除瘀血溫子臟令有孕臨產易生子及生

子充實無病

紫石英

天門冬

各三兩

當歸

芎藭

紫苑

卷

栢桂心

烏頭

乾地黄

牡蒙

一作牡荊子

禹餘糧

石斛

辛夷

各二人

參

桑寄生

續斷

細辛

厚朴

乾薑

食茱萸

牡丹

牛膝

各三兩

銖栢仁

一兩

薯蕷

烏賊骨

甘草

右為末蜜和丸如梧桐子大酒服十五九漸增至三

十九以腹中熱為度不禁房室丈夫出外不可服藥

或溫米飲下空心食前日二服

七子散

出大全良方

治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補

不足兼治婦人無子皆因五癆七傷虛羸百病所致

五味子

鍾乳粉

牡荊子

兔絲子

車前子

蔞藟子

石斛

乾地黄

薯蕷

杜仲

鹿茸

遠志

各八銖

附子

蛇床子

芎藭

各六銖

天雄

人參

茯苓

黃芪

牛膝

各五銖

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六

肉蓯蓉

十一銖

巴戟天

十二銖

右為末酒服方寸匕日二不瘥增二匕以知為度禁下如

藥法不能酒者蜜和丸服亦得一方加覆盆子八銖

女服紫石英丸

紫石英

砂鍋盛之以石掩口火焙紅

禹餘糧

熟地黄

湯洗淨酒蒸焙

辛夷仁

紫桂

去皮不見火

卷栢

石斛

去皮剉酒炒

斷栢子仁

川烏

炮去臍剉

川芎

海螵蛸

醋炒

皮

川當歸

去蘆酒洗粉草

炙各一兩

桑寄生

華陰細辛

山藥 吳茱萸 乾薑 炮各半 人參 七錢 天門冬 去心

一兩 紫朴 去皮薑汁塗炙

右為細末醋糊為丸如桐子大每服七十九至百九空心米飲吞下以腹中熱為度不禁房事夫出不可服盡劑當有姙

卷栢丸 治婦人子臟冷久無子由風寒邪氣客於經絡

絡

卷栢 牡蒙 藁本 當歸 剉碎炒熟 地黃 栢子

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六

仁 乾薑 炮製剉 禹餘糧 燒醋淬七通 白薇 以上各一兩 芎藭

人參 去蘆頭 五味子 石斛 去根剉 桂心 附子 炮製去皮

防風 去蘆頭 吳茱萸 湯浸七通焙乾微炒 甘草 炙微赤剉 牛膝 去苗

桑寄生 川椒 去目及開口者微炒去汗以上各三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心及晚食前

以溫酒下三十九

紫石英丸 治婦人久無子由于臟久積風冷陰陽不

能施化

紫石英 細研水飛過二兩 細辛 桔梗 去蘆頭 厚朴 去蘆皮

汁炙 防風 去蘆頭 川大黃 剉碎微炒 川椒 去目及開口者微炒 附

子 炮製去皮臍 硫黃 細研 白薇 當歸 剉碎微炒 桂心 各一兩 鱉

甲 二兩半生用 牡蒙 人參 去蘆頭 桑寄生 半夏 湯洗七通

去滑用 白蠶 微炒續斷 紫苑 洗去苗土 杜蘅 牛膝 去苗

各一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心及

晚食前溫酒下

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六

養真丸 治婦人血虛氣憊陰不升降久不成妊娠

鹿茸 當歸 肉蓯蓉 禹餘糧 兔絲子 覆

盆子 熟地黃 紫石英 桑螵蛸 各二兩 五味子

真琥珀 白石藥 川芎 桑寄生 卷栢 艾

葉 川薑 堅茯苓 人參 牡蠣 酸棗仁 各一兩

兩 鍾乳粉 兩四

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大食前溫酒吞下五

十九日三服喫後用粥飯壓之

白薇九 治補調衝任服溫暖子宮治胞絡傷損宿受

風寒久無子或受胎不牢多致損墮久服去下藏風

冷令人有子

白薇去苗牡蒙 蒙本各五 薑黃 當歸去苗 熟地

黃各七 川芎 栝子仁微炒 石斛去根 桂心去皮 附子

炮去皮 五味子去梗 防風去苗 甘草炙 川牛膝去苗 吳

茱萸湯浸七次 桑寄生各六 秦椒分禹餘糧八

右為末煉蜜九如梧桐子大空心酒下三十九日二

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

服忌生菜葱蒜麵蕎麥蒜猪肉炙煨葵菜蕪荑松菜

海藻粘食臭物一方有紫參無牡蒙米飲亦得饒覺

妊娠即住服已懷孕者尤不宜服之

白薇九 治婦人無子斷緒上熱下冷飲食減退肢體

黃痺凡有一切疾病皆主之

白薇 熟地黃 川椒去目及開口 白龍骨各一

車前子 當歸微炒 芎藭 蛇床子 細辛 乾

薑地梨剉各半兩 藁本 桂心 卷栢 白芷 覆盆子

菖蒲 人參去蘆 桃仁湯浸去皮尖 白茯苓

遠志去心三分 麥門冬去心焙

右為細末煉蜜和九如梧桐子大每服三十九空心

及晚食前溫服

續嗣降生丹 治婦人稟受氣弱胎臟虛損子宮冷億

血寒痼冷難成子息功效如神

當歸 桂心 龍齒 烏藥真天台 益智 杜仲

石菖蒲 吳茱萸各一兩 茯神 川牛膝 秦艽

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

細辛 苦桔梗 半夏 防風 白芍藥各三 乾

薑一兩半 川椒三兩 附子一隻重八錢者

大入硃砂一錢 牡蠣一大斤要取 附子心作一竅如良子

重洗麵裹煨 用童子小便浸四十九日五

日一換取出用硫黃末一兩半醋塗過却用皮紙

裹又用米醋浸令紙濕鹽泥厚固清乾用炭五觔

每遇合藥八二兩餘 者留後次合藥用

右為細末取附子入內硃砂別研為細末糯米糊為

丸如梧桐子大每服三十九至百九空心吞淡醋溫

酒鹽湯俱可送下一日二服 此藥兼療男子精氣

不固陽事衰弱白濁夢泄及治婦人血虛帶下肌瘦
寒熱但是男女諸虛百損客熱盜汗氣短乏力面無
顏色飲食少味並皆治之更有奇效難以具述君子
宜預行善事調服此藥無不感應

秦桂丸出仁存方 治婦人無子

秦朮 桂心 杜仲炒 防風 牡丹皮 厚朴薑汁

炒各三分 附子 陽起石服 白茯苓各一兩半 白薇 人參

卷柏 鹿茸各一兩 細辛二分

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

高

右各為末以蜜和丸如梧桐子大每服三四十九溫

酒下食前服

朴硝鹽胞湯出聖惠方 治婦人破身以來全不產及斷緒

久不產三十年者

朴硝 牡丹皮 當歸 大黃 桃仁生用全細

辛 厚朴炙 桔梗 人參 赤芍藥 茯苓 桂

心 甘草 牛膝 橘皮各二銖 附子六銖去微

熱水蛭各十枚炙

右咬咀以清酒五升水五升合煮取三升分四服日

三夜一每服相去三時更服如常覆被取少汗不出

冬日著火籠之必下積血及冷赤膿如赤小豆汁蓋

為婦人子宮內有此惡物使然或天陰臍下痛或月

水不調為有冷血不受胎若斟酌不盡氣力弱大因

不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯

冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能

忍服盡大好一日後仍著坐導藥一方不用桔梗甘

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

主

草一方無水蛭

白薇丸出千金方 治月水不利閉塞絕產十八年服此藥

二十八日有子金城太守方

白薇 細辛各三銖 人參 杜蘅 牡蒙 厚朴

半夏 白殭蠶 當歸 紫苑各十銖 牛膝 沙參

乾薑 秦朮各半兩 蜀椒 附子 防風各一兩

右為末蜜和為丸如梧桐子大先食服三九不知稍

增至四五丸此藥不可常服覺有娠即止用之大驗

一方有桔梗丹參十八銖

助陽丹 治婦人無子月經不調蓋因腹脇疼痛血塊

血癖所以不能成胎先服當歸六合散空心煎十餘

服先去敗露腹肚不疼可服助陽丹十五服必然成

胎有一婦人三十七歲無子服此藥半月有子

細辛 防風 茱萸 川椒 白芷 白欬 乾

薑 茯苓 各一兩半 牛膝 秦艽 附子 陳皮 石

菖蒲 厚朴 沙參 人參 桂心 各七錢五分

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

十六

右為細末煉蜜和丸如紅豆大每服十九溫酒下日

進三服尅日見效男子服能補益婦人服之有子覺

有孕不可服婦人無夫者不可服用壬子日修合忌

鷄犬孝服每月經後三五日淨一舉便成亦可延年

益壽

凡人家園圃內有凌霄花婦人聞其氣不孕宜服七子

丸出便產須知

五味子 一兩 兔絲子 一兩 先去灰却用酒浸
二日蒸細焙乾研用 韭子

一兩 覆盆子 一兩 去蒂酒洗蛇床子 半兩 黑附子 一兩 炮白

茯苓 半兩 原蠶蛾 一兩 肉蓯蓉 一兩 鹿茸 一兩

酒炙去毛 益志子 一兩 黃芪 半兩 遠志 半兩 湯洗

石 一兩 酒煨 熟地黃 一兩 湯洗

右為細末酒煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七十

九空心鹽酒或鹽湯下弱甚者加天雄半兩泡去皮

脚腰痠痛者加杜仲一兩去皮薑汁炒去絲石斛一

兩去根

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

十七

治婦人久無子息大有神效

茯苓 桂心 川芎 人參 當歸 各二兩 細辛 二兩

沉香 五味子 各一兩 川牛膝 沙參 白薇

琥珀 各半兩 川烏 一個 川椒 半兩 蜜 一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九溫酒

下醋湯亦得日進二服

杜蘅丸 治婦人腹臟久積風冷血氣凝澀不能宣通

故令無子

杜蘅 附子泡梨去 細辛各一 防風去 白茯苓各一

兩 白薇 牛膝去 半夏湯洗七遍 沙參去 秦艽去

去 桂心 川椒去目及開口 菖蒲 藁本 蛇床

子各半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心

及晚食前溫酒下有子即住服

杜蘅丸 治婦人無子斷緒

杜蘅三月三日麥 半夏湯洗二十遍 白薇 桔梗

欽定四庫全書 普濟方 卷三百三十六

劉附子泡梨去 牛膝切酒浸經 細辛去 蜀椒去

口并目 厚朴去 沙參去 防風去 乾薑炮 桂

去 鹿皮 各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服溫酒下三十九

漸加五十九丸早晨日午各一服

吉祥丸出 治婦人積年不孕

天麻 柳絮 丹皮 茯苓 乾地黄 桂心各一

兩 五味子 桃花 白朮 芎藭各二 覆盆子一

桃仁一百 兔絲子 楮實子各一

右為末煉蜜和丸如菰豆大每服空心以苦酒下五

九日中一服晚一服

秦桂丸一名姦斯丸 治婦人無子服有效危氏方

秦艽去 桂心不見 杜仲去 防風 厚朴各三

附子生 白茯苓各一 白薇 乾薑炮 沙參

牛膝浸 半夏各半 人參一 細辛二分

右為末煉蜜為丸如赤豆大每服三十九空心食前

欽定四庫全書 普濟方 卷三百三十六

醋湯米飲任下未效加丸數已覺有孕便不可服用

溫酒下亦得昔金城太守范羅進此方云甚驗若服

藥四十日無子請戮臣一家以為天下醫人戒其方

因張伯高學士傳云此藥諸士夫服後俱有應驗就

藥絨上書刊二句云修合者用意以誠服餌者存心

以仁不患無子也 服此如覺無益稍加丸數為度

如服七日後陰陽覺有娠此藥與前大子中舍宇文

妻李氏年四十歲無子服此藥十三日有娠此藥姦

斯九屢用屢驗此方不可不廣傳與人夫不在不可

服

扶血丸 治婦人無子

紫石英 桑螵蛸半兩 熟艾一兩 醋炙 卷柏一兩 覆盆子四兩

阿膠炒 包金土各一兩 栝子仁二兩 錢陽起石兩 熟地

黃一兩 牡蠣二兩 磁石二兩

右為末以糯米粥丸如梧桐子大每服三四十九酒

吞下

欽定四庫全書

醫方 卷三百三十六

禹餘糧湯 治婦人胞胎寒冷絕產無子

禹餘糧七兩 白殭蠶去黑微煨 烏賊骨去甲皮各一兩 龍骨研碎

桂去皮 竈下黃土無灰者 石韋去毛炒 乾薑炮 滑石研

赤芍藥 半夏藥水浸一宿生絹袋子盛洗去滑切開生薑汁炒黃 代赭頭釘

者研各半兩

右搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至六分去

滓食前溫酒服

陽起石出危氏方 治丈夫真精氣不濃不能施化是以

無子

陽起石火煨紅研細 鹿茸燎去毛酒蒸培 兔絲子水淘淨酒浸蒸培別研

天雄地皮去 韭子炒 肉苁蓉酒浸各一兩 覆盆子酒浸 石斛

根桑寄生 沉香別研 原蠶蛾酒炙 五味子各半兩

右為細末酒煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七十

丸空心鹽湯或溫酒下

紫石英出大全良方

紫石英 阿膠 當歸 川芎 赤芍藥 川續

欽定四庫全書

醫方 卷三百三十六

斷各一兩 鹿茸 白朮 桂心各半兩 栝子仁二兩 熟地

黃三兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心溫酒下二十九

兼治虛中有熱頭旋暈足如履空嘔吐不食月水不

調或多或少皆虛症也久服能生髮令有子更治虛

悸常若憂思皆心血不足空虛所致也

調經散出便產須知 療月候不調或在月前或在月後或

多或少或逾月不至或一月兩來以此不孕

吳茱萸一兩去閉目者半夏一兩湯洗過三次當歸一兩酒洗去蘆

人參 麥門冬一兩白芍藥者南京川芎色如丹皮

去厚朴見火阿膠料粉炒甘草一

右咬咀每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分去

滓食前稍熱服月候調月月如期而來按時而止則

當有孕 欲娠月候調均顏色肌膚如常但若沉重

煩悶不欲飲食又知患之所在脉又平和是欲妊也

如此兩月後經或不通則結子矣 既妊之後多病

欽定四庫全書

普濟方 卷三百三十六

五

惡阻婦人怯弱有風氣痰飲則病其狀沉重昏眩惡聞食氣喜啖酸酸甚則寒熱心煩嘔痰恍惚不能支持輕者不服藥亦不妨重者須服藥

洗訖九 治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墮

澤蘭葉 白朮各一兩半肉桂去麋皮乾薑炮各兩熟地黃

煨當歸洗焙各二兩石斛酒浸剉炒川芎 白芍藥 牡丹

皮去心延胡索各一兩

右為細末醋麵糊為丸如梧桐子大每服五十九溫

酒空心下一方無乾薑肉桂白朮有白薇人參

坐導藥方 夫求子服藥者須有次第不得不知其次

第謂男服七子散女服盪胞湯及坐導再服紫石門

冬丸則無不效矣

皂莢一兩炙去皮子大黃 戎鹽 礬石燒當歸各二兩五

味子 乾薑各三兩細辛三兩蜀椒炒出汗葶藶子

苦瓠各三分一方作山茱萸

右為末搗篩內輕絹袋子如中指大長三寸盛之令

欽定四庫全書

普濟方 卷三百三十六

五

滿內子門中坐任意勿行走欲小便時即出之便後仍納一日當有青黃冷汁汁盡即止可交合自有子若未見病出亦可至十日安其本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷即發疼痛須候病出盡方已不可中輟每日早晚用苦菜葉煎湯薰洗一方無葶藶一方有砒霜三分著藥後一日乃服紫石門冬丸

鍾乳九 治婦人斷緒無子

鍾乳研白礬燒令汁盡阿膠炙令燥紫石英研蜀椒

去目及開口者炒去汗 生地黃焙 五味子炒 蛇床子炒 原蠶炒

蛾炒 石亭脂研極細各半兩

右除石藥別研外餘藥為末和勻煉蜜和搗丸如梧

桐子大每服空心煖酒下二十九漸加至三十九

慶雲散 治丈夫陽氣不足不能施化

覆盆子 五味子各一升 兔絲子二升 天雄一兩 石斛二兩

白朮各三兩 桑寄生四兩 天門冬九兩 紫石英二兩

右為末篩酒服方寸匕先食服日三素不耐冷者去

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

三

寄生加細辛四兩陽氣不足而無子者去石斛加楨

榔十五枚

治婦人久無子息

吳茱萸湯浸二 白芷去毛 白欬去皮 白茯苓各三錢 細辛

去葉 牛膝去蘆 附子炮去皮脂 人參一錢 桂心一錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九用溫酒送

下食前服

治婦人子臟風冷致令無子

皂莢去黑皮塗酥炙焦黃去子 川大黃剉碎微炒 戎礬 白礬炮

歸剉碎微炒 五味子 川椒去目及開口者微炒去汗 乾薑炮

剉細辛各三分

右為末用綿裹藥末如棗大內產門中有惡物下即

止未效再用

熟乾地黃散 療久無子斷緒小腹疼痛冷氣不調

熟乾地黃 川牛膝 當歸各八分 卷柏 川芎

防風各六分 牽牛子末 桂心各三分

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

三

右咬咀以水六升煮取三升三合去滓分三服服別

和一分牽牛子末如人行四五里更進一服以快利

止忌生菜葱熱麵蕎麥蒜醋猪肉炙燂菜蕪荳松

菜海藻粘食臭物等

八真丹 治婦人無子

川當歸 芍藥 地黃 川芎 皂莢 鹿茸

阿膠炒作珠用 艾葉 續斷

右八味等分細末醋打麵糊為丸如梧桐子大每服

二十九空心好酒送下

白芷煖宮丸

出永類
鈴方

治煖血海實衝任治子宮虛弱

風寒客滯因而斷續不成孕育及穀常墮胎或帶下
赤白濁下五色頭目虛暈吸吸成氣腹若滿心下煩
悸臍腹刺痛連引腰背下血過多兩脇牽急嘔吐不
食面色青黃肌膚瘁瘦寢常自汗

禹餘糧

梨一兩
西

白薑

炮

芍藥

白芷

川椒

製

阿膠

粉艾葉

製
川芎
分各三

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

五

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九丸米飲下或
溫酒醋湯亦得常服溫補胞室和養血氣澤顏色消
散風冷退除百病自成孕性平不熱

大黃丸

出千
金方

治帶下百病無子服藥十天下血二十

日下長蟲及青汗三十日病除五十日肥

大黃

破如米豆
熬令黑

柴胡

朴硝

乾薑

各一升
芎藭五兩

蜀椒

一兩
如雞子
大一枚

右為末蜜和丸如梧桐子先食服七丸米飲下加至

十九以知為度五日微下

治婦人無病觸禁久不生子

出肘
後方

右常為月候月水絕後一日交接為男二日交接為
女三日為男四日為女五日為男六日為女過此不成
成勿復交接更待後月徒然無益浪辛苦也宜用後方
栢子仁丸

出肘
後方

大黃

七分
紫參五分

皂莢

杏仁

吳茱萸

各三分

半夏

前胡

各二分

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

五

右搗篩煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸不過半
年有如前法即定男女也

治婦人不育者

胡椒

二艾一兩
為末

熟鹽

花椒

半兩
為末

砂仁

官桂

茴香

各半兩

右為末裝入猪肚內縫合煮熟每日清晨割二兩好
酒三五盞服之肚腹熱使能有孕

承澤丸

出千
金方

治婦人下焦三十疾不孕絕產