



最佳畅销书

2015

全国卫生专业
技术资格考试权威推荐用书
护理学专业(主管护师)考试

通关必做2000题

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写

(第三版)

权威专家精心打造，精选试题再现命题规律，名家解析指引答题迷津，融会贯通提升复习效果。致力于为考生提供最优秀的辅导用书，是医药科技人不懈的追求



中国医药科技出版社

2015 全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书

护理学专业(主管护师)考试 通关必做2000题

(第三版)

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书的策划理念是帮助忙碌的护理考生花最少的时间轻松突破护考的堡垒而快速过关取胜,因此高效性、趣味性和针对性成为本书追求的最高境界。围绕“学会做善于考试的白衣天使”这一目标,按照最新大纲和考试要求,参照历年真题,精心挑选考题,对难题、偏题和怪题做了解析,有助于考生强化记忆、提高答题技巧,帮助考生灵活应对考试、顺利通关。是参加 2015 主管护师考试考生的必备辅导书。

图书在版编目(CIP)数据

护理学专业(主管护师)考试通关必做 2000 题/卫生专业技术资格考试研究专家组编写. —3 版. —北京:中国医药科技出版社, 2014. 8

2015 全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书

ISBN 978-7-5067-6916-7

I. ①护… II. ①卫… III. ①护理学-医药卫生人员-资格考试-习题集
IV. ①R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 163984 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 A4

印张 13 $\frac{3}{4}$

字数 425 千字

初版 2013 年 1 月第 1 版

版次 2014 年 8 月第 3 版

印次 2014 年 8 月第 3 版第 1 次印刷

印刷 三河市航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-6916-7

定价 29.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

白小红	陈俊	付涛	何玉兰	侯荣	胡留城
黄丽	黄晓冬	计莉	季恩	蒋太春	康钦利
孔志坚	李国静	李颖	梁琼	廖发金	刘波
刘颖	刘琳	刘作华	龙永强	鲁冰	罗小娟
马建国	倪佩钢	聂勇	彭景云	任蓉	沈汛
王莉	张敬	张静静	赵慧慧	付丽珠	刘葆陞

编写说明

主管护师考试是一种职称资格考试，为了帮助读者能顺利地通过2015年的考试，我们根据最新版大纲的要求，结合多年从事考前辅导和基础教学工作的实践经验，编写了这本《护理学专业（主管护师）考试通关必做2000题》（2015年版）。试题按章节进行编排，涵盖了护师资格考试各项考点，覆盖面全，针对性强，对于典型试题和易错题提供精当的解析，便于考生们复习理解。

护师资格考试通常在每年的5月举行，我们建议考生复习采用三段式复习方式，提升复习效率，巩固复习效果。

第一阶段，系统复习阶段（建议时间控制在2个月）。第一阶段全面复习考试大纲要求内容。以教材加考试大纲为主，配合《护理学专业（主管护师）考试考点速记》（2015年版）（中国医药科技出版社出版）进行复习[时间分配：（教材+大纲）：速记=70%：30%]。结束后，做《护理学专业（主管护师）历年考点精析与避错》（2015年版），深入了解考试重点和命题规律，发现复习中存在的问题。建议复习时，多动手，多总结，书和考点速记配合着学习。复习内容以历年考试重点为主，要把宝贵的时间用在刀刃上。

第二阶段，以教材和考点速记复习为主（建议时间2个月，时间分配：教材：笔记=50%：50%）。有了第一阶段的系统复习，这个时候，你对考试内容都会有一定的感觉。这个阶段以重点复习为主。建议每章看后，配合《护理学专业（主管护师）考试通关必做2000题》（2015年版）对本章复习成果进行检验。

第三阶段，冲刺为主（建议时间1个月），快速突破《护理学专业（主管护师）历年考点精析与避错》（2015年版）。配合《护理学专业（主管护师）考试冲刺试卷》（2015年版）继续巩固前两个阶段复习成果。真题练习是任何辅导练习题不能替代的。

相信，经过以上三个阶段的复习，加上你的决心和努力，圆梦2015不再是梦想。我们致力于为广大考生提供优秀的辅导图书，也欢迎广大读者为我们提出宝贵建议，不断修订完善图书质量，满足广大读者需求，我们的邮箱是：kszx405@163.com。

编者

2014年7月

目 录

上篇 命题规律分析

从 2014 主管护师考试真题谈 2015 年复习方向与应考策略	(1)
--	-------

中篇 通关试题

第一章 内科护理学	(19)
第二章 外科护理学	(57)
第三章 妇产科护理学	(94)
第四章 儿科护理学	(121)
第五章 护理健康教育学	(142)
第六章 医院感染护理学	(149)
第七章 护理管理学	(158)
第八章 社区护理学	(163)

下篇 通关试题答案和精选解析

第一章 内科护理学	(178)
第二章 外科护理学	(186)
第三章 妇产科护理学	(193)
第四章 儿科护理学	(198)
第五章 护理健康教育学	(202)
第六章 医院感染护理学	(204)
第七章 护理管理学	(207)
第八章 社区护理学	(208)

上篇 命题规律分析

从 2014 主管护师考试真题谈 2015 年 复习方向与应考策略

迎来送往，又是一个考季结束了，下面我们就对 2014 主管护师考题来个“剖肠刮肚”，找出命题老师的“命题秘笈”，然后指导大家如何“一战而胜”。

一、2014 年主管护师命题出题规律深度剖析

仔细分析 2014 年考题，我们可以发现其有如下特点：

（一）真题的“重出江湖”现象。也就是考点的“依依不舍”现象。例如：

1. 用铁剂治疗缺铁性贫血，最早出现的有效指征是

- A. 红细胞变大
- B. 红细胞数上升
- C. 血红蛋白量上升
- D. 网织红细胞数上升
- E. 红细胞中心浅染恢复

【答案】D

2. 肠结核最常发生在

- A. 回盲部
- B. 升结肠
- C. 横结肠
- D. 降结肠
- E. 乙状结肠

【答案】A

这些考题都是原来真题的重复或者变化题型，看来命题者真的是喜欢老朋友了！这也就意味着大家一定要重视真题。

（二）2014 年考题的“英雄皆有出处”现象：我们总结的 30 种题型 2014 年考题中出现了 23 种，不管命题者如何变化，都是有踪可循的。

★今年考题出现的“最”

1. 我国最常见的贫血是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 溶血性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 营养性巨幼细胞贫血
- E. 恶性贫血

【答案】C

2. 肝脏最基本的结构单位是

- A. 肝细胞索
- B. 肝叶
- C. 肝小叶
- D. 肝窦
- E. 肝段

【答案】C

3. 甲状腺的病人术后最严重的并发症是

- A. 呼吸困难
- B. 手足抽搐
- C. 甲状腺危象
- D. 出血
- E. 误咽

【答案】A

4. 小儿出生后，生长发育最快的时期

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

【答案】B

5. 心力衰竭最重要的诱因是

- A. 摄入钠盐过多
- B. 静脉输液过快
- C. 情绪激动
- D. 过度劳累
- E. 感染

【答案】E

6. 急性脓胸最常见的致病菌是

- A. 厌氧菌
- B. 链球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 金黄色葡萄球菌

【答案】E

7. 成人最常见的肺结核类型是

- A. 原发性肺结核
- B. 浸润性肺结核
- C. 血行播散型肺结核
- D. 结核性胸膜炎
- E. 慢性纤维空洞型肺结核

【答案】B

8. 引起继发性急性细菌性腹膜炎最常见的病原菌是

- A. 大肠埃希菌 B. 厌氧类杆菌
C. 链球菌 D. 变形杆菌
E. 真菌

【答案】A

9. 多器官功能障碍综合征最常累及的器官是

- A. 心 B. 脑
C. 肺 D. 肝
E. 肾

【答案】C

10. 食管癌最多见的病理类型是

- A. 腺癌 B. 鳞癌
C. 小细胞癌 D. 类癌
E. 腺鳞癌

【答案】B

11. 血栓闭塞性脉管炎最常累及的是

- A. 上肢的中小动静脉, 以动脉为主
B. 上肢的中小动静脉, 以静脉为主
C. 下肢的大动脉
D. 下肢的中小动静脉, 以动脉为主
E. 下肢的中小动静脉, 以静脉为主

【答案】D

12. 前尿道损伤多见于

- A. 尿道阴茎部 B. 尿道膜部
C. 尿道球部 D. 尿道膜部
E. 尿道前列腺部

【答案】C

13. 某初产妇, 从分娩次日起持续 3 天体温 37.5°C 左右, 子宫收缩好, 无压痛; 会阴伤口无红肿、无疼痛; 恶露鲜红色, 无臭味; 双乳肿胀, 有硬结。发热的最可能原因

- A. 过度疲劳 B. 乳汁淤积
C. 会阴伤口感染 D. 上呼吸道感染
E. 宫腔有胎膜残留

【答案】B

14. 患者女, 48 岁。有胆石症病史 23 年。上腹痛 6 小时, 呕吐 2 次就诊。实验室检查: 血白细胞 $12 \times 10^9/\text{L}$, 中性粒细胞 85%。为进一步明确诊断, 最有意义的检查

- A. B 超 B. CT
C. 胆囊口服造影 D. 胆囊静脉造影
E. PTC 检查

【答案】A

15. 患者男, 19 岁。外伤, $\text{CVP} 4\text{cmH}_2\text{O}$, 血压低, 最可能是

- A. 感染性休克 B. DIC

C. 肾衰

D. 低血容量休克

E. 心衰

【答案】D

16. 16 岁女学生, 平素体健。学校体检时心率 96 次/分, 律齐, 心尖区闻及收缩期吹风样杂音, 心界增大不明显。最恰当的保健指导是

- A. 保持卧床休息
B. 及早用洋地黄治疗
C. 加强锻炼, 提高代偿力
D. 避免剧烈运动, 防止感染
E. 定期随访

【答案】E

17. 选择抗感染药物的最佳依据是

- A. 体温恢复正常, 症状消失后续用 2~3 天
B. 病情好转, 体温正常 7~10 天再停药
C. 疗程可达 4~8 周
D. 细菌药敏试验加药物代谢动力学特征
E. 静脉滴注抗生素药物必须注意配伍禁忌

【答案】D

18. 护士长反复与想辞职的护士沟通, 护士最终没有辞职

- A. 有效的聆听 B. 重视沟通细节
C. 强化沟通 D. 韧性沟通
E. 语言文字的感染力

【答案】D

19. 护士长以科室为家, 年底工作总结却发现事倍功半, 在明年的工作中护士长最需要处理好的是

- A. 没有有效的利用自己的时间
B. 协同 C. 激励员工事业心
D. 协调 E. 报告上级

【答案】C

20. 男性, 45 岁。3 年前发现右侧股骨远端有一骨性肿块, 无症状, 最可能是

- A. 骨软骨瘤 B. 骨肉瘤
C. 骨质增生 D. 骨巨细胞瘤
E. 骨细胞瘤

【答案】A

21. 张力性气胸最突出的症状

- A. 极度呼吸困难 B. 气管移位
C. 纵隔摆动 D. 反常呼吸
E. 疼痛

【答案】A

22. 患者男, 53 岁。B 超发现肝脏右叶肿大 2 天, 肝功能检查正常, 最有助于提示原发性肝癌的是

- A. AFP B. AKP
C. CEA D. 酸性磷酸酶

E. 总胆红素

【答案】A

★今年考题出现的“首”

1. 患者女, 44 岁。阵发性剑突下偏右腹痛 6 小时, 发作时辗转不安, 缓解时症状消失。查体: 37.5°C , P 85 次/分, 腹软, 剑突下及右侧轻压痛。为明确诊断, 首选检查

A. 腹部平片
B. 胆囊 B 超
C. 血淀粉酶
D. PTC 检查
E. ECT 检查

【答案】B

2. 室速首选药

A. 利多卡因
B. 阿托品
C. 奎尼丁
D. 肾上腺素
E. 奥美拉唑

【答案】A

3. 根据健康信念的模式, 若要促使人们采取促进健康行为, 戒除危害健康行为, 首先应使其

A. 了解其对某种疾病的易感性
B. 认识到某种疾病的易感性
C. 相信自己有能力控制内外因素
D. 相信医生
E. 相信护士

【答案】A

4. 某护士长习惯将自己的工作分类, 首先投入重要紧急的工作中, 然后才是其他较为重要的工作。这种工作法是

A. 四象限时间管理法
B. 区域管理法
C. 记录统计法
D. 拟定时间进度表
E. ABC 时间管理法

【答案】E

5. SLE 首选药物

A. 非甾体抗炎药
B. 糖皮质激素
C. 免疫抑制剂
D. 抗疟药
E. 抗菌素

【答案】B

6. 急性胰腺炎时首要的护理措施

A. 禁食
B. 严密监测病情
C. 维护肾功能
D. 防止低血容量性休克
E. 维持水电解质和酸碱平衡

【答案】A

★今年考题出现的“方式”

1. 周围环境温度超过体表温度时, 人体散热的方式是

A. 辐射
B. 传导
C. 对流
D. 蒸发

E. 运动

【答案】D

2. 新生儿病房为提高护理质量, 设计了临床护理科研方案, 需将住院的新生儿分为两个护理组分别进行不同的护理措施, 其中实验组要采用不同于新生儿护理常规的护理方案。在方案开始执行前护士必须要做的是

A. 报告医生
B. 报告院长
C. 与同级医院沟通
D. 征得新生儿父母的同意并签知情同意书
E. 因为新方法没有风险, 不需告知患儿亲属

【答案】D

3. 通过阅读患者的病历、分析病史及其健康影响因素来评估患者需求的方法是

A. 直接评估法
B. 间接评估法
C. 沟通法
D. 查阅法
E. 接触法

【答案】B

4. “条条大路通罗马”, 说明达成目标可以采用

A. 以行动强化语言
B. 避免一味说教
C. 使用恰当的沟通方式
D. 考虑接收者的观点和立场
E. 充分利用反馈机制

【答案】C

5. 为糖尿病患者传授皮下注射胰岛素采用的方式是

A. 教育
B. 教导
C. 交流
D. 讲授
E. 指导

【答案】E

6. 前囟的测量方法

A. 二对角线连接线长度
B. 相邻二边长度
C. 二对边中点的连接线长度
D. 二对边中点连接线长度的 $1/2$ 长度
E. 凶门四边线长度相加除 4

【答案】C

★今年考题出现的“治疗”

1. 可提高人群持续性免疫力的措施是

A. 隔离患者
B. 三管一灭
C. 预防接种
D. 改变生活习惯
E. 消灭虫害

【答案】C

2. 某护士单独值班, 突然三间病房的床铃同时响起, 该护

士应选择先去照护哪间病房的患者

- A. 距离护士站最近的患者
- B. 平时护患关系融洽的患者
- C. 有重要社会地位的患者
- D. 与本院医生有关系的患者
- E. 最可能有紧急医疗需要的患者

【答案】E

3. 患者男, 16岁。上体育课时与同学踢足球不慎被踢到小腿, 初步诊断为胫骨骨折, 需住院治疗。错误的护理措施是

- A. 热敷
- B. 卧硬板床
- C. 临时牢固固定下肢, 减少搬动
- D. 观察患肢血液循环
- E. 及时为患者测量生命体征

【答案】A

4. 患者男, 55岁。因近几月活动后腰部阵发性剧痛, 且偶有血尿来院就诊。经B超检查诊断为输尿管结石, 随即准备入院治疗, 护士在给患者做入院评估时, 患者突然发生绞痛, 此时最重要的措施是

- A. 大量饮水
- B. 应用抗生素
- C. 解痉止痛
- D. 准备手术治疗
- E. 为患者进行心理护理

【答案】C

5. 术前应预防性应用抗生素的手术是

- A. 疝切除
- B. 甲状腺大部分切除
- C. 各种人造物置换术
- D. 乳房良性肿瘤切除
- E. 拔牙

【答案】C

6. 肺炭疽死亡的患者使用过的废弃物的处理为

- A. 焚烧
- B. 空气消毒
- C. 化学消毒
- D. 物理消毒
- E. 紫外线消毒

【答案】A

7. 患者入院诊断为肺结核, 护士在给其进行静脉注射时应佩戴的口罩是

- A. 一般口罩
- B. 简易口罩
- C. 特制口罩
- D. 普通口罩
- E. 医用防护口罩

【答案】E

8. 女性, 22岁, 缺铁性贫血患者, 口服铁剂治疗的方法错误的是

- A. 饭后服用
- B. 饮浓茶
- C. 与维生素同服
- D. 不与牛奶同服
- E. 用吸管吸服铁剂

【答案】B

9. 糖尿病时禁

- A. 勤用肥皂洗澡
- B. 保健性舞蹈
- C. 慢跑
- D. 散步
- E. 做广播操

【答案】A

10. 脑疝确诊后最先采用的治疗措施是

- A. 立即行CT检查
- B. 静脉给予降颅内压药物
- C. 立即手术去除原发病灶
- D. 脑室分流术
- E. 腰穿放脑脊液

【答案】B

11. 血栓闭塞性脉管炎病人的护理哪项有错

- A. 要求病人绝对戒烟
- B. 指导病人做伯格运动
- C. 患肢局部加热水袋保暖
- D. 观察局部皮肤温度
- E. 观察足背动脉搏动

【答案】C

12. 直肠癌是否切除肛门, 是根据

- A. 肿瘤距肛门的距离
- B. 肿瘤的病理类型
- C. 肿瘤是否已侵犯肠管周围
- D. 肿瘤有无远处转移
- E. 左半结肠的长度

【答案】A

★今年考题出现的“因果”

1. 脑脊液漏是由于

- A. 严重脑挫伤
- B. 严重颅盖骨折
- C. 多处颅盖骨折
- D. 颅底骨折并蛛网膜撕裂
- E. 颅底骨折并硬脑膜撕裂

【答案】E

2. 急性骨髓炎常见于小儿长骨干骺端的原因是

- A. 干骺端有丰富的淋巴网
- B. 干骺端血流丰富和流动缓慢
- C. 外伤后此处淋巴液易渗出
- D. 外伤后此处毛细血管网易出血
- E. 干骺端有丰富的毛细血管网

【答案】B

3. 肾衰纤维性骨炎是因为

- A. 活性维生素D₃生成不足
- B. 贫血
- C. EPP不足
- D. 缺钙
- E. 缺钾

【答案】A

★今年考题出现的“药物”

1. 术前紧张焦虑，麻醉前用药是

- A. 地西洋
- B. 吗啡
- C. 哌替啶
- D. 阿托品
- E. 异丙嗪

【答案】A

2. 能达到高效水平消毒效果的是

- A. 过氧乙酸
- B. 醇类
- C. 季胺盐类
- D. 氯己定
- E. 酚类

【答案】A

3. 达到灭菌水平的消毒剂是

- A. 戊二醛
- B. 氯己定
- C. 苯扎溴铵等
- D. 植物类消毒剂
- E. 金属离子消毒剂

【答案】A

4. 对不耐热、不耐湿物品进行消毒时可选用

- A. 环氧乙烷气体灭菌
- B. 热力灭菌
- C. 微波灭菌
- D. 电离辐射灭菌
- E. 等离子体灭菌

【答案】A

5. 护士发错药未造成任何不良反应

- A. 护理失误
- B. 护理操作不当
- C. 护理错误
- D. 护理不当
- E. 护理缺陷

【答案】E

6. 化疗药物用量依据

- A. 体表面积
- B. 体重
- C. 体液
- D. 毛重
- E. 肾功能

【答案】B

★今年考题出现的“否定”

1. 胰岛素瘤的检查中，一般不包括

- A. 空腹血糖测定
- B. 葡萄糖耐量试验
- C. 胰岛素测定
- D. D860 试验
- E. 基础代谢率

【答案】E

2. 肿瘤细胞的常见扩散途径不包括

- A. 直接蔓延
- B. 播散转移
- C. 淋巴转移
- D. 血行转移
- E. 种植转移

【答案】B

3. 制订护理质量的标准要求不包括

- A. 科学
- B. 准确
- C. 简明
- D. 权威
- E. 统一

【答案】D

4. 影响健康传播效果的主要因素不包括

- A. 传播效果
- B. 传播者
- C. 健康信息
- D. 传播途径
- E. 环境

【答案】A

5. 不属于 ICU 管理原则的是

- A. 提倡介入性监护方法
- B. 必须制定和严格实施一系列的感染管理制度
- C. 提倡非介入性监护方法
- D. 减少介入性血流动力学监护的使用频率
- E. 要加强下呼吸道感染、血管相关性感染和切口感染的预防

【答案】A

6. 在进行目标管理过程中，制定下级和个人分目标时不正确的是

- A. 利益最大化
- B. 目标方向正确
- C. 目标值恰当，既切合实际又有挑战性
- D. 由责任人参与协商分解组织目标
- E. 目标应具体、可测量、有时间规定，便于考核

【答案】A

7. 关于艾滋病不正确的是

- A. HIV 对外界的抵抗力大于 HBV
- B. HIV 抗体检测不出
- C. 肺孢子菌肺炎常见
- D. 急性感染期（I）部分病人出现血清病样症状
- E. HIV RNA 定量检测可判断治疗效果及预后

【答案】B

8. 按归因理论，成功与失败的可能原因不包括

- A. 能力
- B. 努力
- C. 机遇
- D. 身体状态
- E. 任务的难度

【答案】D

9. 主持会议应把握的要点不包括

- A. 做好会议的计划工作
- B. 做好会议的组织协调
- C. 善于主持会议
- D. 控制讨论
- E. 做好会议总结

【答案】D

10. 关于消毒原则错误的叙述是

- A. 进入人体无菌组织的器械必须消毒

- B. 接触皮肤黏膜的器具和用品必须消毒
- C. 用过的医疗器材和物品, 应先去污物, 彻底清洗干净, 再消毒或灭菌
- D. 感染病人用过的医疗器材和物品, 应先消毒, 彻底清洗干净, 再消毒或灭菌
- E. 油、粉、膏等首选干热灭菌

【答案】A

11. 不能预防血管相关感染发生的措施是

- A. 做好消毒隔离是预防血管相关性感染的重要措施
- B. 一旦发现局部感染或全身感染征象应立即拔除导管
- C. 液体应现用现配, 静脉营养液等应在无菌室或层流洁净操作台上进行
- D. 导管尽量延长留置时间以减少插管次数
- E. 尽量减少介入性治疗带来的损伤

【答案】D

12. 制定计划发展可选方案时, 不需要考虑的因素是

- A. 方案与组织目标的相关程度
- B. 可预测的投入与效益之比
- C. 方案与方案之间的可比程度
- D. 公众的接种程度
- E. 下属的接受程度

【答案】C

13. 制定计划发展可选方案时, 不需要考虑的因素是

- A. 方案与组织目标的相关程度
- B. 可预测的投入与效益
- C. 公众的接受程度
- D. 患者角色行为
- E. 下属的接受程度

【答案】D

14. 关于护理人员的职业防护, 错误叙述是

- A. 护理人员无菌操作后可以不洗手
- B. 有较高感染危险科室工作的人员, 在调入或调离这些部门时, 应进行健康检查
- C. 在处理血液体液及被其污染的器械时应戴手套或应用不直接接触的操作技术
- D. 手上有伤口时, 不能接触病人的血液、体液
- E. 进行可能被病人血液、体液溅入眼及口腔内的操作时, 应戴口罩和眼防护罩

【答案】A

15. 关于健康传播的内涵错误的是

- A. 改变个人和群体的知识
- B. 以健康为中心
- C. 改变个人和群体的态度
- D. 改变个人和群体的行为
- E. 最高目标是形成健康态度

【答案】E

16. 不能预防手术部位感染的措施是

- A. 严格进行手术区皮肤消毒和手术区保护
- B. 用无菌蒸馏水冲洗伤口
- C. 按规定更换衣帽, 戴好口罩, 认真刷手
- D. 切口缝合后应选用吸附能力好的敷料
- E. 尽量采用封闭式重力引流

【答案】B

17. 对多重耐药细菌 (MRSA、泛耐药) 感染防控措施不包括

- A. 根据药代动力学及药敏试验结果, 制定个体化的给药方案
- B. 联合用药应达到协同或相加治疗效果, 减少药量, 减少毒性
- C. 不可随便减量或停药
- D. 限制病人的活动范围, 减少转送
- E. 进入病房的医务人员都必须戴高效防护口罩

【答案】D

18. 关于持续有效质量改造描述不正确的是

- A. 强调通过检查手段提高质量
- B. 积累资料
- C. 提高能力
- D. 防止偏向
- E. 重视反馈

【答案】A

19. 行为的构成要素不包括

- A. 行为过程
- B. 人
- C. 指向目标
- D. 环境
- E. 行为结果

【答案】A

20. 主持农村社区育龄妇女“母乳喂养”的小组讨论时, 护士不宜采用的方式是

- A. 向小组成员说明讨论主题与目的
- B. 请每个小组成员自我介绍
- C. 采用点名法征求发言不积极者的意见
- D. 讨论偏题时及时引导成员回到主题
- E. 给积极的小组成员更多的发言机会

【答案】C

21. 授权的原则不包括

- A. 监督控制
- B. 权责对等
- C. 合理合法
- D. 视能授权
- E. 利益原则

【答案】E

22. 某科室对专科护理疾病常规进行修订, 修订的原则不包括

- A. 规范
- B. 正规
- C. 合理
- D. 经济性

E. 合规

【答案】D

23. 卵巢过度刺激综合征, 错误的是

- A. 中度时有明显腹水
- B. 轻度仅表现为腹部胀满、卵巢增大
- C. 重度表现为腹部膨胀
- D. 重度有大量腹水、胸水可导致血液浓缩
- E. 重度有肝肾功能损害

【答案】A

24. 系统性红斑狼疮不能吃的食物

- A. 芹菜
- B. 猕猴桃
- C. 苹果
- D. 白菜
- E. 胡萝卜

【答案】A

25. 女士, 50 岁胆囊切除术后右下肢多次输液, 发生了血栓性静脉炎, 下列护理哪项不对

- A. 右下肢抬高
- B. 局部按摩
- C. 局部制动
- D. 局部热敷
- E. 理疗

【答案】B

26. 不是细菌的

- A. 白色念珠菌
- B. 脑膜炎球菌
- C. 痢疾杆菌
- D. 结核杆菌
- E. 伤寒杆菌

【答案】A

★今年考题出现的“表现”

1. 小儿颅内压增高最早的表现

- A. 前囟饱满
- B. 呛奶
- C. 血压下降
- D. 喷射状吐奶
- E. 恶心伴呕吐

【答案】A

2. 患儿男, 10 岁, 4 周前有上呼吸道感染史, 2 周前出现关节疼痛。查体: 37.9℃, HR 140 次/分, R 26 次/分, 心尖部闻及 2 级收缩期杂音。与该患儿的临床表现相关的病原最有可能是

- A. 肺炎链球菌
- B. 化脓性链球菌
- C. α-溶血性链球菌
- D. A 组乙型溶血性链球菌
- E. B 组甲型溶血性链球菌

【答案】D

3. 早产最初临床表现

- A. 不规律宫缩
- B. 见红
- C. 破膜
- D. 腹痛
- E. 胎心率加快

【答案】A

4. 维生素 D 缺乏性佝偻病激期表现

- A. 骨骼改变
- B. 神经、精神症状
- C. 尿改变
- D. 血液改变
- E. 肝功能改变

【答案】A

5. 青紫型心脏病见于

- A. 法洛四联症
- B. 室间隔缺损
- C. 房间隔缺损
- D. 动脉导管未闭
- E. 肺动脉狭窄

【答案】A

6. 二度 I 型房室传导阻滞心电图表现为

- A. P-R 间期进行性延长, 直至 QRS 波群脱落
- B. P-R 间期恒定, 部分 P 波后无 QRS 波
- C. 每个 P 波后均随 QRS 波
- D. 房室各自活动
- E. P 波与 QRS 波无关系

【答案】A

★今年考题出现的“特点”

1. 脑干损伤时, 瞳孔变化的特征是

- A. 双侧瞳孔散大, 固定
- B. 一侧瞳孔散大, 对光反射消失
- C. 一侧瞳孔缩小, 对光反射存在
- D. 两侧瞳孔等大, 对光反射存在
- E. 两侧瞳孔大小多变, 不等圆

【答案】E

2. 直线型组织结构的特点是

- A. 采用按职能分工实行专业化的管理办法
- B. 组织系统职权从组织上层流向组织基层
- C. 设置两套系统
- D. 在高层管理者之下, 按地区或特征设置若干分部, 实行“集中政策
- E. 执行某方面管理职能并以集中活动为主要特征的组织形式

【答案】B

3. 先兆临产的特点是

- A. 不规律的宫缩
- B. 宫颈口开全
- C. 胎盘娩出
- D. 规律宫缩
- E. 腹痛

【答案】A

★今年考题出现的“数据”

1. 根据小儿年龄段的划分, 幼儿期是指

- A. 从出生~生后 28 天
- B. 出生后~1 岁
- C. 1~3 岁
- D. 3~5 岁
- E. 6 岁

【答案】C

2. 某孕妇, 末次月经是 2006 年 10 月 10 日, 其预产期为

- A. 2007. 7. 7 B. 2007. 7. 13
C. 2007. 7. 17 D. 2007. 7. 19
E. 2007. 7. 22

【答案】C

3. 极低出生体重儿是指

- A. 出生 1 小时内体重不足 2500 克的新生儿
B. 出生 1 小时内体重不足 2000 克的新生儿
C. 出生 1 小时内体重不足 1500 克的新生儿
D. 出生 1 小时内体重不足 1000 克的新生儿
E. 出生 1 小时内体重不足 750 克的新生儿

【答案】C

4. 成人胸外按压与人工呼吸比是

- A. 5:1 B. 15:1
C. 15:2 D. 30:2
E. 40:2

【答案】D

5. 新生儿出生后, 开始喂哺母乳时间是

- A. 15~30 分 B. 3~4 小时
C. 6~8 小时 D. 12 小时
E. 24 小时

【答案】A

6. 大量蛋白尿是指 24 小时尿蛋白定量超过

- A. 1.5 B. 2.5 克
C. 3.5 克 D. 4.5 克
E. 5.5 克

【答案】C

7. 移植术后的急性排斥反应多发生在

- A. 24 小时内 B. 1 周内
C. 1 个月内 D. 6 个月内
E. 1 年内

【答案】E

8. 胎盘形成的时间约在孕期的

- A. 4 周末 B. 48 周末
C. 12 周末 D. 16 周末
E. 20 周末

【答案】C

9. 结核菌侵入人体后, 发生变态反应的时间是

- A. 即刻 B. 2 周后
C. 3 周后 D. 4~8 周后
E. 3 个月后

【答案】D

10. 80% 小儿动脉导管解剖闭合的年龄是

- A. 3 个月 B. 6 个月

C. 12 个月

D. 2 岁

E. 3 岁

【答案】A

11. 院感检测中目标性监测的每项目标监测持续时间应

- A. 连续 2 个月以上 B. 连续 3 个月以上
C. 连续 6 个月以上 D. 连续 12 个月以上
E. 连续 18 个月以上

【答案】D

12. 根据讨论的主题, 选择相关的人员组成小组, 小组讨论的人数一般为

- A. 1~2 人 B. 3~4 人
C. 4~5 人 D. 6~10 人
E. 8~12 人

【答案】D

13. 按照空气卫生学标准, 重症监护室的细菌总数是

- A. $\leq 800\text{cfu/m}^3$ B. $\leq 400\text{cfu/m}^3$
C. $\leq 100\text{cfu/m}^3$ D. $\leq 200\text{cfu/m}^3$
E. $\leq 500\text{cfu/m}^3$

【答案】D

14. 人类行为被动发展阶段是

- A. 0~3 岁 B. 3~12 岁
C. 12 岁~成年 D. 成年以后
E. 老年

【答案】A

15. 炭疽患者家空气消毒可采用过氧乙酸的药量为

- A. 1g/m^3 B. 2g/m^3
C. 3g/m^3 D. 4g/m^3
E. 5g/m^3

【答案】C

16. 紫外线消毒时间

- A. 10 分钟以上 B. 20 分钟以上
C. 30 分钟以上 D. 40 分钟以上
E. 60 分钟以上

【答案】C

17. 某三级医院病房编制床位数为 40 张, 应配置的护士人数为

- A. 10 人 B. 12 人
C. 14 人 D. 16 人
E. 18 人

【答案】E

18. 结核病人的口鼻分泌物用过氧乙酸浸泡的浓度为

- A. 5% B. 4%
C. 3% D. 2%
E. 1%

【答案】E

19. 大环酯类抗感染药物稀释用

- A. 10% 葡萄糖
- B. 生理盐水
- C. 5% 乙醇
- D. 注射用水
- E. 葡萄糖盐水

【答案】D

20. 不孕症诊刮时间应在

- A. 月经来潮 6 小时内进行
- B. 月经来潮 7 小时内进行
- C. 月经来潮 8 小时内进行
- D. 月经来潮 9 小时内进行
- E. 月经来潮 10 小时内进行

【答案】A

21. 输卵管通术时间应在

- A. 月经干净后 3~7 天内进行
- B. 月经干净后 1~2 天内进行
- C. 月经干净后 2~3 天内进行
- D. 月经干净后 7~8 天内进行
- E. 月经干净后 12~14 天内进行

【答案】A

22. 怀疑有子宫内膜早期癌变的内镜检查时间

- A. 月经干净 7 天后进行
- B. 月经干净 6 天后进行
- C. 月经干净 5 天后进行
- D. 月经干净 4 天后进行
- E. 月经干净 3 天后进行

【答案】A

23. 2.5 岁小儿正常心率

- A. 110~120 次/分
- B. 120~130 次/分
- C. 130~140 次/分
- D. 150~160 次/分
- E. 170~180 次/分

【答案】A

24. 小儿生理性贫血时间

- A. 出生后 2~3 个月
- B. 出生后 1~2 个月
- C. 出生后 3~4 个月
- D. 出生后 4~5 个月
- E. 出生后 5~6 个月

【答案】A

25. 当白细胞总数降到多少应暂停化疗

- A. $3 \times 10^9/L$
- B. $1.5 \times 10^9/L$
- C. $4 \times 10^9/L$
- D. $5 \times 10^9/L$
- E. $6 \times 10^9/L$

【答案】A

26. 腰椎间盘突出术后 1 天可做的功能锻炼

- A. 直腿抬高锻炼
- B. 锻炼腰背肌
- C. 三点支撑法飞燕式
- D. 行走训练
- E. 五点支撑法飞燕式

【答案】A

27. 胃肠内营养液应放置于多少度以下冰箱内存放

- A. 4℃
- B. 5℃
- C. 8℃
- D. 12℃
- E. 36℃

【答案】A

28. 高渗性脱水补液是

- A. 5% 葡萄糖
- B. 等渗盐水
- C. 高渗盐水
- D. 以等渗盐水和 5% 葡萄糖液各半
- E. 10% 葡萄糖

【答案】A

★今年考题出现的“主要”

1. 支配内生殖器的神经主要是

- A. 交感神经
- B. 躯体神经
- C. 副交感神经
- D. 骶神经分支
- E. 交感神经与副交感神经

【答案】E

2. 我国流行性乙脑的流行季节主要是

- A. 春季
- B. 春夏季
- C. 夏秋季
- D. 秋冬季
- E. 冬季

【答案】C

3. 体液中, 维持酸碱代谢平衡的最主要缓冲对是

- A. HCO_3^-/H_2CO_3
- B. HPO_4/H_2PO_4
- C. 磷酸盐/磷酸
- D. 血红蛋白/氧合血红蛋白
- E. EPR/HPR

【答案】A

4. 性兴奋时, 润滑阴道口的分泌物主要来自

- A. 大阴唇
- B. 阴蒂
- C. 小阴唇
- D. 前庭大腺
- E. 阴道前庭

【答案】D

5. 血吸虫病所致的门静脉高压症的主要阻塞部位在

- A. 肝内窦前
- B. 肝内窦内
- C. 肝内窦后
- D. 肝前
- E. 肝后

【答案】A

6. 患者, 男, 28 岁, 因外伤致颅内血肿, 昏迷, 并呕吐数次。手术前预防脑疝形成的主要措施是

- A. 头部冰帽降温
- B. 保持呼吸道通畅
- C. 限制液体输入量
- D. 静脉注射地米

E. 快速静脉滴注甘露醇

【答案】E

★今年考题出现的“诊断”

1. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的区别点是

- A. 致病菌不同
- B. 发病年龄不同
- C. 机体抵抗力不同
- D. 腹腔有无原发病灶
- E. 有无腹膜刺激征

【答案】D

2. 为冠心病患者治疗决策提供依据的重要检查是

- A. 心电图
- B. 超声心动图
- C. 冠状动脉造影
- D. 右心室造影
- E. 胸部X线

【答案】C

3. 判断肺结核患者需要呼吸道隔离的指征是

- A. PPD强阳性
- B. 痰抗酸杆菌检查阳性
- C. 肺部浸润性病灶
- D. 血沉显著增快
- E. 淋巴结活检见干酪样坏死物

【答案】B

4. 患者女, 50岁。在家燃煤取暖突然昏迷, 出现面色潮红, 口唇呈樱桃红色, 多汗, 神志不清伴发热, 确诊的检查是

- A. 胸部CT
- B. 胸部MRI
- C. 血清碳氧血红蛋白测定
- D. 全血胆碱酯酶活力测定
- E. 脑电图检查

【答案】C

5. 患者男, 72岁。慢性支气管炎并发肺气肿15年。其一阵剧咳后, 突感左上胸剧烈刺痛, 出现明显的呼吸困难, 不能平卧; 听诊左肺呼吸音明显减弱。为明确诊断, 需做的检查是

- A. 心电图
- B. 心肌酶
- C. 胸部X线片
- D. 超声心动图
- E. ECT检查

【答案】C

6. 28岁孕妇, 孕1产0。妊娠24周糖筛查血糖值为9.5mmol/L。为明确诊断, 该孕妇应进一步接受的检查

- A. 尿糖检测
- B. 空腹血糖
- C. OGTT
- D. 尿酮体检测
- E. 尿蛋白检测

【答案】B

7. 25岁初产妇, 胎膜早破。自然分娩后第3天突然出现畏寒高热体温40℃, 伴有恶心、呕吐。查体: 下腹胀痛、反跳痛, 腹肌紧张明显, 初步诊断为急性盆腔腹膜炎。

为进一步明确病原体, 应选择的实验检查项目

- A. 血常规
- B. 血培养
- C. 阴道分泌物涂片
- D. 尿常规
- E. 尿细菌学检查

【答案】B

8. 患儿女, 12岁。咳嗽咳痰10余日, 咽痛、头痛。乏力、肌肉疼痛, 体温38℃, WBC $7.3 \times 10^9/L$, 血沉30mm/h, 肺部有干、湿啰音; X线示右肺下野浸润阴影。为明确诊断, 该患儿宜进行的检查是

- A. 痰涂片
- B. 血培养
- C. 结核菌素试验
- D. 肺炎支原体血清抗体检测
- E. 痰培养

【答案】D

9. 患者女, 30岁。发现血压高3年。常规体检: BP 150/105mmHg, 双下肢无水肿, 查尿蛋白+++ , 镜下见红细胞, 尿比重1.027, 无高血压家族史。最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 隐匿性肾小球肾炎

【答案】D

10. 患者男, 36岁。近月来腰痛不适。MRI检查结果示纤维环部分裂开、表面完整、髓核身椎管局限性隆起, 诊断为腰椎间盘突出症。目前该患者的病理分型是

- A. 膨隆型
- B. 突出型
- C. 凹陷型
- D. 脱垂游离型
- E. Schmorl 结节

【答案】A

11. 患者男, 59岁, 病毒性肝炎20年, 肝硬化7年。2天前与朋友聚会时饮酒和大量食用海鲜和肉类后, 患者出现喜怒无常、反应迟钝等, 并出现扑翼样震颤。最可能的诊断

- A. 肝性脑病1期
- B. 肝性脑病2期
- C. 肝性脑病3期
- D. 肝性脑病4期
- E. 肝性脑病5期

【答案】A

12. 患者男, 40岁。反复中上腹痛5年, 餐后1小时加重, 下次进餐前缓解。近5天餐后饱胀感明显, 大便呈柏油状。最可能的诊断是

- A. 慢性胃炎合并出血
- B. 十二指肠球部溃疡合并出血
- C. 胃溃疡合并出血
- D. 溃疡合并穿孔
- E. 胃癌

【答案】C

13. 以下可以诊断为医院感染的是

- A. 患者原有的慢性感染在医院内急性发作
 - B. 皮肤黏膜开放性伤口只有细菌定植而无炎症表现
 - C. 由于诊疗措施激活的潜在性感染如疱疹病毒感染
 - D. 由于创伤或非生物性因子刺激而产生的炎症表现
 - E. 新生儿经胎盘获得（出生后 48h 内发病）的感染
- 【答案】C

14. 肺心病患者的血气分析：氧分压 50mmHg，二氧化碳 60mmHg，pH 7.4 护理诊断

- A. 气体交换受损
- B. 清除呼吸道无效
- C. 低效性呼吸形态
- D. 体液不足
- E. 体温过高

【答案】A

15. 临产的重要标志

- A. 有规律宫缩
- B. 破膜
- C. 不规律宫缩
- D. 腹痛
- E. 胎心音加快

【答案】A

16. 测量胎盘功能

- A. 雌酮
- B. 雌二醇
- C. 雌三醇
- D. 孕二醇
- E. 孕酮

【答案】C

17. 血清胆红素进入血 - 脑屏障，引起

- A. 缺血缺氧性脑病
- B. 休克
- C. 胆红素脑病
- D. 黄疸
- E. 窒息

【答案】C

18. 确诊 21 - 三体综合征应选用哪项检查

- A. 染色体检查
- B. 血红蛋白电泳
- C. 血清 T₃、T₄、TSH 测定
- D. 骨骼 X 线片
- E. 脑电图

【答案】A

19. 患儿，2 岁。近 1 个月低热、咳嗽，夜间多汗，消瘦。胸片可见“哑铃状”双极阴影，结核菌素试验（+++），未接种过卡介苗，最可能的诊断是

- A. 结核性胸膜炎
- B. 纤维空洞型肺结核
- C. 原发型肺结核
- D. 干酪性肺结核
- E. 粟粒型肺结核

【答案】C

20. 糖尿病酮症酸中毒，呼吸深大，呼气中出现

- A. 烂苹果味
- B. 尿味
- C. 蒜味
- D. 肝腥味
- E. 恶臭味

【答案】A

21. 外科急腹症未明确诊断前

- A. 不用镇痛药
- B. 腹腔穿刺
- C. B 超检查
- D. CT 检查
- E. 血常规检查

【答案】A

★今年考题出现的“机制”

1. 慢性肺源性心脏病发病的主要机制是

- A. 肺泡毛细血管急性损伤
- B. 肺弥散功能障碍
- C. 支气管阻塞
- D. 支气管肺组织感染
- E. 肺动脉高压形成

【答案】E

2. 不属于激励机制的要点是

- A. 首先要满足最迫切的需要
- B. 应该奉行“连续激励”的原则
- C. 需要一旦得到满足就丧失了它的激励功能
- D. 激励切入点放在优势需求
- E. 提供充分的保健因素，以消除不满

【答案】D

★今年考题出现的“体位”

1. 膀胱癌的好发部位是

- A. 膀胱顶部
- B. 膀胱后壁
- C. 膀胱出口
- D. 膀胱顶部与后壁
- E. 膀胱三角区和侧壁

【答案】B

2. 上下部量，中点的位置在

- A. 耻骨联合上缘
- B. 耻骨联合下缘
- C. 坐骨结节上缘
- D. 坐骨结节下缘
- E. 乳头

【答案】A

3. 孕 30 周，枕左前位，胎心音的听诊部位应在

- A. 脐下左侧
- B. 脐下右侧
- C. 脐上右侧
- D. 脐上左侧
- E. 脐周

【答案】A

4. 胃癌术后饮食倾倒综合征，高渗液快速进入肠道，体位应是

- A. 平卧
- B. 侧卧
- C. 半坐位
- D. 俯卧
- E. 仰卧

【答案】A

5. 颅前窝骨折时，清醒，熊猫眼征，应采取的体位

- A. 半坐位
- B. 左侧卧位
- C. 右侧卧位
- D. 俯卧位
- E. 仰卧位