



工科类大学数学公共课程系列教学丛书
普通高等教育“十三五”规划教材

高等数学


(下册)

曹殿立
马巧云
主编



科学出版社

工科类大
普通



学丛书
教材

高等数学

(下册)

曹殿立 马巧云 主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是普通高等教育“十三五”规划教材,分上下两册出版.下册内容包括空间解析几何与向量代数、多元函数微分学、重积分、曲线积分与曲面积分、无穷级数等.每章除教学内容及习题外,还设有综合练习题.本书致力于内容的科学性、系统性,注重教材的适用性和通用性.在内容的编排上,注重概念实际背景的介绍,突出基本概念的系統理解和解题方法的掌握.本书起点低、坡度缓、难点分散、脉络清晰、详略适当、重点突出,例题、习题及题型丰富.习题除按小节配置外,各章末还设有综合练习题,书末附有答案.

本书可作为高等院校工科类、管理类以及对高等数学有较高要求的经济类、非数学专业理科类各专业本科生的高等数学课程教材、教学参考书以及考研学习或自学用书.

图书在版编目(CIP)数据

高等数学.下册/曹殿立,马巧云主编. —北京:科学出版社,2017.8

工科类大学数学公共课程系列教学丛书

普通高等教育“十三五”规划教材

ISBN 978-7-03-053850-5

I. ①高… II. ①曹… ②马… III. ①高等数学-高等学校-教材 IV. ①O13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 146525 号

责任编辑:张中兴 梁 清 / 责任校对:张凤琴

责任印制:白 洋 / 封面设计:迷底书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

天津市新科印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 8 月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2017 年 8 月第一次印刷 印张:17 1/2

字数:352 000

定价:39.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)



《高等数学（下册）》编委会

主 编 曹殿立 马巧云

副主编 张建军 李艳华 白洪远

编 者 孙成金 张晓梅 禹仁贵

前 言



高等数学是高等院校各专业重要的基础课,也是在自然科学、社会科学中广泛应用的数学基础。

本书按照教育部高等学校“工科类专业本科数学基础课程教学基本要求”,结合作者长期的高等数学教学实践,并在充分借鉴当前国内外同类教材的基础上编写而成。在内容上突出了以下四个特点:

1. 简明实用、通俗易学。略去了极限精确定义和一些抽象、烦琐的理论证明,直接地从客观世界所提供的模型和原理中导出基本概念,使表达更加简明、易于理解。

2. 突出基本概念和基本计算的教学。在课程内容的编排上,注重明晰概念以及理清概念之间的内在联系,注重基本计算方法的系统掌握,并设置较多的例题、习题和综合练习来进一步强化。

3. 突出数学的应用性。引导学生理解概念的内涵和背景,培养学生用高等数学的思想和方法分析、解决实际问题的能力。

4. 体现工科特色。较多地设置了有关工程、机械、电子、能源、交通、食品工程、生物工程、环境工程以及经济管理等方面的实例,突出高等数学在工科专业中的应用,为学生学习专业奠定基础。

参加本书编写的有河南农业大学的曹殿立、马巧云、张建军、李艳华、白洪远、孙成金、张晓梅、禹仁贵,最后由曹殿立统一定稿。

东华大学的秦玉明教授仔细审阅了全稿,并提出了许多意见和建议,在此表示由衷的谢意!

对科学出版社为本书的顺利出版所付出的辛勤劳动表示衷心感谢!

虽然我们十分努力,但由于水平所限,难免存在不妥和疏漏之处,恳请读者批评指正。

编 者


2017年3月1日

本书同步学习辅导教材《高等数学同步学习辅导》(下册)(曹殿立,苏克勤主编)注重课程内容的系统归纳与总结,突出典型例题的示范讲解,注重思路分析和方法归纳,提供主教材全部习题及综合练习题的详尽解答,含历年典型考研真题,提前体验典型考研题型。

同步学习辅导教材为您提供知识总览、典型例题、历年考研典型真题、习题与综合练习题详解等丰富教学内容,助您学有所成!

书名:《高等数学同步学习辅导》(下册)

书号:978-7-03-053852-9 定价:35.00 元



扫辅导书二维码,提高等数学成绩. 科学出版社电子商务平台上本辅导书的购买二维码链接如下:



目 录



前言

第 7 章 空间解析几何与向量代数	1
7.1 向量及其线性运算	1
7.1.1 向量的概念	1
7.1.2 向量的线性运算	2
7.2 空间直角坐标系和向量的坐标	6
7.2.1 空间直角坐标系	6
7.2.2 空间两点间的距离	8
7.2.3 向量的坐标表示	9
7.2.4 利用坐标进行向量的线性运算	10
7.2.5 向量的模和方向余弦	12
7.2.6 向量在轴上的投影	13
7.3 向量的数量积、向量积和混合积	15
7.3.1 向量的数量积	15
7.3.2 向量的向量积	18
* 7.3.3 向量的混合积	21
7.4 平面及其方程	23
7.4.1 曲面方程的概念	23
7.4.2 平面的点法式方程	24
7.4.3 平面的一般方程	25
7.4.4 平面的三点式和截距式方程	26
7.4.5 两平面的夹角	28
7.4.6 点到平面的距离	29
7.5 直线及其方程	31
7.5.1 直线的一般方程	31
7.5.2 直线的对称式方程	32
7.5.3 直线的参数方程	33
7.5.4 有关直线的几个问题	34

7.6 曲面及其方程	40
7.6.1 球面	40
7.6.2 旋转曲面	40
7.6.3 柱面	43
7.6.4 二次曲面	45
7.7 曲线及其方程	48
7.7.1 空间曲线的一般方程	48
7.7.2 空间曲线的参数方程	49
7.7.3 空间曲线在坐标平面上的投影	50
综合练习题七	52
第8章 多元函数微分学	55
8.1 多元函数的极限与连续	55
8.1.1 平面点集的基本概念	55
8.1.2 多元函数的概念	57
8.1.3 多元函数的极限	59
8.1.4 多元函数的连续性	60
8.2 偏导数	63
8.2.1 偏导数的定义	63
8.2.2 偏导数的几何意义	66
8.2.3 高阶偏导数	66
8.3 全微分	69
8.3.1 偏增量与全增量	69
8.3.2 全微分的定义	70
8.3.3 可微的条件	70
8.3.4 全微分在近似计算中的应用*	73
8.4 多元复合函数的求导法则	74
8.4.1 多元复合函数的求导法则	74
8.4.2 全微分的形式不变性	81
8.5 隐函数的求导公式	82
8.5.1 一个方程的情形	82
* 8.5.2 方程组的情形	86
8.6 方向导数与梯度	88
8.6.1 方向导数	88
8.6.2 梯度	91
8.7 多元函数微分学的几何应用	95

8.7.1 空间曲线的切线与法平面	95
8.7.2 空间曲面的切平面与法线	97
8.8 多元函数的极值	99
8.8.1 多元函数的极值	99
8.8.2 多元函数的最大值和最小值	102
8.8.3 条件极值与拉格朗日乘数法	103
综合练习题八	106
第9章 重积分	109
9.1 二重积分的概念与性质	109
9.1.1 实际背景	109
9.1.2 二重积分的定义	111
9.1.3 二重积分的性质	112
9.2 二重积分的计算	114
9.2.1 直角坐标系下二重积分的计算	114
9.2.2 极坐标系下二重积分的计算	123
9.2.3 二重积分的换元法与广义二重积分	128
9.2.4 曲面的面积	131
9.3 三重积分	134
9.3.1 三重积分的概念与性质	134
9.3.2 利用直角坐标计算三重积分	136
9.3.3 利用柱面坐标计算三重积分	141
9.3.4 利用球面坐标计算三重积分	144
综合练习题九	148
第10章 曲线积分与曲面积分	151
10.1 对弧长的曲线积分	151
10.1.1 对弧长的曲线积分的概念与性质	151
10.1.2 对弧长的曲线积分的计算法	153
10.2 对坐标的曲线积分	156
10.2.1 对坐标的曲线积分的概念与性质	156
10.2.2 对坐标的曲线积分的计算法	159
10.2.3 两类曲线积分之间的联系	163
10.3 格林公式及其应用	165
10.3.1 格林公式	165
10.3.2 平面曲线积分与路径无关的等价条件	170
10.3.3 全微分求积与全微分方程	173

10.4 对面积的曲面积分	176
10.4.1 曲面形物体的质量	176
10.4.2 对面积的曲面积分的概念与性质	176
10.4.3 对面积的曲面积分的计算	177
10.5 对坐标的曲面积分	180
10.5.1 有向曲面及其投影	180
10.5.2 对坐标的曲面积分的概念与性质	181
10.5.3 对坐标的曲面积分的算法	184
10.5.4 两类曲面积分之间的联系	187
10.6 高斯公式 通量与散度	190
10.6.1 高斯公式	190
10.6.2 通量与散度	193
10.7 斯托克斯公式 环流量与旋度	196
10.7.1 斯托克斯公式	196
10.7.2 环流量与旋度	198
综合练习题十	200
第 11 章 无穷级数	203
11.1 常数项级数的概念和性质	203
11.1.1 常数项级数的概念	203
11.1.2 等比级数	205
11.1.3 无穷级数的基本性质	205
11.2 正项级数及其审敛法	208
11.2.1 正项级数收敛的充分必要条件	208
11.2.2 比较审敛法	209
11.2.3 比值审敛法与根值审敛法	213
11.3 任意项级数的审敛法	215
11.3.1 交错级数及其审敛法	215
11.3.2 绝对收敛与条件收敛	217
11.4 幂级数	219
11.4.1 函数项级数的概念	219
11.4.2 幂级数及其收敛性	220
11.4.3 幂级数的运算性质	224
11.5 函数展开成幂函数	227
11.5.1 泰勒级数	227
11.5.2 函数展开成幂级数	228

11.6 傅里叶级数.....	233
11.6.1 三角级数与三角函数系的正交性	233
11.6.2 以 2π 为周期的函数展开成傅里叶级数	234
11.6.3 正弦级数和余弦级数	238
11.6.4 以 $2l$ 为周期的函数展开成傅里叶级数	242
综合练习题十一.....	246
附录.....	249
二阶与三阶行列式.....	249
习题与综合练习题参考答案.....	252
参考文献.....	267



第7章 空间解析几何与向量代数

空间解析几何主要研究空间几何图形,如同平面解析几何一样,它将“数”和“形”这两个数学的基本对象统一于一体,用代数方法研究和解决几何问题.平面解析几何是一元函数微积分的基础,同样,空间解析几何也是学习多元函数微积分不可缺少的.

向量代数是解决数学、物理以及工程技术问题的有力工具.本章首先引入空间向量的概念,通过建立空间直角坐标系给出向量的坐标,将向量的几何运算转化为向量坐标的代数运算,并以向量为工具研究空间平面和直线,最后介绍空间曲面、空间曲线以及二次曲面.

7.1 向量及其线性运算

7.1.1 向量的概念

我们把只有大小的量称为**数量**(或**标量**),如长度、质量、时间和温度等.把既有大小又有方向的量称为**向量**(或**矢量**),如位移、速度、加速度、力等.为区别于数量,通常用黑体字母或者上方加箭头的字母来表示向量,如 $\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{v}, \mathbf{F}$ 或者 $\vec{a}, \vec{s}, \vec{v}, \vec{F}$ 等.

向量包含两个要素——大小和方向,故常用有向线段来表示向量.有向线段的方向表示向量的方向,有向线段的长度表示向量的大小.以起点为 M_1 ,终点为 M_2 的有向线段所表示的向量记作 $\overrightarrow{M_1M_2}$ (图7.1).如果有向线段 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 表示向量 $\mathbf{a}$,则称 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 是向量 $\mathbf{a}$ 的一个几何表示.

向量的大小,叫做向量的**模**.有时也称为向量的**长度**.向量 $\mathbf{a}$ 的模,记为 $|\mathbf{a}|$,向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模记为 $|\overrightarrow{M_1M_2}|$.

两个向量**方向相同**,是指将它们移到同一起点时,它们在同一条直线上,它们的终点都在起点的同一侧.反之,若两个终点分别分布在起点的两侧,则称两向量**方向相反**.图7.2中,向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 方向相同,向量 $\mathbf{a}, \mathbf{c}$ 或 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 方向相反.




图 7.1




图 7.2

模等于零的向量叫做**零向量**,记作 0 . 零向量的起点与终点重合,因此零向量的方向是任意的.

如果向量 a, b 的大小相等,方向相同,就称向量 a 与 b 相等,记为 $a=b$. 也就是说,如果两个有向线段的大小相等、方向相同,则不论它们的起点是否相同,就认为它们表示同一个向量. 这种仅依赖于大小和方向,而与起点位置无关的向量称为**自由向量**. 本书中若无特殊说明,均为自由向量.

由于自由向量可在空间中自由平移,因此两个非零向量 a 与 b 的夹角有如下定义:将 a 与 b 平移,使它们的起点重合后,它们所在的射线正向之间的夹角 $\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$ 称为 a 与 b 的**夹角**(图 7.3),记作 $(\hat{a}, \hat{b})$ 或 $(\hat{a}, \hat{b})$.




图 7.3

两个非零向量,如果它们的方向相同或者相反,就称这两个向量**平行**(或**共线**). 向量 a 与 b 平行,记作 $a \parallel b$. 如果两个非零向量的夹角为 90° ,就称这两个向量**垂直**(或**正交**),记作 $a \perp b$. 由于零向量的方向可以看作是任意的,因此可以认为零向量与任意向量既平行又垂直.

类似于两向量共线,还有向量共面的概念. 设有 $k (k \geq 3)$ 个向量,当把它们的起点放在同一点时,如果 k 个终点和公共起点位于同一个平面上,则称这 k 个向量**共面**.

显然,任意两个向量总是共面的.

7.1.2 向量的线性运算

7.1.2.1 向量的加法

设有两个向量 a 与 b ,任取一点 A ,作 $\overrightarrow{AB}=a$,再以 B 为起点,作 $\overrightarrow{BC}=b$,连接 AC ,则向量 $\overrightarrow{AC}=c$ 称为向量 a 与 b 的**和**(图 7.4),记作 $a+b$,即

$$c = a + b.$$

上述作出两向量之和的方法称为向量相加的三角形法则.

容易看到, 向量加法的三角形法则也适用于 a 与 b 平行的情况.

若向量 a 与 b 不平行, 那么, 也可以用如下平行四边形法则求它们的和. 以点 A 为起点, 作 $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AD} = b$, 以 AB, AD 为边作平行四边形 $ABCD$, 连接对角线 AC , 显然, 向量 $\overrightarrow{AC}$ 等于向量 a 与 b 的和 $a + b$. 这与物理学上求合力的平行四边形法则是一致的(图 7.5).




图 7.4




图 7.5

向量的加法满足下列运算规律:

(1) 交换律 $a + b = b + a$;

(2) 结合律 $(a + b) + c = a + (b + c)$.

对于(1), 根据向量相加的三角形法则, 由图 7.5, 有

$$a + b = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = b + a,$$

所以向量的加法满足交换律.

对于(2), 如图 7.6 所示, 先作出 $a + b$, 再将其与 c 相加, 即得和 $(a + b) + c$, 如将 a 与 $b + c$ 相加, 则得同一结果, 所以向量的加法满足结合律.

由于向量的加法满足交换律和结合律, 所以 n 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_n (n \geq 3)$ 相加可写成 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 并可按三角形法则相加如下: 使前一向量的终点作为后一向量的起点, 相继作向量 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 再以第一向量的起点为起点, 以最后一向量的终点为终点作一向量, 这个向量即为这 n 个向量的和向量. 如图 7.7 所示, 有




图 7.6




图 7.7

$$s = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5.$$

设有向量 a , 称与 a 的模相等而方向相反的向量为 a 的负向量, 记作 $-a$. 由此, 定义两个向量 b 与 a 的差为

$$b - a = b + (-a).$$

上式表明, 向量 b 与 a 的差就是向量 b 与 $-a$ 的和. 特别地, 有

$$a - a = a + (-a) = 0.$$




图 7.8

在平行四边形 $ABCD$ 中, 以点 A 为起点, 作 $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AD} = b$, 如图 7.8 所示, 则 $\overrightarrow{BC} = b$, $\overrightarrow{CD} = -a$. 按照向量求和的三角形法则, 显然对角线 BD 上的向量 $\overrightarrow{BD} = b + (-a)$, 即 $\overrightarrow{BD} = b - a$. 而另一对角线 AC 上的向量 $\overrightarrow{AC} = a + b$.

7.1.2.2 数与向量的乘法

对任意的实数 λ 和向量 a , λ 与 a 的乘积(简称数乘)记为 λa . 规定 λa 是一个向量, 它的模与方向定义如下:

- (1) λa 的模是 a 的模的 $|\lambda|$ 倍, 即 $|\lambda a| = |\lambda| \cdot |a|$;
 - (2) 当 $\lambda > 0$ 时, λa 与 a 的方向相同; 当 $\lambda < 0$ 时, λa 与 a 的方向相反.
- 当 $\lambda = 0$ 时, $|\lambda a| = 0$, 即 λa 是零向量, $\lambda a = 0$, 它的方向是任意的.
- 当 $\lambda = \pm 1$ 时, $1a = a$, $(-1)a = -a$.

向量与数的乘法满足下列运算规律:

- (1) 结合律 $\lambda(\mu a) = \mu(\lambda a) = (\lambda\mu)a$;
- (2) 分配律 $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$; $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$.

这些运算规律都可以按照向量与数的乘法的定义来证明.

向量相加及数乘向量统称为向量的线性运算.

例 7.1 证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 其长度等于第三边长度的一半.

证 如图 7.9 所示, 在三角形 ABC 中, D, E 分别为边 AC 和 BC 的中点, 即 $\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}$,

$$\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2} \overrightarrow{CB}.$$

因 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CE}$, 则




图 7.9

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$

亦即 $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{AB}$ 且 $|\overrightarrow{DE}| = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|$.

模等于 1 的向量叫做单位向量. 通常把与非零向量 a 方向相同的单位向量称为 a 的单位向量, 记为 e_a .

构造向量 $\frac{1}{|a|}a$.

因 $|a| > 0$, 由数乘的定义, $\frac{1}{|a|}a$ 与 a 方向相同;

再考虑 $\frac{1}{|a|}a$ 的长度. 由数乘的定义,

$$\left| \frac{1}{|a|}a \right| = \left| \frac{1}{|a|} \right| \cdot |a| = \frac{1}{|a|} \cdot |a| = 1,$$

即 $\frac{1}{|a|}a$ 为单位向量.

综上所述, $\frac{1}{|a|}a$ 是一个与 a 方向相同的单位向量, 因此

$$e_a = \frac{1}{|a|}a \quad \text{或} \quad a = |a|e_a.$$

注 一个非零向量与它的模的倒数的乘积是一个与原向量同方向的单位向量, 这一运算称为将向量单位化.

由向量平行的定义, 对于任意的实数 λ , 向量 λa 总是与 a 平行, 因此可用向量与数的乘积来判定两个向量的平行关系.

定理 7.1 设向量 $a \neq 0$, 则向量 $b \parallel a$ 的充分必要条件是存在唯一的实数 λ , 使得 $b = \lambda a$.

证 条件的充分性由数乘的定义即得. 下面证必要性.

设 $b \parallel a$. 若 $b = 0$, 则取 $\lambda = 0$, 即有 $b = 0 = 0a = \lambda a$.

若 $b \neq 0$, 取 $|\lambda| = \frac{|b|}{|a|}$, 则

$$|\lambda a| = |\lambda| |a| = \frac{|b|}{|a|} \cdot |a| = |b|,$$

且当 b 与 a 同向时, 取 $\lambda = \frac{|b|}{|a|}$, 当 b 与 a 反向时, 取 $\lambda = -\frac{|b|}{|a|}$, 故由向量相等的定义, 有 $b = \lambda a$.

如果另有实数 μ 满足 $\mathbf{b} = \mu \mathbf{a}$, 则两式相减得

$$(\lambda - \mu) \mathbf{a} = \mathbf{0},$$

从而 $|(\lambda - \mu) \mathbf{a}| = |\lambda - \mu| \cdot |\mathbf{a}| = 0$, 由于 $|\mathbf{a}| \neq 0$, 故 $\lambda = \mu$.

我们知道, 确定一条数轴, 需要给定一个点、一个方向及单位长度. 由于单位向量既能确定了方向又确定了单位长度, 因此, 只需要给定一个点及一个单位向量就能确定一条数轴. 此原理是建立数轴的理论依据.

设点 O 及单位向量 $\mathbf{i}$ 确定了数轴, 如图 7.10 所示, 则对于数轴上任意一点 P , 对应一个向量 $\overrightarrow{OP}$. 由于 $\overrightarrow{OP} \parallel \mathbf{i}$, 由定理 7.1, 必存在唯一的实数 x , 使得

$$\overrightarrow{OP} = x\mathbf{i},$$



图 7.10

其中 x 称为数轴上有向线段 $\overrightarrow{OP}$ 的值. 这样, 向量 $\overrightarrow{OP}$ 就与实数 x 一一对应. 从而

$$\text{点 } P \longleftrightarrow \text{向量 } \overrightarrow{OP} = x\mathbf{i} \longleftrightarrow \text{实数 } x,$$

即数轴上的点 P 与实数 x 一一对应. 我们定义实数 x 为数轴上点 P 的坐标.

习题 7.1

1. 设 $\mathbf{u} = \mathbf{a} - \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{a} + 3\mathbf{b} - \mathbf{c}$, 试用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 表示向量 $\mathbf{d} = 2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$.
2. 已知菱形 $ABCD$ 的对角线 $\overrightarrow{AC} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BD} = \mathbf{b}$, 试用向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DA}$.
3. 证明: 对角线互相平分的四边形是平行四边形.

7.2 空间直角坐标系和向量的坐标

代数运算的基本对象是数, 几何图形的基本元素是点, 促成它们相互联系的是点的坐标. 在平面解析几何中, 平面直角坐标系建立了平面上的点与有序二元实数组之间的一一对应关系, 类似地, 为了建立空间中的点与有序三元实数组之间的一一对应关系, 需要构建空间直角坐标系.

7.2.1 空间直角坐标系

在空间中任意选取一个定点 O , 过点 O 作互相垂直的三条数轴 Ox, Oy, Oz , 它们都以 O 为原点且有相同的单位长度, 分别叫做 x 轴(横轴), y 轴(纵轴), z 轴(竖轴), 统称坐标轴. 三个坐标轴的正向符合右手法则, 即以右手握住 z 轴, 当右手的