

文淵閣

影印

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第七六四冊

北京出版集團公司
北京出版社

本册目次

薛氏医案(二)

明薛己撰……………一

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷四十九
五十

詳校官太醫院醫士 臣 舒岱

編修 臣 倉聖脈攷

總校官原任中允 臣 王燕緒

校對官助教 臣 卜維吉

謄錄監生 臣 茅琳

欽定四庫全書

薛氏醫案卷四十九

明 薛己 撰

教氏傷寒金鏡錄

凡傷寒熱病傳經之邪比雜病不同必辨其脉證舌表裏汗下之庶有不誤况脉者血之府屬陰當其得病之初正氣相搏若真氣未衰脉必滑數而有力病久熱甚氣衰脉必微細而無力方數甚也但可養陰退陽此識脉之要也或初病即惡寒發熱後必有渴水燥熱之證或逆厥而利此熱證傳經之邪也若始終皆熱證惟熱而不惡寒故傷寒為病初則頭痛必無發熱惡寒渴水之症一病便有逆厥泄利或但惡寒而無發熱此寒證也此識證之妙也如舌本者乃心之竅於舌心屬火主熱象離明人得病初在表則舌自紅而無白胎等色表邪入于半表半裏之間其舌色變為白胎而滑見矣切不可不明表證故邪傳於裏未罷則舌必見黃胎乃邪

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

已入於胃急宜下之胎黃自去而疾安矣至此醫之不
依次候用湯久失於遲下其胎必黑變瘡起此為難
治若見舌胎如漆黑之光者十無一生此心火自炎與
邪熱二火相乘熱極則有無化水象故色從黑而應水
化也若乃臟腑皆受邪毒日深為瘡必作熱症雖宜下
之乃去胃中之熱否則其熱散入絡臟之中鮮有不死
者譬如火之自炎初則紅過則新為黑色炭矣此亢則
害承乃制今以前十二舌明著猶恐未盡諸瘡復作二

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

三

十四圖并方治列於左則區區推源尋流寔可決生死之

妙也

清碧學士
杜先生著

傷寒用藥說

夫醫者何猶防之將也凡視人疾在究其淺深之異而
療之且疾之襲人若寇之侵境方其至也必瞰其勢之
強弱先以安撫次以講和戒嚴守禦以防其返也如堅
然不退至再至三忍強肆侮意謀土地當此之際李何必
選將練兵剋期至戰寇滅乃已若倉皇無措則土地陷

矣豈非將者不識韜畧不知合變以致悞也可勝嘆哉
夫今之醫不閱方書不察脉理臨瘡茫然當解而不解
當吐下而不吐下畏首畏尾顛倒錯亂助病日深殊不
知醫乃司命其可輕忽如此大抵病之輕淺者即為和
解深重者使便攻擊故曰用藥之時膽欲大而心欲小
毋使君臣失職佐使不當反嫁疾焉苟能如將之用兵
進退合宜操存有法何疾之不愈也余每察脉用藥覺
有疑滯幸承先師之誨故始撮其要領以告後人云

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

三

至正改元一陽吉日永和三仙至人蕭璜鳴書

驗證舌法

夫人之受病傷寒為甚傷寒之治仲景為詳人皆知之
而未必能行之者豈非以其法浩繁有難卒貫者乎舊
有教氏金鏡錄一篇專以舌色視病既圖其狀復著
其情而後別其方藥開卷昭然一覽具在雖不期乎
仲景之書而自悉合乎仲景之道可謂深而通約而
要者矣予昔承乏在留都嘗刺之太醫官舍本皆繪

以五采恐其久而色渝因致謬誤乃分注其色於上使人得以意會焉

舌



舌見白胎滑者邪初入裏也丹田有熱胸中有寒乃少陽半表半裏之證也宜用小柴胡湯梔子豉湯治之

小柴胡湯

方見後

梔子豉湯

方見後

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

四

舌見紅色熱蓄於內也不問何經宜用透頂清神散治之

透頂清神散

猪牙皂角

細辛

白芷

當歸

右為末等分和勻令病人先噙水一口以藥少許吹鼻內吐去水取嚏為度未嚏仍用藥吹入凡瘟疫之

家不拘已未患者皆宜用之

舌見純紅內有黑形如小舌者乃邪熱結於裏也君火

熾盛反無水化宜涼膈散大柴胡湯下之

涼膈散

方見後

大柴胡湯

方見後

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

五


舌見紅色而有小黑色者熱毒乘虛入胃蓄熱則發癰矣宜用玄參升麻葛根湯化斑湯解之玄參升麻葛根

湯

即玄參升麻湯加葛根方見後

化斑湯

即白虎湯加人參方見後



舌見淡紅中有大紅星者乃少陰君火熱之盛也所不勝者假火勢以侮脾土將欲發黃之候也宜用茵陳五


苓散治之

茵陳五苓散 方見後



舌見紅色尖見青黑者水虛火實腎熱所致宜用竹葉

石膏湯治之 方見後



欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

六

舌見淡紅色而中有一紅暈沿皆純黑乃餘毒遺於心胞絡之間與邪火鬱結二火亢極故有是證也以承氣


湯下之 方見後



舌見紅色更有裂紋如人字形者乃君火燔灼熱毒炎

上故發裂也宜用涼膈散

涼膈散 方見後



舌見紅色更有紅點如蟲蝕之狀者乃熱毒熾盛火在

上水在下不能相濟故也宜用小承氣湯下之

小承氣湯 方見後



舌見紅色內有乾硬黑色形如小長舌有刺者此熱毒

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

七

熾甚堅結大腸金受火制不能平木故也急用調胃承氣湯下之

調胃承氣湯 方見後



舌見紅色內有黑紋者乃陰毒厥于肝經肝主筋故舌

見如絛形也用理中合四逆湯溫之

四逆湯

乾薑半兩

附子一枚去皮

甘草六錢二

右每服五錢水一鍾煎六分不拘時溫服

理中湯服法如前

人參

甘草

乾薑炮

白朮炒

舌見黑色水尅火明矣患此者百無一生治者審之

余在留都時地官主事鄭汝東妹婿患傷寒得此舌

欽定四庫全書

薛氏醫案

卷四十九

院內醫士曾禧謂當用附子理中湯人咸驚駭遂止

亦莫能療因甚治棺曾與之隣往視之謂用前藥猶

有生理其家既待以死據從之數劑而愈大抵舌黑

之症有火極似水者即杜學士所謂薪為黑炭之意

也宜涼膈散之類以瀉其陽有水來尅火者即曾醫

士所療之人是也宜理中湯以消陰翳又須以老生

薑切平擦其舌色稍退者可治堅不退者不可治

弘治辛酉金臺姜夢輝患傷寒亦得此舌手足厥冷

吃逆不止眾醫猶作火治幾致危殆判院吳仁齋用


附子理中湯而愈夫醫之為道有是病必有是藥附

子療寒其效可數奈何世皆以為必不可用之藥寧

視人之死而不救不亦哀哉至於火極似水之症用

藥得宜效應不異不可便謂為百無一治而棄之也

教氏傷寒金鏡錄圖方



欽定四庫全書

薛氏醫案

卷四十九

舌見尖白根黃其表證未罷也須宜解表然後方可攻

之如大便秘者用涼膈散加硝黃泡服小便澀者用五

苓散加木通合益元散加薑汁少許以白滾湯調服

涼膈散

生甘草

連翹

山梔

大黃

黃芩

薄荷

薄荷

朴硝

各一

右每服一兩水二盞淡竹葉二十餘片煎至一盞去

粗入生蜜少許熱服以利為度

五苓散

加茵陳即茵陳五苓散

澤瀉

二錢五分

茯苓

二錢五分

猪苓

各一兩

白朮

各一兩

桂

五錢

木通

滑石

甘草

各一兩

右為末每服五錢入薑汁并蜜各少許白滾湯調下



古見弦白心黑而脉沉微者難治脉浮滑者可汗沉實

者可下始病即發此色乃危殆之甚也速進調胃承氣

湯下之

欽定四庫全書 薛氏醫案 卷四十九

調胃承氣湯

甘草

三錢

大黃

六錢

硝

二錢

右用水一鍾半先煎甘草大黃將熟去粗下芒硝再

煎三五沸頓熱服



舌尖白胎二分根黑一分必有身痛惡寒如飲水不至

甚者五苓散自汗渴者白虎湯下利者解毒湯此亦危

證也

五苓散

方見後

白虎湯

知母

一錢五分

甘草

炙一錢

石膏

四錢

粳米

一撮

右每服一兩用水一鍾半入糯米先煎下諸味再煎

去粗服之加人參亦可

解毒湯

欽定四庫全書

薛氏醫案 卷四十九

黃連

一兩

黃柏

五錢


黃芩

五錢

山梔子

二十箇

右每服五錢水一鍾半煎至一鍾去粗頓熱服



舌見白胎中有黑小點亂生者尚有表證其病來之雖


惡宜涼膈散微表之表退即當下之下用調胃承氣湯

涼膈散

方見前

調胃承氣湯


方見前



舌見如灰色中間更有黑暈兩條此熱乘腎與命門也
宜急下之服解毒湯下三五次遲則難治如初服量加

大黃酒浸泡

解毒湯方見後



欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

十三

舌見微黃色者初病即得之發譫語者由失汗表邪入裏也必用汗下兼行以雙解散加解毒湯兩停主之
雙解散加解毒湯

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 麻黃 連

翹 芒硝各半兩 石膏 黃芩 桔梗各一兩 滑石三兩

甘草二兩 荊芥兩 白朮 山梔各半兩

右每服一兩水一鍾半薑三片煎八分服不拘時一


云有桂枝二兩



舌中見白胎外則微黃者必作泄宜服解毒湯惡寒者
五苓散

五苓散方見前

解毒散方見前



欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

十三

舌見微黃色者表證未罷宜用小柴胡湯合天水散主之可下者大柴胡湯下之表裡雙除臨證審用之
小柴胡湯

柴胡四錢 黃芩 甘草 人參 半夏泡各二錢

右每服一兩水一鍾半薑三片棗一枚煎一鍾溫服

天水散

甘草炙一兩 桂府滑石六兩

右各另為末每服五錢入生薑汁并蜜各少許用白

滾湯任意調服如發表用豆豉葱頭煎湯調服

大柴胡湯

柴胡錢四 黃芩 芍藥 各一錢五分 半夏 大黃 二錢五分 枳

實二錢 麩炒

右吹咀每服八錢水一鍾半薑三片棗一枚煎一鍾

溫服



欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

十四


舌見黃色者必初白胎而變黃色也皆表而傳裏熱已入胃宜急下之若下遲必變黑色為惡證為亢害鬼賊邪氣深也不治宜用調胃承氣湯下之

調胃承氣湯 方見前



舌左白胎而自汗者不可下宜白虎湯加人參三錢服

之



舌右白胎滑者病在肌肉為邪在半表半裏必往來寒熱宜小柴胡湯和解之

小柴胡湯 方見前



舌左見白胎滑此臟結之證邪併入臟難治

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九


十五

舌見四圍白而中黃者必作煩渴嘔吐之證無有表者

五苓散益元散兼服須待黃盡方可下也

益元散 方見前

五苓散 方見前



舌見黃而有小黑點者邪遍六腑將入五臟也急服調胃承氣湯下之次進和解散十救四五也

調胃承氣湯

方見前

和解散

藁本

桔梗

甘草

炙各五錢

蒼朮

三錢

陳皮

厚朴

姜製

各一錢


右水一鍾半薑三片棗二枚煎七分去渣不拘時服

服

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

十六



舌見黃而尖白者表少裏多宜天水散一服涼膈散二

服合進之脉弦者宜防風通聖散

天水散

方見前

涼膈散

方見前

防風通聖散

方見前



舌見黃而色有膈瓣者熱已入胃邪毒深矣心火煩渴

急宜大承氣湯下之若身發黃者用茵陳湯下血用

抵當湯水在脇內十棗湯結胸甚者大陷胸湯痞用大

黃瀉心湯

大承氣湯

厚朴

姜製三錢

枳實

炒二錢

大黃

三錢芒硝二錢

右每服一兩水一鍾半先煎枳實候熟入大黃再煎數沸入芒硝煎三五沸去粗熱服

茵陳湯

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

十七

茵陳

五錢

大黃

三錢

山梔子

七枚

右每服一兩水一盞半先煎茵陳半熟次入二味再煎去粗通口熱服

抵當湯

大黃

三錢

水蛭

糯米炒七個

蟅蟲

炒去羽足七箇

右作一服水一盞半煎一鍾去粗通口服

十棗湯

芫花

醋浸炒

大戟

甘遂

煨各等分

右每服二錢弱人減半以水一鍾半大棗十枚劈碎煎取八分去粗通口服

大陷胸湯

大黃^{錢七}芒硝^{錢三}甘遂^{錢四}

右用水二鍾先煎大黃至一鍾去粗下芒硝煎三五沸再下甘遂末溫服取利

大黃瀉心湯

大黃^{錢五}黃連^{錢五}黃芩^{錢五}各三錢五分


欽定四庫全書
薛氏醫案 卷四十九

右作一服水二鍾煎一鍾去粗通口溫服若有宿食痰飲者加半夏麴二錢



舌見四邊微紅中央灰黑色者此由失下而致用大承氣湯下之熱退可愈必三四下方退五次下之而不退者不治

大承氣湯^{方見前}



舌見黃而黑點亂生者其證必渴譫語脉實者生脉瀯者死循衣摸床者不治若下之見黑糞亦不治下宜大承氣湯


大承氣湯^{方見前}



欽定四庫全書
薛氏醫案 卷四十九

舌見黃中黑至尖者熱氣已深兩感見之十當九死惡寒甚者亦死不惡寒而下利者可治宜用調胃承氣湯主之

調胃承氣湯^{方見前}



舌見外淡紅心淡黑者如惡風表未罷用雙解加解毒湯相半微汗之汗罷急下之如結胸煩躁目直視者不

治非結胸者可治

雙解散方見前

解毒散方見前



舌見灰色尖黃不惡風寒脉浮者可下之若惡風惡寒


者用雙解散加解毒湯主之三四下之見糞黑不治

雙解散方見前 解毒湯方見前

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

二十



舌見灰黑色而有黑紋者脉實急用大承氣湯下之脉

浮渴飲水者用涼膈散解之十可救其二三



舌根微黑尖黃脉滑者可下之脉浮者當養陰退陽若

惡風寒者微汗之用雙解散若下利用解毒湯十生七

八也

雙解散方見前

解毒湯方見前



舌根微黑尖黃隱見或有一紋者脉實急用大承氣湯

下之脉浮渴飲水者用涼膈散解之十可救其二三

已上三十六舌乃傷寒驗證之捷臨證用心處之百

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

二十一

無一失

薛氏醫案卷四十九

欽定四庫全書

薛氏醫案卷五十

明薛己訂

錢氏小兒直訣一

脈法

脈弦急氣不和脈沉緩傷食脈促結虛驚脈浮為風脈沉細為寒脈

亂治

薛按脈者人身之造化病機之先見用藥之準繩不

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷五十

可不先明諸心者也全幼心鑑云小兒一歲以前看

虎口食指寅卯辰三關以驗其病脈紋從寅關起不

至卯關者易治若連卯關者難治若寅侵卯卯侵過

辰者十不救一其脈紋見有五色如因驚必青瀉痢

色紫當以類而推之一歲後則可用一指轉側辨其

三部脈弦急浮沉四五歲後脈七八至而細數者為

平九至者傷十至者困六至五至者為虛為寒弦緊

者為風癇弦急為客忤其變蒸者脈必散亂骨間有

熱脈則沉數若浮而不調為鬼祟浮大而數為風熱

伏結為物聚微細為疳積為腹痛浮而洪為有蟲浮

而遲為胃寒此論脈之大要耳然小兒血氣未實驚

則氣散氣散則脈亂矣又當參以三部五脈三部者

乃看面上氣色虎口脈紋寸口一指脈五脈者上按

額前下診太衝并前三部謂之五脈也治法雖分虛

實然實者病氣實而形氣虛也虛者形氣病氣俱虛

也經云真氣奪則虛邪氣勝則實又云虛則補其母

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷五十

實則瀉其子東垣先生云形病俱實當瀉之形病俱

虛當補之

詳見後圖下

面部症

左腮為肝右腮為肺額上為心鼻為脾頰為腎若色赤

者熱也宜隨症治之

薛按左腮屬肝其色青者為順白者為逆若色赤主

肝經風熱發熱拘急青黑主驚風腹痛痰赤主潮熱

痰嗽右腮屬肺其色白者為順赤者為逆若赤色甚

者主咳嗽喘急悶亂飲水傳於腎則小便赤澇或淋閉不通額上屬心其色赤者為順黑者為逆若青黑主驚風腹痛癰癤啼哭微黃主盜汗頭髮乾燥驚疳骨熱鼻屬脾其色黃者為順青者為逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便秘而鼻燥衄血額屬腎其色黑者為順黃者為逆若色赤主腎與膀胱有熱而小便不通

目部症

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷五十

三

目內色赤者心實熱導赤散淡紅者心虛熱生犀散青者肝實熱瀉青丸淡青者肝虛熱地黃丸黃者脾實熱瀉黃散微黃者脾虛熱益黃散白而混者肺實熱瀉白散目無睛光者腎虛也地黃丸主之

薛按目者五臟之精華各有所主白睛屬肺黑睛屬肝上下眼胞屬脾紅脈屬心瞳人屬腎此五臟之正色也然白睛本屬肺而見紅色此心尅肺之賊邪也見青色此肝乘侮之微邪也見黑色此腎乘肺之實

邪也見黃色此脾乘肺之虛邪也餘倣此

五臟虛實寒熱

心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則困卧而悸心熱則合面睡或上竄咬牙者導赤散主之○心氣實而喜仰卧者瀉心湯主之

薛按前症若心小腸實熱宜治以前藥若心肝血虛用五味異功散加當歸若因心血不足用秘旨安神丸若肝心血燥用柴胡梔子散若因肝心血虛用六

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷五十

四

味地黃丸若因脾虛食鬱生痰而驚悸不安者宜用四君子以健脾神麴麥芽以消導山梔柴胡以清熱如用前方病氣雖去前症仍作急調補元氣或反甚急溫補元氣凡此多因妊娠厚味七情或小兒乳哺失宜或乳母飲食鬱怒所致病氣既見形氣已虛必當推其所因而以助胃壯氣為主佐以治病之劑為善餘倣此

肝主風實則面青目直叫哭壯熱項急煩悶虛則咬牙

呵欠○肝熱則手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之

薛按前症若肝木實熱生風而自病肺金實熱而尅木者宜用前二藥以瀉其邪氣之實若肝經風熱而目直等症者用柴胡梔子散以清肝火加味四物湯以養肝血若腎虛而咬牙諸症者用六君子湯以健脾土六味地黃丸以滋腎水苟不審其症之虛實而妄用前藥則虛虛之禍不能免矣

欽定四庫全書

薛氏醫案

五

肝有風則目連劄得心熱則發搐或筋脈牽繫而直視用瀉青丸以治肝導赤散以清心○肝熱則目赤或兼青發搐者亦用前二藥風甚則身反張強直用地黃丸以補腎瀉青丸以治肝

薛按前症若肝經實熱而自病宜用瀉青丸若肝經血燥而自病用抑肝散腎水虛不能生肝者宜用地黃丸若脾土虛不能培木者宜用六君子湯凡肝經既病風火相搏則肝臟虧損若不固根本必變他症

百出也

脾主困實則身熱引飲用瀉黃散虛則吐瀉生風用異功散 面白腹痛口中氣冷不思飲食或吐清水以益黃散溫補脾虛下利用調水丸 呵欠多睡者脾氣虛而欲發驚也

薛按前症若發熱作渴喜冷飲食或泄瀉色黃睡不露睛屬形病俱實宜用瀉黃散疏導之若發熱口乾惡冷飲食或泄瀉色白睡而露睛屬形病俱虛宜用

欽定四庫全書

薛氏醫案

六

異功散調補之若脾氣下陷者補中益氣湯升補之寒水侮土者益黃散溫補之肝木尅土者六君柴胡平補之若目睛微動潮熱抽搐吐瀉不食宜用秘旨保脾湯凡小兒諸病先當調補脾胃使根本堅固則諸病自退愚治沈氏子吐瀉腹痛手足並冷余謂此脾土虛弱寒水所侮先用益黃散一劑諸症頓愈手足稍冷此寒水退而脾土虛弱也用異功散少加木香一劑却去木香再劑而痊