

中医古籍珍本集成

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

本草卷

重修政和经史证类备用本草 ③

湖南科学技术出版社
岳麓书社

外臺秘要

治瘰癧七月七日出時收麻花五月五日收葉二件按注子於癰上灸百壯

又方

治虛勞下

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

【本草卷】

重修政和经史证类备用本草

③

主 编○陈仁寿 吴昌国
编者○（按汉语拼音排序）

陈仁寿 程 茜 程 新 崔 瑛 黄亚俊 李文林

王旭光 吴昌国 张沁园 张薛光 朱蕴菡

湖南科学技术出版社

岳麓书社

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

王李

秘书○王跃军 喻峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○裘沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图

方卷顾问(按汉语拼音排序)

杜 建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施 杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

王 任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李 昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

重修政和經史證類備用本草卷第十二

成都唐慎微續證類備用

宋徽宗政和三年九月庚辰詔修本草

救校勘

木部上品總七十二種

一十九種神農本草經白字

六種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家常用有効注云今附

一種新補

一種新定

重修政和經史証類備用本草

卷十二

七種新分條

一種唐慎微續補

墨蓋子下是

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桂

牡桂

茵桂

松脂

實華根節等附松黃松
諸唐注五粒松續注

槐實

枝皮根等附

槐膠

新定

槐花

新補

枸杞

葉上蟲窠續注

栢實

葉皮側柏等附

扶苓

扶神附

琥珀

璽

元附琥珀下
今新分條

榆皮

花附

酸棗

蘗木

根附

楮實

葉皮莖白汁等
附穀帛續注

乾漆

生漆附

五加皮

牡荊實

蔓荊實

辛夷

桑上寄生

杜仲

楓香脂

皮附唐附

女貞實

拘骨冬青續注

木蘭

蕤核

丁香

今附母丁香續注

沉香

薰陸香

雞舌香

藿香

詹糖香

檀香

乳香

已上六種元附沉香下今各分條

蘇合香

獅子屎續注

金櫻子

今附自草部今移

降真香

八種海藥餘

藤黃

返魂香

海紅豆

落鴈木

蘇木

柵木皮

無名木皮

奴會子

三百一

本草

卷

長

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮

舍水藤中水

皂蘆葉

蜜香

阿勒勃

鼠藤

浮爛囉勒

靈壽木皮

綖木

斑珠藤

阿月渾子

不彫木

曼遊藤

龍手藤

放杖木

石松

牛妳藤

震燒木

木麻

帝休

河邊木

檀桓

木蜜

朗榆皮

那耆悉

黃屑

桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻鼈能



賓州桂



桂花



宜州桂



桂

墮胎堅骨節通血脉理疎不足宜導百藥無所畏以服

神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾

得人參麥門冬并草大黃

黃芩調中益氣得芷胡紫石英乾地黃療吐逆
有菌牡二桂而桂用體大同小異今俗用便有三種以半卷多脂者
單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙經乃並有三桂常服食以
慈游合和雲母蒸化為水者正是此種爾今出廣州者好湘州始興
桂陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段小多脂肉
亦好經云桂葉如柏葉澤黑皮黃心赤齊武帝時湘州送樹以植芳
林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉乖異亦能凌冬忍或疑是牡桂
時人多呼丹桂正謂皮赤爾北方今重此每食輒瀆之蓋禮所云薑
桂以為芬芳
唐本注
菌桂葉似栴葉中有縱文三道表裏無毛而光
澤牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶引經云似栴葉驗之
殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種桂皮稍不同若菌桂
老皮堅板無肉全不堪用其小枝薄卷及二三重者或名菌桂或名
筒桂其牡桂嫩枝皮名為肉桂亦名桂枝其老者名木桂亦名大桂
得人參等良本是菌桂剥出單桂條陶為深誤也
今按
陳藏器本草
云菌桂牡桂桂心已上三色並同是一物按桂林桂嶺因桂為名今
之所生不離此郡從嶺以南際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛
烈皮又厚堅土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色以厚嫩
者為一色嫩既辛香兼又筒卷老必味淡自然板薄板薄者即牡桂也

以老大而名焉筒卷者即菌桂也以嫩而易卷古方有筒桂字似菌
字後人誤而書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是剷除皮
上甲錯取其近裏辛而有味臣禹錫等謹按蜀本注云按此有三種
菌桂葉似柿葉牡桂葉似枇杷葉此乃云葉如柏葉蘇以桂葉無似
柏葉者乃云陶為深誤刺出此條今據陶注云菌桂正圓如竹三重
者良牡桂皮薄色黃多脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂
者此云仙經有三桂以慈涕合和雲母熬化為水服之此則有三種
明矣陶又云齊武帝時相州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武
帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而
言也蘇恭但知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷
之甚也抱朴子云桂可以竹漚合餌之亦可以龜腦和服之藥性論
云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生慈味苦辛無毒主治九種心痛
殺三蟲主破血通利月閉治軟脚痺不仁治胞衣不下除欬逆結氣
擁痺止腹內冷氣痛不可忍主下痢治暈息肉日華子云桂心治一
切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝圖經曰菌
破痂癖癥瘕消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉桂
生交趾山谷牡桂生南海山谷桂生桂陽舊經載此三種之異性味
功用亦別而爾雅但言侵木桂一種郭璞云南人呼桂厚皮者為木
桂蘇恭以謂牡桂即木桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂
肉桂桂心官桂板桂之名而醫家用之罕有分別者舊說菌桂正圓
如竹有二三重者則今所謂筒桂也筒箇字近或傳寫之誤耳或云
即肉桂也牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類剷去皮名桂

中醫古籍珍本集成

本草卷

二〇八

心今所謂官桂疑是此也。桂是半卷多脂者。今所謂板桂疑是此也。今觀真宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不同。然皆題曰桂。無復別名。參考舊注謂菌桂葉似柿葉。中有三道文肌理緊薄如竹。大枝小枝皮俱是筒。與今賓州所出者相類。牡桂葉狹於菌桂而長數倍。其嫩枝皮半卷多紫。與今宜州韶州者相類。彼土人謂其皮爲木蘭皮。肉爲桂心。此又有黃紫兩色。益可驗也。桂葉如柏葉而澤黑。皮黃。心赤。今欽州所出者葉密而細。亦恐是其類。但不作柏葉形。爲疑耳。皮厚者名木桂。即板桂是也。蘇恭以牡桂與單名桂爲一物。亦未可據。其木俱高三四丈。多生深山蠻洞中。人家園圃亦有種者。移植於嶺北。則氣味殊少。辛弊固不堪入藥也。三月四月生花。全類茱萸。九月結實。今人多以裝綴花果作筵具。其葉甚香。可用作飲香。尤佳。二月八月採皮。九月採花。並陰乾。不可近火中品。又有天竺桂。云生西胡國。功用似桂。不過烈。今亦稀有。故但附於此。張仲景治傷寒用桂枝湯。甲乙經治陰受病發痺。內熨方用醇酒二十斗。蜀椒一斗。乾薑一斗。桂一斗。凡四物。以咀著清酒中。綿絮一斤。細白布四丈。皆并內酒中。置馬矢煨中。善封塗。勿使泄氣。五日五夜出布。綿絮暴乾。復漬之。以盡其汁。每漬必晬其日。乃出布。綿乾之。并用滓與絮複布爲中。其布長六七尺。爲六七巾。即用之。生桑炭炙巾。以熨寒痺所刺之處。令熱入。至於病所。寒復炙巾。以熨之。三十遍而止。汗出。炙巾以拭身。亦三十遍而止。起步內無見風。每刺必熨如此。病已矣。此所謂內熨也。又治臂筋急。亦以白酒和桂塗之。續傳信方造桂漿法。夏月飲之。解煩渴。益氣消痰。桂末二大兩。白蜜一升。以水二斗。先煎取一斗。待冷入。

新瓷瓶中後下二物攪二三百轉令勻先以油單一重覆上加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之藥成氣香味美格韻絕高今人

亦多作故

雷公云

凡使勿薄者要紫色厚者去上麁皮取心中

味厚真生用如末用即用重密熟絹并紙裹勿令犯風其州土只有桂草元無桂心用桂草煮丹陽木皮遂成桂心凡使即單擣用之

聖惠方

治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心一兩爲末以酒調如膏用傳頂上并額角

又方

痛妨悶用桂心一分爲末以酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立効

又方治寒疝心痛四肢逆冷全

擣羅爲散不計時候熱酒調下一錢匕

又方

治產後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂心三兩擣羅爲散狗膽汁和丸如櫻桃大

不計時候用熱酒磨下二丸

外臺秘要

療小兒疳中遺尿不自覺桂末雄雞肝等分擣丸服如小豆大溫水下日三

千金方

治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉桂心以酒煮取汁故布蘸榆病上正即止左喎榆右右喎榆左常用大効

又方

大治失音末桂著舌下漸燕汁

又方

治卒中惡心痛桂心八分咬咀以水四升煮取一升分三服

又方

後方

治卒心痛桂心八兩咬咀水四升煮取一升分三服

又方

治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕桂二兩切以水一

外二合者取八合去滓頓服無桂用乾薑亦得

又方

治中風四肢逆冷吐清水宛轉啼呼者取二兩咬咀以水三升煮取二升

中醫古籍珍本集成

本草卷

一一一〇

去滓適寒

又方

治反腰有血痛擣桂篩三分許以苦酒和塗痛上乾復塗

葛氏方

治卒吐血桂屑

方寸匕晝夜含二十許服亦

又方

治產後腹中痙痛末桂溫酒服方寸匕日三子母秘錄同

孫真人食忌

治中風失音方桂一尺以水三分煎取一升服取汗

又方

治噤血取桂心擣作末以水下

方寸梅師方

蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲吐漿煎

濃豉汁

又方

治卒外腎偏腫疼痛方桂心末和水調方寸匕塗之

又方

治產後血泄不禁止餘血彌痛兼塊

桂心乾薑等分爲末

空酒調服方寸匕

斗門方

治中風失音用桂心一兩去其麋皮近人身體懷之至兩時辰許爲末分

爲三服每服用水二盞煎取一盞服之

姚和衆方

治小兒臍腫取桂心炙令熱熨之曰可四五度

抱朴子云

桂可以合苾涕蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙

他子服桂二十年足下毛生日行五百里力舉千斤

衍義曰

桂大熱素問云辛甘發散爲陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療

寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問辛

甘發散爲陽之說尤知菌桂二桂不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮其木身麤厚處亦不中用諸家之說但各執已見終無證據今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世爲別物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

牡桂味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐衄心痛

脅風脅痛溫筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服

通神輕身不老生南海山谷

陶隱居云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀似桂而扁廣殊薄

皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹爲復猶是桂生有老宿者爾亦所未究唐本注云爾雅云浸音寢木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與菌桂同惟藥倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麤虛如木肉少味薄不及小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良臣禹錫等謹按蜀本草圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此爲善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之爾雅疏云浸一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者爲木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木本草謂之牡桂是也藥性論云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛

圖經文具桂條下

經驗

中醫古籍珍本集成

本草卷

後方

治大人小兒寒雜果子多腹脹氣急方取肉桂碾末飯丸如茱萸大小兒熟水下五丸大人十九丸未痊再服

茵桂味辛溫無毒主百病養精神和顏色爲諸藥先聘

通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交

趾桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採

陶隱居云交趾屬交州桂

林屬廣州而蜀都賦云茵桂臨崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真茵桂也仙經乃有用茵桂云三重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪唐本注云茵者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三重卷者藥似栝葉中三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是茵然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州自高錫等謹按蜀本圖經云葉似栝葉而尖狹光淨花白藥黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用三月七月採皮日乾

圖經

文具桂條下

列仙傳

范蠡好食桂飲水討藥人世世見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和

服韓終采藥詩

閭河之桂實大如栗得而食之後天而老

別說云

謹按諸家所說桂之異同幾不

可用考今交廣商人所販及醫家見用唯陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本