

文淵閣

影印

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第七七三冊

北京出版集團公司
北京出版社

本冊目次

本草綱目(二)

明 李時珍撰……………一

欽定四庫全書

子部
本草綱目卷十二下

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣徐彩

欽定四庫全書

本草綱目卷十二目錄

草部

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根莖柔交

于剛而成枝幹葉萼屬陽華實屬陰由是草中有木木中有

草得氣之粹者為良得氣之戾者為毒故有五形焉金木水火土

五氣焉香臭臊腥五色焉青赤黃白黑五味焉酸苦甘辛鹹五性焉寒熱溫涼

五用焉升降浮沉炎農嘗而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二目錄

明賢良醫代有增益但三品雖存淄澠交混諸條重出涇渭

不分苟不察其精微審其善惡何以權七方衡十劑而寄死

生耶于是翦繁去複繩繆補遺析族區類振綱分目除穀菜

外凡得草屬之可供醫藥者六百一十種分為十類曰山曰

芳曰隰曰毒曰蔓曰水曰石曰苔曰雜曰有名未用傷本草部上中

下三品共四百四十七種今併入三十一種移二十三

種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木

部移併一十四種蔓草二十九種菜部移併一十三種
果部移併四種外類有名未用共二百四十七種
神農本草經一百六十四種 梁陶弘景註

名醫別錄一百三十種陶弘景註 七十

李氏藥錄一種魏李當之 吳氏本草一種魏吳普

唐本草三十四種唐蘇恭 藥性本草一種唐甄權

本草拾遺六十八種唐陳藏器 食療本草二種唐孟詵

海藥本草四種唐李珣 四聲本草一種唐蕭炳

開寶本草三十七種宋馬志 嘉祐本草一十七種宋掌馬

圖經本草五十四種宋蘇頌 日華本草七種宋人大明

用藥法象一種元李杲 本草補遺一種元朱震亨

欽定四庫全書

本草會編一種明汪機 本草綱目八十六種明李時珍

附註宋雷斅地炙論 北齊徐之才藥對

唐楊損之刪繁 唐孫思邈千金

蜀韓保昇重註 南唐陳士良食性

宋寇宗奭衍義 唐慎微證類

陳承別說 金張元素珍珠囊

元王好古湯液 吳瑞日用

明汪穎食物 王綸集要

陳嘉謨蒙筌 憲王救荒

甯原食鑑

甘草本經

草之一

山草類上三十一種

黃耆本經

人參本經

沙參本經

薺芫別錄

桔梗本經

長松拾遺

黃精別錄

姜蕤本經

知母本經

肉蓯蓉本經

列當開寶

瑣陽補遺

赤箭天麻 本經

木本經

狗脊本經

貫衆本經

貫衆本經

欽定四庫全書

本草綱目

卷十二目錄

三

三

三

三

三

三

巴戟天本經
巴棘附

遠志本經

百脉根唐本

淫羊藿本經

仙茅開寶

玄參本經

地榆本經

丹參本經

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二目錄

四

紫參本經

王孫本經

紫草本經

白頭翁本經

白及本經

三七綱目

右附方舊八十六新二百六十

本草綱目卷十二目錄

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

明 李時珍 撰

草之一山草類上
一十三種

甘草本經
上品

釋名密甘別錄密草別錄美草別錄路草別錄靈通記事國老

別錄紅景曰此草最為衆藥之主經方少有不為者猶如香中有沈香也國老即帝師之稱雖非君而為

君所宗是以能安和草石而解諸毒也甄權曰諸藥中甘草為君治七十二種乳石毒解一千二百般草

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

木毒調和衆藥有功故有國老之號

集解別錄曰甘草生河西川谷積沙山及上郡二月

郡今不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸道中來赤

皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕乃西羌地

名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者破刀

破不復好青州間有而不如入有紫甘草細而實之

時亦可蘇頌曰今陝西河東州郡皆有之春生青

苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似冬結實作

角子如單豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有

橫梁梁下皆細根也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今

甘草有數種以堅實斷理者為佳其輕虛縱理及細

勒者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云藟大苦郭璞

註似地黃又詩唐風云采芩芩芩首陽之巔是也藟

與芩通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生

處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎李時珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅薑大苦之註為甘草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙濤似有白毛結角如相思角作一本生至熱時角折子扁如小豆極堅齒嚼不破今出河東西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦非甘草也以理度之郭說形狀殊不相類沈說近之今人惟以大經寸而結緊斷文者為佳謂之粉草其輕虛細小者皆不及之錫積霏雪錄言安南甘草大者如柱土人以架屋不識果然否也

根修治 雷斅曰凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每用切長三寸學作六七片入甕器中盛用酒浸蒸從已至午取出暴乾剉細用一法每斤用酥七兩塗炙酥盡為度又法先炮令內外赤黃用時珍曰

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

方書炙甘草皆用長流水熬濕炙之至熟刮去赤皮或用漿水炙熟未有酥炙酒蒸者大底補中宜灸用瀉火宜生用

氣味甘平無毒 寇宗奭曰生則微涼味不佳炙則溫王好古曰氣薄味厚升而浮陽也入

足太陰厥陰經時珍曰通入手足十二經徐之才曰木苦參乾漆為之使惡志遠反大戟芫花甘遂海藻櫟曰忌豬肉時珍曰甘草與藻戟遂芫四物皆反而胡洽居士治痰癖以十棗湯加甘草大黃乃是痰

在膈上欲令通泄以扶去病根也東垣李杲治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪朱震亨治勞瘵蓮心

飲用芫花二方俱有甘草皆本胡居士之意也故陶弘景言古方亦有相惡相反並乃不為害非妙達精

微者不能知此理

主治五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉

倍氣力金瘡腫解毒久服輕身延年本經時珍切腫也溫

中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脉利血氣解

百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種

草別錄主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五臟腎氣

內傷令人陰不痿主婦人血滯腰痛凡虛而多熱者

加用之甄權安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩

悶健忘通九竅利百脉益精養氣壯筋骨大生用瀉

火熱熟用散表寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

脾胃潤肺 李杲吐肺痿之膿血消五發之瘡疽好解小

兒胎毒驚癇降火止痛時珍

稍主治生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮玄胡索

苦楝子 尤妙元素

頭主治生用能行足厥陰陽明二經汚濁之血消腫

導毒震亨主癰腫宜入吐藥時珍

發明 震亨曰甘草味甘大緩諸火黃中通理厚德載

薄味厚可升可降陰中陽也陽不足者補之以甘草溫能除大熱故生用則氣平補脾胃不足而大瀉心

火灸之則氣溫補三焦元氣而散表寒除邪熱去咽
痛緩正氣養陰血凡心火乘脾腹中急痛腹皮急縮
者宜倍用之其性能緩急而又協和諸藥使之不爭
故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜者
用之得其平好古曰五味之用苦泄辛散酸收鹹斂
甘上行而發而本草言甘草下氣何也蓋甘味主中
有升降浮沉可上可下可外可內有和有緩有補有
泄居中之道蓋矣張仲景附子理中湯用甘草恐其
僭上也調胃承氣湯用甘草恐其速下也皆緩用之
意小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用
甘草者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩
脾急也鳳髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘
補之意又曰甘者令入中滿中滿者勿食甘甘緩而
壅氣非中滿所宜也凡不滿而用炙甘草為之補若
中滿而用生甘草為之瀉能引諸藥直至滿所甘味
入脾歸其所喜此升降浮沉之理也經云以甘補之

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

四

以甘瀉之以甘緩之是矣時珍曰甘草外赤中黃色
兼坤離味濃氣薄資全土德協和羣品有元老之功
普治百邪得王道之化贊帝力而人不知斂神功而
己不與可謂藥中之良相也然中滿嘔吐酒客之病
不喜其甘而大戟芫花甘遂海藻與之相反是亦迂
緩不可以救昏昧而君子嘗見嫉於宵人之意與
頌曰按孫思邈千金方論云甘草解百藥毒如湯沃
雪有中烏頭巴豆毒甘草入腹即定驗如反掌方稱
大豆汁解百藥毒予每試之不效加八甘草為甘豆
湯其驗乃奇也又葛洪肘後備急方云席痺刺更當
言嶺南俚人解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法
乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥久與親狎乃得
其詳凡飲食時先取炙甘草三兩生薑四兩水六升煮
毒隨即吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮
二升日三服或用都淋藤黃藤二物酒煎溫常服則
毒隨大小洩出又常帶甘草數寸隨身備急若經含

甘草而食物不吐者非毒物也三百頭牛藥即土
常山也三百兩銀藥即馬兜鈴藤也詳見各條

附方 舊十五 傷寒心悸 脈結代者甘草二兩水三升
新二十 傷寒咽痛 少陰證甘草湯主之用甘草二兩蜜水

要傷寒咽痛 炙水二升煮一升半服五合日二服
張仲景 肺熱喉痛 浸一夜一兩每服五錢水一鍾半
傷寒論 肺熱喉痛 浸一夜一兩每服五錢水一鍾半

入阿膠半片煎 肺痿多涎 肺痿吐涎沫頭眩小便數
服 錢乙直訣 肺痿多涎 而不欬者肺中冷也甘草

乾薑湯溫之甘草炙四兩乾薑炮二兩水三
升煮一升五合分服 張仲景金匱要畧 肺痿久

嗽 涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草三兩炙搗為末每
日取小便三合調甘草末一錢服之 廣利方

小兒熱嗽 甘草二兩豬膽汁浸五宿炙研末蜜丸
豆大食後薄荷湯下十九名涼膈丸 聖

欽定四庫全書 本草綱目 卷十二上 五

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

五

惠 初生解毒 小兒初生未可便與硃砂蜜只以甘草
方 初生解毒 一指節長炙碎以水二合煮取一合以

綿染點兒口中可為一規規當吐出胸中惡汁此後
待兒饑渴更與之令兒智慧無病出痘稀少 王璆

選 初生便閉 甘草和穀煨各一錢水小兒撮口 發
方 初生便閉 半蓋煎服 全幼心鑑 小兒撮口 用生

甘草二錢半水半蓋煎六分溫服令吐 嬰兒目澀 月
疾涎後以乳汁點兒口中 金匱玉函 嬰兒目澀 內

目閉不開或腫羞明或出血者名慢肝風用甘草一
截以豬膽汁炙為末每用米泔調少許灌之 幼幼

新 小兒遺尿 大甘草頭煎湯夜夜 小兒尿血 甘草一兩
書 小兒遺尿 服之 危氏得效方 小兒尿血 二錢水六

合煎二合一歲兒一日 小兒羸瘦 甘草三兩炙焦為末
服盡 姚和衆至寶方 小兒羸瘦 蜜丸綠豆大每溫水

下五九日二 大人羸瘦 甘草三兩炙每旦以小便煮三
服金匱玉函 大人羸瘦 四沸頓服之良 外臺秘要

赤白痢下

在宣州所傳方用甘草一尺炙劈破以淡漿水煎水一升半煎取八合服之立效 梅師方

用甘草一兩炙肉豆蔻七個 舌腫塞口 不治殺人甘草煨剉以水三升煎一分服 煎濃湯熱漱頻

吐聖 太陰口瘡 甘草二寸白礬一兩 發背癰疽 亮海上集驗方云李北海言此方乃神授極奇秘用甘草三兩大兩生搗篩末大麥麴九兩和勻取好酥少許入

內下沸水搜如餅狀方圓大於瘡一分熱傳腫上以絢片及故紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出未成

者腫便內消仍當與黃芪粥為妙 又一法甘草一大兩水炙根碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿

平明以物攪令沫出去沫服之但 諸般癰疽 微炙切以是瘡腫發背皆甚效 蘇頌國經

酒一斗同浸瓶中用黑鉛一片溶成汁投酒中取出如此九度令病者飲酒至醉寢後即愈也 經驗方一

切癰疽 諸發預期服之能消腫逐毒使毒不內攻功效不可具述用大橫文粉草二斤槌碎河水浸一

宿採取濃汁再以密絹過銀石器內慢火熬成膏以菴罐收之每服一二匙無灰酒或白湯下曾服丹藥者亦

解之或微利無妨名 癰疽秘塞 生甘草二錢半井水煎國老膏外科精要方 服能疎導下惡物 直

指乳癰初起 炙甘草二錢新水煎服 些小癰癤 即發熱時方乳癰初起 仍令人唾之 直指方 些小癰癤 即用粉

草節晒乾為末熱酒服一二錢連 痘瘡煩渴 炙甘草草進數服病熱皆止 外科精要方 痘瘡煩渴 炙甘草

根等分水煎服之甘草能通 陰下懸癰 生於穀道前血脈發瘡痘也 直指方 陰下懸癰 後初發如松

子大漸如蓮子數十日後赤腫如桃李成膿即破破則難愈也用橫文甘草一兩四寸截斷以深潤長流

水一盞河水井水不用以文武火慢慢煎水炙之自早至午令水盡為度劈開視之中心水潤乃止細剉

欽定四庫全書

本草綱目 卷十二上

六

欽定四庫全書

本草綱目 卷十二上

七

用無灰好酒二小盞煎至一盞溫服次日再服便可保無虞此藥不能急消過二十日方得消盡與化守

康朝病已破衆醫拱手服此二劑即合 陰頭生瘡 口乃韶州劉從周方也 李迅癰疽方 陰頭生瘡

甘草末頻頻塗之 陰下濕癢 甘草煎湯洗之次以黃神效 千金方 陰下濕癢 五度 古今錄驗 代指

腫痛之 甘草煎湯漬 凍瘡發裂 甘草煎湯洗之次以黃麻油調傳 湯火瘡灼 甘草煎湯洗之次以黃

談望翁方 湯火瘡灼 甘草煎湯洗之次以黃真麻油浸之年久愈妙每月嚼 小兒中蠱 欲死者甘

一盞煎五分服當 牛馬肉毒 甘草煮濃汁飲一二升吐 金匱玉函 牛馬肉毒 或煎酒服取吐或下如

渴不可飲水飲之 飲饌中毒 未審何物卒急無藥只即死 千金方 飲饌中毒 未審何物卒急無藥只

活 金匱 水菰落毒 菜中有水菰落葉圓而光有毒玉函方 水菰落毒 菜中有水菰落葉圓而光有毒

吐以甘草煮汁服之即 解 金匱玉函妙方 黃耆 本經上品

釋名黃芪 綱目戴樞本戴樞別錄又 草別錄又 百本別王孫 藥性論 時珍曰耆長也黃耆色黃為補藥

錄王孫 藥性論 時珍曰耆長也黃耆色黃為補藥乃著龜之著音尸王 孫與牡蒙同名異物

集解 別錄曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中二月十月今亦難得次用黑水宕昌者色白肌理粗新者亦甘

而溫補又有豎陵白水者色理勝蜀中者而冷補又

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

有赤色者可作膏貼俗方多用道家不須恭曰今出
原州及華原者最良蜀漢不復采用宜州寧州者亦
佳頌曰今河東陝西州郡多有之根長一二尺以來
獨莖或作叢生枝幹去地二三寸其葉扶疎作羊齒
狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸
許八月中采根用其皮折之如綿謂之綿黃者然有
數種有白水者赤水者木者功用並同而力不及白
水者木者短而理橫今人多以苜蓿根假作黃者折
皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃者至柔勒
皮微黃褐色肉中白色此為異耳承曰黃者本出綿
上者為良故名綿黃者非謂其柔勒如綿也今圖經
所繪憲州者地與綿上相隣也好古曰綿上即山西
沁州白水在陝西同州黃者味甘柔軟如綿能令人
肥首苜蓿根味苦而堅脆俗呼為土黃者能令人瘦用
者宜審嘉謨曰綿上沁州鄉名今有巡檢司白水赤
水二鄉俱屬隴西時珍曰黃耆葉似槐葉而微尖小

又似蒺藜葉而微闊大青白色開黃紫花大如槐花
結小尖角長寸許根長二三尺以紫實如箭蘇者為
良嫩苗亦可燒淘茹食其子收
之十月下種如種菜法亦可

修治 數曰凡使勿用木者草真相似只是生時葉短
并根橫也須去頭上皺皮蒸半日擘細於槐砧

上剉用時珍曰今人但槌扁以蜜水塗炙數次以熟
為度亦有以鹽湯潤透器盛於湯瓶蒸熟切用者

根氣味甘微溫無毒 經白水者冷補 別錄元素曰味
味厚可升可降陰中陽也入手足太陰氣分又入手

少陽足少陰命門之才曰旋苓為之使惡龜甲白鮮

皮 主治癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻

補虛小兒百病 經本婦人子臟風邪氣逐五臟間惡血

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣
別主虛喘腎衰耳聾瘡寒熱治發背內補 甄權助氣壯
筋骨長肉補血破癥瘕瘰癧瘻贅腸風血崩帶下赤
白痢產前後一切病月候不勻痰嗽頭風熱毒赤目
日治虛勞自汗補肺氣瀉肺火心火實皮毛益胃氣
去肌熱及諸經之痛 素主太陰瘡疾陽維為病苦寒
熱督脈為病逆氣裏急 好古
發明 弘景曰出隴西者溫補出白水者冷補又有赤
色者可作膏用消癰腫藏器曰虛而客熱用白

水黃耆虛而客冷用隴西黃耆大明曰黃耆藥中補
益呼為羊肉白水者涼無毒排膿治血及煩悶熱毒
骨蒸勞熱赤水者涼無毒治血退熱毒餘功並同木耆
涼無毒治煩排膿之力微於黃耆遇關即倍用之元
素曰黃耆甘溫純陽其用有五補諸虛不足一也益
元氣二也壯脾胃三也去肌熱四也排膿止痛治血
生血內托陰疽為瘡家聖藥五也又曰補五臟諸虛
治脉弦自汗瀉陰火去虛熱無汗則發之有汗則止
之好古曰黃耆治氣虛盜汗并自汗及膚痛是皮表
之藥治路血柔脾胃是中州之藥治傷寒尺脉不至
補腎臟元氣是裏藥乃上中下內外三焦之藥也果
曰靈樞云衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而
司開闔黃耆既補三焦實胃氣與桂同功特比桂甘
平不辛熱為異耳但桂則通血脉能破血而熱衛氣
者則益氣也又黃耆與人參甘草三味為除躁熱肌
熱之聖藥脾胃一虛肺氣先絕必用黃耆溫分肉益

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

皮毛實腠理不令汗出以益元氣而補三焦震亨曰黃耆補元氣肥白而多汗者為宜若面黑形實而瘦者服之令人胸滿宜以三拗湯瀉之宗奭曰防風黃耆世多相須而用唐許慎宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時柳太后病風不能言脉沈而口噤亂宗曰既不能下藥宜湯氣蒸之藥入腠理周時可瘥乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如烟霧其夕便得語也果曰防風能制黃耆黃耆得防風其功愈大乃相畏而相使也震亨曰人之口通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不受有形而受無形地以主濁故口受有形而兼乎無形柳太后之病不言若以有形之湯緩不及事今投以二物湯氣滿室則口鼻俱受非智者通神不可回生也果曰小兒外物驚宜用黃連安神丸鎮心藥若脾胃寒濕吐腹瀉瀉痢青白宜用益黃散藥如脾胃火勞役不足之證及服巴豆之類胃虛而成慢驚者用益黃理中之藥必傷人命當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中以甘寒瀉火以酸涼補金使金旺火衰風木自平矣今立黃耆湯瀉火補金益土為神治之法用炙黃耆二錢人參一錢炙甘草五分芍藥五分水一大盞煎半盞溫服機曰蕭山魏直著博愛心鑑三卷言小兒痘瘡惟順逆險三證順者為吉不用藥逆者為凶不必用藥惟險乃悔吝之象當以藥轉危為安宜用保元湯加減主之此方原出東垣治慢驚土衰火旺之法今借而治痘以其內固營血外護衛氣滋助陰陽作為膿水其證雖異其理則同去芍藥加生薑改名曰保元湯炙黃耆三錢人參二錢炙甘草一錢生薑一片水煎服之險證者初出圓暈乾紅少潤也將長光澤頂陷不起也既出雖起慘色不明也漿行色灰不榮也漿定光潤不消也漿老濕潤不斂也結痂而胃弱內虛也痂落而口渴不食也痂後生癰腫也癰腫潰而斂遲也凡有諸證並宜此湯或

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

加芎藭加官桂加糯米以助之詳見本書嘉謨曰人參補中黃耆實表凡內傷脾胃發熱惡寒吐泄急臥脹滿痞塞神短脉微者當以人參為君黃耆為臣若表虛自汗亡陽瀉瀉瘧疾瘧疾陰瘡者當以黃耆為君人參為臣一也
附方 新舊五小便不通 綿黃耆二錢水二盞煎一盞酒
疸黃疾 心下懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃斑為末酒服方寸七氣虛白濁 黃耆鹽炒半兩茯苓一兩日三服 時後方
治渴補虛 男子婦人諸虛不足煩悸焦渴面驗良方 治渴補虛 色萎黃不能飲食或先渴而後發瘡癰或先癰疽而後發渴並宜常服此藥平補氣血安和臟腑終身可免癰疽之疾用綿黃耆箭鋒者去
蘆六兩 一半生焙一半以鹽水潤濕飯上蒸三次焙剉粉甘草一兩一半生用一半炙黃耆為末每服二錢煎服名黃芪六一湯 外科精要 **老人悶塞** 綿黃耆白各半兩為末每服三錢用大麻子一合研爛以水遞漿煎至乳起入白蜜一匙再煎沸調藥空心服甚無秘塞之患其效如神和劑局方 **腸風瀉血** 黃耆黃為末麴糊丸綠豆大每服三十 **尿血沙淋** 痛不可忍丸米飲下 孫用和秘寶方
等分為末以大蘿蔔一個切一指厚大四五片蜜二兩淹炙令盡不令焦點末食無時以鹽湯下 永類
方吐血不止 黃耆二錢半紫背浮萍五錢為末每服一錢薑蜜水下 聖濟總錄 **欬嗽膿血** 咽乾乃虛中有熱不可服涼藥以好黃耆四兩甘草一兩為末每服二錢點湯服 席延賞方

肺癰得吐黃耆二兩為末每服二錢水一中盞煎至六分溫服日三四服聖惠方甲疽

瘡膿生足趾甲邊赤肉突出時常舉發者黃耆二兩蘭茹一兩醋浸一宿以豬脂五合微火上煎取

二合絞去滓以封瘡口上日胎動不安黃耆川芎三度其內自消外臺秘要胎動不安黃耆川芎

各一兩糯米一合水一升陰汗濕痒綿黃耆酒炒為煎半升分服婦人良方未以熟豬心點

人濟妙趙真瘡疽內固黃耆人參各一兩為末入真龍腦一錢用生藕汁和丸

豆大每服二十九溫水下日日服本事方

莖葉主治療渴及筋攣癰腫瘡瘡別錄

人參本經上品

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

十一

釋名人參音參或黃參吳血參別錄人街本經鬼蓋本經神

草別錄土精別錄地精海腴皺面還丹廣雅時珍

浸漸長成者根如人形有神故謂之人參神草神草神字

星之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟

張仲景傷寒論尚作參字別錄一名人微微乃參字

之訛也其成有階級故曰人街其草背陽向陰故曰

鬼蓋其在五參色黃屬土而補脾胃生陰血故有黃

參血參之名得地之精靈故有土精地精之名廣求

利則搖光不明人參不生觀此則神草之名又可證矣

集解別錄曰人參生上黨山谷及遼東二月四月八

者有神普曰或生邯鄲三月生葉小銳枝黑莖有毛

三月九月采根根有手足面目如人者神弘景曰上

黨在冀州西南今來者形長而黃狀如防風多潤實

而甘俗乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨者

次用高麗者高麗即是遼東形大而虛軟不及百濟

並不及上黨者其草一莖直上四五相對生花紫色

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

十一

高麗人作人參讚云三極五葉背陽向陰欲求我

概樹相尋概音賈樹似桐甚大陰廣則多生采作甚

有法今近山亦有但作之不好恭曰人參見用多是

高麗百濟者潞州太行紫團山所出者謂之紫團參

保升曰今沁州遼州澤州冀州平州易州檀州幽州

媯州并州並出人參蓋其山皆與太行連亘相接故

也珣曰新羅國所貢者有手足狀如人形長尺餘以

杉木夾定紅絲纏飭之又沙州參短小不堪用頌曰

其價與銀等稍為難得土人得一窠則置板上以新
絲絨飾之嘉謨曰紫團參紫色稍扁百濟參白堅且
圓名曰條參俗名羊角參遼東參黃潤纖長有鬚俗
名黃參獨勝高麗參近紫體虛新羅參亞黃味薄肖
人形者神其類難辨者力洪時珍曰上黨今潞州也
民以人參為地方害不復采取今所用者皆是遼參
其高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參猶來
中國互市亦可收子於十月下種如種菜法秋冬采
者堅實春夏采者虛軟非地產有虛實也遼參連皮
者黃潤色如防風去皮者堅白如粉偽者皆以沙參
薺芫桔梗根造作亂之沙參體虛無心而味淡薺
芫體虛無心桔梗體堅有心而味苦人參體實有心
而味甘微帶苦自有多余味俗名金井玉闌也其似人
形者謂之孩兒參尤多廣偽宋蘇頌圖經本草所繪
潞州者三極五葉真人參也其潞州者乃沙參之苗
葉沁州兗州者皆薺芫之苗葉其所云江淮土人參

者亦薺芫也並失之詳審今潞州者尚不可得則他
處者尤不可信矣近又有薄夫以人參先浸取汁自
吸乃晒乾復售謂之湯參全不任用不可不察考月
池翁諱言聞字子郁街太醫吏目嘗著人參傳上下
卷甚詳不能備錄亦畧
節要語於下條云耳

修治 弘景曰人參易蛀惟納新器中密封可經年
不壞炳曰人參頻見風日則易蛀惟用盛過麻

油瓦罐泡淨焙乾入華陰細辛與參相間收之密封
可留經年一法用林過竈灰晒乾收亦可李言聞

曰人參生時背陽故不喜見風日凡生用宜吹咀熟
用宜隔紙焙之或醇酒潤透吹咀焙熟用並忌鐵器

根氣味甘微寒無毒 別錄曰微溫普曰神農小寒桐
君雷公苦黃帝岐伯甘無毒元

素曰性溫味甘微苦氣味俱薄浮而升陽中之陽也
又曰陽中微陰之才曰茯苓馬蘭為之使惡溲疏

鹵鹹反藜蘆一云畏五靈脂惡皂莢黑豆動紫石英
元素曰人參得升麻引用補上焦之元氣瀉腎中之火得麥門
冬則生脉得乾薑則補氣果曰得黃耆甘草乃甘溫
除大熱瀉陰火補元氣又為瘡家聖藥震亨曰人參
入手大陰與藜蘆相反服參一兩入藜蘆一錢其功
盡廢也言聞曰東垣李氏理脾胃瀉陰火交泰丸內
用人參皂莢是惡而不惡也古方療月閉四物湯加
人參五靈脂是畏而不畏也又療痰在胸膈以人參
藜蘆同用而取涌越是激其怒性也此皆精微妙奧
非達權衡者不能知

主治補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪
氣明目開心益智久服輕身延年 本經療腸胃中冷心

腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破

堅積令人不忘 別錄主五勞七傷虛損痰弱止嘔噦補

五臟六腑保中守神消胸中痰治肺痿及癰疾冷氣

逆上傷寒不下食凡虛而多夢紛紜者加之 甄權止煩

躁變酸水 李消食開胃調中治氣殺金石藥毒 大明治

肺胃陽氣不足肺氣虛促短氣少氣補中緩中瀉心

肺脾胃中火邪止渴生津液 元素治男婦一切虛證發

熱自汗眩暈頭痛反胃吐食痰瘧滑瀉久痢小便頻

數淋瀝勞倦內傷中風中暑痿痺吐血嗽血下血

淋血崩胎前產後諸病時珍

發明弘景曰人參為藥切要與甘草同功果曰人參甘溫能補肺中元氣肺氣旺則四臟之氣皆旺

精自生而形自盛肺主諸氣故也張仲景云病人汗後身熱亡血脈沉遲者下利身涼脈微血虛者並加

人參古人血脫者益氣蓋血不自生須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長血乃旺也若單用補血藥血無

由而生矣素問言無陽則陰無以生無陰則陽無以化故補氣須用人參血虛者亦須用之本草十劑云

補可去弱人參羊肉之屬是也蓋人參補氣羊肉補形氣者有無之象也好古曰潔古老人云以沙參

代人參取其味甘也然人參補五臟之陽沙參補五臟之陰安得無異雖云補五臟亦須各用本臟藥相

佐使引之言聞曰人參生用氣涼熟用氣溫味甘補陽微苦補陰氣主生物本乎天味主成物本乎地氣

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

十六

味生成陰陽之造化也涼者高秋清肅之氣天之陰也其性降溫者陽春生發之氣天之陽也其性升甘者濕土化之味也其性沉人參氣味俱薄苦者火土相生之味地之陰也其性沉人參氣味俱薄苦者火土相生降熟升味之薄者生升熟降如土虛火旺之病則宜生參涼薄之氣以瀉火而補土是純用其氣也脾虛肺怯之病則宜熟參甘溫之味以補土而生金是純用其味也東垣以相火乘脾身熱而煩氣高而喘頭痛而渴脈洪而大者用黃蘗佐人參孫真人治夏月熱傷元氣人汗大泄欲成痿厥用生參散以瀉熱火而救金水君以人參之甘涼瀉火而補元氣臣以麥門冬之苦甘寒清金而滋水源佐以五味子之酸溫生腎精而收耗氣此皆補天元之真氣非補熱大也白飛霞云人參鍊膏服回元氣於無何有之鄉凡病後氣虛及肺氣嗽者並宜之若氣虛有火者合天門冬膏對服之

正誤微曰夏月少使人參發心症之病好古曰人參甘溫補肺之陽泄肺之陰肺受寒邪宜此補之

肺受火邪則反傷肺宜以沙參代之王綸曰凡酒色過度損傷肺腎真陰虛火動勞嗽吐血欬血等證

勿用之蓋人參入手太陰能補火故肺受火邪者忌之若誤用參者甘溫之劑則病日增服之過多則死

不可治蓋甘溫助氣氣屬陽陽旺則陰愈消惟宜苦甘寒之藥生血降火世人不識往往服參者為補而

死者多矣言聞曰孫真人云夏月服生參散清暑益氣湯三劑則百病不生李東垣亦言生參散清暑益氣

湯乃三伏瀉火益金之聖藥而雷斅反謂發心症久患非矣症乃臍旁積氣非心病也人參能養正破堅

積豈有發症之理觀張仲景治腹中寒氣上衝有頭足上下痛不可觸近嘔不能食者用大建中湯可知

矣又海藏王好古言人參補陽泄陰肺寒宜用肺熱不宜用節齋王綸因和之謂參者能補肺火陰虛

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

十七

火動失血諸病多服必死二家之失皆偏矣夫人參能補元陽生陰血而瀉陰火東垣李氏之說也明矣仲景張氏言亡血虛者並加人參又言肺寒者去人參加乾薑無令氣壅丹溪朱氏亦言虛火可補參者之屬實火可瀉參連之屬二家不察三氏之精微而謂人參補火謬哉夫火與元氣不兩立元氣勝則邪火退人參既補元氣而又補邪火是反復之小入矣何以與甘草苓朮謂之四君子耶雖然三家之言不可盡廢也惟其語有滯故守之者泥而執一遂視人參如蛇蝎則不可也凡人面白面黃面青黃悴者皆脾肺腎氣不足可用也面赤面黑者氣壯神強不可用也脈之浮而芤濡虛大遲緩無力沉而遲濡弱細結代無力者皆虛而不足可用也若弦長緊實滑數有力者皆火鬱內實不可用也潔古謂喘嗽勿用者痰實氣壅之喘也若腎虛氣短喘促者必用也仲景謂肺寒而欬勿用者寒束熱邪壅鬱在肺之欬也

若自汗惡寒而欬者必用也東垣謂久病鬱熱在肺
勿用者乃火鬱于內宜發不宜補也若肺虛火旺氣
短自汗者必內也丹溪言諸痛不可驟用者乃邪氣
方銳宜散不宜補也若裏虛吐利及久病胃弱虛痛
喜按者必用也節齋謂陰虛火旺勿用者乃血虛火
亢能食脉弦而數涼之則傷胃溫之則傷肺不受補
者也若自汗氣短肢寒脉虛者必用也如此詳審則
人參之可用不可用思過半矣機曰節齋王綸之說
本於海藏王好古但綸又過于矯激丹溪言虛火可
補須用參芪又云陰虛潮熱喘嗽吐血盜汗等證四
物加人參黃蘗知母又云好色之人肺腎受傷熱嗽
不愈瓊玉膏主之又云肺腎虛極者獨參膏主之是
知陰虛勞瘵之證未嘗不用人參也節齋私淑丹溪
者也而乃相反如此斯言一出印定後人眼目凡遇
前證不問病之宜用不宜輒舉以藉口致使良工掣
肘惟求免夫病家之怨病家亦以此說橫之胸中甘
欽定四庫全書

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

十八

受若寒雖至上嘔下泄去死不遠亦不悟也古今治
勞莫過於葛可久其獨參湯保真湯何當廢人參而
不用耶節齋之說誠未之深思也楊起曰人參功載
本草人所共知近因病者吝財薄醫醫服藥本惜費
不肯用參療以致輕者致重重者至危然有肺寒
肺熱中滿血虛四證只宜散寒消熱消脹補營不用
人參其說近是殊不知各加人參在內護持元氣力
助羣藥其功更捷若曰氣無補法則謬矣古方治肺
寒以溫肺湯肺熱以清肺湯中滿以分消湯血虛以
養營湯皆有人參在焉所謂邪之所勝其氣必虛又
曰養正邪自除陽旺則生陰血貴在配合得宜爾庸
醫每謂人參不可輕用誠哉庸也好生君子不可輕
命薄醫醫亦不可計利不
用書此奉勉幸勿曰迂

附方 舊九新八人參膏

用人參十兩細切以活火二十
蓋浸透入銀石器內桑柴火緩

緩煎取十盞濾汁再以水十盞煎取五盞與前汁合
煎成膏瓶收隨病作湯使丹溪云多慾之人腎氣衰
憊欬嗽不止用生薑橘皮煎湯化膏服之浦江鄭兄
五月患痢入犯房室忽發昏運不知人事手撒目暗
自汗如雨兩喉中痰鳴如拽鋸聲小便遺失脉大無倫
此陰虧陽絕之證也予令急煎大料人參膏仍與灸
氣海十八壯右手能動再三壯唇口微動遂與膏服
一盞半夜後服三盞服能動三壯唇口微動遂與膏服
盡五斤而痢止至十宣藥已多膿出作嘔發熱六脉沉
數有力此潰瘍所忌也遂與大料人參膏入竹瀝飲
之參盡一十六斤竹代百餘竿而安後經旬餘值大
風拔木瘡起有膿中有紅線一道過肩脾抵右肋予
曰急作參膏以芎歸橘皮作湯入竹瀝薑汁飲之盡
三斤而瘡潰調理乃安若癰疽潰後氣血俱虛嘔逆
不食變證不一者以參者歸木等分煎膏服之最妙
欽定四庫全書

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

十九

治中湯 頌曰張仲景治胸脾心中痞堅留氣結胸胸
參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煮三升每服
一升日三服隨證加減此方自晉宋以後至唐名醫
治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或為散皆有
奇效胡洽居士治霍亂謂之溫中湯陶隱居百一方
云霍亂餘藥乃或難求而治中湯方四順湯厚朴湯不
可暫缺常須預合自隨也唐石象公王方慶云數方
不惟霍亂可醫諸病皆療也四順湯用人參甘草
乾薑附子炮各二兩水六升煎二升半分四服
君子湯 治脾胃氣虛不思飲食諸病氣虛者以此為
主 人參一錢白朮二錢白茯苓一錢炙甘草
五分薑三片棗一枚水二鍾煎一鍾
食前溫服隨證加減 和濟局方 開胃化痰 飲食
不拘大人小兒人參焙二兩半夏薑汁浸焙五錢為
末飛羅麪作糊丸綠豆大食後薑湯下三五十九日

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

三

三服聖惠方加陳橘 胃寒氣滿 不能傳化 易饑 不能
皮五錢 經驗方 胃寒氣滿 食人參末二錢 生附
子末半錢 生薑二錢 水七合 煎二合 雞
子清一枚 打轉空心服之 聖濟總錄 脾胃虛弱 思
飲食 生薑半斤 取汁 白蜜十兩 人參末四兩 胃虛惡
銀錫煎成膏 每米飲調服一匙 普濟方 胃虛惡
心 或嘔吐 有痰 人參一兩 水二盞 煎一盞 入竹瀝一
盞 薑汁三匙 食後溫服 以知為度 老人尤宜 簡
便 胃寒嘔惡 不能腐熟 水穀食即嘔吐 人參丁香藿
方 胃寒嘔惡 香各二錢 半橘皮五錢 生薑三片 水二
盞 煎一盞 溫反胃嘔吐 飲食入口即吐 困弱無力 垂
服 扶萃方 反胃嘔吐 死者上黨人參三兩大兩 拍破
水一大升 煮取四合 熱服 日再兼以人參汁入粟米
雞子白 薤白 煮粥 與噉李直方司熟於漢南患此兩
月餘 諸方不瘥 遂與此方 當時便定 後十餘日 遂入
京師 絳每與名醫論此 藥難可為傳也 李絳兵部手
集 食入即吐 人參半夏湯 用人參一兩 半夏一兩 五
遍取三升 入白蜜三合 煮一斗 以杓揚二百四十
升 半分服 張仲景金匱方 霍亂嘔惡 人參二兩 水
一盞 入雞子白一枚 再煎溫 霍亂煩悶 人參五錢 桂
服一加丁香 衛生家寶方 霍亂煩悶 人參五錢 桂
聖惠方 霍亂吐瀉 煩躁不止 人參二兩 橘皮三兩
濟總錄 聖女娠吐水 等分 為末 以生地黄汁和丸 梧子
大每服五十九丸 米陽虛氣喘 自汗盜汗 氣短頭暈 人
湯下 和劑局方 陽虛氣喘 自汗盜汗 氣短頭暈 人
作四帖 每帖以生薑十片 流水兩 喘急欲絕 上氣鳴
蓋煎一盞 食遠溫服 濟生方 喘急欲絕 上氣鳴
參末湯服方寸七日 產後發喘 人參末一兩 蘇木二
五六服 效肘後方

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

三

兩水二盞 煮汁一盞 調產後血運 人參一兩 紫蘇半
參末服神效 聖惠方 產後血運 人參一兩 紫蘇半
合煎服 聖惠方 產後不語 人參五錢 水煎服 婦人良方 產
醫方摘要 產後不語 人參五錢 水煎服 婦人良方 產
後諸虛 發熱自汗 人參當歸等分 為末 用豬腰子一
至八分 煮米熟 取汁一盞 入藥煎 產後秘塞 人參多仁
至八分 煮米熟 取汁一盞 入藥煎 產後秘塞 人參多仁
錢炒炒為末 煉蜜丸 梧子大每 橫生倒產 人參末各一
服五十九丸 米飲下 濟生方 橫生倒產 人參末各一
錢丹砂末五分 研勻 雞子白一枚 入生薑自然汁三
匙 攪勻 冷服 即母子俱安 神效 此施漢卿方也 婦
人良 開心益智 人參末一兩 鍊成 豬脂十兩 以
日耳目聰明 骨髓充盈 肌膚潤澤 日 聞雷即昏 兒七
記千言 兼去風熱 痰病 千金方 聞雷即昏 兒七
歲聞雷即昏 倒不知人事 此氣怯也 以人參當歸麥
門冬各二兩 五味子五錢 水一斗 煎汁五升 再以水
五升 煎取汁二升 合煎成膏 每服三匙 白湯化 忽
下服盡 一斤 自後聞雷自若矣 楊起簡便方 忽
喘悶絕 方見大 離魂異疾 有人臥則覺身外有身 一
魂歸於肝 此由肝虛邪襲 魂不歸舍 病名曰離魂 用
人參龍齒赤茯苓各一錢 水一盞 煎半盞 調飛過朱
砂末一錢 睡時服一夜 三服 夜後真者 怔忡自汗
氣爽 真者即化矣 夏子益怪證奇疾方 怔忡自汗
心氣不足也 人參半兩 當歸半兩 用豬腰子二個
以水二盞 煮至一盞 半取腰子細切 人參歸同煎至
八分 空心喫 腰子以汁送下 其滓焙乾 為末 以山藥
末作糊丸 綠豆大 每服五十九丸 食遠溫服 下不過二
服即愈 此昆 山神濟大師方也 一心下結氣 硬按之
加乳香二錢 王璠百一選方 一心下結氣 硬按之

則無常覺膨滿多食則吐氣引前後噫呃不除由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣人參一兩橘皮去白四兩為末煉蜜九梧子房後因倦人參七錢水一盞半煎八分食前溫服

一錢水一盞半煎八分食前溫服 聖惠方 房後因倦人參七錢水一盞半煎八分食前溫服

人參銀州柴胡各三錢大棗一枚生薑三兩水一鍾半煎七分食遠溫服日再服以愈為度 奇效良方

肺熱聲啞 人參二兩訶子一兩為末 肺虛久嗽 人參末

角膠炙研一兩每服三錢用薄荷鼓湯一盞葱少許入銚子煎一二沸傾入盞內過效時溫呷三五口甚

佳食止嗽化痰 升熟碧成膏入參末煉蜜和收每嗽即止痰自消 簡便方 小兒喘咳 肺虛無力者人

嗽即止痰自消 簡便方 小兒喘咳 肺虛無力者人

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

參天花粉等分每服半錢安喘嗽血 嗽喘上氣喘水調下以瘥為度 經濟方

脈無力者人參末每服三錢雞子清調之五更初服便睡去枕仰臥只一服愈年深者再服咯血者服盡

一兩甚好一方以烏雞子水磨千遍自然化作水調藥尤妙忌醋醃腥蟹鮓醉飽將息乃佳 沈存中

靈苑 欬嗽吐血 人參黃耆飛羅翅各一兩百合五錢方 為末水丸梧子大每服五十丸食前

茅根湯下 朱氏集驗方用人參乳香辰砂等分為末烏梅肉和丸彈子大每白湯化下一丸日一服

虛勞吐血 補者先以十灰散止之其人必困倦法當五枚水二鍾煎一鍾服熟睡一覺即減吐血下血因

五六繼服調理藥 葛可久十藥神書 吐血下血七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻俱出心肺脈破血

如泉湧須臾不救用人參焙側柏葉蒸焙荊芥穗燒

存性各五錢為末用二錢入飛羅翅二錢以新汲水調如稀糊服少頃再服一服立止 華陀中藏經 血不止 人參柳枝寒食采者等分為末每服一錢東流水服日三服無柳枝用蓮子心 聖

錄總 齒縫出血 人參赤茯苓麥門冬各二錢水一鍾煎七分食前溫服日再蘇東坡得此

自謂神奇後生小子多患此病予陰虛尿血 人參焙累試之累如所言談堃翁試效方

水炙等分為末用紅皮大蘿蔔一枚切作四片以蜜二兩將蘿蔔逐片蘸炙令乾再炙勿令焦以蜜盡為

度每用一片蘸藥食之仍以沙淋石淋方同消渴引鹽湯送下以瘥為度三因方

飲人參為末雞子清調服一錢日三四服 集驗用百丸食前麥門冬湯下日二服以愈為度名玉壺丸

忌酒麪炙燥 鄭氏家傳消渴方人參一兩粉草二

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

兩以雄豬膽汁浸炙腦子半錢為末蜜九芡子大每嚼一丸冷水下 聖濟總錄用人參一兩葛粉二兩

為末發時以燂豬湯一升入藥三錢蜜二兩慢火熬至三合狀如黑餚以瓶收之每夜以匙含嚥不遇

三服取 虛瘧發熱 人參二錢二分雄黃五錢為末端效也 辰井華水吞下七丸發前再服忌諸般熱 冷痢厥逆

物立效一方加神麴等分 丹溪纂要 六脈沉細人參大附子各一兩半每服半兩生薑十

片丁香十五粒粳米一撮水二盞煎七分空心溫服經驗 下痢禁口 人參蓮肉各三錢以井華水二盞煎

方 錢經 老人虛痢 不止不能飲食上黨人參一兩良選方 鹿角去皮炒研五錢為末每服

方寸七米湯調下日 傷寒壞證 凡傷寒時疫不問陰三服 十便良方

傷寒壞證 凡傷寒時疫不問陰