

影印
文淵閣

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第七六〇冊

北京出版集團公司
北京出版社

本冊目次

普濟

方(二四)

明朱橚撰……………一

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百八十四

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀
編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆 琪
校對官修撰臣吳錫齡
謄錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十四 明 周王朱橚 撰

嬰孩諸熱痘腫門

諸熱 附論

經曰火氣不調舉身蒸熱風氣不調令身強直水氣不調身體浮腫土氣不調四肢不舉凡小兒之疾多因風熱不順乳氣不調致生諸疾潮熱驚熱夜熱餘熱食熱疳熱壯熱煩熱骨熱風熱虛熱客熱癖熱寒熱血熱疹熱十六者大同而小異凡熱必乘陽邪而發經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實邪正分爭客搏於皮膚或恍惚啼叫或悶亂啼寢其變多端或在表或在裏或似實而似虛或半表而半裏或半實而半虛皆由血氣盛實臟腑生熱陰陽氣交薰蒸於外致令身熱焉凡病熱者左臉先赤肝受熱也額上先赤心受熱也右臉先赤肺受熱也大抵熱則風生風生則驚悸潮熱發歇有時驚熱顛叫恍惚夜熱夕發旦止餘熱寒邪未盡食熱

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

肚背先熱疳熱骨蒸盜汗壯熱一向不止煩熱心躁不安積熱煩赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱來去不定癖熱涎嗽飲水寒熱發如瘡狀血熱發辰已耳鼻尖冷諸熱得之各有所歸其間有三兩證交互者宜隨其輕重而治之潮熱者血氣盛實臟腑生熱或傷寒時疫觸受邪氣陰氣不足陽氣有餘陽邪暴傷則血氣凝滯不即通流壅遏無歸傳於陽明之經遂成潮熱休作有時其夜間發熱者乃是陰中有陽邪也潮熱或

欽定四庫全書

醫方
卷三百八十四

二

留宿寒夾伏熱者大便黃而臭氣滯宿寒者大便白而酸臭潮熱者實熱也當日間潮熱或即增寒手足俱冷能乳即瘦再加盜汗此食疳之候也發熱日可夜間熱甚天明復涼謂之傷寒餘熱失解小兒傷乳者或時發熱發熱有退時熱退後但復熱或夜間熱者此傷乳食也夜熱者由宿食在小腸當暮發熱明日復止諸家所說夜熱各自不同皆有應驗食疳亦能夜熱傷寒失解亦能夜熱風傷脾胃亦能夜熱寒熱者陰陽盛也先寒

而後熱陽不足先熱而後寒陰不足寒多而熱少陰勝陽也熱多而寒少陽勝陰也寒熱相半陰陽交攻也寒熱隔日陰陽乍離也陽盛發熱陰盛發寒寒而頰赤陰中有陽邪也熱而面青陽中有陰邪也熱而面青陽中有陰邪也寒而面赤陰中有陽邪也其有頭疼汗出者有嘔吐不食者有增寒而飲水者壯熱而欲湯者有筋骨疼痛者或秘或瀉或內寒而外熱或內熱而外寒又有

欽定四庫全書

醫方
卷三百八十四

三

寒而腹中痛熱而腸中鳴是有食積也大抵寒熱回於露風或觸暑毒致陰陽不順邪正不和逆順之法當從乎天地順乎陰陽順之則安逆之則危小兒寒熱多因之次用補助先寒後熱寒多熱少小柴胡湯加桂先熱後寒熱多寒少用白虎湯加桂寒熱相半小柴胡湯壯熱者亦由血氣盛實五臟生熱邪火蒸鬱於內則眠卧不安精神恍惚薰發於外則連滯不已舉動驚惶表裏發熱則煩躁喘急甚則發癰也潮熱者因其解脫風邪所傷客於皮毛入於臟腑則惡風發熱呵欠面青目遊

多睡陽氣有餘身熱無汗陰氣有餘身寒有汗陽氣有餘無

寒而寒陰氣有餘素問云汗出而身熱者風熱也錢氏論云風溫潮熱

者時間發熱過時即退來日依時發此為熱壯熱相似

潮潮則發驚也壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也

風熱者身熱口中氣有風證渴壯者但溫而不熱也急

飲乳者不能食者由客熱入兒臍流入心脾經即古厚

唇燥口不能食積熱者由陽氣盛實積於臟腑上盛則

唇舌生瘡下盛則腰腿癰腫表裏俱盛則精神恍惚煩

赤口乾大小便澀遍身體發熱下之即退有後熱者是

裏熱已去表熱未退汗之則解表熱去後再熱者表裏

欽定四庫全書普濟方卷三百八十四

俱虛陽浮於外陰沉於內所以又熱者乃虛也因傷寒

及諸熱汗下之後去津太過氣血未調食飲勞傷致令

虛熱困倦少力其有久嗽久瀉久痢久血久瘧致諸疾

之後而成者皆虛熱也凡病久者則氣血虛氣虛則發

厥血虛則發熱血氣虛則身熱而足手厥瘡熱者由乳

母好食肥膩恣食甘酸或喜怒氣浮醉飽勞傷乳兒遂

成疳熱或兒食無常生冷過度致令骨熱不除羸瘦煩

渴頰赤面黃不長肌肉凡疳食之熱先起於腹背皮膚

不堪熱近之骨間如火或睡中有汗久變疳勞者渾身

如火手足如冰孫氏云骨熱如湯蒸癖熱者由兒不肯

食哺而但欲飲乳乳壅不能消化伏結腹中致成涎癖

塊也或痰嗽而驚或嘔逆而渴日中啞煎夜間啼叫辰

熱申涼與潮相類也先與白朮散滋養津液次珍珠丸

積血熱者每日巳午間發熱而遇夜則涼是陽中有陽

血氣盛實也蓋血者榮也氣者衛也榮行脉中衛行脉

外營周不息巳午者當心火用事之時也心生血氣行

欽定四庫全書普濟方卷三百八十四

至巳午則陽氣盛陽氣盛則與正相擊故至期而發熱

非其時非血熱也客熱者為陽邪干於心也心若受邪

胃散治之次常服進食丸第四虛驚熱長啼汗出多
冀青黃吐乳兩眼慢雲和咬乳流涎出脚冷病難蘇
若逢頭仰視早治莫蹉跎此候宜服薄荷散并紅綿
散急退熱解驚可以療之第五麻豆熱中指冷如冰
目溢長如睡乳食不省名耳冷眼中赤麻豆出將呈
或時寒熱起困惡沒心候此乃天行之病又乃時
熱不除發出胎毒成此疾不可妄下及妄攻始當
溫涼藥治之法與傷寒相似後當發散使毒氣出腑
則出細疹俗云膚瘡也若不發散便是傷寒未表一
也則毒氣在臟故發豆瘡遍身無縫又寒又熱變成
惡證十死八九小兒瘡證之熱腹痛面腮燥赤呵欠
睡困眼淚多膿乃瘡疹欲出之候急與羌活散二服發汗
三服如未出前證則不可用先與解肌散二服發汗
使氣出臟毒如汗後熱退只用升麻湯汗後尚熱宜
服羌活散如已見兩三點於皮膚加紫草少許如熱
平瘡出稍輕但用辰砂米飲調下半錢其豆稀而輕

欽定四庫全書
普濟方
卷三百八十四
六

蓋欲製其胎毒也故第六疳為熱鼻赤齒頰搖乳食
常無飽頭瘡髮又焦炭餐如飯肌膚赤不自揭心煩
九仍熱服此疳疔後服龍腦甲散退熱次服肥兒丸治
虛第七身熱細看手脚知神昏常不識壯急更不可
癰見食還憎受渴瀉糞如脂終日無歡色唇紅不可
醫此候不可發散只宜補脾仍服十金丹去其積第
八風痰熱晚起早還涼與水無時度粥飲亦知香夜
多喘叫候氣息宜為昌患宜頻進藥莫待服驚張此
候乃痰作而朝涼夜熱即宜用金星丸或氣弱不了
不宜服奪命散急宜服
溫壯者由臟腑不調內有
伏熱挾宿寒皆傳於胃致胃氣不和留滯壅塞故蘊積
體熱名曰溫壯大便黃而臭者內有伏熱大便白而酸臭

體熱名曰溫壯大便黃而臭者內有伏熱大便白而酸臭

夾宿寒故也而人有小兒壯熱者是熱氣薰發於外故
令身體壯熱其發無漸大體與溫壯相似有小異者熱
加甚也此候宜服輕藥惺惺散羌活散皆可如有宿寒
宜服四味理中湯加桂煎服若有伏熱宜服五苓散并
白虎湯二藥俱效 有驚熱即有風熱此言驚風熱又
有邪熱乃感風成病類同傷寒熱又傷寒熱類同瘡疹
熱又瘡疹麻豆之有餘毒作熱傷寒後亦有餘毒作熱積
熱有同瘡熱又有膚熱其信如潮總曰潮熱潮發有期丹
欽定四庫全書
普濟方
卷三百八十四
七

熱疳熱不類諸證血熱即遍體生瘡癩癧疥癬痒及重
發作丹毒龍帶之屬骨熱即外冷內熱其病骨蒸熱也
實熱即氣脉壯實五臟氣充大便硬少或閉不通虛熱
三焦不順五臟不和欲作疳候啼哭煩躁夜出虛汗或
瀉疾後有熱三焦熱即上膈虛煩作渴煩赤驚悸夜夜
啼哭睡中言語五心熱虛煩多驚小便赤澀睡不安穩
氣麓或作瘰癧肝經熱眼目赤腫疼痛多淚羞明或筋
脉拘急有夾風痰肺經熱鼻塞生瘡不聞香臭或餘毒

不散胎熱兒在胎中受母食毒榮衛不順有餘毒之熱發作衆疾或從降生之後常作熱證傷寒後餘毒熱雖曾解表餘熱傳脉或入經絡久而不散瘡疹餘毒熱其兒多患瘡大瘡皆因有餘熱留滯在百脉之間項上生核作熱軟大微紅者名驚氣核更有大小相連長短相雜者是為餘毒熱亦名驚癰初生乳幼者患之三焦蘊熱毒攻咽喉之外名疳顙熱氣血凝滯經絡不行熱毒攻注故生癰癰麻豆作熱類似疹候麻子乃腑受病屬

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

八

聲重頭疼脚熱類如傷寒候傷暑熱煩躁引飲頭目昏重時正盛暑或曾感冒榮熱即血熱也衛熱即氣熱也榮衛不順即血氣不相參虛之致也筋熱咬指甲見血腎熱病作崩砂齒黑斷爛以至馬疳極候煩熱即啼之不已躁熱即哭之不已皆由三焦不順心中積熱虛煩躁悶變蒸熱只在五百七十四日之內三十二日一變六十四日一蒸在其數發作者應也大腸熱肺家有熱在裏流入大腸秘結不通癰疹熱乃是肺經有風在表

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

九

肺主皮毛故生癰疹風痰熱因感風生痰在上膈久不化熱吐逆惡心驚氣熱良由小兒受驚其驚氣不散留在上膈無得自化故作熱毒攻在順項之間肚熱即是積熱證若加脚冷當與下之客熱初生之兒親戚外來兒觸其邪以亂其正故作熱癰熱驚風不散聚在經絡或入臟腑其候常發不省人事痰涎熱驚之所受入經未傳散畧作搐搦小兒有病惟熱最多明理論曰發熱者怫怫然發於皮膚之間熛然散而成熱也輕重不思

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

十

有所謂翕翕發熱者若翕所覆明其熱在外在表屬乃風寒客於皮膚陽氣抑鬱所致宜發汗而散之所謂蒸蒸發熱者謂若薰蒸之蒸明其熱在內屬裏乃氣下陷而入陰中也法當攻下以滌之表證未罷邪氣傳裏裏未作實是為半表半裏之間則表裏俱發熱又輕於絕在表也發熱惡寒發於陽也無熱惡寒發於陰也陽明裏實熱盛當攻之以裏大陽風寒外搏陰盛惡寒雖熱尤當溫散少陽宜和解雖屬小柴胡湯如微熱不渴又

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

十一

夫升降陰陽則來復母三九薄荷湯研下小兒表裏俱熱面黃頰赤唇燥口乾小便赤澀大便焦黃先以四順清涼飲為之疏利其熱即去既去而復熱者裏已消而表未解也隨當用惺惺散或即用紅綿少加去節麻黃以取微汗則表熱盡除其或裏已解而熱又屬表裏俱虛氣不歸元陽浮於外不可再用涼藥再與解表當為和其胃氣使陽斂而身體大涼參苓白朮散姜棗粳煎服熱重者用銀白散

朱監簿子歲忽發熱醫曰此由心熱腮赤唇紅煩燥引飲遂用牛黃

九三服以一二物瀉心湯下之朱曰不愈反加無力而不能食又下之便利黃沫錢曰心經虛而胃中津液以生犀角散治之朱曰大便黃色如何曰胃氣正即瀉自止虛熱也朱曰醫用瀉心湯如何錢曰瀉心湯者惟黃連一物黃連性寒多服則利能寒脾胃也坐久眾醫至曰虛熱若實熱何以瀉心湯下之不安又加面黃頰赤五心煩燥不食而引飲醫曰既虛熱何大便黃沫錢笑曰大便黃沫者多服瀉心湯故也錢後與胡黃連九治愈監簿子五歲夜發熱晚即如故眾醫有作傷寒者有作驚熱者以涼藥解之不愈其候多涎而加腫他醫以錢粉圓去涎病益甚至五日大引飲錢氏曰不可下之乃取白朮散末一兩煎藥汁三升使隨其意取足朱曰飲多不作瀉否錢曰無生水不能作瀉不足怪也但不可下耳朱曰先治何病錢曰止瀉治瀉退熱清神皆此藥也至晚服盡錢曰更可服三升又煎白朮散三升服盡得稍安三日又服白朮散三升其子不渴無涎又投阿

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

三

膠散三升服而安鄧人齊郎中者家好收藥散施於人其子或臟熱齊自取青金膏三服併一服而餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡多亦驚又與青金膏一服又瀉二行加口乾而身熱召錢氏曰成虛羸先命多煎白朮散時服之後又用香薷九三十三日乃愈皇都徐氏子三歲病潮熱每日西則發搗身微熱而目微露睛四肢冷而喘大便微黃錢氏與李醫同法錢問李曰病何搗也曰有風何身熱微溫曰四服所作何目斜何肢冷曰搗則曰冷厥心熱內何喘曰搗之甚也曰何病壯搗引目斜露睛內熱肢冷及搗甚而喘併以何藥治之李曰皆此藥也錢曰不然搗者肝實也故令搗也目斜微露而身微熱者肺潮熱用事肺主身且熱也為肺虛熱所以目微斜露睛者肺潮熱相勝也肢冷者脾虛也肺若虛甚母脾亦虛木氣乘脾四肢即冷治之當先用益黃散阿膠散得脾虛調和退後以瀉清九導赤散

涼驚九治之後九日愈幼幼新書云巢氏病源曰張戶侍其子女蘊積結聚已經年矣其候腹滿壯熱大小便閉不食諸藥醫皆云虛熱作胃寒下食既不能食自然大小便少或作疳熱有藥俱試而無一日間已富迫一日間來招扣之曰合服何藥余答曰當服甘遂大黃驚咳其說言以前諸醫皆補助之此人久不進食豈宜利動余答曰信我者生逆我者死侍郎云更有無甘遂而次於藥力者可否余譴令即服大承氣湯二服而愈次日見之尚餘滯實必過數日而復閉須服前藥始可除根數日後果然再開滿痞結再投以此藥一服而痊全嬰方云朱氏子五歲六月身熱此心煩燥渴可食召一醫作傷寒治用溫熱藥取汁不令見風治之三日其證熱盛狂躁煩渴昏悶驚搗作驚見證變以珍珠九下潮搗神昏怕明就暗大便而常召憑視之曰伏熱生痰燥多憂見食悲向明憎不樂入暗稍相宜無改閉雙目

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

三

時時動四肢渴燥尋冷地暑毒作驚危蓋見兒怕明就暗目赤面紅唇口乾燥身熱煩渴手足不定今他虛冷處將水傾颺兒見水欲掇於內知其暑熱之甚也以甘露散雪水或新汲水調二錢再須冷服飲七分生須潮熱稍輕進之一服更以白虎湯頓冷服半盞少時又一服諸證減半即思飲食後以香薷湯亦冷服之同煎藥相間治之三日而安主人曰前日累驚藥不退今不用驚藥何搗定也答曰孫氏云熱名不安煩久而驚風多不定引於肝風熱相搏加之昏胃所以潮搗也解暑熱而安若認為驚風則無效後之人學若當察用寒暑也錢唐尉王觀國子五歲六月身熱心躁煩渴吐逆而風治三日其證熱盛狂躁喘喝胸膈涎流吐逆全不作暑毒傷心狀若驚頭疼熱渴煩躁無聲昏沉喘噎涎流微汗手足搐搦服間晴此乃暑毒發驚非聲寒也以甘露散下偏銀九醫曰寒胃增過主人曰何知傷伏暑答曰傷寒者惡寒伏暑者惡熱蓋見兒身熱神昏驚搗大欲飲水喜風涼處知其暑熱之盛苟不速用寒冷消暑藥則致躁而死又問吐逆不食如何答曰暑毒痰熱所作不食亦胃熱不食也主人聽之令兒就地上下周迴以水近風涼遇以甘露散水調送下偏銀九百餘粒少頃不痰而愈吳亨秀才子三歲身熱微汗自與惺惺散升麻湯鼠粘湯并驚藥調治四日熱盛召憑視之其目睛青解臉赤氣精神恍惚大便如常愚曰風熱也今熱盛驚何知風熱答曰素問云汗出兒身熱風熱也今熱盛驚候目即之問必發驚搗主人駭然答曰無慮素問又云水寒而靜故為陰火熱而躁故為陽譬之水性靜因風而波生火性炎因風而煙生其病風熱盛則引於肝風肝有風則心火生心火生則肺金縮故風火相搏則正壅而驚搗當以驗風膏連進三服風止則火滅火滅則

金堅於是乃更與珍珠九下涎後不再服驚藥驚搐即
定也主人曰何不用驚藥而更安對曰先退肝風熱心
火即自滅墜下肺經涎驚風方始散傳曰揚湯止沸不
若絕其火利溜澄波不若清其源大抵治病不可不究其
源也小兒四歲六月潮熱心躁大便如常與四順飲
三服微利熱或再日復作來與四順飲雖大便如常黃
熱微從末日舌白乾躁仍舊潮熱自此通日四順飲雖
大便利十餘日纔瀉退來日依然大柴胡湯滯而熱減
未日復熱自得病不減食愚妻曰自得病用藥瀉半月
餘日尚未除若更瀉別生患否愚曰能久勝寒藥必有
大熱能久服熱必有大寒此而久勝寒藥熱尚未退知
有大熱甚明瀉之不妨與調胃承氣湯連三服瀉數次
尚未全除又二服自此五日服承氣湯連三服前發二
十日冷藥服之始熱除後忽左膝疼仲縮艱難將粵結
癰又無紅腫處但筋骨間疼行力不能用藥淋洗膏藥
貼治十餘日不退遍尋小兒方書皆無此證惟有嬰童
寶鑑云風冷寒筋四肢全不仁疼因更冷熱瘰是遍
生又無治法也素問云風冷寒筋四肢熱中氣血則痛
痺不仁寒寒氣傷形故為腫痛又云寒傷形熱傷氣傷
形痛傷腫亦無治法思之病在筋則屈而不能伸病在
骨則伸而不屈風冷傷筋骨則疼因閱其蘇况方左經
九稱女子膝腕軟不能行立治愈遂合二服即戒三分
逐日進服十餘日如舊後有一兒十餘歲膝腕脫疼
軟舉動咩與左經九乳香酒下三兩服即時全效又治
熱涼同病身熱強直者欲作急驚肝經風熱驅風膏四
順飲或加細辛或加獨活兼用涼藥身涼強直者欲作
慢驚肝經虛風神寶丹虎珀散續命湯若大便實無虛
證驅風膏琥珀散身熱不能食者脾胃熱不能食必大

便堅或焦黃四順飲或洗心散八正散身涼不食者脾胃
氣虛或因吐瀉後以益黃散并食藥或傷食不食必噤
哺與食藥如大便食不化紫九下後補脾身熱飲水者
熱在內或中暑吐瀉而渴者五苓散香薷散白虎湯甘
露散便堅或寒邪所作四順飲身熱不渴熱在外宜解
表薄荷麻黃黃芩湯活人書云身熱不渴表有熱小柴
胡湯加桂身熱有渴不喫水但要湯者是內寒故也五
苓散姜棗煎連進則退身涼飲水者因吐瀉失亡津液
多與白朮散如大渴不止龍涎散藕漿散魚涎散擇用
之或以史君子湯加訶子汁身熱身黃者傷寒小便不
利必發黃茵陳湯并煎茵陳汁調五苓散三四服立效
身涼身黃者瀉黃散涼疳熱并三黃九如大便實前牽
牛子汁吞下與取食積藥下之後并益黃散身熱咳嗽
者寒邪在表無汗而嗽五味子麻黃湯洗心散潤肺湯
涎盛鉄粉九下之嗽而有汗羌活散惺惺散鼠粘湯涎
盛下之有傷食嗽其狀嗽嘔下之小兒嗽證下之立効

參朮散人參九更於嗽方中擇用之身涼嗽咳者寒邪
在內肺失解潤散欬冬散胃冷嗽喉中呀呷乳食不化
因胃寒肺冷人參九又因久嗽咯膿血者肺虛難治補
肺散阿膠散如久嗽膿血喘急聲啞膿如黃庖瘡內膿
者必死又一等因傷暖嗽急咯血者易治栢枝散犀角
地黃湯胃冷嗽不因風得名胃嗽霍香散身熱喘急者
麻黃杏仁散湯五味子湯潤肺散身涼喘急者蘇子阿
膠散甚者疑氣杏霜九人參九身熱有痰者小柴胡湯

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

七

生銀九南星九生金九身涼有痰者人參九黃龍九南
星九身熱夜啼者安神膏鈎藤膏虎珀散蘇香九身熱
肚疼者四順飲送妙九子涼肚疼者消食藥紫九子
令微利後益黃散身熱腹急者宣風散牽牛散并子丑
散身涼腹急者宣風散導聖散失肚九塌氣九分氣九
身熱浮腫者宣風散子丑散擬目飲商六飲後以益黃
散身涼浮腫者如久瀉痢浮腫者女面散益黃散五苓
散大便堅金蓮散身熱嘔吐者陰陽九玉散子夏月五

苓散黃龍九身熱嘔吐者妙九子感應九消食藥微微
送下後沉香九身熱洩瀉者黃龍九五苓散香薷散占
仁九身涼洩瀉者千金九益黃散人參膏川椒九身熱
吐瀉五苓散香薷散黃龍九白虎湯身涼吐瀉者千金
九金粟散并如聖九飲身涼下痢者小車九阿膠九如
聖膏金粟散身熱瀉血者胃風湯刺蘇湯三效散五倍
九身涼瀉血者訶灰散箭葉桂心散三效散身涼衄血
者栢枝散藥皮散龍胆九身熱衄血者犀角地黃湯青
苔散并龍胆九身熱吐血者黃芩膏獨金散桂心散身
涼吐血者桂心散秦光散刺蘇散身熱淋瀝者玉漿散
立效八正散桃膠九身涼淋瀝者龍香九桃符九身熱
自汗者麻黃散參芪湯鼈甲九粉汗九身涼自熱者麥
煎散鼈甲九參朮散黃芪湯粉汗散 凡驚熱癇熱驚
風氣熱癰癰熱客忤心熱傷寒熱傷風熱傷暑熱夾食
熱疳熱虛熱煩躁熱筋熱骨熱腎熱以上並宜與服葱
根脫甲散風熱痰熱變熱蒸熱肝熱大腸熱癰疹熱並

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

七

宜加麥冬丹熱食熱三焦小腸熱龍帶熱並宜加大黃
及燈心瘡癰疹熱麻子食已出證熱溫氣熱未出證熱
並宜加紫草川芎當歸餘毒熱胎熱肺熱傷寒後餘毒
熱瘡疹後餘毒熱並宜加薄荷項上生核作熱乍顯熱
癰癰毒熱並宜加大黃朴硝以上宜服大連翹飲子隨
證加前件湯使潮熱榮熱衛熱瘴氣兩日一發三日一
發熱積熱脾熱胃熱痞熱壯熱瘧熱邪熱寒熱脾熱瘧
鬼瘧夜發單瘧獨熱以上宜服梨漿飲子八種虛痢作
熱吐熱瀉熱霍亂吐瀉熱以上並宜服正氣丸調胃散
調助胃氣不可以涼藥退熱補胃氣和其熱自散虛中
積熱腹痛積熱以上並推下積

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

方

龍膽湯 治因胎驚月內氣盛心驚發熱足胎風撮口

壯熱皆可服

龍膽草 鈎藤 柴胡 赤芍藥 茯苓 甘草

各半 兩 蟬蛻 二枚 去 足 大黃 一錢 溫紙 裏 灸 用 黃芩 一錢 防風

麥門冬 去心 各一錢

右咬咀每服一錢水一小盞北棗二枚同煎七分

凝神散 出永類 收斂胃氣清涼肌表

人參 白朮 茯苓 山藥 白扁豆 粳米

知母 生地黃 甘草 淡竹葉 地骨皮

麥門冬

右咬咀每服二錢水一鍾生姜二片棗子二枚煎至

七分去渣不拘時服 凡經汗下熱已去而復作者

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

十九

由表裏俱虛氣不復元陽浮于外熱自發也非實熱

證當和其胃使六陽真氣復歸于內身體即涼凝神

散一方神異所施輒效不可不知也

寒水石散 出千 治小兒身熱不能服藥粉兒方

寒水石 芒硝 滑石 赤石脂 青木香 大

黃 黃芩 防風 芎藭 麻黃根 石膏

右各等分為細末蛤粉一升藥末三合相和再篩細

粉兒日三外臺以牡蠣代防風餘並同

清解散一名散毒散
出直指方治感風發熱頭疼鼻汗流涕無汗

惡風溫壯嘔噎

北參 防風 天麻 北前胡 茯苓二錢 北梗二錢

枳殼 甘草各一錢 細辛 柴胡各一錢 川芎三錢

右末每服一錢小盞薄荷乾三葉略煎溫服

五服化毒丹出和劑局方治小兒蘊積毒熱驚惕狂躁煩赤

咽乾口舌生瘡夜卧不寧譫語煩渴頭身體多生瘡

瘡服此清膈涼血

欽定四庫全書
普濟方 卷三百八十四

右為末入研藥令勻煉蜜為丸每兩作一十二丸每

一歲兒一九分服用薄荷水入研化下及瘡疹毒上

攻口齒瘡生犀角水下涎血臭氣以生地黄自然汗化

一九用雞翎掃安口熱疳內黃瘦雀目不見物陳粟

米泔水化下食後卧時服

清涼飲子出仁存方治小兒由將養乖節或犯寒暑乳哺失

時乍傷饑飽致令血氣不調傷胃不和或發寒熱散

變驚癇小兒血氣脆弱病作變動證候百端若見其

證即便治之使不能成眾病治之若晚其病即成至

羸瘦而難療此藥主兒百病變蒸客忤驚癇壯熱分

解涎壅躁悶煩渴項頸下熱頭面生瘡瘡

大黃泡 連翹生 芍藥生 羌活生 當歸微炒 防風去蘆 甘

草炙 山梔去仁各等分

右為咬咀每服一大錢水半盞煎至三分去滓不計

時候

牛黃膏醫方大成治小兒熱及傷風溫壯疳熱引飲

欽定四庫全書
普濟方 卷三百八十四

牛黃一錢 甘草末一分 川甜硝一分 腦子一錢 寒水石生

研錢別 鬱金末一錢 萊豆粉半兩

右為末研勻煉蜜和九薄荷水化半皂子大食後服

地骨皮散出醫方大成治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

知母 柴胡 甘草炙 人參 地骨皮 赤茯苓

半夏湯泡各等分

右咬咀每服二錢水一盞姜二片煎食後溫服量兒

大小加減

洗心散

出全方

治小兒遍身熱頭目碎痛背膊拘急火熱

上衝口苦唇焦夜臥舌乾喉腫痛涕唾稠粘痰壅氣

粗乳食不進心神躁熱眼澁睛痛傷寒四肢沉重語

聲不出百骨節疼大小便不利疔瘡豆疹時行瘟疫

狂語多渴及治天吊驚風

大黃 甘草 當歸 赤芍藥 荊芥 白朮

一麻黃 去節七兩活 兩書用四兩

右咬咀一錢水半盞生薑薄荷煎服了仰卧仍去枕

欽定四庫全書

普濟方 卷三百八十四

少時如五臟壅實煎四五錢若要瀉轉則熱服

靈砂歸食丹 治小兒蘊積邪熱潮熱不除頰赤口乾

心腸躁煩痰涎不利睡卧不安或發驚癇涎潮搐搦

又療積滯不調不利多日腹中疔痛煩渴嘔噦服藥

調和不能愈者並可服之

牛黃 龍腦 麝香 膩粉 辰砂 金箔

研九 巴豆 去心膜皮炒熟研如 十片 面油三百一十五粒

右合研勻煉黃臘六兩入白沙蜜三分同煉合勻為

九如菜豆大每服二九金銀箔薄荷湯下更量兒大

小加減如驚癇搐搦用腦膩粉蜜湯下服藥先以冷

水浸少時服見效尤速

人參前胡湯

出醫方大成

退餘熱及寒熱往來

半夏

泡七次

黃芩 前胡

一人參 兩

去桔梗

甘草 半

右咬咀每服二錢水半盞生薑三片棗子半枚煎至

二分去滓服一方不用棗煎一方治瘧加地骨皮

二 分去滓服一方不用棗煎一方治瘧加地骨皮

欽定四庫全書

普濟方 卷三百八十四

大黃散

出千金方

治小兒腹大短氣熱有進退食不安穀不

化

大黃 黃芩 甘草 麥門冬 芒硝 石膏

二桂心 兩 銖八

右咬咀以水三升煮取一升分三服暮歲以上下小

兒作五服服之

天竺飲子

出和劑方

治大人小兒臟肺積熱煩躁多渴舌頰

生瘡咽喉腫痛面熱口乾目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡

腫痛又治伏熱暑氣煩躁疹瘡餘毒及大便下血小

便赤澁

方見積熱痢冷門諸熱類

清肌散

出醫方妙選

治小兒初春不問有病俱宜服疎積

熱

當歸

川大黃微泡

人參去蘆各一兩

犀角末

芍藥

甘草

各半兩

右咬咀每服一錢水一盞入生姜三片竹葉二片同

煎五分去滓溫服乳後大小加減

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十四

犀角人參湯

出和劑方

治小兒虛熱及吐瀉煩渴不止及疎

轉後並宜服之

生犀

二錢半

人參

十五兩

茯苓

二十兩

甘草

五兩

桔梗

乾

葛

各二兩半

右為細末每服一大錢水一盞入燈心五莖同煎六

分溫服不拘時候若煩渴入新竹葉同煎

大黃湯

出千金方

治小兒肉中久挾宿熱瘦瘡熱退休作無

時

大黃

甘草

芒硝

各半兩

桂心

八兩

石膏

一大棗五枚

右咬咀以水三升煮取一升每服二合

生犀散

出錢氏方

治小兒熱

生犀

鎔取末

地骨皮

自採佳

赤芍藥

柴胡根

乾葛

各一兩

甘草

炙

右為麤末每服一二錢水一盞煎七分食後溫服

海藏

云此妙陽明相分也

治小兒熱 蓼菜子煮半生搗取汁含之亦可作鮮蒸

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十四

食之

李根湯

出切切新書

治少小暴熱得之二三日

李根

葱

芒硝

各二分

甘草

炙

麥門冬

去心各四兩

右以水三升煮一升半為三服一方有桂無葱

李葉湯

出千金方

治小兒身熱用李葉無多少咬咀以水

煮去滓將浴兒良

柳枝浴湯

出千金方

治小兒生一月至五月乍寒乍熱

用柳枝細切煮汁以浴兒若渴更用冬瓜絞汁服

之

六神散

出鮑氏方 治虛熱

人參 白茯苓 山藥 白朮 白扁豆 甘草

分等

右為末每一大錢姜一片棗一枚煎此藥用處多胃冷加附子風證加天麻痢加粟穀諸治病已除而餘熱未退為虛熱不可攻以此收之

青金餅 治初生嬰兒一切積熱毒積驚

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十四

黃連五兩 龍胆草五兩 龍花二兩 硃砂 麝香

各等分

右為細散煉蜜為丸如梧桐子大捏作餅薄荷湯化開量大小服之

又方

人參 白茯苓 懷山藥 冬台朮 炙甘草

白扁豆 製附子 明天麻 各等分

右為末捏作餅每重一錢薑棗煎湯化下

藿香散

出全嬰方

治小兒脾胃虛弱有熱面赤嘔噦涎嗽及

轉取過多者

麥門冬去心 半夏洗 甘草炙 藿香一分 石膏半兩

右細末三歲一錢水半盞煎三分無時

四順飲

一名四順清涼出全嬰方

治小兒血脈壅實臟腑生熱頰赤

多渴五心煩躁睡卧不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失理令兒血氣不和腸胃不調或溫壯連滯或壯熱不歇卻發驚癇并積潮熱瘡豆發熱并解豆毒

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十四

豆後眼赤翳障身疼癰腫頭疼加川芎增損方法隨

方用尋常只用本方又治風熱結核頭面生瘡癰目

赤咽喉腫一切壅滯並宜服之 當體骨多熱驚多倍用

大黃 熱則生用寒多小便大便多熱倍用 赤芍藥 多熱多驚便亦黃倍用 甘草

熱則生用寒多瀉熱多倍用

右咬咀三歲以上每服一錢水一大盞煎至七分作

兩服量兒大小虛實加減微瀉利為度食後臨卧服

欲利大便秘藥用赤者虛熱加甘草下利加大黃胃