



全国卫生职业教育护理及相关专业“十二五”规划教材配套用书
供职业教育护理专业学生参加全国护士执业资格考试使用

儿 科 护 理 学

考 点 习 题 集

主编 冯泽珀 李 明 李宗英

ERKE HULIXUE KAODIAN XITIJI



第二军医大学出版社
Second Military Medical University Press



全国卫生职业教育护理及相关专业“十二五”规划教材配套用书
供职业教育护理专业学生参加全国护士执业资格考试使用

儿科护理学考点习题集

主 审 朱一明
主 编 冯泽珀 李 明 李宗英
副主 编 童 勇 徐东梅 孙长虹
编 委 (以姓氏笔画为序)
 冯泽珀 孙长虹 李 明 李宗英
 吴 洁 张 艳 姚 云 袁洪仁
 徐东梅 童 勇 魏良花



第二军医大学出版社
Second Military Medical University Press

内 容 简 介

本书是全国卫生职业教育护理及相关专业“十二五”规划教材之《儿科护理学》教材配套用书,旨在帮助学生自习、复习和自测,从广度和深度方面掌握教学大纲要求的知识点,加深对教材内容的理解。同时,帮助学生熟悉考试技巧,指导学生适应和参加全国护士执业资格考试。全书共分 18 章,文后附有参考答案,方便学生对教材内容加深理解,强化已学知识,进一步提高认知能力。

本习题集供接受卫生职业教育的学生与教材配套学习和参加全国护士执业资格考试用。

图书在版编目(CIP)数据

儿科护理学考点习题集/冯泽珀,李明,李宗英主编.
—上海:第二军医大学出版社,2013.9

ISBN 978-7-5481-0670-8

I. ①儿… II. ①冯… ②李… ③李… III. ①儿科学—
护理学—资格考试—习题集 IV. ①R473.72-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 176498 号

出 版 人 陆小新

责任编辑 刘 向 高 标

儿科护理学考点习题集

冯泽珀 李 明 李宗英 主编

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码:200433

发行科电话/传真:021-65493093

<http://www.smmup.cn>

全国各地新华书店经销

江苏天源印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:7.25 字数:167千字

ISBN 978-7-5481-0670-8/R·1444

定价:24.00 元

前言

2010年,《护士执业资格考试办法》出台,并于2010年7月1日起施行。《护士执业资格考试办法》规定,国家护士执业资格考试是评价申请护士执业资格者是否具备执业所必需的护理专业知识和工作能力的考试。2011年进行了一次改革,实行新大纲,护士执业资格考试由原来的四个科目改变为专业实务和实践能力两个科目,一次考试通过两个科目为考试成绩合格。

本书编者都具有丰富的教学经验,对护士执业资格考试备考具有独到的见解。编写按照科学、严谨、客观、规范的试题命题要求,选题内容全面、难度适宜。本书编著结合最新考试大纲的精神,以教学大纲为基准,组织编写了这本既适合在校学生课后同步练习,又适合参加全国护士职业资格考试的考生考前复习的参考用书。

编写本书的各位老师,为此书付出了艰辛的努力,但由于时间仓促,书中难免存在缺点与不足,恳请广大师生在使用过程中批评指正。

编者
2013年7月

答 题 说 明

A₁ 型题：每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A₂ 型题：每道题是以一个案例的形式出现，其下有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A₃ 型题：提供一个案例，下设若干道考题。在每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A₄ 型题：提供一个案例，下设若干道考题。每道考题会逐步增加新的信息，根据题干及新增信息，在考题下的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

目 录

第一章 绪论	(1)
第二章 生长发育	(3)
第三章 营养、喂养及营养性疾病患儿的护理	(9)
第四章 儿童保健和疾病预防、免疫缺陷疾病患儿的护理	(18)
第五章 健康小儿的护理	(21)
第六章 儿科常用护理技术	(26)
第七章 新生儿与新生儿疾病患儿的护理	(29)
第八章 消化系统疾病患儿的护理	(51)
第九章 呼吸系统疾病患儿的护理	(55)
第十章 循环系统疾病患儿的护理	(63)
第十一章 造血系统疾病患儿的护理	(71)
第十二章 泌尿系统疾病患儿的护理	(76)
第十三章 神经系统疾病患儿的护理	(82)
第十四章 传染病寄生虫患儿的护理	(87)
第十五章 常见急症患儿的护理	(90)
第十六章 结缔组织疾病患儿的护理	(93)
第十七章 内分泌系统疾病患儿的护理	(95)
第十八章 生命发展保健	(97)
附：儿科护理学常用数据	(105)
参考答案	(107)

A₁/A₂ 型题

1. 我国围生期通常为
 - A. 胎龄满 28 周至出生后足 7 d
 - B. 胎龄满 20 周至出生后足 7 d
 - C. 胎龄满 28 周至出生后脐带结扎
 - D. 胎龄满 20 周至出生后足 28 周
 - E. 胎龄满 28 周到出生后足 28 d
2. 下列对儿科护理特点的描述错误的是
 - A. 儿科护理应以儿童及其家庭为中心
 - B. 不同年龄小儿有不同的生理正常值
 - C. 体液免疫成熟而细胞免疫不健全
 - D. 小儿各器官的解剖结构与成人不同
 - E. 儿科护理项目多, 护理技术要求高
3. 能够从母体获得的免疫抗体是
 - A. IgE
 - B. IgG
 - C. IgM
 - D. IgD
 - E. SIgA
4. 1~5 岁儿童死因中意外事故占第
 - A. 一或二
 - B. 三或四
 - C. 四或五
 - D. 六或七
 - E. 八或九
5. 小儿出生时头长占身长的
 - A. 1/2
 - B. 1/3
 - C. 1/4
 - D. 1/5
 - E. 1/6
6. 小儿生长发育最快的时期是
 - A. 胎儿期
 - B. 新生儿期
 - C. 婴儿期
 - D. 幼儿期
 - E. 学龄期
7. 小儿最易发生急性肾炎的年龄期是
 - A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼儿期
 - D. 学龄前期
 - E. 学龄期
8. 根据小儿年龄的不同, 小儿时期可分为
 - A. 4 个时期
 - B. 5 个时期
 - C. 6 个时期

D. 7 个时期

E. 8 个时期

9. 维生素 D 缺乏, 成人表现为骨软化症, 小儿可患

A. 肺炎

B. 心肌炎

C. 佝偻病

D. 骨软化症

E. 支气管炎

10. 婴儿期是指

A. 自出生至满 1 周岁之前

B. 出生至 6 个月

C. 1 岁以后

D. 出生 1 周

E. 1~3 岁

11. 新生儿期是指

A. 出生至 1 周岁

B. 出生至 6 个月

C. 自胎儿娩出脐带结扎起至生后满 28 d

D. 出生 1 周

E. 1~3 岁

12. 下列不属于儿科护士要求的是

A. 思想道德素质

B. 科学文化素质

C. 专业素质

D. 身体、心理素质

E. 品性素质

A₁/A₂ 型题

1. 小儿身高发育的第1个加速期是
 - A. 婴儿期
 - B. 幼儿期
 - C. 学龄前期
 - D. 学龄期
 - E. 青春期
2. 小儿躯干的上部量与下部量相等的年龄是
 - A. 8岁
 - B. 9岁
 - C. 10岁
 - D. 11岁
 - E. 12岁
3. 小儿开始能独坐的月龄是
 - A. 3~4个月
 - B. 4~5个月
 - C. 5~6个月
 - D. 6~7个月
 - E. 7~8个月
4. 小儿头围与胸围相等的年龄是
 - A. 8岁
 - B. 9岁
 - C. 10岁
 - D. 11岁
 - E. 12岁
5. 小儿发育最迟的系统是
 - A. 神经系统
 - B. 淋巴系统
 - C. 生殖系统
 - D. 脂肪组织
 - E. 肌肉组织
6. 下列哪项不是青春期常见健康问题
 - A. 物质滥用
 - B. 注意力缺陷多动症
 - C. 酗酒、吸毒
 - D. 意外伤害
 - E. 自杀
7. 前囟大小的正确测量方法为
 - A. 邻角边的长度
 - B. 对边中点的连线长度
 - C. 对边中点连线的1/2长度
 - D. 对角连线的长度
 - E. 菱形四边的周围长度
8. 3岁正常小儿,护士进行健康指导时应重点强调
 - A. 鼓励拿杯子喝水

- B. 保证每日睡眠 15 h
C. 预防溢乳窒息
D. 室温保持在 22~24℃
E. 训练定时排便
9. 小儿出现认生的表现应除外的是
A. 愉快地寻找喜欢的玩具
B. 哭
C. 紧偎母亲
D. 皱眉
E. 避开眼光
10. 儿童开始模仿成人活动的年龄是
A. 1 岁
B. 2 岁
C. 3 岁
D. 4 岁
E. 5 岁
11. 符合 3 个月小儿运动发育的是
A. 直位时能抬头
B. 用手握持玩具
C. 会爬
D. 能坐
E. 扶腋下能站直
12. 测量体重的护理要点错误的是
A. 在晨起空腹排尿后进行
B. 进食后立即进行
C. 每次测量应在同一磅秤上称量
D. 测量前应先校正磅秤为零点
E. 脱去衣裤鞋袜后进行
13. 小儿依恋情绪达到高峰的年龄是
A. 6~7 个月
B. 7~8 个月
C. 9~12 个月
D. 12~13 个月
E. 18 个月以后
14. 关于身高的中点描述下列错误的一项是
A. 新生儿在脐上
B. 2 岁时在脐下
C. 6 岁时在脐与耻骨联合上缘之间
D. 8 岁时在耻骨联合下缘
E. 12 岁时上部量和下部量相等
15. 小儿最早发育的器官系统是
A. 神经系统
B. 生殖系统
C. 淋巴系统
D. 运动系统
E. 循环系统
16. 不符合幼儿期特点的是
A. 生长发育速度较婴儿期减慢
B. 前囟闭合,乳牙出齐
C. 能控制大小便
D. 语言动作及心理方面发展较慢
E. 对危险的识别能力不足
17. 幼儿期小儿心理发展的特征应除外的是
A. 十分任性,力图摆脱父母的约束
B. 依赖性减少
C. 自我意识增强
D. 理解、综合、分析、归纳能力得到发展
E. 能进行想象和思维
18. 正常小儿能用简单的语言表达自己的年龄是
A. 8~9 个月

- B. 10~12 个月
C. 1.5~2 岁
D. 3 岁
E. 4 岁
19. 体重 8.3 kg,前囟 1 cm,出牙 4 个,能扶床栏杆站立,并会发声“爸爸”“妈妈”,最可能的月龄是
A. 3 个月
B. 5 个月
C. 7 个月
D. 9 个月
E. 12 个月
20. 不是小儿注意力的发展规律的是
A. 有意注意是无目的的行为
B. 无意注意是自然发生的
C. 婴儿期以无意注意为主
D. 随年龄增长,产生选择性注意力
E. 5~6 岁小儿能控制注意力
21. 小儿生长发育的规律哪项除外
A. 连续性
B. 顺序性
C. 不平衡性
D. 个体差异
E. 构成性
22. 小儿抓握的动作表现
A. 由粗到细
B. 由细到粗
C. 由简单到复杂
D. 由复杂到简单
E. 由上到下
23. 小儿机体各系统的发育在不同年龄阶段各有先后,指的是
A. 个体差异性
B. 不平衡性
C. 顺序性
D. 连续性
E. 阶段性
24. 反映骨骼发育的重要指标是
A. 体重
B. 身高
C. 头围
D. 胸围
E. 面色
25. 生理性体重下降的范围一般为原出生体重的
A. 9%~12%
B. 5%~10%
C. 3%~9%
D. 3%~5%
E. 4%~6%
26. 小儿 2 周岁时身长约
A. 75 cm
B. 80 cm
C. 85 cm
D. 90 cm
E. 95 cm
27. 11 岁小儿腕部骨化中心应有
A. 8 个
B. 9 个
C. 10 个
D. 11 个
E. 12 个
28. 小儿骨骼发育中,正确的是
A. 前囟最晚闭合的年龄为 10 个月

- B. 后囟一般闭合的年龄在出生后 2 周
- C. 颅缝一般闭合的年龄为 2 个月
- D. 腕部骨化中心出现的年龄为 1 岁半
- E. 上、下部量相等的年龄为 12 岁

29. 正常新生儿头围约为

- A. 34 cm
- B. 36 cm
- C. 38 cm
- D. 40 cm
- E. 42 cm

30. 乳牙一般于几岁出齐

- A. 1 岁
- B. 2 岁
- C. 3 岁
- D. 2~2.5 岁
- E. 3~3.5 岁

A₃/A₄ 型题

(31~33 题共用题干)

护士为 2 岁小儿做健康体格检查,检查结果为正常。采集护理病史时获知:该小儿会跑、跳,会用 2~3 个字构成的句子与父母进行语言交流。

31. 该小儿的体重应为

- A. 6 kg
- B. 9 kg
- C. 12 kg
- D. 15 kg
- E. 18 kg

32. 该小儿的身高应为

- A. 65 cm
- B. 75 cm
- C. 85 cm

D. 90 cm

E. 95 cm

33. 该小儿的乳牙发育应为

- A. 12 颗
- B. 16 颗
- C. 20 颗
- D. 24 颗
- E. 28 颗

(34~37 题共用题干)

5 个月小儿到儿童保健门诊做健康检查。护理病史资料:采取人工喂养,神经心理发育正常,看见母亲能微笑,体重为 5.6 kg。

34. 该小儿的大运动发育状况是能

- A. 抬头
- B. 独坐
- C. 翻身
- D. 爬
- E. 扶物站立

35. 该小儿细动作的发育状况是能

- A. 两手握拳很紧
- B. 开始有意识地取物
- C. 可用拇、示指(食指)拾物
- D. 能独自摆弄小物体
- E. 能将物体从一手传至另一手

36. 该小儿的视感知发育状况是

- A. 能追随跌落的物体
- B. 头、眼协调好
- C. 可注视远距离的物体
- D. 有视深度的感觉
- E. 可区别垂直线和横线

37. 该小儿的听感知发育状况应是

- A. 头可转向声源

- B. 对父母言语有清楚的反应
- C. 能区别言语的意义
- D. 能听懂自己的名字
- E. 可精确地区别不同的声音

(38~41 题共用题干)

小儿,1岁,经检查发育正常。

38. 该小儿应有的乳牙数是

- A. 3 颗
- B. 4 颗
- C. 5 颗
- D. 6 颗
- E. 10 颗

39. 该小儿应达到的身高约为

- A. 50 cm
- B. 55 cm
- C. 60 cm
- D. 65 cm
- E. 75 cm

40. 该小儿的体重可达

- A. 7~8 kg
- B. 9~10 kg
- C. 10~12 kg
- D. 12~13 kg
- E. 14~15 kg

41. 该小儿的心理发展特点是

- A. 主动与内疚或罪恶感
- B. 信任与不信任
- C. 冲突与自控
- D. 角色认同与角色混淆
- E. 勤奋与自卑

(42~44 题共用题干)

小儿,女性,4岁。体重 16 kg,身高 98 cm,

智能发育正常,现在幼儿园学习。

42. 与该小儿生长发育不符的内容是

- A. 会穿鞋
- B. 能唱儿歌
- C. 求知欲强
- D. 喜模仿
- E. 会写字

43. 此期儿童发病率开始增多的疾病是

- A. 婴幼儿腹泻
- B. 肺炎
- C. 急性肾炎
- D. 佝偻病
- E. 骨折

44. 此期儿童心理发育的特征是

- A. 自我认同意识强烈
- B. 自主性明显
- C. 有自卑感
- D. 依赖性强
- E. 有进取精神

(45~48 题共用题干)

小儿,18个月。父母体健、无遗传病史。家长带小儿来医院进行体格检查。

45. 为了解该小儿的营养状况,护士首先应做的检查是

- A. 测体重
- B. 测身高
- C. 测坐高
- D. 测上、下部量比例
- E. 测头围与胸围

46. 该小儿的体格检查结果为发育正常。那么,她的牙齿、胸围、头围应达到的指标是

- A. 乳牙 8 颗,胸围等于头围

- B. 乳牙 8 颗,胸围大于头围
- C. 乳牙 8 颗,胸围小于头围
- D. 乳牙 12 颗,胸围大于头围
- E. 乳牙 12 颗,胸围小于头围

47. 该小儿出生后采用母乳喂养,至 6 个月后改为人工喂养,按时添加辅食;既往体健,无创伤及惊厥史。目前该小儿尚未达到的动作发育是

- A. 弯腰拾东西
- B. 独走
- C. 蹲着玩
- D. 爬台阶
- E. 并足跳

48. 该小儿无遗传、代谢、内分泌疾病,智能发育正常。目前,她适应周围人物的能力及行为尚未达到的指标是

- A. 能模仿成人动作,招手“再见”
- B. 能表示同意、不同意
- C. 能听懂自己的名字
- D. 会表示大小便,听懂命令
- E. 能画人像,记忆力强

(49~51 题共用题干)

小儿,体重 9.2 kg,身长 76 cm,头围 46 cm,牙齿 8 个。

49. 该小儿的年龄是

- A. 10 个月
- B. 12 个月
- C. 15 个月
- D. 16 个月
- E. 18 个月

50. 关于该小儿的粗细动作、语言的发育应除外

- A. 能独走
- B. 能弯腰拾东西
- C. 能爬台阶
- D. 能叫出物品的名字
- E. 指出自己的手、眼

51. 该小儿必须完成的疫苗接种应除外

- A. 卡介苗
- B. 风疹疫苗
- C. 百白破混合制剂
- D. 乙肝疫苗
- E. 麻疹疫苗

(52~54 题共用题干)

小儿,营养状况良好,体重 7 kg,能坐,见生人即哭,前囟大小为 2 cm×2 cm。

52. 男婴最可能的年龄是

- A. 4~5 个月
- B. 5~6 个月
- C. 7~8 个月
- D. 8~9 个月
- E. 10~12 个月

53. 该患儿身长约

- A. 50 cm
- B. 65 cm
- C. 70 cm
- D. 80 cm
- E. 85 cm

54. 其头围大约为

- A. 34 cm
- B. 40 cm
- C. 44 cm
- D. 46 cm
- E. 48 cm

营养、喂养及营养性疾病 患儿的护理

A₁/A₂ 型题

1. 冬季出生小儿给予维生素 D 预防维生素 D 缺乏病,其预防量应是

- A. 2 500 IU/d
- B. 2 000 IU/d
- C. 1 500 IU/d
- D. 1 000 IU/d
- E. 400 IU/d

2. 营养不良患儿皮下脂肪最先减少的部位是

- A. 面部
- B. 腹部
- C. 躯干
- D. 臀部
- E. 四肢

3. 母乳在婴儿胃排空的时间是

- A. 1 h
- B. 1~1.5 h
- C. 2~3 h
- D. 3~4 h
- E. 4~5 h

4. 辅助食品添加的原则,以下哪个选项不

正确

- A. 从少到多
- B. 从细到粗
- C. 由稠到稀
- D. 有一种到多种
- E. 患病期间不添加新的辅食

5. 为了提高母乳喂养率,胎儿娩出后应给予

- A. 尽早哺乳
- B. 2~4 h 后哺乳
- C. 6~8 h 后哺乳
- D. 8~10 h 后哺乳
- E. 12~24 h 后哺乳

6. 幼儿全日热量分配其晚餐占

- A. 10%~15%
- B. 15%~20%
- C. 20%~25%
- D. 25%~30%
- E. 30%~35%

7. 人体维生素 D 的主要来源是

- A. 蛋黄中的维生素 D
- B. 母乳中的维生素 D
- C. 牛奶中的维生素 D
- D. 皮肤合成内源性的维生素 D

- E. 猪肝中的维生素 D
8. 当血钙低于下列哪个数值时,可引起手足抽搐
- 1.4 mmol/L(5.5 mg/dl)~1.5 mmol/L(6.0 mg/dl)
 - 1.5 mmol/L(6.0 mg/dl)~1.63 mmol/L(6.5 mg/dl)
 - 1.6 mmol/L(6.5 mg/dl)~1.75 mmol/L(7.0 mg/dl)
 - 1.75 mmol/L(7.0 mg/dl)~1.88 mmol/L(7.5 mg/dl)
 - 2.0 mmol/L(8.0 mg/dl)~2.13 mmol/L(8.5 mg/dl)
9. 维生素 D 缺乏病激期的主要临床表现是
- 睡眠不安,易惊
 - 骨骼系统改变
 - 多汗
 - 全身肌肉松弛
 - 语言发育迟缓
10. 为预防佝偻病,一般应服维生素 D 至
- 6 岁
 - 5 岁
 - 4 岁
 - 2 岁
 - 6 个月
11. 维生素 B₁ 缺乏的症状与体征应除外
- 贫血
 - 运动和感觉神经炎
 - 心脏扩大
 - 水肿
 - 少尿
12. 重度营养不良患儿,伴腹泻、重度脱水,周围循环障碍明显,下列不妥的处理是
- 补液总量比一般少于 1/3
 - 补钾盐需 7~10 d
 - 补钙盐
 - 不能扩容
 - 补镁
13. 母乳中含大量免疫物质,其中可抑制念珠菌生长的物质是
- 分泌型 IgA
 - 乳铁蛋白
 - 溶菌酶
 - 免疫活性细菌
 - 乙型乳糖
14. 小儿断奶时间一般选择为
- 6~8 个月,最佳季节为春秋季节
 - 8~9 个月,最佳季节为夏季
 - 10~12 个月,最佳季节为春秋季节
 - 14~16 个月,最佳季节为冬季
 - 18~24 个月,最佳季节为春秋季节
15. 佝偻病性手足抽搐症的治疗步骤是
- 止痉—维生素 D—补钙
 - 止痉—补钙—维生素 D
 - 维生素 D—补钙—止痉
 - 维生素 D—止痉—补钙
 - 补钙—止痉—维生素 D
16. 为中、重度营养不良患儿补液时,下列哪项不正确
- 补液速度稍慢
 - 注意补充热量和蛋白质
 - 注意补钙和补镁
 - 补液总量应适当减少
 - 不应补钾

17. 营养不良的患儿皮下脂肪消减的顺序是
 - A. 躯干—臀部—四肢—腹部—面颊部
 - B. 腹部—躯干—臀部—四肢—面颊部
 - C. 四肢—躯干—臀部—腹部—面颊部
 - D. 臀部—躯干—四肢—腹部—面颊部
 - E. 躯干—腹部—四肢—臀部—面颊部
18. 母乳喂养有利于预防佝偻病的主要原因是
 - A. 含不饱和脂肪酸多
 - B. 糖含量高
 - C. 钙、磷比例合适
 - D. sIgA 多
 - E. 母乳中乳清蛋白含量多
19. 患儿,5 个月。夜间烦躁不安,多汗,枕秃,有颅骨软化。血清钙 2 mmol/L (8 mg/dl)、血磷 1.0 mmol/L (3 mg/dl),碱性磷酸酶 310 U/L(金氏单位)。应采取的诊断及治疗是
 - A. 佝偻病活动早期,维生素 D 治疗
 - B. 佝偻病早期,维生素 D 预防
 - C. 佝偻病恢复期,维生素 D 治疗
 - D. 佝偻病活动激期,维生素 D 治疗
 - E. 佝偻病后遗症期,不需治疗
20. 患儿,2 岁。头颅大,前额突出,前凶门大,肋骨呈串珠状,血清钙 2.0 mmol/L,血清磷 1.1 mmol/L,碱性磷酸酶明显升高,智力一般。该患儿最可能为
 - A. 佝偻病
 - B. 散发性呆小病
 - C. 地方性呆小病
 - D. 脑积水
 - E. 软骨营养障碍
21. 小儿总能量的 30%~35%来自
 - A. 蛋白质
 - B. 脂肪
 - C. 糖类(碳水化合物)
 - D. 维生素
 - E. 矿物质
22. 关于母乳的特点错误的一项是
 - A. 母乳中蛋白质以酪蛋白为主
 - B. 母乳中钙、磷比例适当
 - C. 母乳的蛋白质含量比牛乳低
 - D. 母乳中必需不饱和脂肪酸比牛乳多
 - E. 母乳有预防感染的作用
23. 对能量的需要,基础代谢所占比例最高的时期是
 - A. 青春期
 - B. 学龄期
 - C. 学龄前期
 - D. 幼儿期
 - E. 婴儿期
24. 开始给小儿添加蛋黄的时间是
 - A. 生后即给予
 - B. 出生 2~4 周
 - C. 1~3 个月
 - D. 4~6 个月
 - E. 7~9 个月
25. 符合佝偻病激期改变的是
 - A. 血钙正常或稍高
 - B. 血磷正常
 - C. 血钙、磷乘积 <30
 - D. 碱性磷酸酶稍增高
 - E. 长骨 X 线检查骨密度增高
26. 佝偻病患儿由于骨软化和肌肉牵拉可