

最佳畅销书

2016

国家护士执业
资格考试权威推荐用书

护士执业 资格考试冲刺试卷

(第四版)

护士执业资格考试研究专家组 编写



更多免费题库

考前辅导授课名师，紧扣考纲精选试题

涵盖突出考试重点，提高考前冲刺效率

中国医药科技出版社

2016国家护士执业资格考试权威推荐用书

护士执业资格 考试冲刺试卷

(第四版)

护士执业资格考试研究专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书包含 5 套冲刺试卷。试卷完全按考试大纲要求和考试真题题型、题量设置。书后附以答案。

图书在版编目 (CIP) 数据

护士执业资格考试冲刺试卷 / 护士执业资格考试研究专家组编写. —4 版
—北京: 中国医药科技出版社, 2015. 12

2016 国家护士执业资格考试权威推荐用书

ISBN 978-7-5067-7965-4

I. ①护… II. ①护… III. ①护士—资格考试—习题集
IV. ①R192. 6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 288619 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787×1092mm¹/₁₆

印张 9¹/₂

字数 177 千字

初版 2012 年 2 月第 1 版

版次 2016 年 1 月第 4 版

印次 2016 年 1 月第 1 次印刷

印刷 廊坊市广阳区九洲印刷厂

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-7965-4

定价 19.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前言

国家护士执业资格考试是评价申请护士执业资格者是否具备执业所必需的护理专业知识与工作能力的考试，是一种行业准入考试。

护士执业资格考试科目包括专业实务和实践能力，依据最新考试形式，每个科目题量由原来的 135 题减至 120 题。题型包括 A1、A2、A3、A4 四种题型，在考试中分属最佳选择题和案例题两部分。考试时间在每年 5 月中旬。

对于大多数考生而言，复习阶段是非常艰辛的，复习内容繁多，复习任务沉重。为了让广大考生对护士执业资格考试有一个全面的了解，熟悉实战情景，我们精心编写了这本《护士执业资格考试冲刺试卷》。

本书紧扣 2016 年护士执业资格考试大纲，精心甄选习题。试卷题型、题量与实际考试一致，考点分布模拟真题，突出考试重点和易考点。考生在练习模拟试题的过程中可以加深对重点知识的巩固，在复习中查漏补缺，根据自身对知识的掌握情况进行针对性的复习。同时可以进行考前自测。

为了方便考生随时随地学习和自测，本书附加掌上 app 学习服务。考生可下载至移动终端，实现智能学习。

为了不断提升本套考试用书的品质，欢迎广大读者提出宝贵意见，我们将在今后的工作中不断修订完善。反馈信箱：kszx405@163.com。最后祝所有考生在护士执业资格考试中取得好的成绩！

本书编委会

2015 年 10 月

为了更好地服务本书读者，我们与阿虎医考合作为大家答疑解惑，获取更多本书相关知识，请关注微信订阅号



目 录

冲刺试卷.....	1
冲刺试卷一	3
专业实务	3
实践能力	16
冲刺试卷二	29
专业实务	29
实践能力	42
冲刺试卷三	56
专业实务	56
实践能力	69
冲刺试卷四	83
专业实务	83
实践能力	96
冲刺试卷五	109
专业实务	109
实践能力	122
参考答案.....	135
冲刺试卷一	137
专业实务	137
实践能力	138
冲刺试卷二	139
专业实务	139
实践能力	140
冲刺试卷三	141

专业实务	141
实践能力	142
冲刺试卷四	143
专业实务	143
实践能力	144
冲刺试卷五	145
专业实务	145
实践能力	146

冲刺试卷

冲刺试卷一

专业实务

一、以下每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- 下列病症中的临床表现，可见阶段性遗忘的是
 - 强迫症
 - 颅内器质性疾病
 - 精神分裂症
 - 癔症
 - 躁狂症
- 预防肺结核流行的最主要的措施是
 - 减少聚会的机会
 - 接种卡介苗
 - 加强登记管理
 - 不要随地吐痰
 - 发现病人迅速隔离
- 患者，男，66 岁。肝功能失代偿期的肝硬化患者，其血清学检查结果符合本病情的是
 - 白蛋白增高，球蛋白增高
 - 白蛋白增高，球蛋白降低
 - 白蛋白降低，球蛋白增高
 - 白蛋白降低，球蛋白降低
 - 白蛋白正常，球蛋白增高
- 重度有机磷农药中毒的瞳孔变化是
 - 双侧瞳孔针尖样大小
 - 双侧瞳孔扩大
 - 两侧瞳孔不等大
 - 双侧瞳孔缩小、固定，约 2mm
 - 瞳孔无异常
- 大手术后患者宜采用的饮食是
 - 高蛋白、高维生素
 - 高热量、低蛋白
 - 低脂肪、低蛋白
 - 高热量、低脂肪
 - 高脂肪、高蛋白
- 室性心动过速首选的治疗药物是
 - 洋地黄
 - 硝酸甘油
 - 普萘洛尔
 - 酚妥拉明
 - 利多卡因
- 发生溶血反应后，为促进血红蛋白在尿中的溶解度，宜选用的药物是
 - 枸橼酸钠
 - 氯化钠
 - 碳酸氢钠
 - 乳酸钠
 - 葡萄糖酸钙
- 将骨盆各平面中点的假想的轴线称为
 - 胎产式
 - 胎位
 - 胎先露
 - 胎势
 - 骨盆轴
- 以下关于病毒性肝炎的描述，应除外
 - 传染源均为患者和（或）带病毒者
 - 乙型主要通过血液途径传播
 - 病后可获得免疫力，但彼此无交叉免

- 疫保护力
- D. 甲肝儿童多见, 病程呈自限性
- E. 各种病毒性肝炎均应进行抗病毒治疗
10. PDCA 循环管理包括诸多阶段, 其中关键的阶段是
- A. 评估阶段 B. 规划阶段
- C. 督促阶段 D. 处理阶段
- E. 反馈阶段
11. 防止血标本溶血的方法, 下列哪项是错误的
- A. 选用干燥无菌注射器
- B. 注射器采血后带针头沿管壁注入试管
- C. 勿将泡沫注入试管
- D. 避免过度振荡血标本
- E. 标本立即送检
12. 可以从根本上预防风湿性心瓣膜病的措施是
- A. 长期服用抗风湿药物
- B. 积极防治链球菌感染
- C. 避免剧烈运动
- D. 营养支持, 少量多餐
- E. 注意防寒保暖
13. 依赖性护理措施是指
- A. 源于医嘱的措施
- B. 融入其他学科专家意见的措施
- C. 护士独立提出的措施
- D. 源于病人意愿的措施
- E. 源于家属建议的措施
14. 在消化性溃疡的治疗中, 抑制胃酸分泌作用最强的药物是
- A. 铝碳酸镁 B. 西咪替丁
- C. 碳酸氢钠 D. 枸橼酸铋钾
- E. 奥美拉唑
15. 不属于非语言性沟通技巧的是
- A. 倾听 B. 提问
- C. 表情 D. 距离
- E. 眼神交流
16. 口头医嘱执行后, 补写书面医嘱的时间是
- A. 抢救结束后 2 小时内
- B. 抢救结束后 4 小时内
- C. 抢救结束后 6 小时内
- D. 抢救结束后 12 小时内
- E. 抢救结束后 24 小时内
17. 患者, 男, 6 岁, 因烫伤急诊入院。护士在询问烫伤经过时, 患者家属说: “开水瓶倒了, 整个后背都红了。” 护士问道: “您刚才说是被开水烫伤了吗?” 护士所采用的沟通策略是
- A. 微笑 B. 核实
- C. 回应 D. 移情
- E. 沉默
18. 患者, 男性, 85 岁, 因肺炎入院治疗。患者听力严重下降, 护士在与其沟通过程中做法不妥的是
- A. 可以通过触摸加强沟通的效果
- B. 让患者看见护士的面部表情和口形
- C. 进行适当的小结
- D. 用手势和面部表情辅助信息的传递
- E. 让患者用点头或摇头来回答问题
19. 护士不正确的走姿是
- A. 行走时以胸带步, 弹足有力
- B. 柔步无声, 步履轻捷
- C. 两臂前后摆动要强烈有力
- D. 步速稳健快捷
- E. 左右脚沿一直线两旁, 小步前进
20. 初始血尿提示病变部位在
- A. 肾盂 B. 输尿管上段
- C. 膀胱颈部 D. 肾实质
- E. 尿道

21. 患者,女,30岁,孕3产1,诉“2周前出现性生活后阴道有血性白带”。妇科检查:子宫颈中度糜烂,有接触性出血,子宫正常大小,双侧附件阴性。子宫颈刮片细胞学检查为巴氏3级。提示该患者为
- A. 轻度炎症 B. 中度炎症
C. 宫颈癌 D. 可疑癌症
E. 高度可疑癌症
22. 某患者因慢性肾衰竭接受了肾移植手术,术后恢复良好,心怀感激,多次向责任护士打听捐肾者家庭住址,想登门致谢,面对患者的请求,责任护士正确的做法是
- A. 建议电话致谢
B. 婉拒患者的请求
C. 建议给予经济补偿
D. 宣传捐献者事迹
E. 与患者一道登门致谢
23. 患者,男性,23岁,门诊候诊时,突然感到腹痛难忍。护士观察:患者面色苍白,出冷汗,两手冰冷,呼吸急促。护士应采取的措施是
- A. 与患者沟通并给予安慰
B. 嘱患者平卧休息
C. 安排患者提前就诊
D. 请医生加快诊疗速度
E. 给予解痉镇痛药物
24. 支气管扩张的最常见原因是
- A. 婴幼儿期支气管-肺组织感染
B. 腐蚀气体吸入
C. 气管异物
D. 支气管周围淋巴结肿大
E. 肺囊性纤维化
25. 关于碘过敏试验的描述,正确的是
- A. 静脉注射造影剂前不用做皮内试验
B. 试验方法包括口服法和眼结膜试验法
C. 皮肤注射试验,皮丘直径>2cm为阳性
D. 口服后试验者出现眩晕、心慌等可判断为阳性
E. 过敏试验阴性者,造影时不会发生过敏反应
26. 新生儿硬肿症复温的要求是
- A. 迅速复温
B. 4~8h内体温恢复正常
C. 8~12h内体温恢复正常
D. 12~24h内体温恢复正常
E. 24~48h内体温恢复正常
27. 伴有脑脊液漏的颅底骨折属于
- A. 闭合性骨折 B. 开放性骨折
C. 不稳定性骨折 D. 青枝骨折
E. 凹陷性骨折
28. 患者,女,34岁,患慢性胃炎多年,现胃痛难忍,10:00am医生开出医嘱“克洛曲,1#,sos”,此项医嘱的失效时间是
- A. 当日10:00PM B. 当日8:00PM
C. 当日6:00PM D. 次日10:00PM
E. 以医生注明时间为准
29. 患者,男性,89岁,消瘦,卧床。护士巡视发现其骶尾部红、肿、硬结、有小水疱和上皮剥落,触痛,有渗液。判断该患者的情况是
- A. 压疮淤血红润期
B. 压疮浸润溃疡期
C. 压疮炎性前期
D. 压疮炎性浸润期
E. 局部皮肤感染
30. 患儿女,3岁。奔跑时摔倒,致头部外伤,诊断为颅内凹陷性骨折。患儿在急诊科留观期间哭闹不止,护士提供正确

- 的心理护理措施是
- 安慰, 解释治疗的重要性
 - 请患儿妈妈进入留观室陪伴
 - 让患儿听舒缓的音乐
 - 询问患儿需求, 给予满足
 - 请主治医生与患儿交谈
31. 患者, 女性, 35 岁, 因“慢性胆囊炎, 胆石症”反复发作, 拟行手术治疗, 进入手术室的陌生环境后患者常出现的心理反应是
- 担心
 - 烦躁
 - 恐惧
 - 沉默
 - 焦虑
32. 患者, 女, 43 岁, 入院行会阴部手术。术后第二天, 护士到病房为其换药时, 征得患者同意后, 应当首先
- 要求其他人离开
 - 检查患者的手术部位
 - 对换药部位进行适当遮挡
 - 帮助患者脱去衣服, 暴露换药部位
 - 与家属交流意见
33. 具有传染性的非特异性感染是
- 疔
 - 急性淋巴结炎
 - 急性淋巴管炎
 - 丹毒
 - 急性蜂窝织炎
34. 患者, 女, 35 岁。入院评估时护士问患者: “您哪里不舒服?” 患者小声地说: “单位体检时医生说 I 可能得了性病。”护士又问: “您是怎么得上性病的?” 患者回答: “我也不知道。”护士嘲讽地笑着说: “不知道? 好吧, 上床检查看看。”说得病房里在场的其他患者和家属都笑了。此案例中护士的行为侵犯了患者的何种权利
- 保护隐私权
 - 知情同意权
 - 医疗公平权
 - 生命健康权
 - 自主决定权
35. 目前控制哮喘最有效的抗炎药物是
- β 受体激动药
 - 吲哚美辛
 - 糖皮质激素
 - 色甘酸钠
 - 头孢类抗生素
36. 以下临终患者的感知觉中, 最后消失的是
- 嗅觉
 - 视觉
 - 听觉
 - 触觉
 - 味觉
37. 孕妇, 31 岁, 孕 34 周出现无痛性阴道流血, 量中等, 胎位 LSA, 胎心消失, B 超显示完全性前置胎盘, 首先考虑的处理方法是
- 以剖宫产迅速结束分娩
 - 卧床休息与抗休克治疗
 - 阴道检查决定分娩方式
 - 以阴道自然产结束分娩
 - 预防感染与抗休克治疗
38. 护理记录单正确的记录方法是
- 眉栏填写用铅笔
 - 日间用红钢笔书写
 - 夜间用蓝钢笔书写
 - 护理记录单不入病案
 - 总结 24 小时出入液量记录于体温单上
39. 患者, 男性, 29 岁, 裂伤后 7 天, 换药见肉芽组织表面光滑晶亮, 呈淡红色, 触及不出血, 适宜的换药方法是
- 3% ~ 5% 氯化钠湿敷
 - 凡士林纱布覆盖
 - 含氯石灰硼酸溶液 (优琐) 湿敷
 - 硝酸银烧灼

- E. 3% 过氧化氢湿敷
40. 患者, 女, 75 岁, 肝癌晚期, 下列心理护理措施哪项不妥
- 有坦率、诚实的态度
 - 认真听取患者的主诉
 - 充分体谅患者的痛苦
 - 制止患者的愤怒表现
 - 尊重患者的选择
41. 患者, 男性, 40 岁, 右上腹肝区隐痛, 伴恶心、呕吐。门诊查血清谷氨酸氨基转移酶升高。护士应立即采集的措施是
- 详细询问病史
 - 告知门诊医生提前接诊
 - 进行心理护理
 - 转入隔离门诊诊治
 - 测量患者生命体征
42. “阿普唑仑 0.4mg, qn” 此医嘱是
- 长期医嘱
 - 停止医嘱
 - 长期备用医嘱
 - 临时备用医嘱
 - 即刻医嘱
43. 某糖尿病患者出院时, 护士指导其学习自行注射胰岛素, 此时护士担任的角色是
- 照顾者
 - 教育者
 - 领导者
 - 咨询者
 - 管理者
44. 氨中毒引起的肝性脑病的主要机制是
- 氨使蛋白质代谢障碍
 - 氨干扰大脑的能量代谢
 - 取代正常的神经递质
 - 引起神经传导异常
 - 促进氨基酸不平衡
45. 引起夏季 (5~8 月份) 腹泻的常见病原体是
- 致病性大肠埃希菌
 - 耶尔森菌
 - 轮状病毒
 - 艾柯病毒
 - 阿米巴原虫
46. 患者, 男性, 63 岁, 有高血压冠心病病史 5 年。入院血压 195/135mmHg, 治疗后稍有下降, 但时有波动。患者精神紧张, 焦虑。护士为其拟定的护理措施不包括
- 测得血压偏高时应保持镇静
 - 测后与原基础血压对照后, 向患者、家属做好解释
 - 安慰患者保持稳定乐观的情绪
 - 将血压计与患者视线平行, 以便观察病情
 - 进行健康教育, 促进患者改变不良生活方式
47. 心脏最明显的老化表现是
- 双心室肥厚
 - 左心腔相对变大
 - 左心室肥厚, 左心腔相对变小
 - 右心室肥厚
 - 右心腔相对变小
48. 关于医疗机构临床用血的规定, 正确的是
- 对同一献血者两次采集间隔不少于 3 个月
 - 可将临床多余用血出售给血液制品生产单位
 - 必须进行配型检查
 - 献血者每次采集血液量一般为 600ml
 - 主要动员家庭、亲友为患者献血
49. 某病区护士人员的工作方式是: 一组护理人员应用护理程序的工作方法, 共同完成对一组病人的护理工作。该种工作方式是

- A. 小组护理 B. 综合护理
C. 个案护理 D. 责任制护理
E. 经验护理
50. 因医护人员工作失误,造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的是
A. 医疗差错
B. 一级甲等医疗事故
C. 二级医疗事故
D. 三级乙等医疗事故
E. 因不可抗力造成
51. 青春期最突出的表现是
A. 意外发生率高
B. 生长发育最迅速时期
C. 生长发育速度变慢,语言及动作能力提高较快
D. 接受教育的最佳时期
E. 生长发育旺盛,生殖器官迅速发育成熟
52. 患儿,11个月。呕吐、腹泻4天。每日排便12~14次,稀水样便,精神差,脱水症状明显。在补充累积损失过程中小儿出现无力、心音低钝、腹胀、肠鸣音弱,病区护士首先应考虑
A. 低磷血症 B. 高钾血症
C. 低血糖 D. 低钾血症
E. 低钠血症
53. 环磷酰胺有何副作用
A. 加重黏膜破损 B. 尿血、脱发
C. 加重皮肤出血 D. 加重感染
E. 加重红细胞破裂
54. 患者,男性,28岁,脑部撞伤后睡眠4天。查体:患者处于睡眠状,唤醒后又入睡;能简单回答问题,但反应迟钝。判断患者的意识状态为
A. 浅昏迷 B. 深昏迷
C. 嗜睡 D. 意识模糊
E. 谵妄
55. 初产妇,30岁,顺产。产后2天会阴侧切口红肿。给予局部湿热敷,宜选择
A. 1%乳酸溶液
B. 5%碘伏
C. 2%碳酸氢钠溶液
D. 50%硫酸镁溶液
E. 1:5000高锰酸钾溶液
56. 患者,男性,34岁,因外伤下肢骨折入院。现恢复良好,今天开始行复健治疗。中午护士发口服药时患者复健治疗尚未回,该护士应该将其药物
A. 等待下次一起发 B. 暂缓发药
C. 置于床头柜 D. 交给患者家属
E. 告诉医生停药
57. 患者,女性,42岁。混合痔行痔核切除术后,出院时护士的健康指导中不正确的是
A. 高纤维素饮食
B. 保持大便通畅
C. 大便秘结可口服缓泻药
D. 保持肛门清洁
E. 可以适当进食辛辣饮食
58. 治疗性沟通的双方是护士和患者,是护理范畴内与健康有关的专业性内容,其特点是
A. 以病人为中心的沟通
B. 可随意与病人进行交谈
C. 一般性的治疗性沟通
D. 调整身心使疾病康复
E. 指有关治疗措施的交谈
59. 患者,男,45岁,在病房内向护理人员表示食物有毒,吃了会死,故拒绝进食,

护士对这种情况最适当的护理措施是

- A. 先吃一口让患者安心, 并借此证明并不像他所想的那样
- B. 先了解患者为什么会认为食物中有毒
- C. 告诉患者, 为了他好, 若不吃就要鼻饲
- D. 为避免患者情绪失控, 应顺从患者的意思, 不吃就不勉强
- E. 强迫患者吃下食物

60. 能用于 DIC 的血液制品是

- A. 浓缩红细胞
- B. 全血
- C. 纤维蛋白原
- D. 凝血酶原复合物
- E. 血小板浓缩悬液

61. 中医五脏指的是

- A. 心、肝、脾、肺、肾
- B. 肝、胆、胃、大肠、小肠
- C. 心、肝、胃、肺、膀胱
- D. 脾、肝、胃、肺、女子胞
- E. 心、肝、脾、胆、三焦

62. 新生儿生理性体重下降是指平均比出生时下降了

- A. 2%
- B. 3% ~ 9%
- C. 10% ~ 13%
- D. 16%
- E. 18%

63. 患儿, 4 岁, 食果冻误入气管, 出现“三凹征”。判断该患儿呼吸困难的类型是

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 呼吸性呼吸困难
- C. 混合性呼吸困难
- D. 中毒性呼吸困难
- E. 心源性呼吸困难

64. 患者, 女性, 52 岁, 身高 155cm, 体重 75kg, 诊断为 2 型糖尿病, “三多一少”症状不明显, 空腹血糖 9.8mmol/L。首

选的口服降糖药物是

- A. 格列齐特
- B. 甲苯磺丁脲
- C. 格列吡嗪
- D. 二甲双胍
- E. 格列本脲

65. 慢性呼吸衰竭最常见的病因是

- A. 充血性心力衰竭
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管扩张
- D. 慢性阻塞性肺疾病
- E. 神经系统病变

66. 疱疹性咽峡炎的病原体是

- A. 腺病毒
- B. 流感病毒
- C. 冠状病毒
- D. 柯萨奇 A 组病毒
- E. 柯萨奇 B 组病毒

67. 中医急重症不包括

- A. 高热
- B. 癃闭
- C. 关格
- D. 痿症
- E. 中风

68. 做尿糖定量检查的尿标本, 容器中应加入的防腐剂是

- A. 甲醛
- B. 甲苯
- C. 乳酸钠
- D. 浓盐酸
- E. 肝素钠

69. 患者, 女性, 63 岁。右腹股沟斜疝修补术后 7 天, 恢复顺利, 明日出院, 健康教育最重要的是

- A. 增加营养
- B. 定期复查
- C. 适当活动
- D. 避免便秘
- E. 3 个月内避免重体力劳动

70. 患儿, 5 岁, 支原体肺炎, 给予红霉素静脉滴注。输液第 3 天, 输液肢体沿血管走行出现条索状红肿、发热伴疼痛。护士给予的处置不正确的是

- A. 患肢抬高
- B. 增加患肢活动

- C. 超短波局部治疗
D. 95% 乙醇湿热敷
E. 暂停从该静脉输液
71. 女性, 29 岁, 已婚。停经 60 天, 阴道少量出血 1 天, 色鲜红, 伴下腹轻微疼痛。妇科检查: 宫口未开, 子宫如孕 8 周大。1 年前孕 10 周时流产 1 次。该孕妇可能为
A. 先兆流产 B. 难免流产
C. 晚期流产 D. 早期流产
E. 习惯性流产
72. 患者, 男性, 55 岁, 脑出血溶栓治疗, 病情危重, 需要随时观察, 以便进行抢救。护士观察患者病情及生命体征的周期合适的是
A. 24 小时专人护理
B. 每 1 小时巡视 1 次
C. 每 2 小时巡视 1 次
D. 每日巡视 6 次
E. 每日巡视 4 次
73. 以下哪项不是先心病患儿术后并发症
A. 高血压
B. 残余分流
C. 喉返神经损伤
D. 高心排量血量综合征
E. 完全性房室传导阻滞
74. 能反映急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 的典型症状是
A. 脉搏浅快 B. 血压下降
C. 心律不齐 D. 进行性呼吸困难
E. 出现神经精神症状
75. 腰椎间盘突出症最容易发生的部位是
A. 腰 4~5 B. 腰 3~4
C. 腰 2~3 D. 腰 1~2
E. 胸 12~腰 1
76. 护患关系发展到工作期的主要任务是
A. 与病人建立互相信任的关系
B. 为病人日后的健康保健制订计划
C. 采取措施解决病人健康问题
D. 对整个护患关系进行评价
E. 了解病人对其健康状况和护患关系的满意程度
77. 根据二级护理, 护士巡视患者的安排是
A. 24 小时特别护理
B. 每 2 小时观察 1 次
C. 每 3 小时观察 1 次
D. 每日巡视患者 6 次
E. 每日巡视患者 4 次
78. 关于急性肾小球肾炎水肿的主要原因, 描述正确的是
A. 肾小球滤过率降低
B. 肾小管重吸收增加
C. 大量血浆蛋白吸收减少
D. 继发性醛固酮分泌增多
E. 继发性心功能不全
79. 患者, 男性, 23 岁, 因化脓性扁桃体炎需肌内注射青霉素。当患者侧卧位时, 护士为其采取的正确体位是
A. 下腿伸直, 上腿稍弯曲
B. 上腿伸直, 下腿稍弯曲
C. 双手抱膝
D. 两腿弯曲
E. 两腿伸直
80. 下列哪项为单根单处肋骨骨折的处理原则
A. 牵引固定
B. 胸带固定胸廓
C. 呼吸机辅助呼吸
D. 建立人工气道
E. 胸腔闭式引流

81. 患者，女性，65岁，是一位尿毒症患者，现行维持性血液透析，经常抱怨家属照顾不周。今晨对护士说“你们治了这么久也治不好，我不治了！”护士的回答最合适的是
- “您的心情我理解，我们也在努力，感谢您的配合。”
 - “请您不要这么说，太让人伤心了！”
 - “这个病本身就是不容易治愈的！”
 - “您觉得治疗效果不理想，可以找其他治疗途径去其他医院试试。”
 - “这样扰乱了病房的秩序，影响我们的正常工作。”
82. 金黄色葡萄球菌肺炎的诊断主要是依靠
- 起病急，病情重
 - 血白细胞总数高、核左移
 - 双肺底湿啰音密集
 - 胸片显示有多发性脓肿或脓胸、肺大疱
 - 病情发展快
83. 情绪低落常见于
- 抑郁症
 - 强迫症
 - 焦虑症
 - 疑病性神经症
 - 精神分裂症
84. 护士为糖尿病患者进行健康宣导，告知患者正常情况下餐后2小时血糖值应
- $<9.8\text{mmol/L}$
 - $<8.8\text{mmol/L}$
 - $<7.8\text{mmol/L}$
 - $<6.8\text{mmol/L}$
 - $<5.8\text{mmol/L}$
85. 患者，女，32岁，大叶性肺炎，痰液黏稠不易咳出，医嘱行超声雾化吸入稀释化痰止咳。使用超声波雾化器过程中，水槽内水温不超过
- 70°C
 - 60°C
 - 50°C
 - 40°C
 - 30°C
86. 慢性肺源性心脏病患者形成肺动脉高压的最重要因素是
- 缺氧
 - 二氧化碳潴留
 - 呼吸性酸中毒
 - 慢性支气管炎反复发作
 - 肺小动脉炎
87. 7岁小儿不需要复种以下哪项计划免疫制剂
- 乙脑疫苗
 - 百白破疫苗
 - 卡介苗
 - 麻疹疫苗
 - 脊髓灰质炎疫苗
88. 扩张型心肌病标志性的体征是
- 收缩期心脏杂音
 - 叩诊心界扩大
 - 进行性呼吸困难
 - 窦性心动过速
 - 偶发室性早搏
89. 患者，女性，34岁，因“不孕症”就诊。行各项检查后，发现患者患有梅毒。门诊护士将此信息告知了科室的其他护士和其他来就诊的患者。该护士的行为属于
- 侵犯了患者的公平权
 - 侵犯患者的隐私权
 - 侵犯患者的同意权
 - 侵犯患者的生命健康权
 - 侵犯患者风险知情权
90. 护士增进个人人际关系吸引力的要素，不包括
- 提供治疗性的环境
 - 无条件地关心病人，给予温暖
 - 适度的同感心
 - 绝对地保密
 - 敏锐的询问