

神农本草经

SHENNONG 【图文版】 BENCAOJING

神农本草經

下卷

主编：崔玲

- 第一篇 神农本草经简介
- 第二篇 神农本草经序文
- 第三篇 神农本草经上品药物
- 第四篇 神农本草经中品药物
- 第五篇 神农本草经下品药物
- 第六篇 神农本草经七情考
- 第七篇 古书所引《本草经》校点



182. 枕 実

【原文】

枳实，味苦，寒^[1]。治大风在皮肤中，如麻豆苦痒^[2]，除寒热、热结^[3]，止痢，长肌肉，利五脏，益气轻身。生川泽。

【注释】

- [1] 味苦寒：《本草经解》作“气寒，味苦，无毒”。
 - [2] 苦痒：《玄大观》误作“若痒”。
 - [3] 除寒热、热结：《证类》、《纲目》、《本经疏证》、《孙本》、《图考长编》、《顾本》作“除寒热结”。《新修》、《森本》作“除寒热，热结”。从《新修》为正。

【译文】

枳实味苦，性寒。能治疗风邪侵入皮肤，生起小疙瘩，极痒难忍的症状；能解除恶寒发热及邪气积聚；也可止泻痢、长肌肉，调和五脏功能，益气轻身。



酸橙





【形态分布】

2-147 酸 橙

芸香科酸橙。小乔木，树冠伞形。茎枝三棱形，光滑，有长刺。单身复叶，互生；叶柄有狭长形或倒心脏形的翼；叶片革质，两面无毛，具半透明油点。花排列成总状花序；花萼5裂；花瓣5枚；雄蕊25枚，花丝基部部分愈合；子房上位，约12室，柱头头状。果圆形而稍扁，橙黄色，果皮粗糙。花期4~5月，果期6~11月。主产于江西、四川等地，多为栽培。以未成熟果实入药。7~8月果实尚未成熟时采收。

2-148 拘 橋

芸香科枸橘。常绿灌木或小乔木，高5~7m。茎枝具粗大腋生的棘刺，刺长3~4cm，基部扁平；幼枝光滑无毛，青绿色，扁而具棱；老枝浑圆。三出复叶，总叶柄具翼，顶生小叶片椭圆形至倒卵形，长2.5~6cm，宽1.5~3cm，先端圆或微凹，基部楔形，侧生小叶较小，基部偏斜，边缘均有波形锯齿。花生于二年生枝上叶腋，通常先叶开放；萼片5枚，卵状三角形；花瓣5枚，白色，长椭圆状倒卵形，长8~10mm；雄蕊8~10枚，或多至20枚，离生；子房上位，具短柔毛，6~8室，花柱粗短。柑果圆球形，直径2~4cm，熟时黄色，芳香。花期4~5月，果熟期9~10月。分布全国大部分地区。



枸櫞

【药材特征】

2-149 枳实 枳实片

药材 呈半球形，少数为球形，直径0.5~2.5cm。外表面灰绿色或黑绿色，





枳实

有颗粒状的突起和皱纹，有果柄痕迹。切面略隆起，黄白色或黄褐色，边缘有油点，果皮不易剥离，中央有紫黑色的瓤，呈车轮形。质坚硬。气清香，味苦而微酸。

饮片 为半圆形1~2mm薄片，表面黄白色或黄褐色，外皮灰绿色、黑绿色或暗棕绿色。气清香，味苦、微酸。另还有麸炒枳实。

【附 方】

1.枳实栀子豉汤：枳实3枚（炙），栀子14个（擘），豉500克（绵裹）。上三味以清浆水7升，空煮取4升，纳枳实、栀子，煮取2升，下豉，更煮五六沸，去滓。温分再服，覆令微似汗。若有宿食者，加大黄如博碩子大5、6枚。治大病瘥后劳复。（《伤寒论》）

2.治积冷痢脱肛：枳实1枚。上磨令滑泽，钻安柄，蜜涂，灸令暖，熨之，冷更易之，冷更不之，取缩人止。（《千金方》）

3.治风疹：枳实以醋渍令湿，火炙令热，适寒温用，熨上。（《延年方》）

【功能主治】

枳实破气消积，化痰散痞。用于积滞内停、痞满胀痛、泻痢后重、大便不通。

枳壳理气宽中，行滞消胀。用于胸胁气滞、胀满疼痛、痰饮内停、中气下陷等。





〔译 文〕

厚朴味苦，性温。主治外中风邪、伤寒所致的头痛、恶寒发热、惊悸不安、气血痹阻、肌肤麻木不仁，还能杀灭各种寄生虫。

183. 厚朴

【原文】

厚朴，味苦，温^[1]。治中风、伤寒、头痛、寒热^[2]、惊悸^[3]、气血痹^[4]、死肌，去三虫^[5]。

【注释】

[1] 味苦，温：《本草经解》作“气温，味苦，无毒”。“温”字后，《森本》有“生山谷”三字。《证类》、《孙本》无此三字。

[2] 头痛寒热：《御览》无“头痛寒”三字。

[3] 惊悸：《御览》无此二字。“悸”，《新修》原脱，据《证类》补。《森本》无“悸”字。

[4] 气血瘀：《御览》、《本草经解》无“气”字。

[5] 去三虫：《御览》作“去虫”。

【形态分布】

2-150 厚朴

木兰科厚朴。落叶乔木，高5~15m，树皮紫褐色，幼枝有细毛，冬芽粗大。单叶互生，密集于小枝顶端，叶片椭圆状倒卵形，大型，革质，先端钝圆或具短尖，基部楔形或圆形，全缘或微波状。花单生枝端，白色有香气。花被9~12片，雄蕊多数，雌蕊心皮多数，排列于延长的花托上。聚合果长椭圆状卵形，木质。花期4~5月，果期9~10月。主产于四川、湖北、浙江、江西等地。多栽培。干燥干皮、枝皮及根皮入药。每年4~6月剥取。



厚朴



2-151 四叶厚朴

木兰科凹叶厚朴。落叶乔木，树高12~20m，树干通直，皮灰棕色，无毛。单叶互生，叶柄粗壮，无毛；叶片革质，倒卵状椭圆形，长20~45cm，先端凹陷，形成2圆裂，裂深2~3.5cm。花大，白色，与叶同时开放，单生枝顶；花被9~12片，肉质；雄蕊多数，螺旋排列。聚合蓇葖果，种子红色，三角状倒卵形。花期3~4月，果熟期9~10月。分布湖北、四川、浙江、江西、江苏、福建等地，喜温暖、湿润气候，多在海拔300~600m山地栽培。干皮、根皮、枝皮、花及果均供药用。4~8月生长盛期剥20年以上树龄皮；定植5~8年花期采花蕾，蒸后晒干。



凹叶厚朴


【药材特征】

2-152 厚朴 制厚朴


药材 为干皮、根皮、枝皮，均卷成筒状。干皮：卷筒状或双卷筒状，长30~35cm，厚约2~7mm。外表面粗糙，灰棕色或灰褐色，有时呈鳞片状，较易剥落，有明显的椭圆形皮孔和纵皱纹。刮去粗皮显黄棕色。内表面紫棕色或深紫褐色，较平滑，划之显油痕，有发亮的细小结晶。质坚硬，不易折断。断面外层灰棕色，颗粒性；内层紫褐色，纤维性。味苦、辛辣。枝皮：皮薄，呈单筒状，质脆，易折断。根皮：呈单筒状或不规则片状，多弯曲劈破，细小。质硬，易折断。

饮片 呈丝状，宽3~5mm。外表面棕褐色、灰褐色或紫褐色。内表面紫棕色或紫褐色，较平滑，切面颗粒性，有油性，可见多数小亮星。制厚朴有较强的姜辣味。





制厚朴



厚朴花

2-153 厚朴花

药材 干燥花蕾形似毛笔头，长4~7cm，直径2~3cm。外表棕褐色或棕红色，顶尖或钝圆，底稍圆，带有花柄。花瓣未开放者层层覆盖，花柱完整。已开放的有大形花蕊外露，棕色长柱形，花瓣肉质较厚，呈匙形，有油点，折之易碎。气香。

【附 方】

1.厚朴三物汤：厚朴400克，大黄200克，枳实5枚。上三味，以水12升，先煮二味，取5升，内大黄煮取3升，温服1升，以利为度。治腹满大便秘者。（《金匱要略》）

2.大黄汤：大黄（锉碎微炒）、朴消、当归（微炙）、芍药各50克，川芎50.5克，桂（去粗皮）125克，厚朴（去粗皮，生姜汁炙烟，如此7遍）50.5克。上七味，粗捣筛，每服15克，水1杯，生姜1500克，煎至七成，去滓温服，血行即止服。治妇人月水来，腹痛脐下坚硬，积血不下。（《圣济总录》）

【功能主治】

厚朴燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中、脘痞吐泻、食积气滞、腹胀便秘、痰饮咳喘。

厚朴花理气，化湿。用于胸脘痞闷胀满、纳谷不香。

184. 秦 皮

【原 文】

秦皮，味苦，微寒^[1]。治风寒湿痹^[2]、洗洗寒气，除热、目中青翳白膜^[3]。久服头不白，轻身。生川谷，





【注释】

- [1] 微寒：《森本·考异》云：“《长生疗养方》无微字。”

[2] 风寒湿痹：《御览》作“风湿痹”。

[3] 目中青翳白膜：《御览》无“白膜”二字。《森本·考异》云：“《长生疗养方》作‘除目翳膜。’”

【译文】

秦皮味苦，性微寒。主治风寒湿痹证，皮肤寒冷，可清热，除去眼中的青翳白膜。长期服用可使人头发不易变白，身体轻捷灵便。

【形态分布】

2-154 白蜡树

木犀科白蜡树。乔木。叶对生，单数羽状复叶，小叶5~9枚，以7枚为多，椭圆或椭圆状卵形，顶端渐尖或钝，边缘具疏锯齿，叶背沿叶脉有褐色柔毛，小叶柄对生处膨大。圆锥花序，花小，花轴无毛，无花冠。翅果扁平，倒披针形，翅长于果。花期5~6月，果期8~9月。生于山间向阳路旁、坡地湿润处。并有栽培。分布于我国南北大部分省区。茎皮入药，称“秦皮”。春、秋整枝时，剥下干皮或枝皮，晒干。




白蜡树

【药材特征】

2-155 秦皮 秦皮丝

药材 枝皮：卷筒状或槽状，长10~16cm，厚1.5~3cm。外表面灰白色、灰





秦皮

棕色至黑棕色或相间呈斑状；平坦或稍粗糙，有灰白色地衣斑，密布多数细小圆点状皮孔，有细斜皱纹及分枝痕。内表面黄白色或棕色，平滑。质硬脆，断面纤维性，黄白。干皮：长条状块片，厚3~6mm。外表面灰棕色，具龟裂状沟纹及红棕色圆形或横长皮孔，断面易成层剥离呈裂片状。无臭，味苦。

饮片 一般横切成丝片，厚2~6mm。

【附 方】

治赤眼生翳：秦皮50克，水1.5升，煮1升，澄清，日日温洗。一方加滑石、黄连等份。（《外台秘要》）

【功能主治】

清热燥湿，收涩，明目。用于热痢、泄泻、赤白带下、目赤肿痛、目生翳膜。

185. 秦 椒

【原文】

秦椒^[1]，味辛，温。治^[2]风邪气，温中，除寒痹^[3]，坚齿长发^[4]，明目。久服轻身、好色^[5]，耐老^[6]增年通神。生川谷。





【注 释】

- [1] 秦椒：《新修》，《证类》、《纲目》、《孙本》、《顾本》列在中品。但本条文中有“久服轻、身好，色耐老增年通神”等语。应列入上品，
- [2] 治：“治”字后，《纲目》有“除”字。
- [3] 除寒痹：《纲目》作“去寒痹”。
- [4] 长发：《证类》、《品汇》、《目纲》、《图考长编》、《顾本》、《孙本》无“长”字。《新修》、《森本》有“长”字。
- [5] 好色：《证类》、《品汇》、《纲目》、《图考长编》、《孙本》、《顾本》、《森本》作“好颜色”。《新修》作“好色”。从《新修》为正。
- [6] 耐老：《新修》原作“能老”，据《千金翼》、《证类》改。

【译 文】

秦椒味辛，性温。可祛除风邪之气，能温补中气、驱逐寒痹，使牙齿坚固、头发润泽、视力提高。长期服用能使人身体灵便、面色健康、延缓衰老、增长寿命、精神健旺。

【形态分布】

2-156 花 椒

芸香科花椒。灌木或小乔木，高1~3m。树皮暗灰色，枝暗紫色，疏生平直而尖锐的皮刺。单数羽状复叶互生，叶轴具窄翼；小叶5~7片，对生，小叶片



花椒





长2~5cm，宽1.5~3cm，主脉基部具柔毛一丛。花小，绿色，单性，雌雄异株或杂性，伞房状圆锥花序顶生；花被4~8片，三角状披针形，排成一轮。蓇葖果3个，球形，呈红色至紫红色，密生疣状突起的腺点。种子近圆形，蓝黑色，有光泽。花期3~5月，果期7~10月。我国大部分地区有分布。生于路旁或灌木丛中，栽培很多。以果皮或种子等入药。秋季采收。

【药材特征】

2-157 秦椒（花椒）

药材 干燥果皮腹面开裂，呈两瓣形，基部相连，直径约4~5mm。表面红紫色至红棕色，粗糙，顶端有柱头残迹，基部带有小果柄及1~2个未发育的心皮，呈颗粒状。外果皮表面极皱缩，可见许多疣状突起的油腺；内果皮光滑，淡黄色，常由基部与外果皮分离而向内反卷。具特殊的强烈香气，味麻辣而持久。以生品、炒制、醋制、盐制等入药。

2-158 椒 目

药材 为种子。呈卵圆形或类球形，直径约3~5mm。表面黑色有光泽，有时表皮已脱落，露出黑色网状纹理。种皮质坚硬，剥离后，可见乳白色的胚乳及子叶。气香，味辛辣。


炒出汗（油）后入药。

【附 方】


治肾风囊痒：川椒、杏仁。研膏，涂掌心，合阴囊而卧。（《仁斋直指方》）

【功能主治】

秦椒温中散寒，行血通脉，除湿杀虫。用于风寒感冒、闭经、产后腹痛、疥疮。椒目行水，平喘。用于水肿胀满、痰饮喘咳等。




奉椒



目 椒





186. 山茱萸

【原 文】

山茱萸，味酸^[1]，平。治心下邪气、寒热，温中，逐寒湿痹^[2]，去三虫。久服轻身。一名蜀枣^[3]。生山谷。

【注 释】

[1] 味酸：《御览》无此二字。

[2] 寒湿痹：“寒”字后，《新修》原衍“温”字，据《证类》删。《御览》脱“痹”字。

[3] 蜀枣：《御览》、《纲目》作“蜀酸枣”。按《御览》引《本草经》曰：“山茱萸，一名蜀酸枣平。”笔者怀疑“酸枣”恐颠倒之误，应为：“山茱萸，一名蜀枣，酸，平。”



山茱萸

【译 文】

山茱萸味酸，性平。主治心下邪气积聚、恶寒发热，能温补中气、祛除寒湿痹痛，杀灭各种寄生虫。长期服用，能使人体轻捷灵便。又叫蜀枣。



山茱萸





【形态分布】


2-159 山茱萸

山茱萸科山茱萸。落叶小乔木，枝皮灰棕色，小枝无毛。单叶对生，卵形至椭圆形，先端渐尖，基部楔形，全缘；羽状脉整齐明显。伞形花序，着生小枝顶端，花先叶开放，黄色；花萼4枚，不显著；花瓣4枚；子房下位。核果长椭圆形，成熟后樱红色。花期3~4月，果期4~10月。分布陕西、河南、浙江、山西、山东、四川等省。杂生山坡灌木林中，现多栽培。成熟的果实去核后的果肉入药。10~11月间采收。

【药材特征】

2-160 山茱萸(果肉)

药材 不规则的片状或囊状。表面紫红色或黑色，皱缩，有光泽，顶端可见圆形的宿萼痕，基部有果柄痕。质柔软不易碎，内面色较浅，不光滑。气微，味酸涩、微苦。直接入药或酒制后入药。



山茱萸

【附 方】

1. 治五种腰痛，下焦风冷，脚腰无力：牛膝50克（去苗），山茱萸50克，桂心1.5克。上药捣细罗为散。每于食前，以温酒调下10克。（《圣惠方》）
 2. 草还丹：山茱萸（酒浸）取肉500克，破故纸（酒浸1日，炮干）250克，当归200克，麝香5克。上为细末，炼蜜为丸梧桐子大。每服81丸，临卧酒盐汤下。用于益元阳，补元气，固元精，壮元神。（《扶寿精方》）
 3. 治老人小水不节，或自遗不禁：山茱萸肉100克，益智子50克，人参、白术各，40克。分作水剂，水煎服。（《方龙潭家秘方》）

【功能主治】

补益肝肾，收敛固涩。用于眩晕耳鸣、腰膝酸痛、阳痿遗精、崩漏带下等。

187. 紫 藏

【原文】

紫葳^[1]，味酸^[2]，微寒。主妇人产乳^[3]余疾、崩中、癥瘕、血闭、寒





热、羸瘦^[4]，养胎。生川谷。

【注 释】

- [1] 紫葳：《纲目》紫葳条释名下，有“陵苕”二字注为《本经》文，《证类》对此二字注为《别录》文。
- [2] 酸：《御览》、《本草疏证》作“咸”。
- [3] 产乳：《新修》原脱“产”字，据《证类》补。《森本》无“产”字。
- [4] 癜瘕、血闭、寒热、羸瘦：《御览》作“癰血寒热”。

【译 文】

紫葳味酸，性微寒。主治女子产后各种疾病、崩中下血、腹中肿块、经闭、恶寒发热、身体消瘦，有养胎之用。

【形态分布】


2-161 凌霄

紫葳科凌霄。落叶木质藤本。羽状复叶对生；小叶7~9，卵形至卵状披针形，长3~7cm，宽1.5~3cm，先端长尖，基部不对称，无毛，边缘疏生7~8锯齿，两小叶间有淡黄色柔毛。花橙红色，由三出聚伞花序集成稀疏顶生圆锥花丛；花萼钟形，质较薄，绿色，有10条突起纵脉，5裂至中部，萼齿披针形；花冠漏斗状，直径约7cm。蒴果豆荚状，顶端钝。花期6~8月，果期11月。生于山坡。主产黄河、长江流域，广东、广西、贵州等地区有栽培。花入药，夏、秋季花盛开时采摘。



凌霄





紫葳

【药材特征】

2-162 紫葳（凌霄花）

药材 多皱缩卷曲，萼筒钟状，暗棕色，萼齿先端不等5裂，萼筒基部至萼片齿尖有5条明显的纵棱线。花冠黄棕色，先端5裂，裂片半圆形，下部联合呈漏斗状，表面具棕红色细脉纹。雄蕊4枚，2强，着生于花冠上，花药个字形，花柱1枚。气微香，味微苦而略酸。

【附 方】

- 1.治女经不行：凌霄花为末。每服10克，食前温酒下。（《徐氏胎下方》）
 - 2.治崩中漏下血：凌霄花为末。温酒服1勺，1日3次。（《个利方》）
 - 3.治遍身痒：凌霄花为末，每服10克。（《医学正传》）
 - 4.治皮肤湿痒：凌霄花、羊蹄根各等量，酌加枯矾研末，搽患处。（《上海常用中草药》）

【功能主治】

行血去瘀，凉血去风。用于经闭癥瘕、产后乳肿、风疹发红、皮肤瘙痒、疮疖。

188. 猪苓

【原文】

猪苓^[1]，味甘^[2]，平，主疟疾，解毒，辟蛊疰不祥^[3]，利水道。久服轻



身耐老^[4]。一名獮猪矢^[5]。生山谷。

【注释】

[1] 猪苓：《御览》作“脯零”。古“零”、“苓”通用。晋司马彪注《庄子》云：“豕囊，一名猪苓，其根似猪矢。”

[2] 味甘：“甘”字后，《人卫政和》、《本经疏证》有“苦”字，作《本草经》文。

[3] 辟蛊症不祥：《证类》、《纲目》、《品汇》、《本草经疏》、《本经疏证》无“辟”字。“症不祥”，《新修》原作“不注祥”，据《千金翼》、《证类》改。

[4] 耐老：《新修》原作“能老”，据《千金翼》、《证类》改。

[5] 矢：《证类》、《纲目》、《孙本》、《顾本》作屎。《新修》、《本草和名》、《御览》、《森本》作“矢”。


【译 文】

猪苓味甘，性平。主治疟疾、蛊毒、鬼疰等严重传染病，能通利水道。长期服用，可使身体轻捷灵便，延缓衰老。又叫假猪屎。

【形态分布】

2-163 猪苓

多孔菌科猪苓。菌核为不规则块状，表面凹凸不平，皱缩，棕黑或深褐色，多疣状突起，半木质化，体轻。切面为白色或淡黄白色，鲜者较软，干后坚而不



猪苓