

中国科学院中国孢子植物志编辑委员会 编辑

中国真菌志

第二十八卷

虫囊菌目

沈亚恒 叶东海 主编

科学出版社

中国科学院中国孢子植物志编辑委员会 编辑

中 国 真 菌 志

第二十八卷


虫囊菌目

沈亚恒 叶东海 主编

中国科学院知识创新工程重大项目

国家自然科学基金重大项目

(国家自然科学基金委员会 中国科学院 国家科学技术部 资助)



科学出版社

内 容 简 介

《中国孢子植物志》与《中国植物志》、《中国动物志》并称为中国的“三志”，记录了未被纳入《中国植物志》的藻类、真菌、地衣及苔藓植物。因此，《中国孢子植物志》由《中国海藻志》、《中国淡水藻志》、《中国真菌志》、《中国地衣志》、《中国苔藓志》组成。

《中国真菌志》作为《中国孢子植物志》的重要组成部分，出版时间最早，出版卷册最多。自1987年出版第一卷到2016年，经几代科学家潜心编研，历经30余年，已出版52卷。《中国真菌志》是在系统生物学原理和方法指导下，对中国真菌，即真菌界的子囊菌、担子菌、壶菌及接合菌四个门以及不属于真菌界的卵菌等三个门和黏菌及其类似的菌类生物进行搜集、考察和研究，按照类群汇编成册。

本书适合生物学、农林、生态学、食品、中医药相关专业的科研人员、管理人员等参考阅读，适合各级图书馆收藏。

图书在版编目(CIP)数据

中国真菌志：1987—2016年：全52卷 / 中国科学院

中国孢子植物志编辑委员会编著. —北京：科学出版社，2017.2

ISBN 978-7-03-051033-4

I. ①中… II. ①刘… ②郭… III. ①真菌门—植物志—中国 IV. ①Q949.32

中国版本图书馆CIP数据核 (2016)第302898号

责任编辑：王 静 / 责任校对：郑金红

责任印制：徐晓晨 / 封面设计：刘新新

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

智子文化印厂

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

2017年2月第 一 版 开本：787×109 2 1/16

2017年2月第一次印刷 印张：1144

字数：36 441 000

定价：12 000 元

(如有印装质量问题，我社负责调换(科印))

序

中国孢子植物志是非维管束孢子植物志，分《中国海藻志》、《中国淡水藻志》、《中国真菌志》、《中国地衣志》及《中国苔藓志》五部分。中国孢子植物志是在系统生物学原理与方法的指导下对中国孢子植物进行考察、收集和分类的研究成果；是生物多样性研究的主要内容；是物种保护的重要依据，对人类活动与环境甚至全球变化都有不可分割的联系。

中国孢子植物志是我国孢子植物物种数量、形态特征、生理生化性状、地理分布及其与人类关系等方面的综合信息库；是我国生物资源开发利用、科学研究与教学的重要参考文献。

我国气候条件复杂，山河纵横，湖泊星布，海域辽阔，陆生和水生孢子植物资源极其丰富。中国孢子植物分类工作的发展和《中国孢子植物志》的陆续出版，必将为我国开发利用孢子植物资源和促进学科发展发挥积极作用。

随着科学技术的进步，我国孢子植物分类工作在广度和深度方面将有更大的发展，对于这部著作也将不断补充、修订和提高。

中国科学院中国孢子植物志编辑委员会

1984年10月·北京

中国孢子植物志总序

中国孢子植物志是由《中国海藻志》、《中国淡水藻志》、《中国真菌志》、《中国地衣志》及《中国苔藓志》所组成。至于维管束孢子植物蕨类未被包括在中国孢子植物志之内，是因为它早先已被纳入《中国植物志》计划之内。为了将上述未被纳入《中国植物志》计划之内的藻类、真菌、地衣及苔藓植物纳入中国生物志计划之内，出席 1972 年中国科学院计划工作会议的孢子植物学工作者提出筹建“中国孢子植物志编辑委员会”的倡议。该倡议经中国科学院领导批准后，“中国孢子植物志编辑委员会”的筹建工作随之启动，并于 1973 年在广州召开的《中国植物志》、《中国动物志》和中国孢子植物志工作会议上正式成立。自那时起，中国孢子植物志一直在“中国孢子植物志编辑委员会”统一主持下编辑出版。

孢子植物在系统演化上虽然并非单一的自然类群，但是，这并不妨碍在全国统一组织和协调下进行孢子植物志的编写和出版。

随着科学技术的飞速发展，人们关于真菌的知识日益深入的今天，黏菌与卵菌已被从真菌界中分出，分别归隶于原生动物界和管毛生物界。但是，长期以来，由于它们一直被当作真菌由国内外真菌学家进行研究；而且，在“中国孢子植物志编辑委员会”成立时已将黏菌与卵菌纳入中国孢子植物志之一的《中国真菌志》计划之内并陆续出版，因此，沿用包括黏菌与卵菌在内的《中国真菌志》广义名称是必要的。

自“中国孢子植物志编辑委员会”于 1973 年成立以后，作为“三志”的组成部分，中国孢子植物志的编研工作由中国科学院资助；自 1982 年起，国家自然科学基金委员会参与部分资助；自 1993 年以来，作为国家自然科学基金委员会重大项目，在国家基金委资助下，中国科学院及科技部参与部分资助，中国孢子植物志的编辑出版工作不断取得重要进展。

中国孢子植物志是记述我国孢子植物物种的形态、解剖、生态、地理分布及其与人类关系等方面的大型系列著作，是我国孢子植物物种多样性的重要研究成果，是我国孢子植物资源的综合信息库，是我国生物资源开发利用、科学研究与教学的重要参考文献。

我国气候条件复杂，山河纵横，湖泊星布，海域辽阔，陆生与水生孢子植物物种多样性极其丰富。中国孢子植物志的陆续出版，必将为我国孢子植物资源的开发利用，为我国孢子植物科学的发展发挥积极作用。

中国科学院中国孢子植物志编辑委员会

主编 曾呈奎

2000 年 3 月 北京

Foreword of the Cryptogamic Flora of China

Cryptogamic Flora of China is composed of *Flora Algarum Marinarum Sinicarum*, *Flora Algarum Sinicarum Aquae Dulcis*, *Flora Fungorum Sinicorum*, *Flora Lichenum Sinicorum*, and *Flora Bryophytorum Sinicorum*, edited and published under the direction of the Editorial Committee of the Cryptogamic Flora of China, Chinese Academy of Sciences (CAS). It also serves as a comprehensive information bank of Chinese cryptogamic resources.

Cryptogams are not a single natural group from a phylogenetic point of view which, however, does not present an obstacle to the editing and publication of the Cryptogamic Flora of China by a coordinated, nationwide organization. The Cryptogamic Flora of China is restricted to non-vascular cryptogams including the bryophytes, algae, fungi, and lichens. The ferns, a group of vascular cryptogams, were earlier included in the plan of *Flora of China*, and are not taken into consideration here. In order to bring the above groups into the plan of Fauna and Flora of China, some leading scientists on cryptogams, who were attending a working meeting of CAS in Beijing in July 1972, proposed to establish the Editorial Committee of the Cryptogamic Flora of China. The proposal was approved later by the CAS. The committee was formally established in the working conference of Fauna and Flora of China, including cryptogams, held by CAS in Guangzhou in March 1973.

Although myxomycetes and oomycetes do not belong to the Kingdom of Fungi in modern treatments, they have long been studied by mycologists. *Flora Fungorum Sinicorum* volumes including myxomycetes and oomycetes have been published, retaining for *Flora Fungorum Sinicorum* the traditional meaning of the term fungi.

Since the establishment of the editorial committee in 1973, compilation of Cryptogamic Flora of China and related studies have been supported financially by the CAS. The National Natural Science Foundation of China has taken an important part of the financial support since 1982. Under the direction of the committee, progress has been made in compilation and study of Cryptogamic Flora of China by organizing and coordinating the main research institutions and universities all over the country. Since 1993, study and compilation of the Chinese fauna, flora, and cryptogamic flora have become one of the key state projects of the National Natural Science Foundation with the combined support of the CAS and the National Science and Technology Ministry.

Cryptogamic Flora of China derives its results from the investigations, collections, and classification of Chinese cryptogams by using theories and methods of systematic and evolutionary biology as its guide. It is the summary of study on species diversity of cryptogams

and provides important data for species protection . It is closely connected with human activities, environmental changes and even global changes. Cryptogamic Flora of China is a comprehensive information bank concerning morphology, anatomy, physiology, biochemistry, ecology, and phytogeographical distribution . It includes a series of special monographs for using the biological resources in China, for scientific research, and for teaching .

China has complicated weather conditions, with a crisscross network of mountains and rivers, lakes of all sizes, and an extensive sea area. China is rich in terrestrial and aquatic cryptogamic resources . The development of taxonomic studies of cryptogams and the publication of Cryptogamic Flora of China in concert will play an active role in exploration and utilization of the cryptogamic resources of China and in promoting the development of cryptogamic studies in China .

C. K. Tseng

Editor-in-Chief

The Editorial Committee of the Cryptogamic Flora of China

Chinese Academy of Sciences

March, 2000 in Beijing

《中国真菌志》序

《中国真菌志》是在系统生物学原理和方法指导下，对中国真菌，即真菌界的子囊菌、担子菌、壶菌及接合菌四个门以及不属于真菌界的卵菌等三个门和黏菌及其类似的菌类生物进行搜集、考察和研究的成果。本志所谓“真菌”系广义概念，涵盖上述三大菌类生物（地衣型真菌除外），即当今所称“菌物”。

中国先民认识并利用真菌作为生活、生产资料，历史悠久，经验丰富，诸如酒、醋、酱、红曲、豆豉、豆腐乳、豆瓣酱等的酿制，蘑菇、木耳、茭白作食用，茯苓、虫草、灵芝等作药用，在制革、纺织、造纸工业中应用真菌进行发酵，以及利用具有抗癌作用和促进碳素循环的真菌，充分显示其经济价值和生态效益。此外，真菌又是多种植物和人畜病害的病原菌，危害甚大。因此，对真菌物种的形态特征、多样性、生理生化、亲缘关系、区系组成、地理分布、生态环境以及经济价值等进行研究和描述，非常必要。这是一项重要的基础科学研究，也是利用益菌、控制害菌、化害为利、变废为宝的应用科学的源泉和先导。

中国是具有悠久历史的文明古国，从远古到明代的 4500 年间，科学技术一直处于世界前沿，真菌学也不例外。酒是真菌的代谢产物，中国酒文化博大精深、源远流长，有六七千年历史。约在公元 300 年的晋代，江统在其《酒诰》诗中说：“酒之所兴，肇自上皇。或云仪狄，又曰杜康。有饭不尽，委之空桑。郁结成味，久蓄气芳。本出于此，不由奇方。”作者精辟地总结了我国酿酒历史和自然发酵方法，比之意大利学者雷蒂（Radi, 1860）提出微生物自然发酵法的学说约早 1500 年。在仰韶文化时期（5000~3000 B. C.），我国先民已懂得采食蘑菇。中国历代古籍中均有食用菇蕈的记载，如宋代陈仁玉在其《菌谱》（1245 年）中记述浙江台州产鹅膏菌、松蕈等 11 种，并对其形态、生态、品级和食用方法等作了论述和分类，是中国第一部地方性食用蕈菌志。先民用真菌作药材也是一大创造，中国最早的药典《神农本草经》（成书于 102~200 A. D.）所载 365 种药物中，有茯苓、雷丸、桑耳等 10 余种药用真菌的形态、色泽、性味和疗效的叙述。明代李时珍在《本草纲目》（1578）中，记载“三菌”、“五蕈”、“六芝”、“七耳”以及羊肚菜、桑黄、鸡枞、雪蚕等 30 多种药用真菌。李氏将菌、蕈、芝、耳集为一类论述，在当时尚无显微镜帮助的情况下，其认识颇为精深。该籍的真菌学知识，足可代表中国古代真菌学水平，堪与同时代欧洲人（如 C. Clusius, 1529~1609）的水平比拟而无逊色。

15 世纪以后，居世界领先地位的中国科学技术，逐渐落后。从 18 世纪中叶到 20 世纪 40 年代，外国传教士、旅行家、科学工作者、外交官、军官、教师以及负有特殊任务者，纷纷来华考察，搜集资料，采集标本，研究鉴定，发表论文或专辑。如法国传教士西博特（P. M. Cibot）1759 年首先来到中国，一住就是 25 年，对中国的植物（含真菌）写过不少文章，1775 年他发表的五棱散尾菌（*Lysurus mokusin*），是用现代科学方法研究发表的第一个中国真菌。继而，俄国的波塔宁（G. N. Potanin, 1876）、意大利的吉拉迪（P. Giraldii, 1890）、奥地利的汉德尔-马泽蒂（H. Handel-Mazzetti,

1913)、美国的梅里尔 (E. D. Merrill, 1916)、瑞典的史密斯 (H. Smith, 1921) 等共 27 人次来我国采集标本。研究发表中国真菌论著 114 篇册, 作者多达 60 余人次, 报道中国真菌 2040 种, 其中含 10 新属、361 新种。东邻日本自 1894 年以来, 特别是 1937 年以后, 大批人员涌到中国, 调查真菌资源及植物病害, 采集标本, 鉴定发表。据初步统计, 发表论著 172 篇册, 作者 67 人次以上, 共报道中国真菌约 6000 种 (有重复), 其中含 17 新属、1130 新种。其代表人物在华北有三宅市郎 (1908), 东北有三浦道哉 (1918), 台湾有泽田兼吉 (1912); 此外, 还有斋藤贤道、伊藤诚哉、平冢直秀、山本和太郎、逸见武雄等数十人。

国人用现代科学方法研究中国真菌始于 20 世纪初, 最初工作多侧重于植物病害和工业发酵, 纯真菌学研究较少。在一二十年代便有不少研究报告和学术论文发表在中外各种刊物上, 如胡先骕 1915 年的“菌类鉴别法”, 章祖纯 1916 年的“北京附近发生最盛之植物病害调查表”以及钱孙? (1918)、邹钟琳 (1919)、戴芳澜 (1920)、李寅恭 (1921)、朱凤美 (1924)、孙豫寿 (1925)、俞大绂 (1926)、魏萼寿 (1928) 等的论文。三四十年代有陈鸿康、邓叔群、魏景超、凌立、周宗璜、欧世璜、方心芳、王云章、裘维蕃等发表的论文, 为数甚多。他们中有的人终生或大半生都从事中国真菌学的科教工作, 如戴芳澜 (1893~ 1973) 著“江苏真菌名录” (1927)、“中国真菌杂记” (1932~ 1946)、《中国已知真菌名录》 (1936, 1937)、《中国真菌总汇》 (1979) 和《真菌的形态和分类》 (1987) 等, 他发表的“三角枫上白粉菌一新种” (1930), 是国人用现代科学方法研究、发表的第一个中国真菌新种。邓叔群 (1902~ 1970) 著“南京真菌记载” (1932~ 1933)、“中国真菌续志” (1936~ 1938)、《中国高等真菌志》 (1939) 和《中国的真菌》 (1963, 1996) 等, 堪称《中国真菌志》的先导。上述学者以及其他许多真菌学工作者, 为《中国真菌志》研编的起步奠定了基础。

在 20 世纪后半叶, 特别是改革开放以来的 20 多年, 中国真菌学有了迅猛的发展, 如各类真菌学课程的开设, 各级学位研究生的招收和培养, 专业机构和学会的建立, 专业刊物的创办和出版, 地区真菌志的问世等, 使真菌学人才辈出, 为《中国真菌志》的研编输送了新鲜血液。1973 年中国科学院广州“三志”会议决定, 《中国真菌志》的研编正式启动, 1987 年由郑儒永、余永年等编辑出版了《中国真菌志》第 1 卷《白粉菌目》, 至 2000 年已出版 14 卷。自第 2 卷开始实行主编负责制, 2. 《银耳目和花耳目》 (刘波主编, 1992); 3. 《多孔菌科》 (赵继鼎, 1998); 4. 《小煤炱目 I》 (胡炎兴, 1996); 5. 《曲霉属及其相关有性型》 (齐祖同, 1997); 6. 《霜霉目》 (余永年, 1998); 7. 《层腹菌目》 (刘波, 1998); 8. 《核盘菌科和地舌菌科》 (庄文颖, 1998); 9. 《假尾孢属》 (刘锡骐、郭英兰, 1998); 10. 《锈菌目 I》 (王云章、庄剑云, 1998); 11. 《小煤炱目 II》 (胡炎兴, 1999); 12. 《黑粉菌科》 (郭林, 2000); 13. 《虫霉目》 (李增智, 2000); 14. 《灵芝科》 (赵继鼎、张小青, 2000)。盛世出巨著, 在国家“科教兴国”英明政策的指引下, 《中国真菌志》的研编和出版, 定将为中华灿烂文化做出新贡献。

余永年 谨识
庄文颖

中国科学院微生物研究所
中国·北京·中关村
公元 2002 年 09 月 15 日

Foreword of Flora Fungorum Sinicorum

Flora Fungorum Sinicorum summarizes the achievements of Chinese mycologists based on principles and methods of systematic biology in intensive studies on the organisms studied by mycologists, which include non-lichenized fungi of the Kingdom Fungi, some organisms of the Chromista, such as oomycetes etc., and some of the Protozoa, such as slime molds. In this series of volumes, results from extensive collections, field investigations, and taxonomic treatments reveal the fungal diversity of China.

Our Chinese ancestors were very experienced in the application of fungi in their daily life and production. Fungi have long been used in China as food, such as edible mushrooms, including jelly fungi, and the hypertrophic stems of water bamboo infected with *Ustilago esculenta*; as medicines, like *Cordyceps sinensis* (caterpillar fungus), *Poria cocos* (China root), and *Ganoderma* spp. (lingzhi); and in the fermentation industry, for example, manufacturing liquors, vinegar, soy-sauce, *Monascus*, fermented soya beans, fermented bean curd, and thick broad-bean sauce. Fungal fermentation is also applied in the tannery, papermaking, and textile industries. The anti-cancer compounds produced by fungi and functions of saprophytic fungi in accelerating the carbon-cycle in nature are of economic value and ecological benefits to human beings. On the other hand, fungal pathogens of plants, animals and human cause a huge amount of damage each year. In order to utilize the beneficial fungi and to control the harmful ones, to turn the harmfulness into advantage, and to convert wastes into valuables, it is necessary to understand the morphology, diversity, physiology, biochemistry, relationship, geographical distribution, ecological environment, and economic value of different groups of fungi. *Flora Fungorum Sinicorum* plays an important role from precursor to fountainhead for the applied sciences.

China is a country with an ancient civilization of long standing. In the 4500 years from remote antiquity to the Ming Dynasty, her science and technology as well as knowledge of fungi stood in the leading position of the world. Wine is a metabolite of fungi. The Wine Culture history in China goes back 6000 to 7000 years ago, which has a distant source and a long stream of extensive knowledge and profound scholarship. In the Jin Dynasty (ca. 300 A. D.), JIANG Tong, the famous writer, gave a vivid account of the Chinese fermentation history and methods of wine processing in one of his poems entitled *Drinking Games* (Jiu Gao), 1500 years earlier than the theory of microbial fermentation in natural conditions raised by the Italian scholar, Radi (1860). During the period of the Yangshao Culture (5000—3000 B. C.), our Chinese ancestors knew how to eat mushrooms. There were a great number of records of edible mushrooms in Chinese ancient books. For example, back to

the Song Dynasty, CHEN Ren-Yu (1245) published the *Mushroom Menu* (Jun Pu) in which he listed 11 species of edible fungi including *Amanita* sp. and *Tricholoma matsutake* from Taizhou, Zhejiang Province, and described in detail their morphology, habitats, taxonomy, taste, and way of cooking. This was the first local flora of the Chinese edible mushrooms. Fungi used as medicines originated in ancient China. The earliest Chinese pharmacopoeia, *Shen-Nong Materia Medica* (Shen Nong Ben Cao Jing), was published in 102—200 A. D. Among the 365 medicines recorded, more than 10 fungi, such as *Poria cocos* and *Polyporus mylittae*, were included. Their fruitbody shape, color, taste, and medical functions were provided. The great pharmacist of Ming Dynasty, LI Shi-Zhen (1578) published his eminent work *Compendium Materia Medica* (Ben Cao Gang Mu) in which more than thirty fungal species were accepted as medicines, including *Aecidium mori*, *Cordyceps sinensis*, *Morchella* spp., *Termitomyces* sp., etc. Before the invention of microscope, he managed to bring fungi of different classes together, which demonstrated his intelligence and profound knowledge of biology.

After the 15th century, development of science and technology in China slowed down. From middle of the 18th century to the 1940 s, foreign missionaries, tourists, scientists, diplomats, officers, and other professional workers visited China. They collected specimens of plants and fungi, carried out taxonomic studies, and published papers, exsiccatae, and monographs based on Chinese materials. The French missionary, P. M. Cibot, came to China in 1759 and stayed for 25 years to investigate plants including fungi in different regions of China. Many papers were written by him. *Lysurus mokusin*, identified with modern techniques and published in 1775, was probably the first Chinese fungal record by these visitors. Subsequently, around 27 man-times of foreigners attended field excursions in China, such as G. N. Potanin from Russia in 1876, P. Giraldui from Italy in 1890, H. Handel-Mazzetti from Austria in 1913, E. D. Merrill from the United States in 1916, and H. Smith from Sweden in 1921. Based on examinations of the Chinese collections obtained, 2040 species including 10 new genera and 361 new species were reported or described in 114 papers and books. Since 1894, especially after 1937, many Japanese entered China. They investigated the fungal resources and plant diseases, collected specimens, and published their identification results. According to incomplete information, some 6000 fungal names (with synonyms) including 17 new genera and 1130 new species appeared in 172 publications. The main workers were I. Miyake in the Northern China, M. Miura in the Northeast, K. Sawada in Taiwan, as well as K. Saito, S. Ito, N. Hiratsuka, W. Yamamoto, T. Hemmi, etc.

Research by Chinese mycologists started at the turn of the 20th century when plant diseases and fungal fermentation were emphasized with very little systematic work. Scientific papers or experimental reports were published in domestic and international journals during the 1910 s to 1920 s. The best-known are "Identification of the fungi" by H. H. Hu in 1915, "Plant disease report from Peking and the adjacent regions" by C. S. Chang in 1916,

and papers by S. S. Chian (1918), C. L. Chou (1919), F. L. Tai (1920), Y. G. Li (1921), V. M. Chu (1924), Y. S. Sun (1925), T. F. Yu (1926), and N. S. Wei (1928). Mycologists who were active at the 1930 s to 1940 s are H. K. Chen, S. C. Teng, C. T. Wei, L. Ling, C. H. Chow, S. H. Ou, S. F. Fang, Y. C. Wang, W. F. Chiu, and others. Some of them dedicated their lifetime to research and teaching in mycology. Prof. F. L. Tai (1893—1973) is one of them, whose representative works were “List of fungi from Jiangsu” (1927), “Notes on Chinese fungi” (1932—1946), *A List of Fungi Hitherto Known from China* (1936, 1937), *Sylloge Fungorum Sinicorum* (1979), *Morphology and Taxonomy of the Fungi* (1987), etc. His paper entitled “A new species of *Uncinula* on *Acer trifidum* Hook. & Arn.” was the first new species described by a Chinese mycologist. Prof. S. C. Teng (1902—1970) is also an eminent teacher. He published “Notes on fungi from Nanking” in 1932—1933, “Notes on Chinese fungi” in 1936—1938, *A Contribution to Our Knowledge of the Higher Fungi of China* in 1939, and *Fungi of China* in 1963 and 1996. Work done by the above-mentioned scholars lays a foundation for our current project on *Flora Fungorum Sinicorum*.

In 1973, an important meeting organized by the Chinese Academy of Sciences was held in Guangzhou (Canton) and a decision was made, uniting the related scientists from all over China to initiate the long term project “Fauna, Flora, and Cryptogamic Flora of China”. Work on *Flora Fungorum Sinicorum* thus started. Significant progress has been made in development of Chinese mycology since 1978. Many mycological institutions were founded in different areas of the country. The Mycological Society of China was established, the journals *Acta Mycological Sinica* and *Mycosystema* were published as well as local floras of the economically important fungi. A young generation in field of mycology grew up through post-graduate training programs in the graduate schools. The first volume of Chinese Mycoflora on the Erysiphales (edited by R. Y. Zheng & Y. N. Yu, 1987) appeared. Up to now, 14 volumes have been published: Tremellales and Dacrymycetales edited by B. Liu (1992), Polyporaceae by J. D. Zhao (1998), Meliolales Part I (Y. X. Hu, 1996), *Aspergillus* and its related teleomorphs (Z. T. Qi, 1997), Peronosporales (Y. N. Yu, 1998), Sclerotiniaceae and Geoglossaceae (W. Y. Zhuang, 1998), *Pseudocercospora* (X. J. Liu & Y. L. Guo, 1998), Uredinales Part I (Y. C. Wang & J. Y. Zhuang, 1998), Meliolales Part II (Y. X. Hu, 1999), Ustilaginaceae (L. Guo, 2000), Entomophthorales (Z. Z. Li, 2000), and Ganodermataceae (J. D. Zhao & X. Q. Zhang, 2000). We eagerly await the coming volumes and expect the completion of *Flora Fungorum Sinicorum* which will reflect the flourishing of Chinese culture.

Y. N. Yu and W. Y. Zhuang
Institute of Microbiology, CAS, Beijing
September 15, 2002

致 谢

本书是我国虫囊菌目的研究总结。先后参加过此项研究工作的有广东省微生物研究所的王经来、郑国扬、廖权辉、廖金才、林兆生等同志。本志编著者在此表示衷心感谢。

在本书完成过程中，曾得到许多单位和研究工作者多方面的热情支持与帮助。曾协助采集部分研究标本的有广东省微生物研究所的罗宽华、章卫民、杨小兵同志；海南省的林文琼、李启明、周克宝、苏定昌、陈永福、甘运深同志；云南农业大学的张中义教授；西藏蔬菜研究所的熊卫平、刘玉红、戴安国、李晓忠、周军等同志及国内许多病虫害测报站人员。中国科学院动物研究所的虞佩玉研究员、李鸿兴同志；南开大学的郑乐怡教授和任树芝教授；西华师范大学郑发科教授；中山大学的贾凤龙教授为我们鉴定相关的寄主。中国科学院微生物研究所的庄剑云研究员、中国台湾台北师范学院的吴美丽教授、中国台湾师范大学的简秋源和阮列阳教授、西班牙巴塞罗那市立大学的 S. Santamaria 教授、英国自然历史博物馆的 A. Weir 博士热心提供相关的文献资料。本研究组的张韵同志协助整理和校对部分标本和文字。本志编著者对他们的帮助表示衷心感谢。

特别感谢中国科学院微生物研究所的郑儒永院士通过多方努力和日本静冈大学的 K. Sugiyama 教授和 Hiroshima 大学的 K. Terada 教授联系，调借了保藏于日本的大部分我国台湾省的虫囊菌标本。K. Sugiyama 和 K. Terada 两位教授不仅热情提供以上标本给作者借阅，还赠送了相关的许多文献资料。庄文颖研究员亲自帮助从美国哈佛大学法罗标本馆 (FH) 调借了该馆中保存的部分中国虫囊菌标本。

沈端祥教授、庄文颖研究员、余永年研究员对书稿进行了仔细审阅，并提出了宝贵的修改意见，在此一并致谢。

本研究同时还得到广东省自然科学基金、广东省科学院分析测试中心测试基金和广东省菌种保藏与应用重点实验室的资助。

本研究是在广东省菌种保藏与应用重点实验室完成的。

说 明

1. 中国虫囊菌目 (Laboulbeniales) 志是对我国虫囊菌的研究总结。本志包括五部分：一、绪论，二、专论，三、参考文献，四、附录，五、索引。
2. 虫囊菌学名按现行的《国际植物命名法规》(Greuter *et al.* 1994) 进行订正，汉名参照叶东海为《拉汉真菌名称》(未出版) 编纂的虫囊菌部分的拉汉对照名录。
3. 寄主学名及汉名主要参照《拉英汉昆虫名称》(1983, 科学出版社)。
4. 世界分布的排序是亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲，洲以下按照国家英文名称的字母顺序排。
5. 国内分布的排序是根据 1995 年版中国行政区划研究会编《中国行政区划手册》，省以下地名按汉语拼音字母顺序。
6. 本书提供了我国已知种的分属、分种检索表。
7. 种的形态描述，系根据标本的研究和测量所得。作者未观察过标本的种均一一注明。所有标本注明 HMIGD 为广东省微生物研究所真菌标本室的标本；注明 FH 为美国哈佛大学法罗标本馆 (Farlow Cryptogamic Herbarium, Harvard University) 的标本；注明 K-S, M-I 和 K-T 分别为日本真菌学者 K. Sugiyama, M. Ishikawa 和 K. Terada 提供的标本。
8. 参考文献部分按作者姓名字母顺序排列。我国作者按汉语拼音字母顺序排列，其他非英语作者按拉丁化后的字母顺序排序。
9. 本书共有插图 178 幅，除特别标注外，均为作者根据所观察的标本所绘。

目 录

序

中国孢子植物志总序

《中国真菌志》序

致谢

说明

绪论	(1)
形态	(1)
寄主	(12)
分布	(14)
分类进展	(15)
Tavares 分类系统	(17)
中国虫囊菌研究简史	(20)
虫囊菌的研究方法	(25)
专论	(27)
一、二托菌科 <i>Herpomycetaceae</i>	(27)
I. 二托菌属 <i>Herpomyces</i> Thaxter	(28)
1. 格林二托菌 <i>H. grenadinus</i> Thaxter	(28)
2. 蜚蠊二托菌 <i>H. periplanetae</i> Thaxter	(29)
二、角霉科 <i>Ceratomycetaceae</i>	(31)
II. 单主菌属 <i>Autoicomyces</i> Thaxter	(31)
3. 中华单主菌 <i>A. chinensis</i> D. H. Ye & Y. H. Shen	(32)
4. 弯喙单主菌 <i>A. falcifer</i> (Thaxter) Thaxter	(33)
5. 水龟虫单主菌 <i>A. helocharalis</i> Thaxter	(34)
6. 矮小单主菌 <i>A. humilis</i> (Thaxter) Thaxter	(36)
7. 日本单主菌 <i>A. japonicus</i> Thaxter	(37)
8. 隐藏单主菌 <i>A. latens</i> Thaxter	(38)
9. 缘生单主菌 <i>A. marginicola</i> Thaxter	(39)
III. 喜湿菌属 <i>Phurmomyces</i> Thaxter	(41)
10. 喜湿菌 <i>P. obtusus</i> Thaxter	(41)
IV. 绞菌属 <i>Plectomyces</i> Thaxter	(42)
11. 绞菌 <i>P. gracilis</i> Thaxter	(42)

V. 喙菌属 <i>Rhynchophoromyces</i> Thaxter	(43)
12. 小齿喙菌 <i>R. denticulatus</i> (Thaxter) Thaxter	(44)
13. 喙菌 <i>R. rostratus</i> (Thaxter) Thaxter	(45)
14. 爪生喙菌 <i>R. unguicola</i> (Thaxter) I. I. Tavares	(46)
VI. 螻蛄菌属 <i>Tettigomyces</i> Thaxter	(46)
15. 渐尖螻蛄菌 <i>T. acuminatus</i> Thaxter	(47)
16. 非洲螻蛄菌 <i>T. africanus</i> Thaxter	(49)
17. 短螻蛄菌 <i>T. brevis</i> Thaxter	(50)
18. 毛生螻蛄菌 <i>T. chaetophilus</i> Thaxter	(51)
19. 混淆螻蛄菌 <i>T. confusus</i> Thaxter	(52)
20. 线状螻蛄菌 <i>T. filiformis</i> D. H. Ye	(54)
21. 细螻蛄菌 <i>T. gracilis</i> Thaxter	(55)
22. 螻蛄菌 <i>T. gryllotalpae</i> Thaxter	(56)
23. 印度螻蛄菌 <i>T. indicus</i> Thaxter	(57)
24. 间型螻蛄菌 <i>T. intermedius</i> Thaxter	(58)
25. 翅生螻蛄菌 <i>T. pterophilus</i> Thaxter	(59)
26. 普通螻蛄菌 <i>T. vulgaris</i> Thaxter	(60)
三、真角霉科 <i>Eucratomycetaceae</i>	(61)
VII. 螺旋菌属 <i>Cochliomyces</i> Spegazzini	(62)
27. 螺旋菌 <i>C. argentinensis</i> Spegazzini	(62)
四、虫囊菌科 <i>Laboulbeniaceae</i>	(63)
VIII. 无雅菌属 <i>Acompsomyces</i> Thaxter	(65)
28. 贫弱无雅菌 <i>A. pauperculus</i> Thaxter	(66)
IX. 无形菌属 <i>Amorphomyces</i> Thaxter	(67)
29. 意大利无形菌 <i>A. italicus</i> Spegazzini	(67)
X. 无孔菌属 <i>Aporomyces</i> Thaxter	(69)
30. 钻形无孔菌 <i>A. subulatus</i> Thaxter	(69)
31. 无孔菌 <i>A. uniflagellatus</i> Thaxter	(71)
XI. 顶囊菌属 <i>Blasticomyces</i> Tavares	(72)
32. 帚状顶囊菌 <i>B. fastigiatus</i> (Thaxter) I. I. Tavares	(73)
33. 顶囊菌 <i>B. lispini</i> (Thaxter) I. I. Tavares	(74)
XII. 葡雄菌属 <i>Botryandromyces</i> Tavares & Majewski	(75)
34. 长泥甲葡雄菌 <i>B. heteroceri</i> (Maire) I. I. Tavares & T. Majewski	(75)
XIII. 间雄菌属 <i>Cantharomyces</i> Thaxter	(77)
35. 弱间雄菌 <i>C. exiguus</i> Thaxter	(77)
36. 日本间雄菌 <i>C. japonicus</i> K. Sugiyama	(78)
37. 小间雄菌 <i>C. platystethi</i> Thaxter	(80)
XIV. 牙甲菌属 <i>Chaetarthriomyces</i> Thaxter	(81)
38. 长托牙甲菌 <i>C. coelostomalis</i> (Thaxter) I. I. Tavares	(82)

XV. 甲壳菌属 <i>Chitonomyces</i> Peyritsch	(83)
39. 具刺甲壳菌 <i>C. aculeifer</i> Spegazzini	(85)
40. 厦门甲壳菌 <i>C. amoyensis</i> Thaxter	(86)
41. 斐济甲壳菌 <i>C. australasiae</i> Thaxter	(87)
42. 贝克甲壳菌 <i>C. bakeri</i> Thaxter	(88)
43. 四节龙虱甲壳菌 <i>C. bidessarius</i> (Thaxter) Thaxter	(90)
44. 中华甲壳菌 <i>C. chinensis</i> Thaxter	(91)
45. 覆跗龙虱甲壳菌 <i>C. chungü</i> Thaxter	(92)
46. 小角甲壳菌 <i>C. corniculatus</i> Thaxter	(93)
47. 无穴甲壳菌 <i>C. excavatus</i> Thaxter	(94)
48. 叉状甲壳菌 <i>C. furcatus</i> Thaxter	(95)
49. 细柄甲壳菌 <i>C. gracilipes</i> Thaxter	(96)
50. 水龙虱甲壳菌 <i>C. hydropori</i> Thaxter	(97)
51. 锯齿甲壳菌 <i>C. indentatus</i> Thaxter	(98)
52. 间型甲壳菌 <i>C. intermedius</i> Thaxter	(100)
53. 日本甲壳菌 <i>C. japonensis</i> Thaxter	(101)
54. 爪哇甲壳菌 <i>C. javanicus</i> Thaxter	(102)
55. 长托甲壳菌 <i>C. laboulbenioides</i> Thaxter	(103)
56. 舌状甲壳菌 <i>C. ligulatus</i> Thaxter	(105)
57. 甲壳菌 <i>C. melanurus</i> Peyritsch	(105)
58. 整齐甲壳菌 <i>C. ordinatus</i> Thaxter	(107)
59. 东方甲壳菌 <i>C. orientalis</i> Thaxter	(108)
60. 怪甲壳菌 <i>C. paradoxus</i> (Peyritsch) Thaxter	(109)
61. 鹦鹉状甲壳菌 <i>C. psittacopsis</i> Thaxter	(110)
62. 暗色甲壳菌 <i>C. pullus</i> Thaxter	(111)
63. 弯甲壳菌 <i>C. recurvatus</i> Thaxter	(112)
64. 刺甲壳菌 <i>C. spinosus</i> Thaxter	(113)
65. 直甲壳菌 <i>C. strictus</i> Thaxter	(115)
66. 跗生甲壳菌 <i>C. tarsicola</i> Thaxter	(116)
67. 钩甲壳菌 <i>C. unciger</i> (Thaxter) Thaxter	(116)
68. 罕见甲壳菌 <i>C. vixvisibilis</i> Thaxter	(118)
69. 云南甲壳菌 <i>C. yunnanensis</i> Y. H. Shen & T. H. Li	(119)
70. 环纹甲壳菌 <i>C. zonatus</i> Thaxter	(119)
XVI. 翅托菌属 <i>Coreomyces</i> Thaxter	(121)
71. 华翅托菌 <i>C. chinensis</i> Thaxter	(122)
72. 弯翅托菌 <i>C. curvatus</i> Thaxter	(123)
73. 意大利翅托菌 <i>C. italicus</i> Spegazzini	(124)
74. 小划蝽翅托菌 <i>C. micronectae</i> Thaxter	(125)
75. 小翅托菌 <i>C. minor</i> Thaxter	(125)