

DIQIU KEXUE
GAILUN

地球科学概论

缪启龙 林文实 吴息 周锁铨 ◎ 编


(第四版)

 气象出版社
China Meteorological Press

地球科学概论

(第四版)

缪启龙 林文实 吴 息 周锁铨 编



内 容 简 介

本书比较系统地阐述了地球科学各个学科的基本概念、原理和知识。全书共分十章,包括地球在宇宙中的位置、大气圈、地球构造、地球表面概况、地球上的水、冰雪覆盖、生物群落与生态系统、自然地理水平地带性和垂直地带性、中国自然地理特征、地图投影。内容力求知识面宽阔、深入浅出、重点突出。

本书可作为大气科学、环境科学、地理科学、农学、林学等相关专业的大学本科生、研究生作为教材以及相关的科技工作者参考,也可为中学自然、地理教师作教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

地球科学概论 / 缪启龙等编. -- 4 版. -- 北京 :
气象出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-5029-6436-8

I. ①地… II. ①缪… III. ①地球科学-高等学校-
教材 IV. ①P

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 240100 号

Diqiu Kexue Gailun

地球科学概论

缪启龙 等 编

出版发行: 气象出版社

地 址: 北京市海淀区中关村南大街 46 号

邮政编码: 100081

电 话: 010-68407112(总编室) 010-68409198(发行部)

网 址: <http://www.qxcbs.com>

E-mail: qxcbs@cma.gov.cn

责任编辑: 林雨晨

终 审: 邵俊年

责任校对: 王丽梅

责任技编: 赵相宁

封面设计: 博雅思企划

印 刷: 三河市百盛印装有限公司

开 本: 720 mm×960 mm 1/16

印 张: 16.5

字 数: 328 千字

版 次: 2016 年 10 月第 4 版

印 次: 2016 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等,请与本社发行部联系调换

第四版前言

本教材自 2001 年出版以来,受到全国许多高校师生和读者的欢迎,得到了专家的推荐和好评,于 2004 年出版第二版,2007 年出版第三版,今年春天,气象出版社要求修改,出版第四版,值此之际,真诚地感谢广大师生对本教材的青睐,特别向曾对本教材提出宝贵意见的专家、学者,致以诚挚的谢意!感谢气象出版社的编辑为本教材的多次出版付出的辛勤劳动。

本次全书修改由缪启龙负责,教材的基本结构没有变化,增添了部分内容,改写了部分文字。南京信息工程大学的余锦华教授提供了气候变化专门委员会(IPCC)第五次科学评估的气温变化图,朱伟军教授改写了与厄尔尼诺有关的内容,王让会教授改写了生物群落的基本特征,段春锋博士绘制了气候要素及海温的分布图;南京信息工程大学教务处张永宏教授、南京信息工程大学滨江学院教务办给予了大力支持。在此一并表示感谢。

请继续关注本教材,欢迎提出宝贵意见!

缪启龙

2015 年 11 月

于南京信息工程大学

南京信息工程大学滨江学院

第三版前言

本教材自 2001 年出版以来,受到全国许多高校师生和读者的欢迎,得到了专家的推荐和好评,于 2004 年出版第二版。适逢第三版出版之际,真诚地感谢广大师生对本教材的青睐,特别向曾对本教材提出宝贵意见的专家、学者,致以诚挚的谢意!感谢气象出版社第一编辑室为本教材的多次出版付出的辛勤劳动。

第三版对第二版中的少数错别字作了改正,替换了个别插图,并将近代气候变化的阐述改用政府间气候变化专门委员会(IPCC)的第四次(2007)科学评估中的内容;关于冥王星在新版中加注了 2006 年 8 月 24 日联合国天文学联合大会(IAU)的决议:冥王星被补为“矮行星”,不再视为行星。

请继续关注本教材,欢迎提出宝贵意见!

缪启龙

2007 年 7 月 1 月

于南京信息工程大学

第一版前言

《地球科学概论》是中国气象局“九五”期间的教材之一。它比较系统地阐述了地球科学各个学科的基本概念、原理和知识。由于地球是一个有序的巨系统,各个子系统之间是相互联系、相互影响的,地球科学研究的范围十分广泛,研究的对象极为复杂多样,是一门综合性很强的学科。因此,编写时注意以系统论的观点来组织教材,并要求内容广泛、深入浅出。在阐述地球科学一般基础理论的同时,注意到中国自然地理状况;在教材的最后还增加了地图投影的基本知识,以使读者能够识别、使用各种不同的地图。

本书由缪启龙主编,参加编写的有林文实(第三、五、六章)、吴息(第一、七、九章)、周锁铨(第四章)、缪启龙(第二、八、十章),全书的统稿、修改和定稿由缪启龙负责。

本书的出版得到了中国气象局科教司高教处和处长邓金宁、南京气象学院教务处和环境科学系、中山大学大气科学系的大力支持,南京气象学院翁笃鸣教授对大纲提出了具体的修改意见,气象出版社第一编辑室主任陶国庆、编审顾仁俭先生给予了极大的关心,在此一并表示真诚的谢意。

由于我们的水平有限,内容难免有不妥和错误之处,祈望批评指正。

缪启龙

2000年11月

于南京气象学院

目 录

第四版前言

第三版前言

第一版前言

第 1 章 地球在宇宙中的位置	(1)
§ 1.1 地球与宇宙	(1)
§ 1.2 天球与天球坐标系	(12)
§ 1.3 时间的计量	(19)
§ 1.4 季节与昼夜	(23)
第 2 章 大气圈	(29)
§ 2.1 大气圈的组成及结构	(29)
§ 2.2 气象要素的特征、变化和分布	(32)
§ 2.3 天气系统	(42)
§ 2.4 地球上的气候带	(51)
§ 2.5 气候的变化	(54)
第 3 章 地球构造	(58)
§ 3.1 地球的圈层构造	(58)
§ 3.2 大地构造学说	(69)
§ 3.3 火山与地震	(76)
第 4 章 地球表面概况	(84)
§ 4.1 地球表面形态及其演化	(84)
§ 4.2 地形形成的基本规律及地貌表现	(87)
§ 4.3 世界地形概述	(102)
第 5 章 地球上的水	(120)
§ 5.1 地球上的水体	(120)
§ 5.2 陆地上的水	(123)
§ 5.3 海洋	(128)
§ 5.4 海水的运动	(133)
§ 5.5 海洋温度	(141)

第 6 章 冰雪覆盖	(149)
§ 6.1 极地冰盖	(149)
§ 6.2 冰川	(152)
§ 6.3 冰川地貌与冻土地貌	(156)
§ 6.4 地质年代的冰期	(161)
第 7 章 生物群落与生态系统	(164)
§ 7.1 土壤	(164)
§ 7.2 种群与生物群落	(168)
§ 7.3 生态系统	(179)
第 8 章 自然地理水平地带性和垂直地带性	(186)
§ 8.1 自然地理的区域分布	(186)
§ 8.2 垂直地带性与水平地带性的关系	(188)
§ 8.3 自然地理环境的三维结构	(191)
§ 8.4 自然区划	(193)
§ 8.5 中国自然区划	(199)
第 9 章 中国自然地理特征	(206)
§ 9.1 中国的地形、地貌特点	(206)
§ 9.2 中国的水系	(217)
§ 9.3 中国的土壤分布	(222)
§ 9.4 中国的植被	(224)
§ 9.5 中国的海洋	(228)
§ 9.6 中国自然地理条件与气候的联系性	(231)
第 10 章 地图投影	(233)
§ 10.1 地图投影	(233)
§ 10.2 地图比例尺与方向	(246)
§ 10.3 用等高线表示地形的的方法	(248)
参考文献	(255)

第 1 章 地球在宇宙中的位置

地球是人类的故乡,地球上的大气、水、岩石、土壤和生物的综合作用,哺育着人类,形成地球表面独具一格的物质世界,称之为地理环境,是地球科学研究的主要对象之一。而地球又处在更大的宇宙环境之中,为更好地了解人类生存的地球环境,了解和研究地球在宇宙中的位置是很有必要的。

§ 1.1 地球与宇宙

1.1.1 宇宙的概念

1.1.1.1 宇宙的起源

宇宙是普遍、永恒的物质世界。我国古语曰:“四方上下曰宇,古往今来曰宙”。“宇”指无限空间的意思,“宙”指无限时间的意思,宇宙是空间和时间的统一体。宇宙不是一个抽象的概念,它是由物质所组成的,在广袤深邃的宇宙中存在着各种天体以及弥漫物质,其表现形态多种多样,复杂万端。宇宙中的一切物质都处于不断地运动和变化之中。

宇宙的形态究竟是怎样的?它是如何形成的?这是人类有史以来各国科学家和哲学家们长期探索的重要问题,至今人们对于宇宙的认识还在不断探索前进。

在 17 世纪,伽利略、牛顿在经典力学体系的基础上,建立了宇宙无限无边的理论,即宇宙的体积是无限的,没有空间边界,无限的天体分布在无限的空间之中。宇宙无限论的观点,无论是在哲学上还是在自然科学上,在 20 世纪初已为多数人所接受。

1917 年,爱因斯坦在广义相对论的基础上,提出了有限无界的静态宇宙模型。认为宇宙是有限无边的,即宇宙空间的体积是有限,是一个弯曲的封闭体,这个弯曲的封闭体没有边界,类似一个球面,面积有限,但沿着球面运动总是遇不到“边”。爱因斯坦关于时间、空间、引力的全新理论,拉开了现代宇宙学研究的序幕。1924 年,弗里德曼在广义相对论的框架下,从理论上论证了宇宙要么膨胀,要么收缩,决不会保持静止状态。1929 年,哈勃在仔细研究了一批星系的光谱之后发现,除个别例外,绝大多数星系的光谱都表现出红移现象,而且红移量大致与星系的距离成正比。如果将红移解释为多普勒效应,那就意味着所有星系都在离开我们而去,其退行速度正比于同我们的距离。这个关系被称为哈勃定律,比例常数称为哈勃常数。这一发现为弗里德曼的宇宙

模型提供了直接的观测数据,动摇了静止宇宙的传统观念,即宇宙在不断膨胀。按照这个结论来推理下去就意味着过去必定存在一个有限的时刻,那时宇宙中的物质被压缩为极高密度的状态,这个时刻被称为“大爆炸”,也就是宇宙的起源。有人设想“大爆炸”时的宇宙温度可达 10^{32} K,随着宇宙的膨胀,辐射温度不断下降,但始终保持着黑体辐射谱形和总体均匀性。伽莫夫的计算结论是:作为“大爆炸”过程的遗迹,目前宇宙中应普遍存在温度约 5K 的背景黑体辐射。1964 年,美国贝尔电话实验室的彭齐亚斯和威尔逊用一架卫星通信天线在 7.35cm 波长外偶然探测到一种来自宇宙空间的强度与方向无关的辐射信号,引起了天文学家们的注意,随即进行了大量的调查。1989 年,美国宇航局专门为此发射了宇宙背景探测器卫星,观测数据表明,该辐射的谱分布与 2.735K 的黑体辐射完全相合,太空不同方向的相对温差小于十万分之一。这就证明了背景辐射的黑体性和普适性。这种“背景辐射”的存在是“大爆炸”模型最令人信服的证据之一。

1.1.1.2 宇宙中的天体和物质

宇宙的统一性在于它的物质性,即任何宇宙空间无一不是物质的或由物质构成的,但宇宙中的物质的存在形式具有多样性,一部分物质以星际物质(气体、尘埃)等形式连续弥散在广阔的空间;另一部分物质则积聚成团,表面为各种堆积形态的积聚实体,如地球、月球、行星、恒星和星云等,通常将包括星际物质和各种积聚态实体在内的所有宇宙星体统称为天体。现在最前沿的宇宙学研究认为,宇宙中的物质可分成三类,一类是可见物质,如上面介绍的各种物质,其所占物质总量的份额很小;另一类是暗物质,如黑洞等,其所占物质总量的份额比可见物质大很多;第三类是暗能量,其所占物质总量的份额超过一半,是主宰宇宙发展变化的物质能量。

(1) 恒星

恒星是宇宙中最主要的天体,肉眼所见的天体绝大多数都是恒星,它们集中了宇宙中相当部分的质量,是由炽热气体组成的能够自身发光的球形或类球形的天体。维持恒星辐射的能源主要是热核反应,其内部温度必然很高,但其表面温度差异很大,最热的恒星表面温度可达几十万度,最冷的仅有二三千度,太阳表面温度约为 6000K 左右。恒星都具有巨大的质量,大多数恒星的质量在 0.1~10 倍太阳质量之间。大的恒星直径是太阳的 2000 倍左右,小的恒星直径小于 1000km,恒星的平均密度相差也很悬殊,从水的密度的几千万分之一到千万倍以上。

恒星也有生有灭,其生命史是漫长的,演化是非常缓慢的。恒星的演化过程分为四个阶段:引力收缩阶段(幼年期)→主序星阶段(壮年期)→红巨星阶段(中年期)→白矮星、中子星、黑洞阶段(晚年期)。恒星处于生命史发展的不同阶段,发光特性也不同。

地球上观测到的恒星的明亮程度被称为亮度,常用星等来表示。通常星等指视星等,即地球上观测到的星光视亮度。古人将肉眼所见的恒星亮度分为六个等级,其中

15个最亮的恒星称为一等星,肉眼所见的最暗的星称为六等星。现代人们将视星等与亮度的关系确定为:一等星比六等星亮100倍,即视星等每差一等,亮度相差2.512倍。星等可以是小数或负数,如天狼星是-1.45等,太阳是-26.8等。恒星的亮度受与地球的距离影响,并不完全代表恒星的发光能力。将恒星亮度统一归算到距地球32.6光年处时的星等称为绝对星等,它能比较不同恒星的真正发光本领,也被称为光度,如太阳的绝对星等是4.9等。

(2) 银河系与河外星系

星系是恒星的巨大集团,是由几十亿至几千亿颗恒星以及星际气体和尘埃物质等构成,占据几千至几十万光年空间的天体体系。

太阳和地球所在的星系叫银河系,因其在天穹上显现一条乳白色亮带——银河而得名。银河系恒星总数大约一二千亿颗,其相当大一部分是成群成团分布的,有成对的双星,三、五互有联系的恒星组成的聚星和十个以上的恒星组成的星团。银河系内,除恒星外,还有各种类型的银河星云、星际气体和尘埃。银河星云是由星际气体和星际尘埃所组成的,有云雾状外表的天体,有亮星云、暗星云、行星状星云和弥漫星云等类型。星际气体和尘埃合称星际物质,据估计在银河系星际物质和恒星总质量不相上下。

银河系以外的星系,统称为河外星系,目前观测到的与银河系同样量级的星系有10亿个以上。星系的形状和结构是多种多样的,按照形态可分为旋涡星系、椭圆星系、棒旋星系、透镜星系和不规则星系等几种主要类型。肉眼能看到的河外星系只有仙女座星云和大、小麦哲伦星云。

通常把我们观测所及的宇宙部分称为总星系,它是人类目前所认识的宇宙最高级的天体系统,但它不是全部宇宙,而仅仅是宇宙的一部分。

1.1.2 地球与太阳

1.1.2.1 太阳系

太阳系是太阳和以太阳为中心、受它的引力支配而环绕它运动的天体所构成的系统。在太阳系中,太阳的质量占太阳系总质量的绝大部分,约占99.8%,其他天体的质量总和只占约0.2%。太阳以它巨大的引力支配环绕它运动的成员,并不断地供给它们以光和热。

太阳系中的其他主要成员有行星和环绕行星的卫星。太阳系中已经发现的八大行星,依照与太阳距离由近到远的顺序,依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星(图1.1)。以前,还有第九大行星冥王星,但是,根据2006年8月24日联合国天文学联合会大会(IAU)的决议:冥王星被视为太阳系的“矮行星”,不再视为行星。距太阳较近的四颗大行星(水、金、地、火)被称为类地行星,其特点是:质量小,体积小,卫星数少,平均密度较大,表面温度较高,公转周期较短,自转周期较长。而木、土、天

王、海王四颗行星称为类木行星,它们的特点是:质量大,体积大,卫星数较多,平均密度较小,表面温度低,公转周期长,自转周期短。如木星的质量和体积分别是地球的 317 倍和 1316 倍,绕它旋转的卫星多达 16 个,它的平均密度为 $1.33\text{g}/\text{cm}^3$,是地球平均密度($5.52\text{g}/\text{cm}^3$)的 0.24 倍,公转周期 11.86a,自转周期 9h 50min。距太阳最远的冥王星按其大小、质量近似类地行星,而表面温度、公转周期又近于类木行星。




图 1.1 太阳系、地球在太阳系中的位置

除大行星外,围绕太阳运行的还有数以万计的小行星,它们主要分布在火星和木星轨道之间,大多数小行星都很小,直径只有几十千米,甚至几千米,较大的可达 200km 以上,小行星的外形很不规则,它们也都进行着自转和公转。

太阳系里还有大量的质量很小的天体,如彗星和流星体。其中彗星是一种质量较小,具有云雾状外貌,多数绕太阳作闭合轨道运动的天体,但它们的轨道偏心率很大。彗星一般由彗头和彗尾两部分组成。彗头的核心是彗核,它集中了彗星的主要质量,由冻结了的甲烷、氨、二氧化碳等气体所组成,也有一些石质物体和尘埃质点,当它临近太阳时,彗核受热,冰冻物质气化,在核周围形成彗发,在太阳光压和太阳风的作用下,在背向太阳的方向彗发延伸出长长的彗尾。彗核的直径为 $1\sim 100\text{km}$,彗发的直径可达几万千米,彗尾可长达 1 亿 km。彗发和彗尾由极稀薄的气体组成,密度极小。彗星的轨道大体分三类:椭圆轨道、抛物线轨道和双曲线轨道,大部分彗星的轨道是围绕太阳的很扁的椭圆,它们的周期相差很大,由数年至数千年不等,如著名的哈雷彗星的周期是 76 年。少数彗星沿抛物线或双曲线轨道飞行,它们绕过太阳后,就不再复返,属于非周期性彗星。

在太阳系行星际空间游动着大大小小的固体块和尘粒,称为流星体。当它们临近地球时,受地球引力的吸引,进入地球大气层,因摩擦发热而燃烧发光,这就是我们观测到的流星。流星体主要来源是小行星和彗星的碎块,小的仅几克,大的可有几百吨。进入地球大气层的流星体多数被燃烧化为灰烬,少数残体落到地面,叫作陨石或陨星。按

其组成成分可分为三类:铁陨石,石陨石和石铁陨石。

1.1.2.2 太阳

太阳是太阳系唯一的恒星,它是太阳系的中心天体,也是太阳系的质量中心、引力中心和运转中心。太阳是一个巨大的能量源,不断地向四周发射出大量的光和热。到达地球上的热能仅是太阳所射出的热能的极微小部分,却是地球上能量的主要来源。因此,日地关系密切,太阳的光和热是地球上一切生命的源泉,也是地球上大气运动和气候形成的最重要的因子。

(1) 日地距离及太阳的大小、质量

地球在一个椭圆轨道上绕太阳公转,太阳位于椭圆的一个焦点上,所以日地距离一年中不断变化,日地最远距离(地球位于远日点)为 $15210 \times 10^4 \text{ km}$,日地最近距离(地球位于近日点)是 $14710 \times 10^4 \text{ km}$,日地平均距离为 $14960 \times 10^4 \text{ km}$ 。用雷达探测方法算出日地距离精确数值是 $1.49597892 \times 10^8 \text{ km}$ 。日地平均距离在天文学上作为1个长度单位,称为天文单位。

地球上看到的光亮的太阳圆面,叫太阳视圆面。通过子午仪或其他仪器可测得太阳圆面直径(称视直径)所张的角度平均为 $31'59''.3$ 。由日地距离和视半径的张角可知太阳的半径约为 696000 km 。是地球半径的109倍。太阳的体积大约是地球的130万倍。

由万有引力定律及有关物理定律可推得太阳的质量约为 $1.989 \times 10^{27} \text{ t}$,相当于地球质量的33万多倍。太阳的平均密度为 1.41 g/cm^3 ,约为地球平均密度的1/4。太阳各部分的密度相差悬殊,表面稀疏,中心密集。

(2) 太阳的结构

太阳是一个体积、质量巨大的炽热气体球,由等离子体所组成。我们只能观察到太阳表面的一些状态和性质,而对其内部无法直接观测,但通过对太阳基本数据的观测和与观测相符合的理论推求,以及在地球上已证实的氢核聚变的反应率、物质传播辐射的机制等物理规律,可以推测出太阳内部的结构(图1.2)。太阳整个都是气体,内部为稠密的气体,外部是稀薄的气体,太阳的外层稀薄气体称为太阳大气。目前认为太阳内部由中心向外可划分为三个同心圈层。

1)核反应区。太阳中心到1/4太阳半径范围内是进行热核反应产生能量的区域,这个区域体积只占太阳体积的1/64,却集中了太阳质量的一半。这里温度高达 $1500 \times 10^4 \text{ K}$,压力可达3000亿个地球大气压。在太阳中心区域这种超高温高压条件下,不断进行着大规模的氢热核聚变反应,释放出巨大的能量。

2)辐射区。核反应区的外面是热核反应产生的辐射能量在这里通过太阳各层物质的吸引、发射、再吸收、再发射的过程向外输送。热核反应产生的高能 γ 射线经过这个过程逐步降低频率,最后成为太阳向空间辐射的较低能量的可见光和其他形式的辐射。




图 1.2 太阳结构示意图

3)对流区。位于辐射区外,是太阳内部稠密大气的最外层,由辐射区输送的能量使这里温度达 $(10^0 \sim 10^1) \times 10^4 \text{ K}$,稠密炽热的气体处于升降起伏的对流状态。在太阳大气中产生的各种活动现象(如黑子、耀斑等)都与对流区的活动有关。

太阳大气是太阳外层的稀薄大气,按其物理性质的不同,又能将其划分为三个层次:

1)光球。肉眼所见太阳的耀眼夺目的太阳视表面就是光球。它是太阳的明晰界限,通常意义下的太阳表面就是指的色球,太阳的直径也以光球为界。它在太阳大气的最底层,厚度仅约 500 km 。我们平常所观测的太阳光基本都是从这一层发出的。光球的温度由里向外逐渐降低,底部温度约 6000 K ,顶部温度约 $4000 \sim 5000 \text{ K}$ 。光球温度与太阳内部形成极大的温度梯度,这种温度分布显著的不均衡,造成对流区太阳大气的剧烈的对流运动。

2)色球。在光球之上,称为色球。它向上延伸到 $2000 \sim 10000 \text{ km}$ 的范围,厚度各处不同。它发出的可见光很少,其总量不及光球的 1% ,因此,我们平常看不到色球,只

有在日全食的时候,当光球的强烈光线被月球所掩蔽时,可以看到这个发出非常美丽的玫瑰红色的辉光的气层,因此称为“色球”。色球的结构是不均匀,其边缘不像光球那样清晰整齐,由许多细小的“火舌”组成,致使它的边缘呈锯齿状。“火舌”是上升的气流,对色球边缘的高分辨率观测显出色球层的精细结构,主要包含着高速的明亮喷射气流,称为“针状物”,它们在色球层中不断产生,并不断消失,平均存在时间大约 $5 \sim 10\text{min}$ 左右。色球的温度随高度而增加,色球底层几千度,到高层达几万度。

3) 日冕。在日全食的时候或使用日冕仪可观测到一圈白光和淡黄光裹住了日轮,这就是日冕。它是太阳大气的最外层,范围可延伸到十几个太阳半径的地方,其物质极其稀薄,它的亮度仅及色球的千分之一。日冕的形状经常在变化,厚度也处处不同。在太阳活动极大期,日冕呈圆形,太阳活动极小期的日冕在太阳两极缩短,在太阳赤道带突出。日冕的温度极高可达 $(100 \sim 200) \times 10^4 \text{K}$ 。太阳光谱的远紫外线和 X 射线主要是在日冕中产生,太阳的射电辐射的大部分也产生在日冕中。日冕的温度极高,说明日冕中的物质是以极高的速度在运动着,日冕中的快速粒子能摆脱太阳引力场的束缚,向外膨胀而进入行星际空间,这种现象叫作“日冕膨胀”。热电离子连续不断地从太阳流出,就形成太阳风。

(3) 太阳活动现象

太阳活动就是指太阳表层的物质运动和变化过程。在太阳大气中可以观察到各种活动变化现象,如太阳黑子的出现和消失、日珥的变化、耀斑的爆发等等,此外在太阳大气中还可以观测到不断运动和变化着的米粒组织、谱斑、色球网络、针状物、喷焰等。太阳活动是太阳大气里的一切活动的总称。强烈的太阳活动能使一些波段的太阳辐射发生很大变化,并能把大量的物质粒子射入空间,影响地球磁场和大气层。太阳活动有时剧烈,有时平静,存在一个 11a 的准周期。当太阳活动处于低潮时,称为宁静太阳;太阳活动处于高潮时,称为扰动太阳。太阳活动主要是指扰动太阳的活动。扰动太阳的主要标志之一是太阳黑子,特别是黑子群的频繁出现,扰动太阳的另一个更重要的标志是太阳耀斑的频繁出现。耀斑是太阳上最强烈的,也是对地球影响最大的活动。

用小倍率的望远镜,甚至肉眼就可以看到在太阳的光球表面上有一些黑的斑点,称为黑子。它是光球中的大气涡旋,其中心温度约为 4200K ,比周围温度低 1000K 左右,因此显得比光球暗。黑子大多数成群出现,有时也有单个黑子活动。一般情况下,一群黑子里有两个主要的黑子,这一对黑子,位置偏西的叫前导黑子,偏东的叫后随黑子。一个发展完整的黑子群,从单个黑子出现,到两个主要黑子发育成熟,在其周围再出现许多小黑子,形成黑子群以后又逐渐衰落、消失这一过程需要几十天。小黑子的直径在数千千米,个别发展成大黑子,直径可达 $10 \times 10^4 \text{km}$ 。大部分黑子寿命不长,常不到一天,有一些黑子的寿命达一个月以上。长期记录日面上的黑子的数目,发现有的年份黑子较多,有的年份较少,黑子数的年均值大致作周期变化,周期约为 11a。

在全色光照片上能看到一种比光球更明亮一些的斑点,叫作光斑。它的温度比光球高不了多少,据测定只比周围高 $100\sim 300\text{K}$;平均寿命 $2\sim 3\text{d}$ 。光斑常出现在黑子的周围,一般环绕着黑子,与黑子有密切的关系,光斑比黑子早出现几小时或几天。在色球层中,光斑之上紧接着分布着谱斑,形状与光斑相似,是光斑在色球层的延续。谱斑的温度比周围高,大部分谱斑附近有黑子群,其寿命比黑子长,它的大小从几千千米到几十万千米,其面积大小也是太阳活动的强弱的标志。

色球层中,有时有巨大的气柱升腾而起,如同火焰喷舌,可以达到几万千米甚至百万千米以上的高度,然后落回日面,或脱离太阳的引力而消散不见。这些气柱称为“日珥”。它是突出在太阳边缘外面的发光气团,呈朱红色。一般在日全食时利用色球望远镜或分光镜等仪器进行观测时才能被看见。日珥的形态多变,大小不一,一般长约 $20\times 10^4\text{km}$,高约 $3\times 10^4\text{km}$,厚约 5000km ,有的变化缓慢,可以生存几个月,气流上升的速度较低,约 10km/s ,有的变化强烈,气流升腾速度到达 10^2km/s 。日珥主要存在于日冕中,但下部与色球相连。日珥通常可分为宁静日珥、爆发式日珥和活动区日珥三种。宁静日珥寿命较长,可长期存在于日冕中,它在日面上表现为伸得很长的暗条。爆发式日珥比较罕见,运动速度可高达每秒几百千米。当它上升到相当高度时,会分裂出凝团和股流,然后沿着近似垂直的方向落回太阳。活动区日珥运动速度也可达 10^2km/s ,一般伸展高在 $10\times 10^4\text{km}$ 以内。

耀斑是太阳上爆发现象的标志,它主要发生在色球中,是日面上局部区域亮度突增的现象,表现为特别明亮的斑点,称为色球爆发。耀斑的温度很高,达 1×10^4 度左右或更高,常出现在太阳表面大黑子或黑子群附近,寿命由几分钟到几小时。耀斑活动与黑子有密切关系,在一个黑子群的存在期间,平均每 7h 出现一个耀斑。耀斑是太阳大气中的一种不稳定过程,是太阳上最强烈的,也是对地球影响最大的活动现象。太阳所发射电波的强度可以在几年内不发生多大的变化,但当日面出现耀斑时,太阳射电可以一下子增强几百万倍。在耀斑爆发时除发射可见光外,还发射大量的紫外线、X 射线和 γ 射线,还有红外、射电辐射和高能粒子流,甚至能量特高的宇宙射线。耀斑的短波辐射和带电粒子流到达地球后,会引起地球上一系列的地球物理现象,如磁暴、极光和电讯扰动以至中断等。从日地关系方面来看,耀斑的作用比太阳黑子的作用更加直接和重要。

(4) 太阳常数

太阳辐射指其表面以电磁波方式向外传递的能量。地球上所观测到的太阳辐射,绝大部分从太阳光球发出,从色球层和日冕发出的只占极小的一部分。太阳辐射的能量主要集中在可见光波段, $0.2\sim 10.0\mu\text{m}$ 波段就占全部太阳辐射的 99.9% 。

表示太阳辐射能力的物理量称为太阳常数。它是指当日地处于平均距离时,单位时间内垂直投射于大气上界单位面积上全部波长的太阳辐射能通量。常用符号 I_0 表

示,单位用 W/m^2 [1985 年以前用 $\text{cal}/(\text{cm}^2 \cdot \text{min})$]。1981 年 10 月在墨西哥召开的世界气象组织仪器和观测方法委员会第八届会议上通过的太阳常数取值为 $1367.69 \text{W}/\text{m}^2$ 。

太阳辐射强度是相当稳定的,只有 $0.5\% \sim 1.0\%$ 的变化,主要表现在各种太阳活动所引起的中远紫外线、X 射线和无线电波的变化(这两部分可称为非定常辐射部分),以及微粒流强度的变化。

1.1.3 地球的卫星

月球是地球唯一的天然卫星,也是人类了解最多的天体。在地球引力的作用下,月球有规律地绕地球运行,构成地月系。由于月绕地、地绕日的运动,我们在地球上才能看到月相的变化以及日食、月食的现象。月球具有相当大的质量,又是距地球最近的天体,所以它的引力作用对地球的影响尤为突出,主要表现在地球上的潮汐现象和自转速度的变慢。

月球是离地球最近的天体,其绕地运行也是一个椭圆轨道,月球在远地点时距离地球 405508km ,近地点时为 363300km ,平均距离为 384404km 。由于月球距地球很近,它的视半径为 $15'32''.6$,与太阳的视半径($16'0''$)相差无几,在地球的天空,太阳和月亮是最显著的天体。实际月球半径约为 1738km ,相当于地球半径的 $3/11$ 。月球面积大约是地球表面积的 $1/14$,比亚洲面积稍小。月球的质量相当于地球质量的 $1/81.3$ 。平均密度为 $3.34 \text{g}/\text{cm}^3$,为地球平均密度的 $3/5$,这表明月球内部不像地球那样有一个很密的核心。月面上的重力加速度为 $1.62 \text{m}/\text{s}^2$,约为地球的 $1/6$ 。

由于月球表面的重力加速度很小,所以不能保持大气层,月球表面特征与地球有很大的不同。月球表面高低起伏,其结构有环形山、山系、海、月谷和月面辐射纹等特征类型(图 1.3)。月面上较亮的部分多数是山,月面上的山主要不是山脉,而是一些相互不连接的环形山(或称月坑),山作环状,四周高起,中间平地上又常有小山,与地球上的火山口相似,大的直径在 $200 \sim 300 \text{km}$ 以上,如贝利环形山直径 295km 。月球上也有连绵不断的山系或山脉,它的数目比环形山少得多,大多数以地球上的山命名,如亚平宁山系长达 1000km 。肉眼看月球表面上有一些比较阴暗的地区,过去被称为“海”,实际上它们是一些比较广阔的平原。之所以颜色较暗,是因为那里存在着大范围的熔岩流,这是月球上分布最广的地形。月海大多具有圆形封闭的特点,四周是山脉。在月球表面很多区域可以看到一种暗黑的狭窄的弯曲的线条,它们大概是月亮上的深而窄的裂缝,被称为月谷。月球上一些大环形山周围有向四方散发出去的,宽度达几百千米的光亮宽带,被称为月面辐射纹。