



最佳畅销书

2015

全国卫生专业

技术资格考试权威推荐用书

护理学专业(护师)考试

通关必做2000题

主编 刘月梅

(第三版)

- 权威专家精心打造，精选试题再现命题规律，名家解析指引答题迷津，融会贯通提升复习效果。致力于为考生提供最优秀的辅导用书，是医药科技人不懈的追求

中国医药科技出版社



2015 全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书

护理学专业(护师)考试 通关必做2000题

(第三版)

主编 刘月梅

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书的策划理念是帮助忙碌的护理考生花最少的时间轻松突破护考的堡垒而快速过关取胜。因此高效性、趣味性和针对性成为本书追求的最高境界。围绕“学会做善于考试的白衣天使”这一目标,按照最新大纲和考试要求,参照历年真题,精心挑选考题,对难题、偏题和怪题做了解析,有助于考生强化记忆、提高答题技巧,帮助考生灵活应对考试、顺利通关。是参加 2015 护师考试考生的必备辅导书。

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业 (护师) 考试通关必做 2000 题/刘月梅主编. —3 版. —北京: 中国医药科技出版社, 2014. 8

2015 全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 6914 - 3

I. ①护… II. ①刘… III. ①护理学 - 护士 - 资格考试 - 习题集
IV. ①R47 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 163981 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 A4

印张 13 $\frac{3}{4}$

字数 526 千字

初版 2013 年 1 月第 1 版

版次 2014 年 8 月第 3 版

印次 2014 年 8 月第 3 版第 1 次印刷

印刷 三河市航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 6914 - 3

定价 29.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

主 编 刘月梅

副主编 马玉珍

编 委	白小红	陈 俊	付 涛	何玉兰	侯 荣
	胡留城	黄 丽	黄晓冬	计 莉	季 恩
	蒋太春	康钦利	孔志坚	李国静	李 颖
	梁 琼	廖发金	刘 波	刘 颖	刘 琳
	刘作华	龙永强	鲁 冰	罗小娟	马建国
	倪佩钢	聂 勇	彭景云	任 蓉	沈 汛
	王 莉	张 敬	张静静	赵慧慧	付丽珠
	刘葆陞				

编写说明

护师资格考试是一种职称资格考试，为了帮助读者能顺利地通过 2015 年的考试，我们根据最新版大纲的要求，结合多年从事考前辅导和基础教学工作的实践经验，编写了这本《护理学专业（护师）考试通关必做 2000 题》（2015 年版）。试题按章节进行编排，涵盖了护师资格考试各项考点，覆盖面全，针对性强，对于典型试题和易错题提供精当的解析，便于考生们复习理解。

护师资格考试通常在每年的 5 月举行，我们建议考生复习采用三段式复习方式，提升复习效率，巩固复习效果。

第一阶段，系统复习阶段（建议时间控制在 2 个月）。第一阶段全面复习考试大纲要求内容。以教材加考试大纲为主，配合《护理学专业（护师）考试考点速记》（2015 年版）（中国医药科技出版社出版）进行复习 [时间分配：（教材 + 大纲）：速记 = 70% : 30%]。结束后，做《护理学专业（护师）历年考点精析与避错》（2015 年版），深入了解考试重点和命题规律，发现复习中存在的问题。建议复习时，多动手，多总结，书和考点速记配合着学习。复习内容以历年考试重点为主，要把宝贵的时间用在刀刃上。

第二阶段，以教材和考点速记复习为主（建议时间 2 个月，时间分配：教材：笔记 = 50% : 50%）。有了第一阶段的系统复习，这个时候，你对考试内容都会有一定的感觉。这个阶段以重点复习为主。建议每章看后，配合《护理学专业（护师）考试通关必做 2000 题》（2015 年版）对本章复习成果进行检验。

第三阶段，冲刺为主（建议时间 1 个月），快速突破《护理学专业（护师）历年考点精析与避错》（2015 年版）。配合《护理学专业（护师）考试冲刺试卷》（2015 年版）继续巩固前两个阶段复习成果。真题练习是任何辅导练习题不能替代的。

相信，经过以上三个阶段的复习，加上你的决心和努力，圆梦 2015 不再是梦想。我们致力于为广大考生提供优秀的辅导图书，也欢迎广大读者为我们提出宝贵建议，不断修订完善图书质量，满足广大读者需求。邮箱：kszx405@163.com。

本书编委会

2014 年 7 月

目 录

上篇 命题规律分析

从 2014 护师考试真题谈 2015 年复习方向与应考策略	(1)
--------------------------------------	-------

中篇 通关试题

第一章 基础护理学	(17)
第二章 内科护理学	(39)
第三章 外科护理学	(76)
第四章 妇产科护理学	(115)
第五章 儿科护理学	(136)

下篇 通关试题答案和精选解析

第一章 基础护理学	(155)
第二章 内科护理学	(163)
第三章 外科护理学	(185)
第四章 妇产科护理学	(197)
第五章 儿科护理学	(206)

上篇 命题规律分析

从 2014 护师考试真题谈 2015 年 复习方向与应考策略

迎来送往，又是一个考季结束了，下面我们就对 2014 护师考题来个“剖肠刮肚”，找出命题老师的“命题秘笈”，然后指导大家如何“一战而胜”。

一、2014 年护师命题出题规律深度剖析

仔细分析 2014 年考题，我们可以发现其有如下特点。

(一) 真题的“重出江湖”现象。也就是考点的“依依不舍”现象。例如：

1. 患者男，53 岁。B 超发现肝脏右叶肿大 2 天，肝功能检查正常，最有助于提示原发性肝癌的是

- A. AFP
- B. AKP
- C. CEA
- D. 酸性磷酸酶
- E. 总胆红素

【答案】A

2. 下列哪项为肝硬化患者肝功能失代偿期的典型表现

- A. 食欲不振
- B. 恶心、呕吐
- C. 蜘蛛痣
- D. 肝掌
- E. 腹水

【答案】E

这些考题都是原来真题的重复或者变化题型，看来命题者真的是喜欢老朋友了！这也就意味着大家一定要重视真题。

(二) 2014 年考题的“英雄皆有出处”现象：我们总结的 30 种题型 2014 年考题中出现了 23 种，不管命题者如何变化，都是有踪可循的。

★今年考题出现的“最”

1. 患儿，4 岁，突然出现左上腹部疼痛，为了准确地对其疼痛进行评估，护士最好选用的评估工具是

- A. 面部表情疼痛评估工具
- B. 描述式疼痛评估工具
- C. 数字式疼痛评估工具
- D. 填图式疼痛评估工具
- E. 言语式疼痛评估工具

【答案】A

2. 胃肠减压最可靠的拔管指征是

- A. 体温正常
- B. 腹胀消失
- C. 肠鸣音恢复
- D. 抽出液减少
- E. 肛门排气

【答案】E

3. 用铁剂治疗缺铁性贫血，最早出现的有效反应是

- A. 红细胞变大
- B. 红细胞数上升
- C. 网织红细胞数上升
- D. 血红蛋白量上升
- E. 红细胞中心浅染恢复

【答案】C

4. 脑瘫最常见的是

- A. 痉挛型
- B. 混合型
- C. 手足徐动型
- D. 强直型
- E. 共济失调型

【答案】A

5. 慢性肾衰竭临床哪项是最早最突出症状

- A. 皮肤瘙痒、紫癜
- B. 口腔氨臭味、腹泻
- C. 代谢性酸中毒呼吸深而长
- D. 贫血
- E. 胃肠道症状如食欲不振、恶心、呕吐等

【答案】E

6. 化脓性脑膜炎最易出现的并发症是

- A. 硬脑膜下积液
- B. 脑室管膜炎
- C. 智力低下
- D. 脑积水
- E. 脑疝

【答案】A

7. 风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全最重要的体征是

- A. 主动脉瓣区收缩期粗糙杂音
- B. 主动脉瓣区舒张早期叹气样杂音
- C. 水冲脉
- D. 心尖抬举样搏动
- E. 主动脉瓣区第二心音减弱或消失

【答案】B

8. 目前最有效的防治支气管哮喘药物是

- A. β_2 受体激动药
- B. 茶碱类药
- C. 糖皮质激素
- D. 抗胆碱药
- E. 肥大细胞膜稳定剂

【答案】C

9. 患儿生后 7 天, 出现全身强直性痉挛, 牙关紧闭、苦笑面容, 双拳紧握, 上肢屈曲、下肢伸直, 呈角弓反张, 阵发性痉挛, 该患儿最可能的疾病是

- A. 破伤风
- B. 狂犬病
- C. 癫痫
- D. 缺血缺氧性脑病
- E. Down 病

【答案】A

10. 治疗心绞痛作用最快、最有效的药物是

- A. 吗啡
- B. 哌替啶
- C. 硝酸甘油
- D. 普萘洛尔
- E. 硝苯地平

【答案】C

11. 肿瘤化疗期间严重呕吐的患者应采取的最合理的营养方式是

- A. 部分肠内营养
- B. 全量肠内营养
- C. 肠外营养
- D. 单纯葡萄糖输液
- E. 经口进食

【答案】C

12. 肺癌中恶性程度高且预后最差的是

- A. 鳞癌
- B. 小细胞癌
- C. 大细胞癌
- D. 高分化腺癌
- E. 低分化腺癌

【答案】B

13. 颈段食管癌最易转移到

- A. 颈深淋巴结
- B. 纵隔淋巴结
- C. 膈下淋巴结
- D. 胃部淋巴结
- E. 腹主动脉旁淋巴结

【答案】A

14. 患者女, 42 岁。已婚, 因月经周期延长及月经量增多 1 年就诊。查体: 贫血貌, 宫颈光滑, 宫体如孕 3 月大小, 表面凹凸不平, 质硬, 双附件正常, 考虑为子宫肌瘤, 最恰当的处理是

- A. 随访观察
- B. 抗生素
- C. 择期手术
- D. 子宫切除术

E. 子宫及双附件切除

【答案】D

15. 患者男, 53 岁。B 超发现肝脏右叶肿大 2 天, 肝功能检查正常, 最有助于提示原发性肝癌的是

- A. AFP
- B. AKP
- C. CEA
- D. 酸性磷酸酶
- E. 总胆红素

【答案】A

★今年考题出现的“首”

1. 对张力性气胸现场抢救, 首先应

- A. 厚敷料加压包扎
- B. 人工呼吸
- C. 快速输液、吸氧
- D. 闭式胸膜腔引流
- E. 胸腔穿刺排气

【答案】E

2. 肝硬化患者, 食管静脉曲张出血 600ml, 血压低, 首选的措施是

- A. 立即平卧位, 头偏向一侧
- B. 立即吸氧
- C. 立即安置双囊三腔管
- D. 立即给予止血药物
- E. 立即给予升压药物

【答案】E

3. 患者男, 50 岁。咳嗽咳痰, 体温不高。X 线发现: 左肺叶不张, 少量胸膜腔积液, 为确诊, 进一步检查首选

- A. 胸部 CT
- B. 剖胸探查
- C. 胸膜腔镜检查
- D. 支气管镜检查
- E. 经胸壁穿刺活组织检查

【答案】A

4. 治疗慢性再生障碍性贫血首选

- A. 糖皮质激素
- B. 免疫抑制剂
- C. 造血因子
- D. 雄激素
- E. 雌激素

【答案】D

5. 诊断急性脑血管病 (除蛛网膜下隙出血) 首选的检查是

- A. 脑脊液检查
- B. CT
- C. MRI
- D. 电生理检查
- E. 脑电图

【答案】B

6. 室性期前收缩首选

- A. 洋地黄
- B. 异丙肾上腺素
- C. 麻黄素
- D. 阿托品
- E. 利多卡因

【答案】E

7. 足月儿, 产钳助产娩出, 出生时全身皮肤苍白, 呼吸微弱, 心率 30 次/分, 肌张力松弛。生后首先应采取的措施是

- A. 面罩给氧
- B. 胸外心脏按压
- C. 清除口鼻腔分泌物
- D. 注射 5% 碳酸氢钠和呼吸兴奋剂
- E. 弹足底或刺激皮肤以引起啼哭

【答案】C

8. 解除非尿路梗阻性尿潴留, 不应首先

- A. 下腹部热敷
- B. 按摩下腹部
- C. 听流水声
- D. 温水洗外阴
- E. 导尿术

【答案】E

★今年考题出现的“方式”

1. 测定人体是否感染过结核的有效方法是

- A. 纤维支气管镜检查
- B. PPD 试验
- C. X 线检查
- D. CT 检查
- E. 痰结核菌检查

【答案】B

★今年考题出现的“治疗”

1. 患者, 女性, 73 岁, 肺癌晚期。患者胸痛、极度衰竭, 有时意识模糊。护士为其心理护理, 交流时宜使用的距离是

- A. 亲密距离
- B. 个人距离
- C. 社会距离
- D. 社交距离
- E. 公众距离

【答案】A

2. 对风湿性心脏病患者作健康指导时, 关键措施是

- A. 加强体育锻炼
- B. 育龄女患者须避免妊娠
- C. 绝对卧床休息
- D. 积极防治链球菌感染
- E. 低盐饮食

【答案】D

3. 一般伤口换药后的器械物品处理是

- A. 先浸泡后清洗
- B. 先清洗后灭菌
- C. 先清洗后浸泡灭菌
- D. 先灭菌后清洗再浸泡
- E. 先浸泡后清洗再灭菌

【答案】E

4. 关于急性阑尾炎非手术治疗的护理, 错误的是

- A. 半卧位, 卧床休息
- B. 禁食
- C. 应用有效抗生素
- D. 确诊后可以用哌替啶止痛

E. 禁用泻药及灌肠

【答案】D

5. 溃疡性结肠炎急性发作期病人正确的饮食是

- A. 给予冷饮
- B. 给予牛乳等高蛋白饮食
- C. 给予富含纤维素的水果
- D. 给予富含纤维素的蔬菜
- E. 给予少渣流质或半流质饮食

【答案】E

6. 休克首要的治疗是

- A. 扩容
- B. 纠正酸中毒
- C. 维护心功能
- D. 控制感染
- E. 维护肾功能

【答案】A

7. 以非手术治疗为主的乳房疾病是

- A. 一期乳癌
- B. 二期乳癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳腺囊性增生病

【答案】E

8. 开放性骨折最重要的治疗措施是

- A. 心理护理
- B. 早期彻底清创, 使用抗生素
- C. 及时使用 TAT
- D. 及时复位固定
- E. 镇静止痛

【答案】B

9. 关于对 ARDS 患者的治疗, 不正确的是

- A. 延长机械通气时间
- B. 选用呼气末正压通气
- C. 使用有效抗生素
- D. 加强营养支持
- E. 加大补液量

【答案】E

10. 硫酸镁治疗妊娠期高血压疾病, 最先出现的毒性反应是

- A. 头晕、血压过低
- B. 呼吸减慢
- C. 心率减慢
- D. 膝反射减弱或消失
- E. 尿量过少

【答案】D

11. 治疗慢性肾炎所致的容量依赖性高血压首选

- A. 氯氢噻嗪
- B. 普萘洛尔
- C. 硝苯地平
- D. 卡托普利
- E. 替米沙坦

【答案】A

12. 患者女, 36 岁。患慢性肾炎, 眼睑水肿, 血压高, 大量蛋白尿, 大便正常, 饮食应采用

- A. 低盐饮食 B. 高磷饮食
C. 高蛋白饮食 D. 高脂饮食
E. 不限制饮食

【答案】A

★今年考题出现的“指标”

1. 根据艾瑞克的心理社会发展学说，学龄期正性解决指标是

- A. 学会相信别人
B. 学会自控而不失自尊与人相处
C. 有自我认同感及发展自身潜能的计划
D. 求得创造与自我发展，并能控制自己的世界
E. 敢于有目的地去影响和改善环境，并能评价自己的行为

【答案】B

★今年考题出现的“因果”

1. 肝硬化患者禁食硬食、油炸、粗纤维食物是因为

- A. 减少肠道氨的吸收 B. 严格限制钠的摄入
C. 抑制假性神经递质 D. 减轻肝脏解毒功能
E. 以防损伤食道黏膜而出血

【答案】E

2. 肝炎病人眼结膜黄染的原因是

- A. 血中胆固醇增高 B. 血中二氧化碳增高
C. 血中氧含量增高 D. 血中胆红素增高
E. 红细胞破坏增多

【答案】D

3. 腹腔镜检查手术后，患者出现肩痛及上肢不适。原因可能是

- A. 手术过程中损伤
B. 通气针进腹腔前充气
C. 充气过急，气体进入血管
D. 腹腔内残留气体
E. 气体通过横膈裂孔进入纵隔

【答案】E

4. 双胎妊娠在分娩期第一个胎儿娩出后，由于子宫突然缩小，容易出现

- A. 前置胎盘 B. 胎盘早剥
C. 胎膜早破 D. 胎儿畸形
E. 产程缩短

【答案】B

★今年考题出现的“典型”

1. 下列哪项为肝硬化患者肝功能失代偿期的典型表现

- A. 食欲不振 B. 恶心、呕吐
C. 蜘蛛痣 D. 肝掌
E. 腹水

【答案】E

★今年考题出现的“药物”

1. 避免与牙齿接触的药物是

- A. 颠茄合剂 B. 稀盐酸
C. 氧化铝凝胶 D. 磺胺类药
E. 退热药

【答案】B

★今年考题出现的“否定”

1. 促进病人休息的护理措施不包括

- A. 尊重病人的休息方式
B. 营造舒适的物理环境
C. 酌情给予安眠药
D. 合理安排治疗护理活动
E. 病人卧床休息前做好睡前安排

【答案】C

2. 患者肖某，男，40岁，因火灾全身重度烧伤，不能经口进食，消化功能不良，需要补充营养，医嘱给予要素饮食，采用连续滴入的方式补充，下列做法不正确的是

- A. 速度从40~60滴/分开始，逐渐增加
B. 滴注要素饮食时，保持液体温度在50℃~60℃
C. 要素饮食最大浓度不能超过25%
D. 要素饮食期间应定期检查血糖和尿糖
E. 停用要素饮食时，需要逐渐减量

【答案】B

3. 关于尿毒症病人皮肤护理，错误的是

- A. 勤用肥皂洗澡 B. 瘙痒明显可用温水浴
C. 勤换衣服 D. 经常更换卧姿
E. 按摩受压部位

【答案】A

4. 在ICU监护中，不属于基础监护的内容是

- A. 持续心电图 B. 留置导尿管，观察尿量
C. 给氧 D. 持续测呼吸频率
E. 定期查尿素氮

【答案】A

5. 关于类风湿关节炎病人的护理措施，不正确的是

- A. 遵医嘱使用抗炎镇痛药 B. 绝对卧床休息
C. 热水浴以减轻疼痛 D. 保护关节于功能位
E. 必要时使用夹板固定关节

【答案】B

6. 孕妇不需要立即就诊的症状是

- A. 寒战高热 B. 阴道流血
C. 腹部疼痛 D. 胎动计数突然增加
E. 头痛、眼花、胸闷

【答案】D

7. 不符合黑痣恶变的表现是

- A. 迅速长大
- B. 色素减退
- C. 出现疼痛
- D. 溃烂出血
- E. 周围出现色素环

【答案】B

8. 关于慢性肾小球肾炎患者的护理措施, 不正确的是

- A. 消除疑虑, 配合治疗
- B. 合理膳食, 保证足够的营养
- C. 让患者了解有关防治知识
- D. 多饮水, 保持尿量在 2500ml
- E. 避免与上呼吸道感染者接触

【答案】D

9. 敌百虫中毒禁忌的洗胃液是

- A. 清水
- B. 肥皂水
- C. 生理盐水
- D. 1:5000 高锰酸钾
- E. 2% 碳酸氢钠冲洗

【答案】E

10. 不属于羊水栓塞的处理是

- A. 持续性低流量给氧
- B. 半卧位
- C. 遵医嘱立即静脉滴注地塞米松 20~40mg
- D. 如发生在第一产程立即剖宫产结束分娩
- E. 如正在滴注催产素应立即停止

【答案】E

11. 某白血病患者接受化疗, 静脉滴注柔红霉素 60mg + 生理盐水, 护士不慎将药液外漏至血管外, 错误的措施是

- A. 停止注射, 原部位回抽 3~4ml 后, 拔出针头
- B. 静脉滴注前后用生理盐水
- C. 普鲁卡因局部封闭
- D. 局部热敷
- E. 抬高患肢

【答案】D

12. 患者女, 30 岁。癫痫大发作被人发现。间歇期仍意识不清, 错误的措施是

- A. 需要专人守护, 记录包括发作持续时间、间隔时间等
- B. 使患者平卧, 加强保护
- C. 立即解开衣领、衣扣和在臼齿间置压舌板或小布卷
- D. 若剧烈抽搐则应强行用约束带捆扎抽搐的肢体以防意外
- E. 禁止口腔测温

【答案】D

13. 手术治疗胃十二指肠溃疡的适应证不包括

- A. 恶变
- B. 穿孔
- C. 出血
- D. 瘢痕性幽门梗阻
- E. 反酸

【答案】E

14. 不属于白血病细胞浸润的表现是

- A. 肝脾淋巴结肿大
- B. 骨骼和关节疼痛
- C. 肺脏浸润表现
- D. 脾及黏膜浸润
- E. 眼眶骨膜浸润

【答案】C

15. 颅内压增高明显时, 应避免

- A. CT 检查
- B. MRI 检查
- C. 腰椎穿刺
- D. 脑血管造影
- E. 颅脑多普勒检查

【答案】C

16. 洋地黄中毒的主要表现不包括

- A. 恶心、呕吐
- B. 室性早搏
- C. 水肿、蛋白尿
- D. 黄视或绿视
- E. 视力模糊

【答案】C

17. 关于革兰阳性球菌感染的临床表现, 错误的是

- A. 发热呈间歇热
- B. 面色潮红
- C. 腹泻
- D. 皮疹
- E. 形成转移性脓肿

【答案】A

18. 关于新生儿坏死性小肠结肠炎的临床表现, 不正确的是

- A. 常有窒息史
- B. 以腹痛起病
- C. 腹胀
- D. 呕吐
- E. 便血

【答案】A

19. 根据《阿拉木图宣言》护理保健工作可分为四个方面, 不包括

- A. 维持健康
- B. 促进健康
- C. 预防保健
- D. 合理治疗
- E. 社区康复

【答案】A

20. 塞利 (Selye) 认为应激下, 警告期常出现的症状, 不包括

- A. 血糖降低
- B. 血压升高
- C. 心跳加快
- D. 肌肉紧张度增加
- E. 脉搏加快

【答案】A

21. 对患者进行口服给药健康教育, 不正确的是

- A. 需吞服的药物通常用温开水送服, 也可以用茶水服用
- B. 缓释片、肠溶片、胶囊需要嚼碎, 以便吸收
- C. 健胃药宜在饭后服用

- D. 磺胺药, 因需保证药效, 服药后不宜饮水
E. 服强心苷类药物时, 心率低于 60 次/分或节律异常, 应停药并报告医生

【答案】A

22. 社区健康促进不包括

- A. 慢性病治疗 B. 社区健康教育
C. 合理营养教育 D. 让社区居民养生
E. 给社区居民提健康建议

【答案】A

★今年考题出现的“表现”

1. 慢性胃炎最常见的临床表现是

- A. 上腹饱胀不适、疼痛 B. 无症状
C. 饥饿痛、夜间痛 D. 呕吐咖啡色液体
E. 反复黑便

【答案】A

2. 普通感冒的主要临床表现是

- A. 喉炎 B. 肺炎
C. 胸膜炎 D. 支气管炎
E. 鼻咽部炎

【答案】E

3. 中枢性呼吸衰竭的突出症状是

- A. 呼吸节律不规则 B. 呼吸时出现三凹征
C. 鼻翼扇动 D. 呼吸表浅
E. 呼吸频率加快

【答案】A

4. 慢性支气管炎发展为阻塞性肺气肿突出的症状是

- A. 反复咳嗽, 进行性加剧
B. 反复感染, 咯血
C. 发热、咳嗽、咳脓痰
D. 呼吸困难、咳大量脓痰
E. 逐渐加重的呼吸困难

【答案】E

5. 早期食管癌的症状是

- A. 恶心、呕吐 B. 持续胸背痛
C. 黑便 D. 吞咽哽噎感
E. 进行性吞咽困难

【答案】D

6. 内囊病变引起的瘫痪表现为

- A. 单瘫 B. 偏瘫
C. 截瘫 D. 四肢瘫
E. 交叉瘫

【答案】B

7. 小儿头皮静脉如果误入动脉可表现为

- A. 无大变化 B. 充血, 发绀
C. 条索状红线 D. 苍白、水肿
E. 呈树枝分布状苍白

【答案】E

★今年考题出现的“特点”

1. T 管拔管前试行夹管后应特别注意观察的是

- A. 饮食、睡眠 B. 神志、血压和脉搏
C. 大便的颜色 D. 腹痛、发热、黄疸
E. 引流口有无渗液

【答案】D

2. 3~6 个月患儿, 维生素 D 缺乏性佝偻病多见的骨骼改变是

- A. 方颅 B. 颅骨软化
C. 肋骨串珠 D. 手镯、脚镯征
E. 下肢畸形

【答案】B

3. 患者女, 38 岁。每次餐后 30~60 分钟上腹部有烧灼感, 持续 1~2 小时, 此时腹痛特点应考虑

- A. 慢性胃炎 B. 食管炎
C. 胃溃疡 D. 十二指肠溃疡
E. 胰腺炎

【答案】C

4. 符合绞窄性肠梗阻的辅助检查结果是

- A. 血红蛋白降低
B. 血白细胞和中性粒细胞正常
C. 尿比重降低
D. 直肠指检时指套染红
E. X 线腹部平片可见多个阶梯状排列的气液平面

【答案】E

5. 在有创面的部位做热敷应特别注意

- A. 受敷部位下垫橡胶单和治疗单
B. 测量尿量
C. 注意患者病情
D. 测量体温
E. 测量血压

【答案】A

6. 超声雾化吸入特点是

- A. 雾量恒定, 方便使用
B. 雾滴细小但不均匀
C. 气雾滴随呼吸最终可以到达段支气管
D. 气雾通过导管随病人吸气达到肺泡
E. 产生气雾温度低, 治疗后不易受凉

【答案】D

★今年考题出现的“数据”

1. 因抢救病人未能及时书写病历的,应在多长时间内补齐
- A. 6 小时 B. 12 小时
- C. 24 小时 D. 48 小时
- E. 2 周

【答案】A

2. 水痘病人呼吸道隔离至
- A. 出疹后 14 天 B. 出疹后 7 天
- C. 皮疹全部结痂后 7 天 D. 皮疹全部结痂后 3 天
- E. 皮疹全部消退

【答案】B

3. 葡萄胎清宫术后随访时间至少为
- A. 1 年 B. 2 年
- C. 3 年 D. 4 年
- E. 5 年

【答案】B

4. 按吸气性呼吸困难的轻重,临床上讲喉梗阻分为
- A. 2 度 B. 3 度
- C. 4 度 D. 5 度
- E. 6 度

【答案】C

5. 适于非手术治疗的结石直径应小于
- A. 0.6cm B. 1.0cm
- C. 1.5cm D. 2.0cm
- E. 2.5cm

【答案】B

6. 病毒性心肌炎患儿卧床休息至热退后
- A. 1~2 周 B. 3~4 周
- C. 5~6 周 D. 7~8 周
- E. 9~10 周

【答案】B

7. 患者女,45 岁。急性腹膜炎入院已休克。现取中凹卧位,具体是
- A. 上身抬高 5°~10°、下肢抬高 10°~20°
- B. 上身抬高 5°~10°、下肢抬高 20°~30°
- C. 上身抬高 10°~15°、下肢抬高 20°~30°
- D. 上身抬高 15°~20°、下肢抬高 15°~25°
- E. 上身抬高 20°~25°、下肢抬高 20°~25°

【答案】C

8. 胆总管探查术后,拔除 T 管应至少术后
- A. 3 天 B. 7 天
- C. 14 天 D. 21 天
- E. 28 天

【答案】C

9. 急性特发性血小板减少性紫癜的血小板计数一般是

- A. 小于 $20 \times 10^9/L$ B. 小于 $30 \times 10^9/L$
- C. 小于 $40 \times 10^9/L$ D. 小于 $50 \times 10^9/L$
- E. 小于 $60 \times 10^9/L$

【答案】A

10. 重症肺炎患儿静脉给药时间应持续至体温正常后
- A. 1~2 天 B. 3~4 天
- C. 5~7 天 D. 3~5 天
- E. 8~10 天

【答案】C

11. 晚期产后出血是指分娩多长时间后,在产褥期内发生了大量出血
- A. 2 小时 B. 8 小时
- C. 12 小时 D. 16 小时
- E. 24 小时

【答案】E

12. 静脉点滴 10% 葡萄糖液 200ml,其中 10% 氯化钾的最大量为
- A. 2ml B. 3ml
- C. 4ml D. 5ml
- E. 6ml

【答案】E

13. 保存移植器官的灌流液温度是
- A. -4℃ B. 0℃
- C. 4℃ D. 20℃
- E. 36℃

【答案】C

14. 通常对开放性损伤进行清创,不宜晚于
- A. 立即进行 B. 伤后 3~5 小时
- C. 伤后 6~8 小时 D. 伤后 12 小时
- E. 伤后 24 小时

【答案】C

15. 心跳呼吸停止后,脑细胞开始死亡的时间是心跳呼吸停止
- A. 1~3min B. 4~6min
- C. 7~9min D. 10~12min
- E. 13~15min

【答案】B

16. 已打开过而未被污染的无菌包,其有效的使用时间为
- A. 4h B. 8h
- C. 12h D. 16h
- E. 24h

【答案】A

17. 患者男,36 岁。甲肝。出院后床单位算是暴晒几小时
- A. 2 小时 B. 4 小时

- C. 5 小时
E. 8 小时
【答案】D
- D. 6 小时

18. 尿 17 - 酮类固醇、儿茶酚胺和尿钙等测定时, 每 1000ml 尿中加入浓盐酸防腐需要

- A. 1ml
C. 3ml
E. 10ml
- B. 2ml
D. 5ml

【答案】D

19. 妊娠期血容量增加, 产后恢复至未孕状态所需的时间是

- A. 1~2 周
C. 3~5 周
E. 2~3 周
- B. 3~4 周
D. 4~5 周

【答案】E

20. 初孕妇初次能感觉胎动的时间是

- A. 14~16 周
C. 18~20 周
E. 24 周以上
- B. 15~18 周
D. 20~24 周

【答案】C

21. 5 岁孩子估计的收缩压 (mmHg) 是

- A. 70
C. 90
E. 110
- B. 80
D. 100

【答案】C

22. 为病人进行鼻饲时, 要求每次鼻饲量不应超过

- A. 100ml
C. 200ml
E. 300ml
- B. 150ml
D. 250ml

【答案】C

23. 世界上第一所正式的护士学校成立于

- A. 1860 年
C. 1907 年
E. 1984 年
- B. 1888 年
D. 1920 年

【答案】A

★今年考题出现的“主要”

1. 肾功能衰竭贫血的主要原因是

- A. 红细胞溶血
C. 红细胞生成素减少
E. 骨髓造血组织减少
- B. 慢性失血
D. 营养不良

【答案】C

2. II 型呼吸衰竭患者维持呼吸中枢的兴奋主要靠

- A. CO_2 对呼吸中枢的刺激

- B. CO_2 对外周化学感受器的刺激
C. 缺氧对呼吸中枢的刺激
D. 缺氧对外周化学感受器的刺激
E. 缺氧和 CO_2 对呼吸中枢的刺激

【答案】D

3. 决定心脏病患者是否妊娠、婚育主要根据

- A. 生育史
C. 心脏病的种类
E. 治疗情况
- B. 家族史
D. 心功能分级

【答案】D

4. 抗幼年类风湿关节炎治疗的主要药物是

- A. 青霉素
C. 水杨酸制剂
E. 维生素 D
- B. 红霉素
D. 维生素 C

【答案】C

5. 抗甲状腺药物的副作用主要是

- A. 皮肤瘙痒
C. 中毒性肝炎
E. 粒细胞减少
- B. 剥脱性皮炎
D. 心绞痛

【答案】E

6. 产后乳汁分泌量主要取决于

- A. 乳房发育情况
C. 产后营养状况
E. 新生儿吸吮刺激
- B. 产妇健康情况
D. 新生儿发育情况

【答案】E

7. 患者男, 34 岁。腰麻下行下肢手术, 术后发生尿潴留, 其主要原因是

- A. 手术部位疼痛
C. 不习惯卧床排尿
E. 心理因素
- B. 不习惯病室排尿
D. 神经被阻滞

【答案】D

★今年考题出现的“诊断”

1. 患者女, 44 岁。1 周前获知自己患肺癌, 情绪变化很大, 患者常向医务人员及家属发脾气, 对医务人员工作十分挑剔, 此时患者的心理反应是

- A. 接受期
C. 协议期
E. 否认期
- B. 忧郁期
D. 愤怒期

【答案】D

2. 患者女, 28 岁。患风湿性心脏病 3 年。心悸、气短加重 1 周。T 36.8℃, 双下肺闻湿啰音, 双下肢水肿。诊断考虑

- A. 风湿活动
C. 上呼吸道感染
- B. 急性心肌炎
D. 心力衰竭

E. 呼吸衰竭

【答案】D

3. 患儿, 2 岁。近 1 个月低热、咳嗽, 夜间多汗, 消瘦。胸片可见“哑铃状”双极阴影, 结核菌素试验(+++), 未接种过卡介苗, 最可能的诊断是

A. 结核性胸膜炎
B. 纤维空洞型肺结核
C. 原发型肺结核
D. 干酪性肺结核
E. 粟粒型肺结核

【答案】C

4. 2 个月患儿, 人工喂养, 近 2 日口腔黏膜上出现白色乳凝块样物, 不痛, 用棉签不易拭去, 强行剥脱后, 局部黏膜潮红粗糙, 有渗血。最可能的是

A. 单纯性口炎
B. 鹅口疮
C. 疱疹性口炎
D. 溃疡性口炎
E. 卡他性口炎

【答案】B

5. 患儿男, 7 岁。1 周前双下肢突然出现密集紫癜样皮疹, 皮疹突出皮肤, 对称分布, 伴有痒感; 数日后皮疹逐渐消退, 昨晚进食鱼虾后皮疹又再次出现, 并伴有脐周明显疼痛和恶心呕吐。查大便隐血阳性。最可能的诊断是

A. 急性肠炎
B. 暴发性脑膜炎
C. 特发性血小板减少性紫癜
D. 皮肤黏膜淋巴结综合征
E. 过敏性紫癜

【答案】E

6. 患者男, 45 岁。突然出现胸部疼痛, 向腹部放射, 伴恶心、呕吐急诊入院, 患者紧张、大汗、濒死感。心电图: II、III、aVF 导联 ST 段弓背样抬高。初步诊断

A. 急性阑尾炎
B. 不稳定心绞痛
C. 急性胃炎
D. 急性胆囊炎
E. 急性心肌梗死

【答案】E

7. 患者男, 60 岁。1 周来因心源性昏厥发作两次来诊, 下列哪项心律失常容易引起此征

A. 心房纤颤
B. 三度房室传导阻滞
C. 左前分支阻滞合并右束支阻滞
D. 阵发性室上性心动过速
E. 频发室性早搏

【答案】B

8. 患者女, 24 岁。未婚。面部出现严重蝶形红斑, 且长期不规则低热, 最优护理诊断是

A. 体温过高
B. 疼痛
C. 活动无耐力
D. 自我形象紊乱
E. 知识缺乏

【答案】D

9. 诊断关节脱位最可靠的方法是

A. 外伤史
B. 疼痛
C. 局部压痛
D. 功能障碍
E. X 线检查

【答案】E

10. 诊断感染性心内膜炎最可靠的是

A. 心电图
B. 超声心电图
C. X 线检查
D. 血培养
E. 免疫学检查

【答案】D

11. 血清白蛋白显著降低应考虑

A. 肝硬化
B. 肺炎
C. 支气管炎
D. 哮喘
E. 贫血

【答案】A

12. 粒细胞核左移提示

A. 过敏
B. 脱水
C. 失血
D. 感染严重
E. 酸中毒

【答案】D

13. 明确诊断风湿性心脏病的检查是

A. X 线
B. 超声心电图
C. 心电图
D. 心肌酶
E. 血沉

【答案】D

14. 患者女, 50 岁。在家燃煤取暖突然昏迷, 出现面色潮红, 口唇呈樱桃红色, 多汗, 神志不清伴发热, 确诊的检查是

A. 胸部 CT
B. 胸部 MRI
C. 血清碳氧血红蛋白测定
D. 全血胆碱酯酶活力测定
E. 脑电图检查

【答案】C

15. 患者女, 40 岁。因严重呼吸困难入院。查体: T 39.5℃, P 90 次/分, BP 116/80mmHg, 血气分析: PaO₂ 55mmHg, PaCO₂ 30mmHg, 该患者应考虑为

A. 急性肾衰
B. 急性呼吸窘迫综合征
C. 弥漫性血管内凝血
D. 急性肝衰竭
E. 急性心力衰竭

【答案】B

16. 初产妇, 27 岁。2 天前自觉胎动频繁, 未就诊。今晨胎动消失, 胎儿可能出现了

- A. 胎心加快
C. 肠蠕动减慢
E. 肾小球滤过率升高
- B. 胎儿死亡
D. 呼吸运动表浅

【答案】B

17. 需要采血清标本的是

- A. 测定血沉
C. 测定血清酶
E. 测定血尿素氮
- B. 测定血氨
D. 测定血氧分压

【答案】C

18. 患者男, 55 岁。近来消瘦, 大便隐血阳性, 诊断为胃癌。患者出现了心理障碍, 有利于患者应对的转机是

- A. 出现迁怒行为不要太多责怪
B. 不必纠正患者抑郁
C. 出现愤怒时立即制止
D. 满足患者提出治疗要求
E. 告知患者全部病人都会死亡

【答案】A

★今年考题出现的“机制”

1. 腰椎穿刺后的病人颅内压过低引起头痛的机制是

- A. 脑部血液循环障碍
C. 脑部缺血、缺氧
E. 脑膜受刺激
- B. 脑代谢障碍
D. 牵张颅内静脉窦和脑膜

【答案】D

★今年考题出现的“体位”

1. 左下肺叶支气管扩张病人, 体位引流应采取

- A. 平卧位
C. 头低仰卧位
E. 头低右侧卧位
- B. 头低俯卧位
D. 头低左侧卧位

【答案】D

2. 患者男, 68 岁。有高血压病史已经 30 年, 晚餐时突然昏倒, 伴呕吐送来急诊, 以“脑出血”收住院。护理体检: 颜面潮红, 呼吸深, 脉搏 60 次/分, 血压 210/120mmHg, 颈软, 左上肢不能动, 对疼痛刺激无反应, 小便失禁。错误的护理措施是

- A. 保持安静避免搬运
B. 保持呼吸道通畅
C. 每 30 分钟测一次血压, 待稳定后适当减少测量次数
D. 药物调控血压, 但不能使血压下降过多
E. 头低位以免脑出血

【答案】E

3. 乳癌淋巴转移最常见的部位是

- A. 腋窝
C. 锁骨上
E. 肝脏
- B. 锁骨下
D. 胸骨旁

【答案】A

4. 对于阴道后壁修补术后护理, 错误的是

- A. 头低足高位
C. 保持外阴清洁
E. 治疗慢性咳嗽
- B. 保持大便通畅
D. 避免使用腹围

【答案】A

5. 患者女, G1P0, 孕 34⁺₅, 无任何诱因出现较多液体自阴道流出。产科检查: 有宫缩, 胎先露高浮, 考虑胎膜早破。护士指导孕妇应绝对卧床, 采取的体位是

- A. 左侧卧位
C. 俯卧
E. 坐位
- B. 平卧
D. 右侧卧位

【答案】B

6. 患者男, 45 岁。血尿半个月, 每次均为初血尿。出血部位在

- A. 前尿道
C. 膀胱颈部
E. 肾脏
- B. 后尿道
D. 膀胱三角

【答案】A

7. 冠心病舌下给药的最佳体位

- A. 仰卧位
C. 俯卧位
E. 端坐位
- B. 侧卧位
D. 半卧位

【答案】D

8. 阿米巴痢疾患者的灌肠卧位

- A. 右侧卧位
C. 俯卧位
E. 膝胸卧位
- B. 左侧卧位
D. 仰卧位

【答案】A

★今年考题出现的“概念”

1. 患者, 女性, 56 岁, 客家人, 因急性胆囊炎入院。与护士沟通能听懂大部分普通话, 但是不会说。护士应注意使用的沟通技巧是

- A. 反馈
C. 提问
E. 核对
- B. 鼓励
D. 倾听

【答案】A

2. 护理程序的基本框架理论是

- A. 沟通理论
C. Orem 自理理论
E. 基本需要层次论
- B. 一般系统论
D. 应激与适应理论

【答案】B

3. 接触传染的是

- A. 疖
C. 丹毒
- B. 痢
D. 气性坏疽

E. 急性淋巴结炎

【答案】C

4. 心功能评估的依据是

- A. 病程长短
- B. 活动能力
- C. 有无合并症
- D. 心脏体征
- E. 辅助检查资料

【答案】B

5. 室颤先兆的心律失常是

- A. 房性早搏
- B. 窦性心动过速
- C. 多源性室性早搏
- D. 室性早搏 2 次/分
- E. 阵发性室上性心动过速

【答案】C

6. 产程划分中, 宫颈扩张是指

- A. 从规律宫缩开始至宫口开大 10cm
- B. 从规律宫缩开始至宫口开大 20cm
- C. 从宫颈扩张 3cm 至宫颈扩张 10cm
- D. 从规律宫缩开始至胎儿娩出
- E. 从宫颈口开全至胎儿娩出

【答案】A

7. 需要时 (长期) 医嘱的缩写是

- A. hs
- B. qn
- C. prn
- D. sos
- E. st

【答案】C

8. 比陈述事实高一层的沟通是

- A. 分享感受
- B. 一致性沟通
- C. 一般性沟通
- D. 要点式沟通
- E. 分享个人的想法

【答案】E

★今年考题出现的“病因”

1. 白血病患者, 出现出血及发热。发热的原因是

- A. 血小板少
- B. 骨髓被破坏
- C. 出血被吸收
- D. 红细胞破坏多
- E. 细菌感染

【答案】C

2. 患者男, 35 岁。因车祸 10 小时入院。入院后给予留置导尿管, 引流出暗红色小便 20ml, 经尿管注水 200ml, 5 分钟后用力抽出, 仅能抽出 100ml, 此现象提示该患者出现了

- A. 骨盆骨折
- B. 失血性休克
- C. 上尿路损伤
- D. 尿道损伤
- E. 膀胱损伤

【答案】E

3. 肝后型门静脉高压症的病因包括

- A. 血吸虫病肝硬化
- B. 布加综合征
- C. 肝门区肿瘤压迫
- D. 肝外门静脉血栓形成
- E. 肝炎后肝硬化

【答案】B

4. 手术后易引起尿潴留的是

- A. 脊柱手术
- B. 胆道手术
- C. 胃肠道手术
- D. 肛门会阴手术
- E. 双下肢手术

【答案】A

★今年考题出现的“目的”

1. 患者经抢救无效死亡, 头下垫小枕头的目的是

- A. 保持舒适
- B. 易于辨认
- C. 防止面部淤血
- D. 保持正确姿势
- E. 尊重死者

【答案】C

2. 出现链霉素过敏反应时, 使用葡萄糖酸钙的目的是

- A. 收缩血管, 增加外周阻力
- B. 控制支气管平滑肌
- C. 减轻毒性症状
- D. 抗低血压
- E. 抗心律失常

【答案】C

★今年考题出现的“属于”

1. 适应模式是由谁提出的

- A. 纽曼
- B. 佩皮劳
- C. 罗伊
- D. 马斯洛
- E. 奥伦

【答案】C

2. 患者女, 45 岁。因尿毒症肾移植, 肾来源于患者的姐姐。该移植属于

- A. 自体移植
- B. 同质移植
- C. 同种异体移植
- D. 异种移植
- E. 亲属移植

【答案】C

3. 属于血液系统监护检查的是

- A. 血尿素氮
- B. 血肌酐
- C. 血小板
- D. 血糖
- E. 血氨

【答案】C

4. 抗癌药阿奇霉素属于

- A. 激素类
- B. 抗代谢类
- C. 烷化剂
- D. 抗生素类
- E. 植物药类

【答案】D