

医生医教研, MIMS帮你搜

MIMS.com

中国药品手册 · 第29版 · 2009

息息相关 | 得心应手



新!

紧跟医改的迈进步伐, 熟知新颁布的
“国家基本药物”

- 请参阅本刊中“国家基本药物及其零售
指导价”章节

全!

“商品名及通用名索引”中列出
上万个国家药监局批准的药品

- 了解各药物活性成份的可选药物

多!

刊物、网站、光盘三为一体

- 方便医务人员通过多种途径获取
医药信息





www.mims.com

中国药品手册

MIMS

第29版

2009年 第2册

MIMS创刊于1970年

上海办事处

上海市威海路511号

绅士大厦1705室

邮编: 200041

电话: (021) 5213 6622

传真: (021) 5213 6621

北京办事处

北京市朝阳区东三环中路39号

建外SOHO 18号楼1902室

邮编: 100022

电话: (010) 5869 4691/2/3/4

传真: (010) 5869 4695

珠海办事处

珠海市香洲区人民东路125号

工商大厦1506B室

邮编: 519001

电话: (0756) 811 6841

传真: (0756) 811 6842

总经理

张慧珠

市场服务

范少娥 / 耿林娜 / 陈宇梅 / 杨杨

市场推广

沈怡

发行

肖洁

出版公司

CMPMedica Pacific Ltd

美迪医讯亚太有限公司

香港湾仔轩尼诗道338号

北海中心9楼

电话: (852) 2559 5888

传真: (852) 2559 6910

电邮: enquiry.cn@asia.cmpmedica.com

出版人

杨应标

区域运作总监

邱亨达

主编

梁慧芬

编辑

李丹 / 韩静芳 / 刘培英 / 蓝雅仪 / 黄惠萍

制作

余福钧 (经理)

何伟雄

李素丽

美工与排版

沈秀音 (经理)

尤俪哗

李彩玲

洪静芬

李俪燕

钱俪仙

信息管理

黄丽君

徐位峰

翁健祥



CMPMedica

United Business Media

CMPMedica全球发行的药品手册

MIMS系列 - 中国及香港、台湾、澳大利亚、
孟加拉、韩国、印尼、马来西亚、缅甸、新西兰、
菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国、越南

Arzneimittel Kompendium - 瑞士

CIMS - 印度

Gelbe Liste - 德国

Medex-Medasso, Hopitex - 比利时、荷兰

Pharmindex - 波兰、匈牙利

Simposium Terapêutico - 葡萄牙

Vademecum - 西班牙

Vidal - 白俄罗斯、哈萨克斯坦、法国、俄国、越南、
乌兹别克斯坦

ISSN 1025-4234

目录

CONTENTS

MIMS 药品手册查阅指南 (用法指导) How To Use	A5
MIMS 药物分类索引 (产品的药理分类) MIMS Classification Index	A8
缩写索引 (本刊所用的缩写字和符号) Abbreviation Index	A11
国家基本药物及其零售指导价格 (2009 年版) 新 Essential Drug & Price Index	A13
国家基本医疗保险和工伤保险药品目录 (2004 年版) Insurance Drug Index	A42
更新内容统计资料 New In This Issue	A70
新产品篇 (新上市的产品介绍) New Preparations	
• 新成份	A70
• 新配方	A88
• 新品牌	A89
• 新剂型	A89
药物特性一览表 Summary Tables	
• 高血压的治疗药物 更新	A90
• 抗凝血药物 更新	A91
• 用于流感的抗病毒药物 更新	A92
产品篇 (简明实用的产品处方信息) Product Information Section	1
• 请登录MIMS网站 (www.mims.com) 或参阅 《MIMS中国药品手册年刊》查阅更多、更详细的药品信息	
药商索引 - 制造商和代理 / 经销商 Company Index - Manufacturers & Distributors	B1
药商通讯录 (制造商、代理/经销商的联络信息) Company Directory	B6
商品名及通用名索引 (以产品名称的汉语拼音顺序排列) Brand & Generic Name Index	B35
• 包括所有刊登于本刊和MIMS网站的上万个药品名称	

MIMS 药物分类索引

MIMS CLASSIFICATION INDEX

统列本刊所采用的药理分类及其副分类, 以及同类药物所在的页码。

This index lists major pharmacological classes and sub-classes with corresponding page references.

1. 消化系统 GASTROINTESTINAL & HEPATOBIILIARY SYSTEM

- a. 抗酸、抗反流和治疗
消化性溃疡的药物
Antacids & Antiulcerants 2
- b. 胃肠调节药,
治疗腹胀和抗炎药
GIT Regulators,
Antiflatulents &
Anti-inflammatories 8
- c. 解痉药
Antispasmodics 11
- d. 止泻药
Antidiarrheals 12
- e. 缓泻剂和泻药
Laxatives, Purgatives 13
- f. 助消化药
Digestives 15
- g. 利胆剂、胆石溶解剂和
保肝药
Cholagogues,
Cholelitholytics &
Hepatic Protectors 16
- h. 肛用制剂
Anorectal Preparations 19
- i. 止吐药
Antiemetics 20
- j. 其他消化系统用药
Other Gastrointestinal
Drugs -

2. 心血管和造血系统 CARDIOVASCULAR & HEMATOPOIETIC SYSTEM

- a. 心功能不全和心律失常用药
Cardiac Drugs 21
- b. 抗心绞痛药
Anti-Anginal Drugs 25
- c. 血管紧张素转换酶抑制剂
ACE Inhibitors 28
- d. β -受体阻滞剂
Beta-Blockers 32
- e. 钙拮抗药
Calcium Antagonists 36

- f. 血管紧张素 II 受体拮抗剂
Angiotensin II
Antagonists 40
- g. 其它降压药
Other Antihypertensives ... 43
- h. 利尿药 Diuretics 46
- i. 抗利尿剂 Antidiuretics 48
- j. 周围血管扩
张药和脑激活剂
Peripheral Vasodilators &
Cerebral Activators 49
- k. 血管收缩剂
Vasoconstrictors 52
- l. 调脂药物
Dyslipidaemic Agents 52
- m. 止血剂 Haemostatics 57
- n. 抗凝血、抗血小板和
纤维蛋白溶解剂
Anticoagulants, Antiplatelets
& Fibrinolytics
(Thrombolytics) 60
- p. 静脉炎和静脉曲张用药
Phlebitis & Varicose
Preparations 66
- q. 影响血液流变学状况的制剂
Haemorrhheologicals 67
- r. 影响血液及造血系统的药物
Haematopoietic Agents 67
- s. 用于心血管疾病的其它药物
Other
Cardiovascular Drugs 69

3. 呼吸系统 RESPIRATORY SYSTEM

- a. 呼吸兴奋剂
Respiratory Stimulants 71
- b. 平喘药及慢阻肺用药
Antiasthmatic &
COPD Preparations 71
- c. 止咳祛痰和感冒药
Cough & Cold
Preparations 78
- d. 治疗鼻塞和其它鼻腔用药
Nasal Decongestants &
Other Nasal
Preparations 82
- e. 作用于呼吸系统的其它药物
Other Drugs Acting on
the Respiratory System 83

4. 中枢神经系统 CENTRAL NERVOUS SYSTEM

- a. 抗焦虑药
Anxiolytics 84
- b. 镇静催眠药
Hypnotics &
Sedatives 86
- c. 抗抑郁药
Antidepressants 89
- d. 抗精神病药
Antipsychotics 95
- e. 抗癫痫和抗惊厥药
Anticonvulsants 102
- f. 治疗多动障碍和其他
中枢神经系统用药
Other CNS Drugs &
Agents for ADHD 106
- g. 治疗神经退变性疾病制剂
Neurodegenerative
Disease Drugs 107
- h. 抗震颤麻痹药
Antiparkinsonian
Drugs 108
- i. 治疗眩晕用药
Antivertigo Drugs 111
- j. 麻醉性镇痛药
Analgesics (Opioid) 112
- k. 解热镇痛和
其他镇痛药
Analgesics
(Non-Opioid) &
Antipyretics 115
- l. 非甾体抗炎药
Nonsteroidal Anti-
inflammatory Drugs
(NSAIDs) 116
- m. 神经痛用药
Drugs For
Neuropathic Pain 123
- n. 偏头痛用药
Antimigraine
Preparations 124
- p. 神经营养剂
Nootropics &
Neurotonics 124

5. 肌肉/骨骼系统 MUSCULO-SKELETAL SYSTEM

- a. 治疗类风湿的药物
Disease-Modifying
Anti-Rheumatic
Drugs (DMARDs) 127
- b. 治疗高尿酸血症和
痛风用药
Hyperuricemia &
Gout Preparations 127
- c. 骨骼肌松弛药
Muscle Relaxants 128
- d. 抗炎酶类
Anti-inflammatory
Enzymes -
- e. 治疗神经肌肉疾病用药
Neuromuscular
Disorder Drugs 131
- f. 其他用于肌肉
骨骼疾病的药物
Other Drugs Acting on
Musculo-skeletal
System 132

6. 激素 HORMONES

- a. 雄激素和相关合成药
Androgens & Related
Synthetic Drugs 133
- b. 雌激素、孕激素及
相关合成药
Oestrogens &
Progesterones &
Related Synthetic
Drugs 134
- c. 复方性激素
Combined Sex
Hormones -
- d. 肾上腺皮质激素
Corticosteroid
Hormones 138
- e. 脑垂体激素和相关药物
Trophic Hormones &
Related Synthetic
Drugs 141
- f. 合成代谢药
Anabolic Agents 145
- g. 其它与激素相关的药物
Other Hormone
Related Drugs 146

7. 避孕制剂 CONTRACEPTIVE AGENTS

- a. 短效口服避孕药
Oral Contraceptives 147
- b. 长效避孕药
Depot Contraceptives 149
- c. 其它避孕药和用品
Other Contraceptives 149

8. 抗微生物药物 ANTI-INFECTIVES (SYSTEMIC)

- a. 氨基糖苷类
Aminoglycosides 150
- b. 头孢菌素类
Cephalosporins 153
- c. 青霉素类
Penicillins 163
- d. 其他 β -内酰胺类
Other Beta-lactams 167
- e. 酰胺醇类
Chloramphenicols 170
- f. 大环内酯类
Macrolides 170
- g. 喹诺酮类
Quinolones 174
- h. 四环素类
Tetracyclines 180
- i. 磺胺药
Sulphonamides 181
- j. 抗菌复合物
Antibacterial Combinations ... -
- k. 其它抗生素
Other Antibiotics 182
- l. 抗结核药
Anti-TB Agents 186
- m. 抗麻风病药
Antileprotics -
- n. 抗真菌药
Antifungals 187
- p. 抗病毒药
Antivirals 190
- q. 驱肠虫/抗吸虫药
Anthelmintics 197
- r. 抗疟药
Antimalarials 198
- s. 抗阿米巴病药
Antiamoebics 199
- t. 治疗其他寄生虫病用药
Other Antiprotozoal
Agents -

9. 肿瘤科用药 ONCOLOGY

- a. 肿瘤化疗用药
Cytotoxic
Chemotherapy 199
- b. 抗肿瘤激素类药物
Hormonal
Chemotherapy 214
- c. 用于肿瘤的免疫疗法
Immunological
Chemotherapy 217
- d. 其他用于肿瘤的药物及
支持疗法
Supportive Care
Therapy 219

10. 泌尿生殖系统 GENITO-URINARY SYSTEM

- a. 用于阴道疾病的制剂
Preparations for
Vaginal Conditions 221
- b. 泌尿道抗菌药
Urinary Antiseptics -
- c. 作用于子宫的药物
Drugs Acting on
the Uterus 222
- d. 勃起功能障碍用药
Drugs for Erectile
Dysfunction 224
- e. 用于膀胱或前列腺
疾患的药物
Drugs for Bladder &
Prostate Disorders 225
- f. 作用于泌尿生殖系统
的其它药物
Other Drugs Acting on
the Genito-Urinary
System 229

11. 内分泌和代谢系统 ENDOCRINE & METABOLIC SYSTEM

- a. 胰岛素制剂
Insulin Preparations 229
- b. 抗糖尿病药物
Antidiabetic Agents 233
- c. 甲状腺素制剂
Thyroid Hormones 237
- d. 抗甲状腺制剂
Antithyroid Agents 238
- e. 治疗肥胖症用药
Anti-obesity Agents 239

This section contains abbreviated prescribing information by pharmacological class. Product entry under each class is mainly by brand name and basic information given includes: manufacturer, distributor (in brackets []), forensic classification, contents, indications, dosage, administration of oral drugs (Pre- & Post-Prandial Advice [PPA]), contraindications, special precautions, adverse reactions, drug interaction, presentation/price, US FDA Pregnancy Category (Pregnancy Safety Index) and cross-reference to MIMS Annual, whenever available.

Product entries listed are sequenced by pharmacological class, within which product entries are sorted by Chinese product names in Chinese phonetic order.

MIMS Specialty Edition (MSE) titles consisting of MIMS Antimicrobial Guide, MIMS Cardiovascular Guide, MIMS Dermatology Guide, MIMS Endocrinology Guide, MIMS Gastroenterology Guide, MIMS Neurology & Psychiatry Guide, MIMS Obstetrics & Gynecology Guide, MIMS Ophthalmology Guide and MIMS Respiratory Guide are included under relevant MIMS sub-classes, where the MSE Chart Titles Cross-Reference features Disease Management Charts that relate to the particular therapeutic class.

The  sign next to the product name indicates that the product belongs to the National Insurance Drug.

Pre- and Post-Prandial Advice (PPA) is now integrated into the product entry of oral medicines under the heading **Administration**. It provides information on the administration of oral medicines in relation to food intake. Please refer to the footer notes whenever available on each page for the detailed definition of food symbols used.

All prices quoted are list prices, unless stated as "nett". Nett price is list price less a company's standard wholesale discount but does not take into consideration any additional discounts such as quantity discounts, bonus offers, periodic offers and cash discounts. As change in prices may take place without notice, prices quoted can only be taken as a guide.

The information is abstracted from the full scientific prescribing information published in MIMS Annual & MIMS Online or from the manufacturer/company's literature. When further details are required, reference to MIMS Annual & MIMS Online or the manufacturer/company should be made.

本章节列出简要的**药物处方信息**，包括药物活性成份、适应症、用法用量和服药时间提示、禁忌、注意事项、不良反应、药物相互作用及包装/价格。某些产品也列出了其详细资料在《MIMS中国药品手册年刊》的页码。

产品简介按其不同药理分类排列，而同类药物则按产品中文名称的汉语拼音顺序排列。

经国家药监局核准的产品信息由药商提供。为方便繁忙的医生在最短时间内迅速找到关键的处方信息，本书仅列出精简的药品资料。若需了解详细处方资料，请参阅《MIMS中国药品手册年刊》、MIMS（敏思）网站或产品说明书。此外，医生已经熟知、适用于所有药物的注意事项和基本医药常识不逐一列在每个产品简介中，例如：

- 已知对某种药物成份过敏者禁止使用含该成份的药物；
- 按照用法用量服用，如服药期间症状加重或出现其他症状，应及时去医院就诊；
- 药品性状发生改变时禁止服用；
- 儿童必须在成人的监护下使用；
- 请将药品存放在儿童不能拿到的地方；
- 如同时服用两种或以上的药物，请事先征求医师或药师的意见，并参阅各药物的说明书；
- 请遵医嘱。

为了帮助医生获得更多的临床实用信息，MIMS药品资料现在可与《MIMS专科用药指南》（《妇产科疾病用药指南》、《呼吸系统疾病用药指南》、《抗微生物药物指南》、《内分泌与代谢疾病用药指南》、《神经与精神疾病用药指南》、《消化系统疾病用药指南》、《心血管疾病用药指南》）交互参照使用。本书在各类药物简介的开始部分，列出了在相关《MIMS专科用药指南》介绍该类药物临床使用信息的相关专题名称。

产品简介中使用的特殊符号：

- ① 产品名称右边的符号①表示该产品为国家医保药品。如果该产品有多个剂型，只要其中1个剂型为医保药品，即列出显示①，以作提醒。
 - ☑ [服药与进食] 中的符号“☑”、“×☑”、“±☑”表示口服药物是否受进食时间的影响。
 - ♀ 表示美国FDA的药物妊娠安全性分级，“♀”之后未列出分级时，请参阅“注意事项”和“禁忌”中的说明。
- 有关其他特殊符号和缩写字请参阅“缩写索引”。

书中仅列药品**零售价**，不包含批发或其他折扣价，诸如大量采购、奖券购买、特卖或现金购买。所列价格可能改变而未能及时更改，故所列价格仅供参考。

1a. 抑酸、抗反流和 治疗溃疡的药物 Antacids & Antulcerants

有关此类药物的临床应用,也可参阅以下《MIMS 专科用药指南》*的相关专题:

- 急性胰腺炎
- 慢性胃炎
- 慢性胰腺炎
- 上消化道出血
- 胃泌素瘤(卓-艾综合征)
- 胃食管反流病
- 消化不良
- 消化性溃疡病

*请参阅: MIMS 消化系统疾病用药指南

爱希 AXID
礼来 Lilly

【成份】尼扎替定 Nizatidine

【适应症】参阅“用量”。

【用法用量】活动性十二指肠溃疡及良性胃溃疡 300 mg qd。维持治疗 150 mg qd。胃食管反流性疾病 成人 150 mg bid。参阅说明书。

【服药与进食】[x⑩]

【注意事项】使用本药后症状改善并不能排除癌症的可能性。中至重度肾功能不全者、妊娠及哺乳妇女慎用。

【不良反应】贫血, 荨麻疹, 出汗。

【包装/零售价】胶囊 150 mg x 6 粒。

FDA 妊娠分级 ♀: B

新内容!

紧跟医改的迈进步伐, 熟知新颁布的“国家基本药物” - 请参阅本刊中“国家基本药物及其零售指导价”章节, 或登录 MIMS.com

下载其电子版

Eisai 卫材(中国)药业有限公司



波利特 PARIET

卫材 Eisai

【成份】雷贝拉唑钠
Na rabeprazole

【适应症】胃、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾氏综合征。

【用法用量】成人推荐剂量为 10 mg qd, 根据病情可增加至 20 mg qd。胃溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎的疗程通常为 8 周, 十二指肠溃疡的疗程通常为 6 周。

【服药与进食】[x⑩]

【注意事项】治疗前应排除胃或食管恶性病变的可能。有药物过敏史、肝功能损伤患者、妊娠和哺乳妇女慎用。不推荐用于儿童。

【不良反应】过敏反应, 心悸, 便秘、腹泻、头痛、浮肿, 白细胞减少, GOT、GPT、总胆红素升高, 蛋白尿。参见产品说明书。

【药物相互作用】本药可引起合用的地高辛血药浓度升高。

【包装/零售价】薄膜衣片 10 mg x 14 片 (¥247)。

FDA 妊娠分级 ♀: B



达克普隆 TAKEPRON

天津武田 Tianjin Takeda

【成份】兰索拉唑 Lansoprazole

【适应症】胃溃疡、十二指肠溃疡、反流性食管炎、卓-艾综合征 (Zollinger-Ellison 症候群)、吻合口溃疡。

【用法用量】成人 30 mg qd。胃溃疡和吻合口溃疡、反流性

食管炎, 连服 8 周, 十二指肠溃疡需连服 6 周。反复发作和复发性反流性食管炎的维持治疗 15 mg qd, 如症状缓解不明显可加量至 30 mg qd。高龄、肝或肾功能障碍患者 15 mg qd。

【服药与进食】[x⑩]: 餐前服用。

【注意事项】有药物过敏史、肝功能障碍、老年患者慎用。因本药会掩盖胃癌的症状, 所以须先排除胃癌, 方可给药。长期使用本品或用于儿童的安全性尚未确立。孕妇慎用, 哺乳妇女服用时应避免哺乳。

【不良反应】过敏反应, 血象异常, 肝功能损害, 偶见便秘、腹泻、口渴、腹胀, 头痛或嗜睡, 发热、血总胆固醇和尿酸升高。

【药物相互作用】勿与硫酸阿托那韦合用。与茶碱类合用可使茶碱血药浓度下降。与他克莫司合用可能会造成其血药浓度的增加。与地高辛、甲基地高辛合用可能会增强这些药物的作用。与依曲康唑、吉非替尼合用可能会削弱这些药物的作用。

【包装/零售价】胶囊 30 mg x 14 粒 (¥183)。

FDA 妊娠分级 ♀: B

参见 www.mims.com, 年刊 2009/2010 第 149 页



Bayer HealthCare

达喜 (原名: 胃达喜) TALCID

拜耳 Bayer

【成份】铝碳酸镁 Hydrotalcitol

【适应症】胆酸相关疾病, 急、慢性胃炎, 反流性食管炎, 胃、十二指肠溃疡, 与胃酸有关的胃部不适症状, 如胃痛、胃灼烧、反酸、酸性暖气、饱胀。预防非甾体类药物的胃粘膜损伤。

【用法用量】1-2 片/次, 3-4 次/天。胃和十二指肠溃疡 2 片/次, 4 次/天。在症状缓解后至少维持 4 周。

所列价格可能改变而未及时修改, 故仅供参考, 请向制造商或经销商查询当令价格。

x⑩ 空腹服用

±⑩ 空腹或餐后服用均可

✓⑩ 进餐时或餐后服用

【服药与进食】 [√①]

【注意事项】 严重心、肾功能不全者，高镁血症、高钙血症患者慎用。

【不良反应】 大剂量服用可能导致软糊状便和大便次数增多，偶见便秘、口干和食欲不振。长期服用可导致血清电解质变化。

【药物相互作用】 可影响四环素、铁制剂、地高辛、法莫替丁、雷尼替丁、西咪替丁和香豆素衍化物的吸收，因此这些药物应提前或推后 1-2 小时服用。

【包装/零售价】 咀嚼片 500 mg x 20 片 (¥28.20)。

FDA 妊娠分级 (♀)

参见 www.mims.com,
年刊 2009/2010 第 159 页

盖世龙 GASLON N

日本新药 Nippon Shinyaku

【潮适医药】

【成份】 马来酸伊索拉定
Irsogladine maleate

【适应症】 胃溃疡；改善急性胃炎、慢性胃炎急性发作期的胃粘膜病变(糜烂、出血、发红、浮肿)。

【用法用量】 4 mg/日、分 1-2 次口服。老年患者从低用量(例如 2 mg/日)开始给药。

【服药与进食】 [±①]

【注意事项】 孕妇、儿童慎用。

【不良反应】 发生率约 0.6%，包括肝酶升高、便秘、腹泻、恶心、呕吐、皮疹、胸部压迫感。

【包装/零售价】 片剂 2 mg x 10 片, 20 片, 100 片。

FDA 妊娠分级 (♀)



高舒达 GASTER

安斯泰来制药 Astellas Pharma

【成份】 法莫替丁 Famotidine

【适应症】 消化性溃疡、急性胃粘膜病变、反流性食管炎、胃泌素瘤。

【用法用量】 20 mg bid, 4-6 周

为一疗程。溃疡愈后的维持量减半。肾功能不全者应调整剂量。

【服药与进食】 [√①：早、晚餐后或睡前服]

【禁忌】 严重肾功能不全者，哺乳期、妊娠期妇女禁用。

【注意事项】 需在排除胃癌诊断后方可使用。肝、肾功能障碍者、婴幼儿、高龄者慎用。

【不良反应】 少见口干、头晕、失眠、便秘、腹泻、皮疹、面部潮红、白细胞减少、偶有轻度转氨酶增高。

【药物相互作用】 可使合用的伊曲康唑血药浓度降低。

【包装/零售价】 片剂 20 mg x 30 片 (¥56.60)。

FDA 妊娠分级 ♀ : B

参见 www.mims.com,
年刊 2009/2010 第 252 页

胶体果胶铋 - 华北制药

COLLOIDAL BISMUTH

PECTIN - NCPC

华北制药 NCPC

【成份】 胶体果胶铋
Colloidal bismuth pectin

【适应症】 慢性胃炎，缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感、反酸。

【用法用量】 成人 150 mg qid。

【服药与进食】 [x①：餐前 1 小时及睡前服用]

【禁忌】 严重肾功能不全及孕妇禁用。

【注意事项】 连续使用不宜超过 7 天，症状未缓解或消失应给予适当诊治。不得与牛奶同服。

【不良反应】 粪便呈黑褐色。

【药物相互作用】 勿与其他铋制剂、强力制酸剂合用。

【包装/零售价】 胶囊 50 mg x 24 粒 (¥19)。

FDA 妊娠分级 (♀)

请参阅《MIMS 药品手册年刊》

或登录 MIMS 网站: www.mims.com

点击“M”图标，了解完整的药品处方和学术资料



上海强生制药有限公司
Shanghai Johnson & Johnson Pharmaceuticals Ltd

兰达 MYLANTA

上海强生制药

Shanghai Johnson & Johnson Pharm

【成份】 碳酸钙 Calcium carbonate (CaCO₃)

【适应症】 缓解由胃酸过多引起的上腹痛、返酸、烧心感和上腹不适等。

【用法用量】 口服。6-11 岁儿童 (22-43.9 kg) 10 mL/次，2-5 岁儿童 (11-21.9 kg) 5 mL/次，饭后 1 小时或需要时按体重或年龄给药，每天不超过 3 次，连续服用最大推荐剂量不超过 14 天。

【服药与进食】 [√①]

【注意事项】 心肾功能不全者慎用；长期大量服用本品应定期测血钙浓度。

【不良反应】 偶见暖气、便秘。大剂量服用可发生高钙血症或碱中毒。

【药物相互作用】 与噻嗪类利尿药合用，可增加肾小管对钙的重吸收。慎与洋地黄类药物合用。

【包装/零售价】 混悬剂 80 mg/mL x 148 mL。

FDA 妊娠分级 ♀ : C

参见 www.mims.com,
年刊 2009/2010 第 406 页

礼先 NOVEK

上海爱的发 Shanghai Ethypharm

【成份】 奥美拉唑 Omeprazole

【适应症】 参阅“用法用量”。

【用法用量】 胃、十二指肠溃疡，应激性溃疡 20 mg qd-bid，胃溃疡的疗程通常为 4-8 周，十二指肠溃疡的疗程通常为 2-4 周。反流性食管炎 20-60 mg qd-bid，疗程通常为 4-8 周。卓-艾氏综合征(胃泌素瘤) 60 mg qd，以后调节剂量为 20-120 mg/日，每日超过 80 mg 时，应分为 2 次服用。

【服药与进食】 [±①]

【禁忌】 严重肾功能不全者及婴幼儿禁用。

♀：美国 FDA 的药物妊娠安全性分级，“♀”之后未列出分级时，参阅“注意事项”和“禁忌”

注意询问药物过敏史，如患者对某一成份过敏，禁用含该成份的药物。

【**注意事项**】肾功能不全及严重肝功能不全者慎用。治疗胃溃疡时，应排除胃癌后才能使用本品。儿童、孕妇一般不用，哺乳妇女慎用。

【**不良反应**】口干、恶心、呕吐、腹胀、便秘、腹泻、腹痛；ALT、AST和胆红素升高。感觉异常、头晕、头痛、嗜睡、失眠、外周神经炎。

【**药物相互作用**】本药可降低洛尼松、地高辛的疗效，影响铁剂、四环素、氨苄西林、酮康唑的吸收，影响环孢素的血药浓度。使用三唑仑、劳拉西洋或氟西洋期间，给以本药可致步态紊乱。

【**包装/零售价**】肠溶胶囊

20 mg × 14 粒。

FDA 妊娠分级 ♀ : C

参见 www.mims.com,
年刊 2009/2010 第 436 页

丽珠胃三联

LIVZON WEISANLIAN

丽珠集团丽珠制药厂

Livzon Pharmaceutical
Factory Zhuhai

【丽珠医药营销有限公司】

【**成份**】4 片白色片 次枸橼酸铋钾 Bismuth subcitrate 110 mg, 2 片黄色片 克拉霉素 Clarithromycin 250 mg, 2 片绿色片 替硝唑 Tinidazole 500 mg

【**适应症**】胃、十二指肠溃疡（伴有幽门螺杆菌感染者）、特别是复发性和难治性溃疡；慢性胃炎（伴有幽门螺杆菌感染者）用一般药物治疗无效而症状又较重者。

【**用法用量**】白色片剂 2 片，每日 2 次，绿色片剂 1 片，每日 2 次，黄色片剂 1 片，每日 2 次。疗程为 1 周。

【**禁忌**】严重肝、肾功能损害者及孕妇、哺乳期妇女。

【**注意事项**】有肝、肾功能损害者及儿童慎用。

【**不良反应**】偶见轻度消化道反应：如口内金属味、恶心、呕吐、便秘、腹泻。过敏反应：如皮疹、荨麻疹。中枢神经反

应：如头痛、头晕、失眠、乏力。深色尿。

【**药物相互作用**】本药中的枸橼酸铋钾不可与牛奶、酒精、碳酸类饮料同时服用。本药中的替硝唑与酒精饮料同服可引起腹部痉挛、面部潮红或呕吐。本药中的克拉霉素能干扰卡马西平的血药浓度，增加其作用，并可能使特非那丁的血药浓度升高。

【**包装/零售价**】薄膜衣片 8 片。
FDA 妊娠分级 (♀)



吴中医药

洛凯 LUOKAI

苏州六药 Suzhou No 6 Pharm

【吴中医药】

【**成份**】奥美拉唑钠

Omeprazole Na

【**适应症**】十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变、复合型溃疡等急性上消化道出血。

【**用法用量**】40 mg/次，每日 1-2 次，溶解于 100 mL 氯化钠注射液静滴，滴注时间不得少于 20 分钟。

【**注意事项**】治疗胃溃疡时应排除胃癌后使用本品。目前尚无儿童使用本品的经验。孕妇及哺乳期妇女慎用。

【**不良反应**】偶有轻微的头晕、恶心。

【**药物相互作用**】与安定、华法令合用时，这些药品应减量。

【**包装/零售价**】注射粉剂

40 mg × 1 支 (¥63.70)。

FDA 妊娠分级 ♀ : C

参见 www.mims.com,
年刊 2009/2010 第 465 页

《MIMS 消化系统 疾病用药指南》

以图表方式显示常见消化系统疾病的内科治疗方案，以及简明扼要的相关药品处方剂量，专为内科和消化科医生制作的临床工具书。

AstraZeneca
阿斯利康
为生命护航

洛赛克 MUPS

LOSEC MUPS

阿斯利康 AstraZeneca

【**成份**】奥美拉唑镁

Omeprazole Mg

【**适应症**】参阅“用法用量”。

【**用法用量**】十二指肠溃疡

20 mg qd，通常 2 周内可治愈。

其它药物治疗无效的十二指肠溃疡：40 mg qd，通常 4 周内可治愈。

胃溃疡 20 mg qd，通常 4 周内可治愈。其它治疗无效的胃溃疡：40 mg qd，通常 8 周内可治愈。

对复发患者可重复予以治疗。根除幽门螺杆菌

本药 20 mg bid，加阿莫西林和

克拉霉素，或克拉霉素和甲硝唑，疗程一般为 1 周。

胃食管反流性病的对症治疗 10-20 mg

qd，疗程一般 2-4 周。反流性

食管炎 20-40 mg qd，疗程一般 4-8 周。

一旦复发，应重复

治疗。卓-艾氏综合征 起始剂

量为 60 mg qd，然后个体化调

整剂量和确定疗程。如每天需

要量超过 80 mg，应分 2 次服

用。预防非留体类抗炎药相关

的胃溃疡、胃黏膜糜烂或消化

不良 20 mg qd。酸相关性消化

不良上腹痛或不适，伴有或不

伴有烧心症状 10-20 mg qd。

参阅产品说明书。

【**服药与进食**】【**Ⓜ**】

【**注意事项**】治疗胃溃疡时，必

须先排除恶性肿瘤。对经内镜

确诊食管炎而长期服用本药者，

每天 10 mg 较每天 20 mg 治疗

的缓解率低，每天服用 10 mg

者应定期进行内镜监测。哺乳

期妇女慎用。严重肝功能损害

者每日用量不超过 20 mg。参

阅产品说明书。

【**不良反应**】常见头痛和胃肠道

症状，罕见过敏反应、脱发、

关节痛、肌肉疲劳、肌痛、头

晕、感觉异常、嗜睡、乏力、

可逆性精神错乱、口干、口炎、

念珠菌病、肝性脑病、男子女

性型乳房、血象异常、多汗、

所列价格可能改变而未及时修改，故仅供参考，请向制造商或经销商查询当令价格。

Ⓜ 空腹服用

Ⓜ 空腹或餐后服用均可

Ⓜ 进餐时或餐后服用

外周水肿、视力模糊、味觉异常和低钠血症。参阅产品说明书。

【药物相互作用】应避免和酮康唑或依曲康唑合用。

【包装/零售价】片剂 10 mg x 7 片 (¥64.90), 20 mg x 7 片 (¥115), 14 片 (¥215)。

FDA 妊娠分级 ♀ : C

参见 www.mims.com,

年刊 2009/2010 第 466 页



洛赛克针剂

LOSEC INJECTION/

LOSEC INFUSION

阿斯利康 AstraZeneca

【成份】奥美拉唑钠

Omeprazole Na

【适应症】消化性溃疡出血、吻合口溃疡出血。应激状态时并发的急性胃黏膜损害、非甾体类抗炎药引起的急性胃黏膜损伤。预防重症疾病（如脑出血、严重创伤等）及胃手术后引起的上消化道出血等；全麻或大手术后、衰弱、昏迷患者防止胃酸反流合并吸入性肺炎；作为当口服疗法不适用时下列病症的替代疗法：十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及卓-艾氏综合征。

【用法用量】静脉注射剂 40 mg/次，缓慢静脉注射，每日 1-2 次。

静脉滴注剂 40 mg/次，在 20-30 分钟或更长时间内静脉滴注，每日 1-2 次。

【不良反应】常见头痛、腹泻、便秘、腹痛、恶心/呕吐。罕见可逆性精神错乱、口干、口炎、胃肠道念珠菌感染、白细胞减少、粒细胞缺乏症、过敏反应。参阅产品说明书。

【药物相互作用】本药会延长其它酶降解物如地西洋、华法林及苯妥英的清除。

【包装/零售价】静脉注射剂 40 mg x 1 瓶 (¥143)。静脉滴注剂 40 mg x 1 瓶 (¥143)。

FDA 妊娠分级 ♀ : C

参见 www.mims.com,

年刊 2009/2010 第 468 页

膜固思达 MUCOSTA

浙江大家 Otsuka

【成份】瑞巴派特 Rebamipide

【适应症】胃溃疡、急性胃炎、慢性胃炎的急性加重期胃粘膜病变的改善（糜烂、出血、充血、水肿）。

【用法用量】成人 100 mg tid，早、晚及睡前口服。

【服药与进食】(±④)

【注意事项】孕妇或可能已怀孕的妇女，只有治疗的益处大于危险性时才可使用。哺乳期妇女用药时应避免哺乳。儿童用药的安全性尚未确认。

【不良反应】便秘、腹胀、腹泻、恶心、呕吐、烧心、腹痛、嗝气、味觉异常。月经异常、BUN 上升、浮肿、咽喉部异物感。白细胞或粒细胞减少。肝功能障碍、皮疹等过敏症状。上述不良反应发生率均在 0.1% 以下。偶发舌麻、血小板减少、黄疸、心慌。

【包装/零售价】薄膜包衣片 100 mg x 12 片 (¥26.50)。

FDA 妊娠分级 (♀)



耐信 NEXIUM

阿斯利康 AstraZeneca

【成份】埃索美拉唑镁

Esomeprazole Mg

【适应症】参阅“用法用量”。

【用法用量】胃食管反流病 反流性食管炎的治疗：40 mg qd，连服 4 周，对于食管炎未治愈或持续有症状者，建议再服 4 周。已经治愈的食管炎患者预防复发的长期治疗：20 mg qd。胃食管反流性疾病的症状控制 - 没有食管炎的患者：20 mg qd。如果用药 4 周症状未获控制，应作进一步检查。一旦症状消除，随后的症状控制

可采用按需疗法，即需要时口服 20 mg qd。根除幽门螺杆菌、愈合与其相关的十二指肠溃疡、预防复发 本药 20 mg + 阿莫西林 1 g + 克拉霉素 500 mg bid，共 7 天。

【服药与进食】(±④)

【禁忌】对苯并咪唑类化合物或本品的任何成份过敏者禁用。

【注意事项】怀疑有或已患有胃溃疡时，应排除恶性肿瘤。严重肝功能损害患者的本品剂量不应超过 20 mg。

【不良反应】头痛、腹痛、腹泻、腹胀、恶心/呕吐、便秘；皮炎、瘙痒、荨麻疹、头昏、口干。参阅产品说明书。

【药物相互作用】对于那些吸收过程受胃酸影响的药物，在本品的治疗期间，由于胃酸下降，可增加或减少这些药物的吸收。本药治疗期间，酮康唑和依曲康唑的吸收会降低。

【包装/零售价】肠溶片 20 mg x 7 片 (¥98), 40 mg x 7 片 (¥140)。

FDA 妊娠分级 ♀ : B

参见 www.mims.com,

年刊 2009/2010 第 538 页



耐信注射剂 NEXIUM IV

阿斯利康 AstraZeneca

【成份】埃索美拉唑钠

Esomeprazole Na

【适应症】作为当口服疗法不适用时，胃食管反流病的替代疗法。本品通常短期用药（不超过 7 天），一旦可能，就应转为口服治疗。

【用法用量】反流性食管炎 40 mg qd；反流疾病的症状治疗 20 mg qd，溶于 0.9% 氯化钠后，在至少 3 分钟以上的时间内静注，或在 10-30 分钟内静滴。

【禁忌】对本品任何成份、其它苯并咪唑类化合物过敏者禁用。

【注意事项】怀疑病人患有或已诊断胃溃疡时，如出现异常症

♀：美国 FDA 的药物妊娠安全性分级，“♀”之后未列出分级时，参阅“注意事项”和“禁忌”

注意询问药物过敏史，如患者对某一成份过敏，禁用含该成份的药物。

状, 应排除恶性肿瘤的可能。严重肾功能不全的患者慎用。严重肝功能损害者的剂量应不超过 20 mg/日。妊娠妇女慎用, 儿童、哺乳妇女不应使用。

【不良反应】胃肠道反应, 头痛; 少见眩晕、头昏、皮炎、皮肤过敏反应, 口干、肝酶升高, 外周水肿, 感觉异常、嗜睡或失眠。

【药物相互作用】本品治疗期间, 酮康唑和依曲康唑的吸收会降低。与经 CYP 2C19 代谢的药物(如地西泮、西酞普兰、丙米嗪、氯米帕明、苯妥英)合用时, 这些药物的剂量可能需要降低。与阿扎那韦合用, 其血药浓度可能降低。

【包装/零售价】注射粉剂 40 mg x 1 支。

FDA 妊娠分级 ♀: B

参见 www.mims.com, 年刊 2009/2010 第 540 页

① 哌仑西平 - 白云山制药

PIRENZEPINE-
BAIYUNSHAN PHARM

白云山制药 Baiyunshan Pharm

【成份】盐酸哌仑西平
Pirenzepine HCl

【适应症】用于抑制胃酸及缓解胃痉挛所致的疼痛。

【用法用量】成人 25-50 mg bid。

【服药与进食】[x⑩]: 早晚饭前半小时服用]

【禁忌】孕妇, 青光眼、前列腺肥大患者禁用。

【注意事项】本品连续使用不得超过 7 天, 症状未缓解或消失应查找原因并给予相应处理。哺乳期妇女、肝、肾功能不全者慎用。

【不良反应】口干、视力模糊、便秘、腹泻、头痛。少见精神混乱、排尿困难。

【药物相互作用】乙醇、咖啡因可降低本品疗效。西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁可增强本品疗效。

【包装/零售价】片剂 25 mg。
FDA 妊娠分级(♀)

NYCOMED

奈 科 明

潘妥洛克 PANTOLOC ①

奈科明 Nycomed [海南华卫]

【成份】泮托拉唑 Pantoprazole

【适应症】参见“用法用量”。

【用法用量】肠溶片 20 mg 轻度反流性食管炎: 20 mg qd。

疗程一般 2-4 周, 如必要可再延长 4 周。长期维持治疗: 20 mg qd, 如复发可将剂量加大到

40 mg qd, 复发治愈后再恢复原剂量。严重肝功能障碍的患者, 剂量一般不应超过 20 mg/日。肠溶片 40 mg 胃、十二指肠溃疡; 中、重度反流性食管炎: 40 mg bid。伴有幽门螺杆菌感染的十二指肠或胃溃疡:

本药与阿莫西林+克拉霉素, 或甲硝唑+克拉霉素, 或阿莫西林+甲硝唑合用。肾功能受损和老年患者 剂量不宜超过

40 mg/日, 但在采用联合疗法时, 老年患者在 1 周的治疗中也使用 40 mg bid。严重肝衰竭的患者 隔日 40 mg。疗程:

联合疗法一般 7 天, 可酌情延长。十二指肠溃疡的疗程通常为 2 周, 个别病例可延长至 4 周。胃溃疡和反流性食管炎需要治疗 4 周, 个别病例可延长至 8 周。针剂 十二指肠溃疡;

胃溃疡; 中、重度反流性食管炎: 40 mg qd, 静脉输入(至少持续 2 分钟)或静滴(持续 15 分钟以上)。疗程不超过 8 周。

【服药与进食】[x⑩]: 早餐前 1 小时(和晚餐前)完整服用。]

【禁忌】在根除幽门螺杆菌感染的联合疗法中, 有中、重度肝肾功能障碍者禁用。

【注意事项】遇有肝衰竭的患者, 应定期监测肝脏酶谱的变化, 若其测定值增加, 必须停药。妊娠和哺乳妇女慎用。儿童不宜应用此药。

【不良反应】腹痛、腹泻、便秘或腹胀、头痛。偶见恶心、头晕、视力障碍, 过敏反应。

【药物相互作用】本品可能减少生物利用度取决于胃内 pH 值的药物(如酮康唑)的吸收。

【包装/零售价】肠溶片 20 mg x 7 片(¥68), 40 mg x 7 片(¥97.90), 14 片(¥191)。注射粉剂 40 mg x 1 瓶(¥150)。

FDA 妊娠分级 ♀: B

参见 www.mims.com, 年刊 2009/2010 第 592 页

Takeda

普托平
普托平
口服崩解片

普托平 PREVACID

天津武田 Tianjin Takeda

【成份】兰索拉唑 Lansoprazole

【适应症】胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾综合征。

【用法用量】可将药片置于舌上, 用唾液湿润并以舌轻压, 崩解后随唾液吞服; 也可以水送服。成人 反流性食管炎 30 mg qd, 连服 8 周。对反复发作和复发性反流性食管炎的维持治疗: 15 mg qd, 如症状缓解不明显可加量至 30 mg/日。

其他适应症: 30 mg qd。胃溃疡和吻合口溃疡, 连服 8 周, 十二指肠溃疡需连服 6 周。

【服药与进食】[x⑩]: 餐前服用。]

【注意事项】曾有药物过敏史、肝功能障碍、老年患者、孕妇慎用。反复发作和复发性反流性食管炎的维持治疗期间建议定期内窥镜检查。哺乳期妇女如必须服用本药, 应停止哺乳。对儿童用药的安全性尚未确立。

【不良反应】重要不良反应有: 过敏反应, 血常规异常, 肝功能障碍, 腹泻。

【药物相互作用】禁与阿扎那韦合用。慎与茶碱类、他克莫司水合物、地高辛、甲基地高辛、依曲康唑、吉非替尼、苯妥英、安定合用。

所列价格可能改变而未来及时修改, 故仅供参考, 请向制造商或经销商查询当前价格。

x⑩ 空腹服用

*⑩ 空腹或餐后服用均可

•⑩ 进餐时或餐后服用

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

【包装/零售价】口崩片 30 mg
x 10 片 / 盒 (¥148)。

FDA 妊娠分级 ♀ : B

参见 www.mims.com。

年刊 2009/2010 第 614 页

瑞信 RUIBEI

清华源兴

Tsinghua Yuanxing Bio Pharm

【成份】枸橼酸铋雷尼替丁
Ranitidine bismuth citrate

【适应症】胃、十二指肠溃疡；
与抗生素合用，根除幽门螺杆菌。

【用法用量】350 mg bid，疗程
不宜超过 6 周。与抗生素合用
的剂量和疗程参见产品说明书。

【服药与进食】[X⑩]：饭前服
用。]

【注意事项】不宜长期大剂量使
用。服用本品后可见粪便变黑、
舌发黑，属正常现象。不建议
用于孕妇、哺乳期妇女及儿童。

【不良反应】过敏反应罕见；可
能出现肝功能异常；偶见头痛、
关节痛及胃肠道功能紊乱，如
恶心、腹泻、腹部不适、胃痛、
便秘；罕见粒细胞减少。

【包装/零售价】胶囊 350 mg x
6 粒 (¥33)，10 粒 (¥53)。

FDA 妊娠分级 ♀ : C

善卫得 ZANTAC

葛兰素史克 GlaxoSmithKline

【成份】盐酸雷尼替丁
Ranitidine HCl

【适应症】胃/十二指肠溃疡，
手术后溃疡，反流性食管炎，
卓-艾氏综合征，预防应激性溃
疡、消化性溃疡引发的胃肠道
出血，为有吸入胃酸危险的全身
麻醉病人作预防处理。预防
非甾体抗炎药、幽门螺旋杆菌
引起的十二指肠溃疡。

【用法用量】急性期 成人 150
mg bid 或夜间服 300 mg。疗程
一般为 4-8 周，如需要可治疗
12 周。长期治疗 夜间服 150
mg。肾功能损害病人 150 mg/
日。儿童 2-4 mg/kg bid，最高
剂量为 300 mg/日。

【服药与进食】[*⑩]

【注意事项】胃溃疡病人在开始
用药前应排除恶性肿瘤的可能
性。严重肾功能障碍、有哮喘
病史者、妊娠及哺乳妇女慎用。

【不良反应】偶见可逆性肝功能
损害，血球计数的变化，过敏
性反应。个别病例可见心动徐
缓、头痛、眩晕、幻觉及皮疹。

【包装/零售价】片剂 150 mg
x 10 片 (¥51.60)。注射液 50
mg/2 mL x 5 安瓿 (¥32 / 安瓿)。
FDA 妊娠分级 ♀ : B



卫材 (中国) 药业有限公司

施维舒®

施维舒 SELBEX

卫材 Eisai

【成份】替普瑞酮 Teprenone

【适应症】急性胃炎、慢性胃炎
急性加重期，胃粘膜病变（糜
烂、出血等）和胃溃疡。

【用法用量】50 mg tid，根据年
龄、症状酌情增减。

【服药与进食】[V⑩]：饭后 30
分钟内口服]

【注意事项】孕妇、儿童慎用。

【不良反应】偶尔会出现便秘、
腹泻、腹胀、口渴、恶心、腹
痛。GOT、GPT 值轻度升高。
头痛。过敏症。胆固醇值升高，
眼睑发红或热感。

【包装/零售价】胶囊 50 mg x
20 粒 (¥39.60)。

FDA 妊娠分级 (♀)

参见 www.mims.com，

年刊 2009/2010 第 672 页

素可立 SUCRATE

积大制药 Jida Pharm [积华医药]

【成份】硫糖铝 Sucralfate

【适应症】胃溃疡、十二指肠溃
疡、急性及有症状的慢性胃炎、
非甾体抗炎药引起的胃炎、食
管溃疡。

【用法用量】1 g bid，维持及巩
固用量：每次服用量不变，服
药次数可减少，如每日服用 1
次，最好在晚间服用。

【服药与进食】[X⑩]：晨起饭前
1 小时及晚间休息前空腹服用。]

【注意事项】长期大剂量服用本
品可能会造成磷缺乏。肝肾功
能不全者慎用。本品入口会产
生一种独特的涩味，可服用少
量清水或饮料消除这种感觉。
孕妇及哺乳期妇女慎用。

【不良反应】便秘、口干、腹
泻、皮疹、瘙痒、面部水肿、
乏力、头晕、失眠和肝转氨酶
升高。

【药物相互作用】与四环素类抗
生素合用，可降低此类化合物的
吸收和利用。如果在服用本
品的同时需其它药品，请至少
间隔 2 小时。服本品半小时内
不宜服用制酸剂。

【包装/零售价】混悬 凝胶
1 g/5 mL x 12 袋 / 盒。

FDA 妊娠分级 ♀ : B

参见 www.mims.com，

年刊 2009/2010 第 738 页

泰胃美 TAGAMET

中美史克 SmithKline & French

【成份】西咪替丁 Cimetidine

【适应症】胃/十二指肠溃疡，
反流性食管炎，应激性溃疡及
卓-艾氏综合征。

【用法用量】成人 200-400 mg
bid-qid，餐后及睡前服，或
800 mg qd，睡前 1 次服。预防
溃疡复发 400 mg qd，睡前服。
肾功能不全患者 200 mg q12
hr。老年患者用量酌减。

【服药与进食】[V⑩]：餐后及睡
前服用。]

【禁忌】孕妇和哺乳期妇女禁用。

【注意事项】癌性溃疡者使用前
应先明确诊断。严重心脏及呼
吸系统疾患、系统性红斑狼疮、
器质性脑病、肝肾功能损害的
患者慎用。16 岁以下儿童不推
荐使用。

【不良反应】腹泻、乏力、头
晕、嗜睡、头痛、皮疹。用量
较大可引起男性乳房发育、女
性溢乳、性欲减退、阳痿、精
子数减少。本品有一定的神经
毒性。罕见过敏反应、肝肾功
能损害、白细胞及粒细胞减少。

【药物相互作用】与制酸药合用
时，两者应至少相隔 1 小时服。

♀：美国 FDA 的药物妊娠安全性分级，“♀”之后未列出分级时，参阅“注意事项”和“禁忌”

注意询问药物过敏史，如患者对某一成份过敏，禁用含该成份的药物。

与胃复安合用时,需增加本品剂量。慎与硫糖铝、苯二氮草类、香豆素类抗凝血药、苯妥英钠、普萘洛尔、美托洛尔、甲硝唑、茶碱、咖啡因、氨茶碱等黄嘌呤类药、维拉帕米、地高辛、奎尼丁、卡托普利、氨基糖甙类、其他肝内代谢药如利多卡因、三环类抗抑郁药合用。

【包装/零售价】片剂 400 mg x 20 片 (¥42.10), 800 mg x 10 片 (¥41.80)。注射液 200 mg/2 mL x 6 瓶 (¥119.20)。

FDA 妊娠分级 ♀ : B

1b. 胃肠调节、治疗腹胀和抗炎药物 GIT Regulators, Antiflatulents & Anti-inflammatories

有关此类药物的临床应用,也可参阅以下《MIMS 专科用药指南》* 的相关专题:

- 便秘 (慢性)
- 肠易激综合征
- 恶心和呕吐
- 慢性胃炎
- 胃食管反流病
- 消化不良
- 炎症性肠病

* 请参阅: MIMS 消化系统疾病用药指南

柏西 ESPUMISAN

柏林·化学 Berlin-Chemie

【成份】二甲硅油 Simethicone

【适应症】参阅“用法和用量”。

【用法用量】因气体在腹部聚集而引起的胃肠道不适,如腹胀和术后: 婴儿 1 mL (25 滴) 混合到瓶装食物中,哺乳前或后喂服。1-6 岁儿童 每日 3-5 次, 1 mL (25 滴)/次。6-14 岁儿童 每日 3-5 次, 1-2 mL (25-50 滴)/次。青少年及成人 每日 3-5 次, 2 mL (50 滴)/次。腹部影像学检查的辅助用药 (例如 X 线, 超声, 胃镜) 检查前 1 日

服用 3 次, 每次 2 mL (50 滴), 检查当日早晨服用 2 mL (50 滴)。用作造影剂混悬液的添加剂 1 升造影剂内加入 4-8 mL, 用于双重对比显示。

【服药与进食】[±⑩]

【禁忌】严禁用于对西甲硅油或山梨酸及其盐类过敏的患者。

【包装/零售价】乳剂 40 mg/mL x 30 mL (¥48)。

FDA 妊娠分级 ♀ : C



加斯清 GASMOTIN

大日本住友制药

Dainippon Sumitomo

【成份】枸橼酸莫沙必利

Mosapride citrate

【适应症】缓解慢性胃炎伴有的消化系统症状 (烧心, 早饱、上腹胀、上腹痛、恶心、呕吐)。

【用法用量】5-10 mg tid。

【服药与进食】[±⑩]

【注意事项】通常持续使用 2 周仍未见症状改善时,不应再长期盲目服药。孕妇慎用。哺乳妇女用药时应停止哺乳。儿童使用的安全性尚未确定。

【不良反应】主要为腹泻和稀便,口干、疲倦感。罕见肝功能障碍。

【药物相互作用】与抗胆碱药并用时应分开间隔使用。

【包装/零售价】薄膜衣片 5 mg x 10 片/盒, 100 片/盒。

FDA 妊娠分级 (♀)

参见 www.mims.com,

年刊 2009/2010 第 311 页

伽斯康 GASCON

橘生药品 Kissei Pharm [万联行]

【成份】二甲硅油 Dimethicone

【适应症】参阅“用法用量”。

【用法用量】成人 改善因胃肠道内气体而引起的腹部症状: 120-240 mg/日, 分 3 次口服。内窥镜检查除去胃内有泡性粘液: 于胃内窥镜检查前 15-40 分钟, 通常成人用 40-80 mg 加水 10 毫升混合后口服。X 光

检查腹部驱除肠内的气体: 于检查前 3-4 日开始, 120-240 mg/日, 分 3 次口服。另外用量可根据患者的年龄, 症状的轻重进行适量增减。

【服药与进食】[✓⑩]: 饭后或两餐间口服。]

【注意事项】摇匀后再使用。关于对孕妇及哺乳期妇女、儿童、老年患者用药的安全性尚不明确。

【不良反应】偶见软便、胃部不适、腹泻、腹痛; 罕见呕吐、恶心、胃部腹胀、食欲不佳、头痛。

【包装/零售价】乳剂 20 mg/mL x 300 mL/瓶。

FDA 妊娠分级 (♀)

参见 www.mims.com,

年刊 2009/2010 第 332 页

类克 REMICADE

西安杨森 Xian-Janssen

【成份】英夫利西单抗

Infliximab

【包装/零售价】注射液

100 mg x 1 瓶 (¥6,600)。

FDA 妊娠分级 ♀ : B

参阅 18b。

立愉 RUDD-U

法健化学制药 Frankin Pharm

【成份】每片含 盐酸羟苯利明 Oxyphenycyclimine HCl 5 mg,

二甲硅油 Simethicone 40 mg,

维生素 U Vit U 20 mg, 三硅酸

镁 Mg trisilicate 275 mg, 氢氧化

铝 (凝胶) Al(OH)₃ 200 mg

【适应症】消化不良、胃痉挛、胃肠胀气、胃酸过多、胃溃疡、胃灼热、饮酒过多后产生的胃部不适、打嗝、反胃。

【用法用量】常用剂量为每天 3 次, 每次 2 片, 咬碎或分成小块后用温水送服。

【禁忌】前列腺肥大、青光眼、阑尾炎或有类似症状、骨折患者禁用。

【注意事项】肾功能不全、高血压、心脏病、胃肠道阻塞性疾病、甲亢、溃疡结肠炎、反流性食管炎患者慎用。低磷血症

所列价格可能改变而未及时修改, 故仅供参考, 请向制造商或经销商查询当令价格。

×⑩ 空腹服用

±⑩ 空腹或餐后服用均可

✓⑩ 进餐时或餐后服用

(如吸收不良综合征) 患者不宜长期大量服用。有胆汁、胰液等强碱性消化液分泌不足或排泄障碍者不宜使用。孕妇及哺乳妇女、12 岁以下儿童慎用。

【不良反应】可能出现的副作用有口干、便秘。

【药物相互作用】本品中的盐酸羟苯利明会加强抗组胺药的抗胆碱作用, 而碱性药铝、镁也可能会减低四环素之吸收。

【包装/零售价】片剂 30 粒 (¥51.50)。

FDA 妊娠分级(♀)

妈咪爱 MEDILAC-VITA

北京韩美 Hanmi

【成份】每袋颗粒剂含 屎肠球菌 1.35×10^8 个, 枯草杆菌 1.5×10^7 个, 维生素 C 10 mg, 维生素 B₁ 0.5 mg, 维生素 B₂ 0.5 mg, 维生素 B₆ 0.5 mg, 维生素 B₁₂ 1 ug, 烟酰胺 2.0 mg, 乳酸钙 20 mg, 氧化锌 1.25 mg。

【包装/零售价】颗粒剂 1 g x 10 袋 (¥22.50), 1 g x 15 袋 (¥29.80), 1 g x 30 袋 (¥55)。

FDA 妊娠分级(♀)

参阅 1f.

美常安 MEDILAC-S

北京韩美 Hanmi

【成份】每粒胶囊含 屎肠球菌 4.5×10^8 个, 枯草杆菌 5×10^7 个。

【包装/零售价】肠溶胶囊 250 mg x 10 粒 (¥16.40), 20 粒 (¥32)。

FDA 妊娠分级(♀)

参阅 1d.

培非康 PEIFEIKANG

信谊制药 Sine Pharm

【成份】双歧杆菌 Bifidobacteria, 嗜酸性乳杆菌 Lactobacillus acidophilus, 粪链球菌 Strep faecalis

【适应症】肠菌群失调症, 轻、中型急性腹泻, 慢性腹泻, 腹胀, 便秘。

【用法用量】散剂成人 1-2 包, bid-tid。儿童用量酌减。冲调后服用, 胶囊成人 2-3 粒 bid-

tid。6-13 岁儿童 1-2 粒。1-6 岁 1 粒。0-1 岁 1/2 粒, bid-tid。

【服药与进食】[±⑩]

【包装/零售价】散剂 1 g x 6 包 (¥18), 18 包 (¥36.90)。胶囊 210 mg x 12 粒 (¥21), 20 粒 (¥35), 30 粒 (¥39)。

FDA 妊娠分级(♀)

颇得斯安 PENTASA

辉凌制药 Ferring

【成份】美沙拉秦 Mesalazine

【适应症】参阅“用量”。

【用法用量】缓释片 溃疡性结肠炎 成人 急性发作: 1 g qid, 维持期: 500 mg qid。2 岁以上儿童 20-30 mg/kg/日、分服。克罗恩病 成人 1 g qid。2 岁以上儿童 20-30 mg/kg/日、分服。栓剂 溃疡性直肠炎 成人 1 枚 qd-bid。

【服药与进食】[√⑩]: 餐后服用。]

【禁忌】对本药、水杨酸类药物及赋形剂过敏; 严重肝肾功能损害; 胃或十二指肠溃疡; 出血倾向增加者忌用。

【注意事项】对柳氮磺胺吡啶过

敏、肝功能不全的患者慎用。

出现不耐受本品的急性症状者, 如痉挛、腹痛、发热、严重头痛和皮疹, 应立即停药。肾功能不全患者不推荐使用。推荐在给药前、给药 2 周后, 其后每隔 4 周应进一步检查血和尿 23 次。如果结果一直正常, 应每 3 个月随诊或出现其它疾病的征象时立即随诊。

【不良反应】1-3% 患者会出现腹泻、恶心、腹部不适、头痛、呕吐及皮疹, 如荨麻疹和湿疹。偶见超敏和药物引起的发热。罕见肌肉和关节疼痛、暂时脱发、红斑狼疮样反应、气短、影响肝肾功能、心肌和胰腺炎及血液指标改变。

【包装/零售价】缓释片 500 mg x 100 片。栓剂 1 g x 28 粒。

FDA 妊娠分级 ♀: B

参见 www.mims.com, 年刊 2009/2010 第 600 页

莎尔福 SALOFALK

福克药厂 Dr. Falk [康哲]

【成份】美沙拉秦 Mesalazine

【适应症】肠溶片: 溃疡性结肠炎急性发作和复发; 克罗恩氏病急性发作。灌肠液和栓剂: 溃疡性结肠炎的急性发作。

【用法用量】肠溶片 溃疡性结肠炎急性发作 1.5-3 g/日, 维持期 1.5 g/日。克罗恩病急性发作 1.5-4.5 g/日。栓剂 1 次 1 粒 (0.5 g), 1 日 2-3 次, 便后塞入肛门。灌肠液 每晚睡前从肛门灌进大肠, 每次 1 支 (4 g)。参阅产品说明书。

【服药与进食】[x⑩]: 餐前 1 小时, 整片用足够的水送服。]

【禁忌】对水杨酸及其衍生物过敏; 严重肝、肾功能异常; 胃或十二指肠溃疡; 出血体质的患者禁用。

【注意事项】在治疗开始 14 天, 就应检查血细胞计数和尿液。此后, 每隔 4 周复查, 共检查 2-3 次。如未见异常, 每 3 个月应检查 1 次血浆尿素氮、血肌酐和尿沉渣等反映肾功能的检查。治疗期间, 注意监测高铁血红蛋白值水平。肺功能障碍 (特别是哮喘)、对包含硫酸酯酶的制剂过敏的患者慎用。儿童不宜使用。孕妇慎用, 哺乳妇女服药期间需停止哺乳。

【不良反应】偶见胃肠道反应, 罕见头痛、头晕, 过敏反应, 肌痛、关节痛, 血细胞计数改变, 肝功能参数改变。

【药物相互作用】慎与下列药物合用: 香豆素类抗凝药、糖皮质激素、磺酰脲类药、甲氨蝶呤、丙磺舒、苯磺唑酮、螺内酯、吠塞米、利福平。

【包装/零售价】肠溶片 0.5 g x 40 片。灌肠液 4 g x 60 mL x 7 支。栓剂 0.5 g x 30 粒。

FDA 妊娠分级 ♀: B

参见 www.mims.com, 年刊 2009/2010 第 656 页

请通知我们您已变更的地址, 以便及时将本刊送到您手上。

♀: 美国 FDA 的药物妊娠安全性分级, “♀”之后未列出分级时, 参阅“注意事项”和“禁忌”

注意询问药物过敏史, 如患者对某一成份过敏, 禁用含该成份的药物。

舒丽启能 CEREGINON ①

天津田边

Tianjin Tanabe Seiyaku

【成份】马来酸曲美布汀
Trimebutine maleate

【适应症】胃肠运动功能紊乱引起的食欲不振、恶心、呕吐、暖气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症状的改善，肠易激综合征。

【用法用量】100-200 mg tid。根据年龄、症状适当增减剂量。

【服药与进食】[±⑩]

【注意事项】老年人、孕妇、哺乳妇女及儿童慎用。

【不良反应】偶有便秘、腹泻、腹鸣、口渴、口内麻木、心动过速、眩晕倦怠、头痛、皮疹及GOT、GPT升高。

【包装/零售价】薄膜包衣片
100 mg x 20 片 (¥26.30)。

FDA 妊娠分级(♀)

思密达 SMECTA

博福-益普生 Beaufour-Ipsen

【成份】蒙脱石 Montmorillonite

【包装/零售价】散剂 3 g x 6 袋 (¥17)、10 袋 (¥27)。

FDA 妊娠分级(♀)

参阅 1d。



为力苏 ELTHON

雅培 Abbott

【成份】盐酸伊托必利
Itopride hydrochloride

【适应症】胃肠动力减弱引起的消化不良症状，包括上腹部饱胀感、上腹痛、食欲不振、恶心、呕吐等症状，如功能性消化不良、慢性胃炎。

【用法用量】成人 50 mg tid，根据年龄和症状可相应调整剂量。若用药 2 周后症状改善不明显，宜停药。

【服药与进食】[x⑩]：餐前口服。]

【禁忌】存在胃肠道出血、机械梗阻或穿孔时禁用。

【注意事项】妊娠妇女慎用。服用本药物时应当避免哺乳。

【不良反应】偶有腹泻、腹痛、便秘、唾液分泌增加、头痛、易激惹、睡眠改变、眩晕、催乳素分泌增加、白细胞减少、血BUN、肌酐值升高、胸背痛、疲乏感，很少见过敏症状。

【药物相互作用】抗胆碱能药物可能减弱本药的作用。

【包装/零售价】薄膜衣片
50 mg x 10 片 (¥24)、20 片 (¥47)。
FDA 妊娠分级(♀)

参见 www.mims.com,

年刊 2009/2010 第 830 页

维柳芬 WEILIUFEN ①

三维制药 Sunve Pharm

【成份】柳氮磺吡啶

Sulfasalazine

【适应症】参阅“用法用量”。

【用法用量】溃疡性结肠炎：

成人 3-4 g/日，分 3-4 次口服。

儿童：40-60 mg/kg/日。维持

量 20-30 mg/kg/日，均分 3-6

次服用。类风湿关节炎：由

250-1500 mg/日开始，逐渐增加

剂量至 2 g/日，分 2 次服用。

【服药与进食】[√⑩]：遇有胃

肠道刺激症状，除强调餐后整片

吞服外，也可分成小量多次服

用。]

【禁忌】对磺胺及水杨酸盐过

敏、肠梗阻或泌尿系梗阻、急

性间歇性卟啉症患者，孕妇、

哺乳期妇女，2 岁以下小儿禁

用。

【注意事项】缺乏 G6PD、肝肾

功能不全、血卟啉症、血小板

或粒细胞减少、血紫质症、肠

道或尿路阻塞患者慎用。用药

心悸。少见红细胞异常、紫绀、腹痛、头晕、耳鸣、蛋白尿、血尿、皮肤黄染。罕见骨髓抑制、肝炎、胰腺炎、周围神经病变、无菌性脑膜炎、肺部并发症、眶周水肿、肾病综合征、男性生殖功能紊乱。

【药物相互作用】与尿碱化药合

用可使磺胺药排泄增多。勿与

对氨基苯甲酸合用。与下列药

物合用时需调整其剂量：口服

抗凝药、口服降糖药、甲氧噻

吩、苯妥英钠、硫磺妥钠。慎

与洋地黄类、丙磺舒或叶酸、

骨髓抑制药、溶栓药物、光敏

药物、乌洛托品、新霉素、具

有肝毒性的药物合用。本药可

影响雌激素类药物的避孕可靠

性。与磺胺酮同用时需要调整

磺胺药的剂量。

【包装/零售价】肠溶片
250 mg x 60 片 (¥24.40)。

FDA 妊娠分级 ♀：B；D - 如在

产前使用

参见 www.mims.com,

年刊 2009/2010 第 835 页

【禁忌】禁用于刺激胃运动可能

产生危险（如胃肠道出血、机

械性梗阻或穿孔）的患者，催

乳素分泌性垂体瘤或催乳素腺

瘤患者。

【注意事项】肝功异常、肾功能

不全患者，以及婴儿、孕妇和

哺乳妇女慎用。

【不良反应】偶见胃肠道反应、

口渴、胸痛、过敏反应、血清

所列价格可能改变而未及时修改，故仅供参考，请向制造商或经销商查询当令价格。

x⑩ 空腹服用

±⑩ 空腹或餐后服用均可

√⑩ 进餐时或餐后服用

泌乳素水平升高。儿童可能出现锥体外系症状。

【药物相互作用】与吩噻嗪类、丁酰苯类、萝芙藤生物碱类合用时，易出现内分泌功能调节异常或锥体外系症状。慎与地高辛、抗胆碱药物合用。与CYP3A4抑制剂合用时，本品的血药浓度增加。

【包装/零售价】片剂 10 mg x 20 片, 30 片 (¥13.50)。

FDA 妊娠分级 ♀ : C

1c. 解痉药 Antispasmodics

有关此类药物的临床应用,也可参阅以下《MIMS 专科用药指南》*的相关专题:

- 肠易激综合征
- 急性感染性腹泻
- 慢性腹泻

* 请参阅: MIMS 抗微生物药物指南, MIMS 消化系统疾病用药指南

阿托品 - 新华制药 ATROPINE - XINHUA PHARM

新华制药 Xinhua Pharm

【成份】硫酸阿托品

Atropine sulfate

【包装/零售价】注射液 1 mg x 2 mL。

FDA 妊娠分级 ♀ : C

参阅 2a.



苏威
制药

SOLVAY PHARMA

得舒特 DICETEL 苏威制药 Solvay Pharma

【成份】匹维溴铵

Pinaverium Br

【适应症】对症治疗与肠道功能紊乱有关的疼痛、排便异常和胃肠不适; 对症治疗与胆道功能紊乱有关的疼痛; 为钡灌肠做准备。

【用法用量】成人: 3-4 片/天, 如有必要可增至 6 片/天。为钡灌肠做准备时, 应于检查前 3 天开始用药, 剂量为 4 片/天。

【服药与进食】[✓Ⓜ]: 进餐时整片吞服。]

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】哺乳期间应避免服用。

【不良反应】极少数人有轻微的胃肠不适; 极个别出现皮疹样过敏反应。

【包装/零售价】薄膜衣片

50 mg x 15 片 (¥37)。

FDA 妊娠分级 (♀)

参见 www.mims.com,

年刊 2009/2010 第 174 页

颠茄 - 泰源药业

BELLADONNA-

TAI YUAN PHARM

泰源药业 TaiYuan Pharm

【成份】颠茄 Belladonna

【适应症】胃肠痉挛性疼痛。

【用法用量】腹痛时服用 10-20 mg/次。

【服药与进食】[±Ⓜ]

【禁忌】青光眼、尿潴留、前列腺肥大、心动过速患者禁用。

【注意事项】在环境温度较高时, 用药后有体温急骤升高的危险。脑损害、心脏病、急性出血伴有心血管功能不稳定、高血压、返流性食管炎、胃肠道阻塞性疾病、溃疡性结肠炎、肝/肾功能中重度损害、甲亢、肺部疾患、重症肌无力、植物神经疾病、尿路疾病患者, 儿童、老年人慎用。

【不良反应】便秘, 出汗减少, 口鼻、咽喉及皮肤干燥, 视力模糊, 排尿困难。少见眼睛痛、眼压升高、过敏性皮疹。

【药物相互作用】与尿碱化药同用时, 本药的疗效或毒性加强。与金刚烷胺、美克洛嗪、吩噻嗪类药、其他抗胆碱药、扑米酮、普鲁卡因胺、三环类抗抑郁药同用时, 本药的毒副作用加剧。与制酸药、吸附性止泻药同用时, 服用时间应隔开 1 小时以上。与可待因或美沙酮同用时可发生严重便秘、麻痹性肠梗阻或尿潴留。与胃复安同用时, 其促进胃肠运动的作用可被颠茄拮抗。与 MAOI, 包

括呋喃唑酮、丙卡巴肼同用时, 抗毒蕈碱作用的副反应增强。

【包装/零售价】片剂 10 mg。

FDA 妊娠分级 ♀ : C

东莨菪碱 - 民生药业

SCOPOLAMINE-

MINSHENG PHARM

民生药业 Minsheng Pharm

【成份】氢溴酸东莨菪碱

Scopolamine HBr

【包装/零售价】注射液

0.3 mg/mL x 1 支。

FDA 妊娠分级 ♀ : C

参阅 4i.

里拉通 RILATEN

柏林 - 化学 Berlin-Chemie

【成份】罗西维林 Rociverine

【适应症】缓解胃肠道肌肉痉挛引起的急性、亚急性腹痛。

【用法用量】每日 3-4 次, 每次 10 mg (1 片)。紧急情况下可一次服用 2 片。

【禁忌】青光眼、前列腺增生、尿潴留、幽门狭窄及其它胃肠道狭窄患者禁用。

【注意事项】心脏病、冠心病和高血压、老年 (尿潴留) 患者, 以及孕妇慎用。因该药可能引起视觉障碍, 驾驶汽车或从事特殊行业的患者需了解。无儿童用药经验。

【不良反应】对药物过度敏感者可出现: 口干、瞳孔放大、因调节功能紊乱而引起的视觉障碍、心动过速、困倦、收敛作用、热性潮红、震颤。

【药物相互作用】过度敏感患者在治疗期间, 服用抗胆碱药期间与甾体类药物或三环类抗抑郁药联合用药有增加青光眼或尿潴留的危险性。

【包装/零售价】薄膜衣片 10 mg x 10 片, 30 片 (¥128)。

FDA 妊娠分级 (♀)

请参阅《MIMS 药品手册年刊》或登录 MIMS 网站: www.mims.com 点击“M”图标, 了解完整的药品处方和学术资料

♀ : 美国 FDA 的药物妊娠安全性分级, “♀”之后未列出分级时, 参阅“注意事项”和“禁忌”

注意询问药物过敏史, 如患者对某一成份过敏, 禁用含该成份的药物。

诺仕帕 NO-SPA
赛诺菲安万特 **sanofi aventis**
[众佳]

【成份】盐酸屈他维林
Drotaverine HCl

【适应症】胃肠道、胆囊和胆道、肾和泌尿道、子宫平滑肌痉挛，先兆流产，子宫强直。注射液除上述适应症外，还用于缩短分娩时间，辅助治疗胰腺炎、血管性头痛。

【用法用量】片剂成人 40-80 mg tid。6 岁以上儿童 40 mg bid-qid。1-6 岁儿童 20-40 mg tid。

注射液 成人 常规平均用量：40-240 mg/日，分 1-3 次皮下或肌肉注射，或缓慢静注。参见产品说明书。

【服药与进食】[±⑩]

【禁忌】严重肝、肾、心功能不全的患者，1 岁以下的儿童禁用。

【注意事项】血压过低的患者慎用。乳糖酶不足，半乳糖血症或葡萄糖/半乳糖吸收不良的患者不适用。如果患者有眩晕，应该避免有潜在危险性的作业，如驾驶和操纵机器。避免在妊娠与哺乳期服用。

【不良反应】极罕见恶心、便秘；头痛，眩晕和失眠；心悸和血压过低。

【药物相互作用】磷酸二酯酶抑制剂（如罂粟碱），使左旋多巴的抗帕金森病效应减低，本药与左旋多巴合用时，强直和颤抖可能加剧。

【包装/零售价】片剂 40 mg x 20 片。注射液 40 mg/2 mL x 5 安瓿。

FDA 妊娠分级(♀)

参见 [www.mims.com](#), 年刊 2009/2010 第 571 页

山莨菪碱 - 康恩贝
ANISODAMINE-CONBA
康恩贝 **Conba Pharm**

【成份】消旋山莨菪碱

【适应症】缓缓解胃肠痉挛所致的疼痛。

【用法用量】成人 5-10 mg/次，按需服用 1-3 次/日。

【服药与进食】[±⑩]

【禁忌】哺乳期妇女、出血性疾病、脑出血急性期、青光眼、前列腺肥大、尿潴留患者禁用。

【注意事项】严重心衰、心律失常患者，孕妇、儿童、老人慎用。

【不良反应】口干、面红、视近物模糊。用量较大时可出现心率加快，排尿困难。

【药物相互作用】与甲氧氯普胺、多潘立酮同用，各自的作用降低。本品可延长胃排空时间，故能增加很多药物的吸收率而产生不良反应。

【包装/零售价】片剂 5 mg。

FDA 妊娠分级(♀)

斯巴敏 SPASMOMEN

柏林 - 化学 **Berlin-Chemie**

【成份】奥替溴铵 **Otilonium Br**

【适应症】胃肠道痉挛和运动功能障碍(肠易激综合征，胃炎，胃十二指肠炎，肠炎，食管病变)。也可用于内窥镜检查前准备(食管-胃-十二指肠镜，结肠镜，直肠镜等)。

【用法用量】40-80 mg tid。

【服药与进食】[±⑩]

【注意事项】青光眼，前列腺增生，幽门狭窄患者慎用。一般不用于孕妇和哺乳期妇女。

【包装/零售价】薄膜衣片 40 mg x 10 片, 30 片 (¥59.30)。
FDA 妊娠分级(♀)

溴丙胺太林 - 力生制药
PROPANTHELINE BROMIDE-LISHENG PHARM

力生制药 **Lisheng Pharm**

【成份】溴丙胺太林

Propantheline Br

【适应症】胃肠痉挛性疼痛。

【用法用量】成人 疼痛时服 15 mg。必要时 4 小时后可重复 1 次。

【服药与进食】[x⑩]：餐前半小时服用。]

【禁忌】出血性疾病及术前、尿潴留、前列腺肥大、青光眼患者及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】心脏病、肝功能损

害、高血压、呼吸道疾病患者、孕妇及老人慎用。

【不良反应】口干、面红、视力模糊、尿潴留、便秘、头痛、心悸。

【药物相互作用】勿与甲氧氯普胺、多潘立酮同用。本品可延长一些药物的吸收，如对乙酰氨基酚。本品可降低红霉素的疗效。地高辛的血浆浓度可因同用本品而提高。

【包装/零售价】片剂 15 mg x 100 片。

FDA 妊娠分级 ♀：C

1d. 止泻药 Antidiarrheals

有关此类药物的临床应用，也可参阅以下《MIMS 专科用药指南》* 的相关专题：

- 肠易激综合征
- 急性感染性腹泻
- 慢性腹泻
- 伪膜性肠炎
- 炎症性肠病

* 请参阅：MIMS 抗微生物药物指南，MIMS 消化系统疾病用药指南

Abbott
A Promise for Life

海兰赛 HIDRASEC
Sophartex [雅培]

【成份】消旋卡多曲
Racecadotril

【适应症】成人急性腹泻的对症治疗。

【用法用量】成人：首次服药可在任何时间开始服用 100 mg，之后每次在 3 次正餐前服用 100 mg。连续用药不超过 7 天。

【服药与进食】[x⑩]：正餐前服用。]

【禁忌】孕妇，哺乳妇女及儿童不应使用。

【注意事项】如果患者出现脱水现象，本品应与口服补液盐合用。

【不良反应】偶见嗜睡、皮疹和便秘。

所列价格可能改变而未来及时修改，故仅供参考，请向制造商或经销商查询当前价格。

x⑩ 空腹服用

±⑩ 空腹或餐后服用均可

✓⑩ 进餐时或餐后服用