

歷屆

護理師高普考詳解

藝軒圖書出版社編輯部 編著

藝軒圖書出版社

歷屆護理師 高普考詳解

藝軒圖書出版社編輯部 編著

藝軒圖書出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

歷屆護理師高普考詳解／藝軒圖書出版社編輯部編
著. --第一版. --臺北縣新店市：藝軒，2006[民
95]

面：公分.

ISBN 957-616-856-2（平裝）

1. 護理-問題集

419.7022

94023288

本書任何部份之文字或圖片，如未獲得本社書面同意，
不得以任何方式抄襲、節錄及翻印

新聞局出版事業登記證局版台業字第一六八七號

歷屆護理師高普考詳解

編著者：藝軒圖書出版社編輯部

發行所：藝軒圖書出版社

發行人：彭賽蓮

總公司：台北縣新店市寶高路7巷1號5樓

電話：(02)2918-2288

傳真：(02)2917-2266

網址：www.yihscient.com.tw

E-mail:yihscient@ms17.hinet.net

總經銷：藝軒圖書文具有限公司

台北市羅斯福路三段316巷3號

（台大校門對面·捷運新店線公館站）

電話：(02)2367-6824

傳真：(02)2365-0346

郵政劃撥：01062928

台大醫學院展售處

台北市仁愛路台大醫學院聯教館醫工室B1

電話：(02)2397-5070

台中門市

台中市北區五常街178號

（健行路445號宏總加州大樓）

電話：(04)2206-8119

傳真：(04)2206-8120

大夫書局

高雄市三民區十全一路107號

（高雄醫學大學正對面）

電話：(07)311-8228

本公司常年法律顧問／魏千峰、邱錦添律師

二〇〇六年元月第一版

ISBN 957-616-856-2

本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換。

讀者訂購諮詢專線：(02)2367-0122

推薦序

於學校接受護理專業課程與臨床實習而畢業後，對護理學生而言最重要的一項考試莫過於通過考試院護理師(士)考試，而取得專業證照後，即可至各層級醫療機構、學校、工廠等，擔任護理專業人員。

誠然，通過護理師(士)執照考試是你我共同的心願。因此，本書經多年努力後，彙括近5年護理師(士)檢覈考、專技高普考之考題為主要架構，按年代逐一編制而成，並敦聘各科資深護理專業教師加以詳細解題與補充精華重點，所集合而成之一本非常棒的考試用書。另外，在每一年度的考題之後，特別針對『重要考題』部分附加詳細解題說明，以利考生於最短的時間內完成複習，並能掌握考題趨勢方向。

建議如何準備護理師(士)執照考試：

一、首先應將近5年考過同一科目之考題，連續於『同一時段』內詳細練習並加以閱讀，如此能加深您對該科目重點之印象。

二、於練習每一年度之考題時，應特別注意各科目之『關鍵詞(字)』、『題目線索』、『不同年度題目異同處』等，將題目加以全面性思考後，詳細閱讀選項，更能增進您『答題技巧』與『答對機率』。

三、於閱讀本書時，能將該科目相關之課本、講義、參考用書等放於身旁，必要時將相關資料再閱讀一次，更能讓您在準備考試時『事半功倍』。

最後，期望本書能助您在準備考試過程中，能讀得輕鬆、愉悅並高分通過護理師(士)檢覈考、二技、插大等考試。誠然，本書編輯期間，雖經數十次仔細校對，難免可能有疏漏之處，尚祈各位先進不吝指導。

敬祝 金榜題名

駱俊宏 謹 識

西元2006年元月於苗栗

目 次



94 年第二次專技高考

基本護理學（包括護理原理與護理術）與護理行政	1
產兒科護理學	11
內外科護理學	21
精神科與社區衛生護理學	30
基礎醫學（包括生理學、藥理學、微生物學與免疫學）	42

94 年第二次專技普考

基本護理學概要（包括護理原理與護理技術）	51
產兒科、精神科與社區衛生護理學概要	62
內外科護理學概要	71
基礎醫學概要（包括生理學、藥理學與微生物免疫學）	79

94 年第二次檢覈考

護理學及護理技術	87
產兒科護理	97
內外科護理	107
精神科及公共衛生護理	117
基礎醫學（包括解剖生理學、藥理學、微生物學）	131

94 年第一次專技高考

基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政	143
產兒科護理學	152
內外科護理學	163
精神科與社區衛生護理學	172
基礎醫學（包括生理學、病理學、藥理學、微生物學與免疫學）	182

94 年第一次專技普考

基本護理學概要（包括護理原理與護理技術）	193
產兒科、精神科與社區衛生護理學概要	202
內外科護理學概要	214
基礎醫學概要（包括生理學、藥理學與微生物免疫學）	223

94 年第一次檢覈考

護理學及護理技術	231
產兒科護理	241
精神科及公共衛生護理	252
內外科護理	263
基礎醫學（包括解剖生理學、藥理學、微生物學）	272

93 年第二次專技高考

基本護理學（包括護理原理與護理技術）與護理行政	281
產兒科護理學	290
內外科護理學	302
精神科與社區衛生護理學	311
基礎醫學概要（包括生理學、病理學、藥理學、微生物學與免疫學）	322

93 年第二次專技普考

基本護理學概要（包括護理原理與護理技術）	332
產兒科、精神科與社區衛生護理學概要	344
內外科護理學概要	357
基礎醫學概要（包括生理學、藥理學與微生物免疫學）	365

93 年第一次專技高考

基本護理學與護理行政	374
產兒科護理學	386
內外科護理學	399

精神科與社區衛生護理學	411
基礎醫學（包括生理學、病理學、藥理學、微生物學與免疫學）	424

93 年第一次專技普考

基本護理學概要（包括護理原理與護理技術）	446
產兒科、精神科與社區衛生護理學概要	459
內外科護理學概要	472
基礎醫學概要（包括生理學、藥理學與微生物免疫學）	483

93 年第二次檢覈考

護理學及護理技術	501
產兒科護理	510
內外科護理	522
精神科及公共衛生護理	530
基礎醫學概要（包括解剖生理學、藥理學、微生物學）	540

92 年第二次專技高考

基本護理學與護理行政	551
產兒科護理學	564
內外科護理學	575
精神科與社區衛生護理學	587
基礎醫學（包括生理學、病理學、藥理學、微生物學與免疫學）	598

92 年第二次專技普考

基本護理學概要（包括護理原理與護理技術）	607
產兒科、精神科與社區衛生護理學概要	619
內外科護理學概要	630
基礎醫學概要（包括生理學、藥理學與微生物免疫學）	641

92 年第一次專技高考

基本護理學與護理行政	648
------------	-----

產兒科護理學	659
內外科護理學	669
精神科與社區衛生護理學	681
基礎醫學（包括生理學、病理學、藥理學、微生物學與免疫學）	691

92 年第一次專技普考

基本護理學概要（包括護理原理與護理技術）	700
產兒科、精神科與社區衛生護理學概要	711
內外科護理學概要	721
基礎醫學（包括生理學、藥理學與微生物免疫學）	731

92 年檢覈考

護理學及護理技術	739
婦產、小兒、精神科及公共衛生護理	751
內外科護理	762
基礎醫學（包括解剖生理學、藥理學、微生物學）	773

91 年專技高考

基本護理學與護理行政	781
產兒科護理學	792
內外科護理學	805
精神科與社區衛生護理學	815
基礎醫學	824

91 年專技普考

基本護理學概要	833
產兒科、精神科與社區衛生護理學概要	844
內外科護理學概要	854
基礎醫學概要（包括生理學、藥理學與微生物免疫學）	866

91 年第二次檢覈考

護理學及護理技術	874
產兒科護理	885
內外科護理	898
精神科及公共衛生護理	907
基礎醫學	917

91 年第一次檢覈考

護理學及護理技術	925
產兒科護理	935
內外科護理	946
精神科及公共衛生護理	955
基礎醫學	966

90 年專技高考

基本護理學與護理行政	975
產兒科護理學	987
內外科護理學	999
精神科與公共衛生護理學	1010
基礎醫學	1021

90 年第二次檢覈考

護理學及護理技術	1029
產兒科護理	1043
內外科護理	1054
精神科及公共衛生護理	1066
基礎醫學	1079

90 年第一次檢覈考

護理學及護理技術	1087
----------	------

產兒科護理	1100
內外科護理	1111
精神科及公共衛生護理	1123
基礎醫學	1134

90 年公務人員高考第二試

基本護理學與護理行政	1142
藥理學、微生物學與免疫學	1153
解剖學、生理學及病理學	1162
產兒科護理學	1170
內外科護理學	1181
精神科與公共衛生護理學	1193

90 年公務人員普考第二試

基本護理學概要	1204
產兒科、精神科與公共衛生護理概要	1214
內外科護理概要	1224
基礎醫學概要	1236

94 年第二次專技高考

基本護理學（包括護理原理與護理術）與護理行政

- 有關洗手的敘述，下列何者不正確？(A)需在流動的水中洗手 (B)洗手時每一個部位，至少要搓洗 5—10 次，搓洗時間至少要 30 秒至一分鐘 (C)洗手時，需特別注意指尖、指縫、指甲周圍及手掌側面 (D)內科無菌洗手時，手及前臂必須高於肘關節
- 「六分鐘護一生」—子宮頸癌防治，是屬於三段五級預防的那個階段？(A)第一段促進健康期 (B)第一段特殊保護期 (C)第二段早期診斷及早期治療期 (D)第三段復健期
- 病人肌肉注射後的空針處理，以下何者最正確？(A)針頭回套後，將針頭與針筒分開，分別丟棄在針頭處理盒，與感染可燃的垃圾桶中 (B)針頭不須回套，針頭直接丟棄於針頭處理盒後，針筒則丟棄於感染可燃的垃圾桶中 (C)針頭回套後，整隻空針直接丟棄在一般可燃的垃圾桶中 (D)針頭回套後，整隻空針直接丟棄在針頭處理盒中
- 下列何者不正確？(A)南丁格爾女士所提的照護重心是，為病患準備最合適環境，促其自然痊癒 (B)奧倫 (Dorothea Orem) 指出健康是沒有病痛、傷害與疾病，且能夠自我照顧的狀態 (C)佩普洛 (Peplau) 指出健康是，生理與心理需要能獲得滿足，且能發揮其創造力與生產力 (D)羅伊 (Roy) 指出健康是，身體之能量互動狀態良好
- 李小姐血液檢查結果顯示 HBsAg(+)、Anti-HBs(-)、肝功能檢查數值正常，無不適症狀，此情況顯示李小姐體內帶有足以傳染他人得病的 B 型肝炎病毒，所以李小姐應稱為下列何者？(A)感染原 (infection agent) (B)病原體 (pathogen) (C)帶原者 (carrier) (D)宿主 (host)

答案：1. (D) 2. (C) 3. (B) 4. (D) 5. (C)

註解：1. 內科無菌洗手後，沖水時手及前臂應低於手肘。

2. 「六分鐘護一生」—子宮頸癌防治屬早期篩檢，早期治療。

3. 病人注射後之針頭，不須回套可減少針扎之機會。

4. 羅依 (Roy)，以適應為導向的護理概念模式，強調「適應良好」即表示「健康」。

6. 下列有關院內感染的敘述，何者錯誤？(A)防止院內感染最基本、最重要的措施是，接觸病人前後都需洗手 (B)個案住院之前已有尿路感染，但是在住院期間的尿液培養又發現新的微生物，此種情形是屬於院內感染 (C)最常見的院內感染是傷口感染 (D)與抗生素之誤用與濫用有關
7. 李小弟罹患腸病毒住院治療，下列各項感染控制的措施，何者適宜？①護士在照顧病人時，不需任何隔離措施②鼓勵李小弟應多攝取營養與多至戶外活動，以增強抵抗力 ③應安排李小弟單獨一間或與李小弟同樣的感染者合用一間隔離病房 ④護士在照顧李小弟的前後均需洗手 (A) ①② (B) ③④ (C) ②③ (D) ①④
8. 下列那些病患需採保護性隔離？①開放性肺結核②接受化學療法者，絕對嗜中性白血球計數 (absolute neutrophil count; ANC) 降到 $500-1000 / \text{mm}^3$ ③腸病毒 ④骨髓移植患者 (A) ①② (B) ③④ (C) ②④ (D) ①③
9. 護理人員書寫護理紀錄時之注意事項，下列何者正確？(A)書寫錯誤時，須在錯誤處畫上橫線註明「error」，並在錯誤處簽名 (B)紀錄的內容必須真實，並加上主觀判斷 (C)護理紀錄時間欄內所寫的時間，是指記錄的時間 (D)記錄時可以使用紅、藍、黑原子筆及鉛筆
10. 當護理人員執行醫囑前，應檢視下列那些項目以確立醫師所開立的醫囑處方箋 (order sheet) 是完整有效的？①須有開立醫囑醫師的簽名 ②須有病人主訴 ③須有開立醫囑的日期及時間 ④須有病人姓名 ⑤須有病人床號 ⑥須有護理長簽名 (A) ①②③④ (B) ①③④⑤ (C) ①②⑤⑥ (D) ③④⑤⑥
11. 觀察病患的症狀 (symptoms) 與徵象 (signs)，下列那些項目是屬於病人的症狀 (symptoms)？①呼吸困難 ②體溫 39°C ③血小板數目 ④臉色蒼白 (A) ①② (B) ①④ (C) ②④ (D) ②③
12. 下列何者正確？①p.r.n.的醫囑為長期醫囑，病人需要時即可給予 ②S.O.S.為臨時醫囑，超過 6 小時此醫囑自動失效 ③護生在緊急情況時，可以接受口頭醫囑 ④醫囑更新 (order renew)，表示之前的醫囑自動無效 (A) ①④ (B) ①② (C) ②③ (D) ②④

答案：6. (C) 7. (B) 8. (C) 9. (A) 10. (B) 11. (B) 12. (A)

註解：6. 最常見的院內感染是泌尿道感染，主要是金黃色葡萄球菌造成的。

7. 腸病毒的感控措施，應於接觸案主前、後徹底洗手，及隔離措施減少病擴散之可能。

9. 記錄內容不可加主觀的判斷，亦不可以鉛筆記錄。

12. S.O.S.為臨時醫囑（如有需要給一次），但超過 12 小時未執行則自動停止；護生在緊急狀況時仍不可接口頭或電話醫囑。

13. 「到達醫院時已經死亡」之英文縮寫是？ (A)E.D.C. (B)D.O.D. (C)D.O.A. (D)A.A.D.
14. 簡女士因痔瘡開刀，給予溫水坐浴，何者有誤？ (A)坐浴盆內放置 1/2~2/3 的熱水 (B)水溫一開始以 40.5~43°C 為宜 (C)最高水溫可增至 46°C 以上 (D)以 1:100 的優碘溶液浸泡，可以預防感染
15. 有關等長運動的敘述，何者正確？ (A)肌肉張力增加，但無關節的活動，與肌肉長度的改變 (B)指關節的活動與肌肉長度的改變 (C)肌肉收縮時，肌肉長度改變而張力不變 (D)能預防關節僵硬，維持關節的活動度與柔軟度
16. 下列何策略無法促進與病人有效的溝通？ (A)集中焦點 (B)反映 (C)給予忠告 (D)傾聽
17. 醫囑為 Gentamycin 60 mg q8h，而 Gentamycin 瓶上標示“2 ml/vial, 40 mg/mL”，請問每次給藥時需給多少 c.c.？ (A)1 (B)1.25 (C)1.5 (D)2.5
18. 有關盤尼西林皮膚試驗的敘述，何者正確？ (A)以 75%酒精棉球，環形消毒直徑 3 吋 (B)針頭插入皮膚的角度，需為 45~60 度 (C)需先反抽檢查無回血，才可將藥物注入皮內 (D)使用紅筆沿小泡周圍勾出大小，在旁註明時間與藥名
19. 有關藥物「單一劑量 (unit dose)」給藥系統之敘述，下列何者錯誤？ (A)由藥局每日自動發配一日量 (B)藥物包裝多以單一次投藥量個別包裝 (C)護理人員給藥前，由單一劑量藥車取藥，不必再核對即可發藥，為最省時之給藥系統 (D)護理人員若接獲停用處方箋，藥車上有藥亦不發放
20. 下列有關 Z 字形注射法 (Z-track method) 的敘述，何者不正確？ (A)使用 Z 字形注射法，應側拉皮膚，以 90 度插入針頭 (B)反抽確定無回血後，緩緩注入藥物，10 秒後再拔出針頭 (C)注射後以掌根按摩 30 秒 (D)本注射法目的，在防止注射之藥物回滲

答案：13. (C) 14. (C) 15. (A) 16. (C) 17. (C) 18. (A) 19. (C) 20. (C)

註解：14. 溫水坐浴一般水溫為 40.5-43°C 為宜，最高以不超過 46°C。

15. 等長運動—肌肉的張力改變，長度不變，ex 上石膏患肢之運動。等長運動—肌肉的張力不變，長度改變。

17. Gentamycin 2ml/vial, 40mg/ml，現單次給藥劑量為 60mg。故， $\frac{80\text{mg}}{2\text{ml}} = \frac{60\text{mg}}{x}$ ， $x=1.5(\text{ml})$ 。

18. 盤尼西林皮膚試驗，注射時針頭需 0-15°，不需反抽將藥物注入皮內，注射後用藍筆沿小泡周圍勾出大小，以利觀察其變化。

20. Z 字形注射法，於注射後不可按摩，以防止藥液回滲。

21. 新入院病人的護理措施，何者不宜？(A)病人入院時，一定會有不適的反應，請病人要多忍耐 (B)介紹醫院的環境及有關規定 (C)測量病人的身高體重及生命徵象 (D)提供病人當時的需要
22. 下列何項護理措施，對有睡眠問題的個案，不恰當？(A)評估病房環境，協助排除影響個案睡眠的因素 (B)指導個案漸進式肌肉放鬆法 (C)讓個案白天多休息，以補充夜晚不足的睡眠 (D)睡前給予背部護理、按摩背部
23. 下列影響脈搏的因素，何者有誤？(A)當身體感到疼痛時，脈搏跳動速率會增加 (B)服用毛地黃製劑，會使脈率減少 (C)進食後會使脈率減少 (D)甲狀腺腫大的個案，脈搏跳動速率會增加
24. 三讀五對中的「藥物對」主要是指：(A)藥瓶的外觀形狀要對 (B)藥物擺放的位置要對 (C)藥瓶的標籤顏色要對 (D)藥物的名稱及所含劑量要對
25. 下列給藥常用縮寫之中文意義，何者有誤？(A)q.o.d. 每隔一日 (B)t.i.d. 每日 3 次 (C)A.U. 左耳 (D)S.L. 舌下
26. 肌肉注射時減輕個案不適的措施，下列何者正確？(A)肌肉注射臀部時，病患可採俯臥腳趾向內 (B)針頭快速插入後，快速注入藥物 (C)針頭要緩慢地插入，且注射完後迅速拔出針頭 (D)注射部位要選擇堅硬處
27. 下列有關靜脈滴注的敘述，何者錯誤？(A)精密輸液套管 (volume-controlled bag; VCB) 約是每 c.c. 60 滴 (B)使用 IV drip 給液時，滴定室中液面以 1/3 至 1/2 之高度為宜 (C)排除 IV 管路空氣時，首先要使滴定室填充適量液體，再排管路空氣 (D)塑膠袋裝的點滴瓶，若需要使用導氣設備，則應插在軟袋底部
28. 注射處沿著靜脈有發紅現象，且輸液注入速度變慢，應：(A)把點滴架調高 (B)用生理食鹽水注入沖洗 (C)在發紅處給予熱敷 (D)拔除靜脈注射
29. 吳小弟因肺炎住院，醫囑予 24 小時內靜脈輸液 0.9% normal saline 1000 ml; LR (Lactated Ringer) 500 ml，若採精密輸液套管應為：(A)16 滴 / 分 (B)21 滴 / 分 (C)63 滴 / 分 (D)83 滴 / 分

答案：21. (A) 22. (C) 23. (C) 24. (D) 25. (C) 26. (A) 27. (D) 28. (D) 29. (C)

註解：23. 進食後因消化作用，速率會增加。

25. A.U. 為雙耳，A.S. 左耳。

26. 肌肉注射臀部時，採俯臥腳趾向內，可使臀部肌肉放鬆，減輕予案之不適。

28. 注射處沿著靜脈有發紅現象，可能有靜脈炎，應更換注射部位及設備，並局部抬高。

29. $\frac{(1000+500) \times 60 \text{滴(精密)}}{24 \times 60} \doteq 63 \text{滴} / \text{min}。$

30. 輸血之敘述，何者正確？(A)靜脈給藥可從輸血套管注入 (B)LR (Lactated Ringer) 可與輸血製品併用 (C)最初 15 分鐘最常出現輸血反應，故輸血速度宜維持在 20～30 滴 / 分 (D)輸入 1 單位的紅血球濃厚液 (packed RBC)，約可增加血色素 (Hb) 1 gm/dL
31. 下列靜脈輸液，何者不是等張溶液？(A)0.9%NaCl (B)5%Glucose (C)LR (Lactated Ringer) (D)TPN 溶液
32. 趙小妹 2 歲，體溫達 39.5℃，給予溫水拭浴時，下列敘述何者正確？(A)水溫 41～43℃ (B)若病人覺得冷，可在其腳部置放熱水袋 (C)拭浴時，最好使用摩擦方式 (D)拭浴時，可以將溫水以 70%酒精取代
33. 靜脈注射後，循環負荷過量的症狀，何者錯誤？(A)血壓下降 (B)心跳加快 (C)頸靜脈膨脹 (D)呼吸困難
34. 護理腹瀉病人時，應優先處理的問題為：(A)體液與電解質之不平衡 (B)擔心病情導致之焦慮 (C)腹瀉後的全身倦怠 (D)眩暈所致之意外傷害
35. 尿液常規檢驗，應採取何時的尿液，最適當？(A)任何時間之尿液均可 (B)清晨第一次解出的中段尿液 (C)下午 5 時後的尿液 (D)睡前的尿液
- 情況：金老太太因腦血管病變導致尿滯留，所以給予存留導尿，請依此回答下列第 36 題至第 38 題：
36. 執行女病人存留導尿之步驟，下列何者錯誤？(A)會陰消毒由下往上擦拭，一次用一個棉球 (B)使用水溶性潤滑劑潤滑 (C)導尿管插入之長度約為 2 吋 (D)應打入 5—10 c.c.蒸餾水於導尿管水囊中
37. 何者可以有效預防泌尿道感染？(A)告知金老太太不要下床活動，以防尿管的尿液回流 (B)攝取足夠的液體量，每日至少 2000—3000 c.c. (C)經常給予膀胱灌洗 (D)每天更換存留導尿管
38. 金老太太留置尿管期間，護理人員欲協助她下床坐輪椅，下列敘述中，何者最恰當？(A)將輪椅推近床沿，蓄尿袋放於床褥上 (B)將蓄尿袋置於輪椅之下的地面上 (C)將蓄尿袋懸掛於輪椅側、低於膀胱之處 (D)將蓄尿袋置於患者大腿上

答案：30. (C) 31. (D) 32. (B) 33. (A) 34. (A) 35. (B) 36. (A) 37. (B) 38. (C)

註解：32. 溫水拭浴之水溫自 32℃開始減至 21℃，以減拍方式減少，以摩擦產熱酒精拭浴之濃度 30-35%。

33. 靜脈注射後，循環負荷過量之患者血壓上升。

36. 女病人導尿時會陰消毒應由上→下擦式，一次用一顆棉球。

37. 預防泌尿道感染方法，應鼓勵多活動，每日攝入水量 2000-3000 ml 並維持每日尿量 2000 ml，存留導尿管並每週更換一次。

38. 存留導尿管之蓄尿袋應懸掛低於膀胱之處。

39. 預防便秘的護理方法，何者錯誤？(A)養成定時排便的習慣 (B)鼓勵病人禁食，以防止糞便形成 (C)每日攝取液體 2000—2500 c.c. (D)多吃蔬果類
40. 體溫單的大便欄上記錄著 1/E，這表示：(A)已給予甘油灌腸一次 (B)已給予大量灌腸一次 (C)在接受灌腸後，並未解大便 (D)在接受灌腸後，已有效解便
41. 護士執行會陰沖洗，過程中正確者為：(A)協助病人採屈膝仰臥式 (B)最佳選擇為 1：40 的 Lysol 溶液 (C)沖洗壺壺口朝向會陰 (D)第一支棉棒應先擦洗遠側大陰唇外側
42. 簡小姐因跌倒撞及頭部而出血，而其傷口以外的頭髮上仍有血跡糾結，此時應如何處理？(A)用肥皂洗頭後再以梳子梳開 (B)直接用剪刀剪掉沾有血跡的頭髮 (C)以 50%酒精溶液局部擦洗後梳開 (D)用石油苯 (benzene) 來梳開
43. 楊先生罹患口腔癌，口腔兩頰有嚴重潰瘍及疼痛，護理人員為其選擇的漱口劑，下列何者不宜：(A)綠茶水 (B)稀釋的 Xylocaine solution (C)酒精性優碘 (D)冷開水
44. 王小弟 2 歲，測量耳溫時，應：(A)將耳朵向下向後拉 (B)將耳朵向上向後拉 (C)將耳朵向上向前拉 (D)將耳朵向下向前拉
45. 呼吸方式有一起伏之週期，開始時為短而淺，其後每一呼吸漸深，直至呼吸困難最高點，然後逐漸下降，直至完全停止，這樣的呼吸方式稱為：(A)喟嘆呼吸 (sighing respiration) (B)庫斯毛耳氏呼吸 (Kussmaul's respiration) (C)潮氏呼吸 (Cheyne-Stokes respiration) (D)畢歐氏呼吸 (Biot's respiration)
46. 大量出血可能出現的脈象為：(A)交替脈 (B)洪脈 (C)絲脈 (D)柯利干氏脈 (corrigan's pulse)
47. 下列有關測量血壓的敘述，何者錯誤？(A)右臂測得的血壓值會比左臂高約 10 mmHg (B)站立時血壓高於平躺時血壓 (C)量血壓後，若要反覆再測一次時，二次之間至少應間隔 2 分鐘 (D)半側身麻痺的病人，應測患側之血壓

答案：39. (B) 40. (D) 41. (A) 42. (C) 43. (C) 44. (A) 45. (C) 46. (C) 47. (D)

註解：41. 會陰沖洗最佳的溶液為 N/S，沖洗壺壺口朝床尾，第一支棉棒由中間分開小陰唇、尿道口、陰道口至肛門方向清洗。

42. 頭髮糾結時可以用 50%或髮油協助梳開。

43. 酒精性優碘對傷口具刺激性，應用水滴性優碘。

44. 兒童耳滴藥或量耳溫時，耳朵應向後向下拉。

47. 半側身體麻痺病人，測量血壓時應採健側。

48. 下列有關血壓值變化的敘述，何者錯誤？(A)冬天血壓值上升，乃因末梢血管收縮，所以血壓上升 (B)測量血壓時，若使用的壓脈帶過窄，易造成收縮壓偏高的誤差 (C)一般而言，隨著年齡的增加，血壓值也跟著增加 (D)上午的血壓值較下午為高，乃因新陳代謝速率增加所致
49. 下列有關熱衰竭的敘述，何者錯誤？(A)皮膚乾燥，體溫上升至 $41-42^{\circ}\text{C}$ (B)發生時，應迅速將病人移至陰涼處，採垂頭仰臥式讓病人休息 (C)病人常會出現臉色蒼白、皮膚濕冷、大量流汗、脈搏快且弱 (D)係因身體潮濕且暴露於高溫過久
50. 瘧疾病患住院初期，早晚的體溫溫差大，可能升高或突然降低至正常體溫以下，稱為：(A)恆常熱(constant fever) (B)弛張熱(remittent fever) (C)間歇熱(intermittent fever) (D)再發熱(relapsing fever)
51. 梁先生住院期間，血壓值均維持在 $136\sim 146\text{ mmHg} / 78\sim 80\text{ mmHg}$ ，今早 9 點所測得的血壓值為 $156 / 88\text{ mmHg}$ ，請問最合宜之處理是：(A)請梁先生做完復健運動之後，再測量一次血壓 (B)立刻給予梁先生降血壓的藥物 (C)了解梁先生量血壓前，是否有活動、進食，並告知先休息 30 分鐘後，再測量一次血壓 (D)告訴梁先生一次血壓較高沒關係，若下午 5 點測量還是偏高，再做處理
52. 葉先生肺癌手術後第二天胸管留置，護理人員協助其採坐臥姿(Fowler's position)，下列敘述何者錯誤？(A)直接將床頭搖高 90 度 (B)此姿勢可促進胸腔引流 (C)可先將床尾搖高，以預防個案往床尾下滑 (D)同時用枕頭支托頭、頸及背部
- 情況：詹先生住院後因無法由口進食，決定給予插鼻胃管，請依此回答下列第 53 題至第 55 題：
53. 放置鼻胃管時，下列措施中，何者有誤？(A)協助病患採半坐臥或坐姿 (B)鼻胃管插入長度，約為鼻尖至劍突處之長度 (C)潤滑鼻胃管，不可使用油性潤滑劑 (D)鼻胃管進入口咽部時，可請病患做吞嚥動作，以利插入

答案：48. (D) 49. (A) 50. (C) 51. (C) 52. (A) 53. (B)

註解：48. 下午的血壓值較上午為高，因新陳代謝速率↑所致。

49. 熱衰竭的症狀為皮膚蒼白、濕冷、血壓降低、脈搏快且弱、體溫正常。

51. 梁先生該次血壓值偏高，應先了解有無造成血壓↑的原因，並再測量一次。

52. 坐臥姿(Fowler's position)為抬頭床頭 $45-60^{\circ}$ 。

53. 鼻胃管插入長度約為鼻尖經耳垂到劍突的長度。