



醫編（二）

（清）何夢瑤 撰

醫碥（二）

（清）何夢瑤 撰

廣西師範大學出版社
桂林 ·


GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

醫編卷之三

南海何夢瑞

雜症

○腫脹

腫脹有二。一因於水。水氣停蓄于肌膚。或藏府。因而肌膚或脣。
肚腹膨脹也。其色鮮明潤澤。其皮光薄。甚則如水晶其肉脹。其身重。
其脹不遠。每自下而上。腫有分界。按其手足上。如糟如泥。成窟。
不起。拔而散之。猝不能聚也。腹未築。不聚。以腹中氣盛水多。水挾氣能鼓起也。
壅滯作脹。所謂諸腹脹大。或氣寒不運作脹。所謂胃寒則脹。肥一因於氣。氣熱。
或氣實作脹。實者邪氣也。亦加氣因痰食盡血七情接觸而虛壅盛作脹。所謂脾氣實則腹脹。胃氣實則脹也也。

氣虛作脹。虛則不能運。所謂氣虛也。其色蒼老。皮厚肉堅。其脹或連胸膈。或候然而脹者。陽性急速也。或自上及下者。陽本乎上也。或通身盡脹者。氣無不至也。以手按之。隨手卽起者。如按氣囊也。兩足或有按之不能猝起者。以証既不同。施治亦異。然水與氣本一物。氣蒸成水。氣凝成水。水就下故也。病常相兼。水畜氣必滯。氣鬱水亦停。則治水當兼理氣。水行氣。氣行水。治氣當兼行水。水行氣自行。

治水當分陰陽。陰水無火之也。或益肺脾之陽水。或補命門之火。陽水有火之水也。隨火之所在而治之。少年。渴熱。丙畜最多此証。偏身腫。煩渴。小便赤澁。大便多閉。此屬陽水輕。宜四磨飲。見添磨生枳壳。兼進保和丸。見增。飲食重則疏鑿。飲子利之。以通爲度。亦

雖煩渴而大便已利者。宜用五苓加木通大腹皮以利小便。五苓見傷濕△

徧身腫不煩渴。大便自調。或溏泄。小便雖少而不赤澁。此屬陰水。宜質脾飲。小便如常。至晚有微赤。却無澁滯。亦屬陰也。不可遽補。木香流氣飲。觀繼進復元丹。若便不溏。氣息磨飲下黑丹。

見杞逆

陰水雖宜補陽。然小火不能勝大水。必先瀉去其水。乃用燮藥以補元氣。陰水雖寒。火亦鬱而成熱。寒水也。熱標耳。

金匱分五水曰風水皮水正水石水黃汗

風水脈浮。骨節疼痛。水流關節或重而酸。水在筋膚也。發熱無汗。惡風。外邪。面目腫大。目下微腫如蚕。如新臥起狀。目下屬太陰。又胃經筋散目下土虛則水

反。冠。筋。胃。脈。人迎脈也。水浮時時。未氣當發汗。脈而上注也。頸脈動。氣上逆故動。時時歎。侵肺。脈浮而洪。浮則爲風。洪則爲氣。氣鬱。風氣相搏。風強。熱也。則爲

癰。瘍。身體爲痺。痒爲泄風。言庠皆名爲泄風也。熱爲風。久爲癥

癩卽病癩以風熱久不散揚而爲渴。氣強則爲水。熱多而不得

渴。熱濕相蒸生蟲肌內潰腐也。氣強則爲水。外泄則蒸氣成水。難以俯仰。水浸淫于肌。

風氣相擊。身體浮腫。汗出乃愈。此

爲風水。此句上有惡風則虛句下有不惡風者。小便通利。上焦

爲風水。有矣。其口多沫。此爲黃汗之文。焦當是錯簡刪之。

水脈浮身重。汗出惡風者。防已黃耆湯主之。

固表以散風水。腹痛加芍

藥。加芍藥甘草以調中。風水惡風。一身悉腫。脈浮不渴。續自汗出。無大

熱。越婢湯主之。惡風則爲表陽虛。加附子。

皮水。皮受水濕也。脈浮。水在皮肉。濕邪從下旁入。膿不消。則附。故足跗浮腫。按之沒指。不

惡風非邪其腹如鼓

加鼓則非鼓也以水在皮膚不在腹內故外有脹形而內無滿喘也

不渴故不當發汗渴而不惡寒者此爲皮水

在表

渴此言渴者蓋皮水亦有淺深之分深而近裏亦足以抑遏陽氣不化津液故渴也

渴有水而無風故不渴

在裏

腫水氣在皮膚中防已茯苓湯主之

裏水當依金鑑作皮水

越婢加

术湯主之甘草麻黃湯亦主之

正水腎藏之水其腹如鼓脈沉遲喘

水逆于上故喘

石水脈沉腹滿不喘

陰盛結于少腹如石之下沉不上下故不喘

黃汗出沾衣如黃柏桂枝湯土黃爲熱所蒸故色黃如此

脈沉遲身發熱

濕滯陽氣不行

胸滿四支頭面腫不愈必致癰膿

濕熱久而愈盛氣血被其壅塞而成癰膿

身腫而冷狀如周痹胸中塞不能食

濕熱爲寒濕所鬱相

反聚瘡

熱爲寒濕所鬱相

攻擊故聚痛聚結

舊石

卷之三

三

也。暮躁不得眠。

暮則寒濕愈盛。熱故躁不得眠。

此爲黃疸。

黃汗身體脹發

熱汗出而渴。狀如風水。

皆面目浮腫也。脈自沉。以汗出入水巾浴水從

汗孔入得之。

水過傷汗液于肌內爲熱。斯蒸而成黃。

藥棲枝苦酒。

即釀湯主之。金鑑謂棲枝散邪。黃耆固衛。白芍酒酒方無清熱去濕之旨。徒取因斂得無妄乎。此方恐是錯簡。終不可用。

按風水皮水皆水之在表者。以感風受濕爲別。故有惡風與不惡風之分。正水石水皆水之在裏者。以上浮下沉爲別。故有喘與不喘之異。黃汗雖狀如風水。而風水脈不沉。汗不黃。自不同也。

黃汗當添黃疸門。

又按正水。水之上浮者必于肺。故喘。然肺自有水病。故金匱謂痛在骨節。數而喘不渴者。此爲肺脹。

本文字作脾。服令從金。

端改其狀如腫。似腫非腫。益肺脹。發汗則愈。越婢加湯又謂肺水之。中未形于外也。發汗則愈。越婢加湯又謂肺水其身腫。皮膚浮腫小便難。肺氣爲水所壅不能通調水道下輸膀胱時時鴨溏。水糞相雜大腸冰。是也。又按石水。水之下沉者。卽金匱所謂腎水者。腹大腫。腰痛。不得溺。陰腫舊在心水下。陰腫今從金罐移此。陰下濕。如牛鼻上汗。其足逆冷而反癟。言不若他水之而曰浮腫也。是也。又金匱謂肝水者。其腹大不能自轉側。脇下腹痛。時時津液微生。小便續通。水氣上升冲逆。有時生小便。有時通津液。得上下時通也。心水者。身重。少氣。印短不得卧。煩而躁。脾水者。腹大四支苦重。津液不生。脾濕。穀氣不運。不得升。故津液不生。水在肝部。別名肝氣弱。不化。是各藏皆有水也。水益隨所在而名之。

外水腰以下腫當利小便。宜用貼臍等法。巴豆去油四錢水銀
 綿一片布臍上內餌外用帛縛時許瀉下惡水三五次去藥白
 蒜補佐弱者隔日取一次一針可救三五人。一法華赤南陸根
 摩訶帛縛定水自小便出一法田螺四個大蒜五個車前子末
 三錢研成餌貼定帛縛少時尿利則愈或內服沉香琥珀丸卽
苦參歷子郁李仁防己沉香陳皮琥珀杏仁蘇子赤茯苓澤瀉麝香也。
 嘴急不得臥者蘇子厚歷等分棗肉丸。四肢腫宜五皮飲五
飲不論陰陽水俱可先用或除濕湯加木瓜腹皮如未効四磨飲兼吞桂黃丸仍用赤小豆粥佐之。
 感濕者腰以下腫尤甚。五苓散。見復風吞木瓜丸。見中風間進除濕湯。見中風加
 木瓜腹皮茱萸子炒。惟面與足腫早則面甚晚則足甚者風
 水也。風上行則面腫益濕氣非風不能上面也。濕下降則足腫。視大便之硬溼別其証之陰
 陽除濕湯。見中風加木瓜腹皮白芷可通用。或以蘇子降氣湯觀

除濕湯各半貼前腹

單面腫則獨用蘇子降氣
湯。單足腫則用除濕湯。

內水腹大。小

便不利。脈沉甚可下之。

十裏湯。濟川散。神裕丸。內攻散。舟車丸。

之類。益水可從小便利。亦可從大便泄也。

病輕者枳實白朮湯。

白朮補土。枳實破堅。張元素治病變此磨之。此水飲所作。

湯。烏丸。以彼屬食積所傷。故川丸以消故用湯以蕩涤之。

水脹冬瓜宜長吃。

鯉魚重一觔已上者。

煮。去腸雜。細切仰米

取汁。和冬瓜葱白作羹食之。

青頭鴨或白鴨。去腸雜。

細切仰米

煮粥空腹食之。

老鴨。生殺取血俟凝。銀簪割片。燒酒熱泡食

之。

鴨身去毛雜。燒酒頓爛。空心食。俱不着醫服。後小便利。腫立

消。忌鹽三年。

水腫外散。內利峻劑疏鑿飲子。和劑茯苓導水

湯。

醫貫胃虛不能制水者。以補土爲主。補中益氣湯。

六君子湯。一方並見氣分。

實脾飲。亦可。脾氣旺則水自行。不必加行氣利水之品。

若湯等。

若湯等。

卷一百一十一

三

三

三九二

腎火虛。三焦之氣化不行。關門不利。水聚不出。惟濟生腎氣丸。
見虛相火。最驗。若腎水虛火炎。水從火溢。上積于肺。喘不能臥。腹大
 膨脹。腰痛。兩足先腫。小水短澁。面赤或腫。口渴大便反燥。六味
加麥冬五味牛膝車前。
已上論水腫。

氣脹又名鼓脹。以其外雖堅滿。中空無物。止氣作脹耳。有似平鼓也。
 若兼中實有物。食痰血之類。盤踞藏府。如木之藏蠹。如皿之聚蟲。則
 又名蠱脹。又有中毒而致。鼓脹必浮革。蠱脹必牢實。治蠱如大
 黃芩硝牽牛檳榔三稜蓬术俱可用。一味地栗乾最妙。
 氣脹作脹。宜厚朴等以破滯。氣虛中滿。宜補氣。加芍藥等以收其散。
 滅更分寒熱。虛而寒者。寒脹中滿分消湯。虛而熱者。熱脹中滿

分消丸。七情服五膈寬中散。見反胃木香流氣飲沉香降氣湯。並見氣火大怒而脹分心氣飲。憂思過度而脹紫蘇子湯。大

病後浮腫白朮三錢參芪各一錢半白茯二錢陳皮半麥麴白芍木香各一錢炙草大腹皮各五分薑棗煎久瀉後服者六君子見加白朮麻桂附歸服後脹甚勿疑久自效因無而成水腫分利者飲之老人虛寒服厚朴炮附水香。因飲食所傷者氣必滿。乃當以通利之。前享薄中湯失飢傷飽痞悶停酸早食暮不食。見通利之法。食後氣易消暮則氣難化也大異香散畜血作脹腹皮上見青筋脈乳癰婦人多有此先以桃仁承氣湯。勢重者抵當湯下之或代抵當丸並見虛人不可下者且以活血活血散

增補

卷之二十三

二

調治。血脈多有煩燥。漱水不嚥。迷忘如狂。痛悶喘急。大便黑小便利虛。氣爲血鬱。熱蒸成血瘀逆等証。人參歸葛湯。痰能溝氣。勿謂不能住服。故古人治氣爲瘀鬱住服。加味枳术湯。氣水血三者病常相因。有先病氣滯而後血結者。如婦人先病氣鬱。致月經不行者是也。有病血結而後氣滯者。如婦人先病月經不行者是也。有先病水腫而血隨敗者。水積日久。滲透經絡。有先病血結而水隨者。血結則熱蒸成水。婦人月經不順化水腫。人參大黃湯。須求其本而治之。積聚相攻疼脹。初用七氣消聚散。日久弱者。參木健脾湯。少佐消導藥。鹽聚作脹。治法詳蟲門。已上論氣脹。○食血瘀強積聚。雖非氣爲主。故皆屬之氣也。

藏府外胸腹中邪充塞則胸腹脹。名經絡營衛氣無不到則血脈皮膚無不脹矣。

故有脈脹、膚脹之名。脈脹者筋起絡色變而脾胃者則飲食少。厲他藏府者則飲食如常。又屬

而

木香流氣飲治膚脹加陳芍姜黃治脈脹而欲知爲何部之邪。則先脹處與脹甚處是也。脾胃受邪則先從

而

胃脘痞塞起又屬經脈者飲食亦如常。又屬任皮膚分虛實。其藏府之氣本盛。被邪填塞不行者爲實。氣本不足。因

而

邪所壅者爲虛。虛中亦有挾實以其邪爲質者驅之。虛者補之。寒者熱之。熱者寒之。結者散之。留者行之。邪從外入內而盛于

而

中者。先治其外而後調其中。陰從下逆上而盛于中者。先抑之而調其中。陽從上降而盛于中者。先舉之而調其中。手足不

而

腫。獨腹脹謂之單腹脹。俗名蜘蛛蠱難治。以病全聚于藏府。不分散于四支也。實者

188

厚朴散虛者

調中健脾丸

厚朴散虛者。服藥後手足腫。病自內達外也。不久愈。若從手

足至腹。爲從外入內難治。以病全聚于臟腑不分散于四支也。

黃者厚朴散虛者調中健脾丸。

服藥後手足腫。病自內達外也。不久愈。若從手足腫至腹。爲從

外入內難治。

男自下而上。男陽盛邪不易犯。今乃以

而下。女陰盛邪不易侵。今亦以

漸上犯。則邪盛陽虛可知。女自上

而下。女陰盛邪不易侵。今亦以

知。皆難治。男止下腫。女止上腫。皆

譬如草寇竊發。原易撲滅。若直逼京師重地。乃可危耳。

予和治一婦水腫。四肢不舉。令以草貯布囊高支兩足而臥。乃服土涌下泄瀉之藥。自腰以上。水覺下行。自足跗以上。水覺上行。會於臍下。泄瀉而出。病大減。此法宜知勝於升提也。

診法。內水脈沉。外水脈浮。氣脹浮沉無定。氣時外行時內聚故也。

總以有神和緩有爲佳。忌弦細微弱。

水腫鼓脹死証。

腹脹身熱，陽盛而失血。

則陰亡矣，未清也。脫也。

陰盛可知。瀉數行。中亦腫先四肢後八腹。前利旋腫滿。服下利之藥。

而旋消旋勝。高起唇黑，肝脾笑，脾陰囊腐，腎缺益脊，足平心平，背平心平，益背平肺傷，足平腎傷。

腹筋青，青張脣黑，傷脾笑，傷陰囊腐，傷缺益脊，足平心平，背平心平。

足平腎傷，掌腫無紋，心脈虛濶，虛濶爲血氣敗腫，脹逢之總可驚。

○黃疸

病由濕熱蒸發如解廬相似。徧身頭目爪甲皆黃小便黃赤不利。有色如黃者有外感鬱熱與素有之濕相蒸，或外感于濕與素有之熱相蒸而發黃者，宜從汗解詳傷寒。誰有內生之濕熱相蒸者，在上則吐之，在下則下之，利之然有陽黃、陰黃之分，蓋熱勝。