

中国科学院华南植物园
中山大学



中国中草药

三维图典

第 2 册

叶华谷 李书渊 曾飞燕 李楚源 刘运笑 主编

原动植物图 / 手绘图 / 药材图 三位一体国内首创



SPM 南方出版传媒

广东科技出版社 | 全国优秀出版社



中国中草药

三维图典

第2册

叶华谷 李书渊 曾飞燕 李楚源 刘运笑 主编

SPM 南方出版传媒

广东科技出版社 | 全国优秀出版社

· 广 州 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国中草药三维图典. 第2册 / 叶华谷, 李书渊,
曾飞燕等主编. —广州: 广东科技出版社, 2017. 6
ISBN 978-7-5359-6717-6

I. ①中… II. ①叶… ②李… ③曾… III. ①中
草药—图谱 IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第076943号

中国中草药三维图典(第2册)

Zhongguo Zhongcaoyao Sanwei Tudian (Di-er Ce)

责任编辑: 杜怡枫

封面设计: 林少娟

责任校对: 冯思婧 谭曦 罗美玲

责任印制: 彭海波

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路11号 邮政编码: 510075)

http: //www. gdstp. com. cn

E-mail: gdkjyxb@gdstp.com.cn (营销)

E-mail: gdkjzbb@gdstp.com.cn (编务室)

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

排 版: 广州市友间文化传播有限公司

印 刷: 珠海市鹏腾字印务有限公司

(珠海市拱北桂花北路205号桂花工业村1栋首层 邮政编码: 519020)


规 格: 889 mm×1 194 mm 1/16 印张18.25 字数580千

版 次: 2017年6月第1版

2017年6月第1次印刷

定 价: 128.00元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。





编辑委员会

主 编 叶华谷 李书渊 曾飞燕 李楚源 刘运笑

副主编 廖文波 叶育石 陆颂规 黄志海 李步杭 肖胜武

编 委 (按姓氏笔画排序)

于 慧	王发国	王德勤	叶 赟	叶华谷	叶育石
付 琳	刘 冰	刘 念	刘运笑	杜怡枫	李书渊
李如良	李步杭	李泽贤	肖胜武	吴林芳	邹 滨
陆颂规	陈 珽	陈玉笋	陈巧明	陈有卿	陈海山
张 征	张慧晔	林汝顺	林清琴	罗 红	侯惠婵
秦新生	夏 静	唐秀娟	黄志海	黄珊珊	曹洪麟
曹照忠	曾飞燕	曾宪禹	翟俊文		

摄 影 叶华谷 邹 滨 叶育石 李泽贤 曾飞燕

绘 图 刘运笑 肖胜武 余 峰 余汉平 邓盈丰 邓晶发

本书承

“广东车八岭国家级自然保护区森林资源监测及数据采集项目 (GDHS16SGHG05042)、生态位差异在亚热带森林群落物种共存和生物多样性维持方面的作用研究 (33000-41031021)、广东省岭南药用植物资源保护与利用企业重点实验室 (产学研) 培育基地 (项目编号: 2012A061600005)”项目资助出版。

内 容 简 介

《中国中草药三维图典》共4册，本书为第2册，共收录212味常见中草药。为了多维度、全方位地反映中草药的形态特征、生长习性和药材鉴别要点，配有多角度拍摄和手绘的710余幅彩色图片；为系统反映中草药应用，本书还编排了各品种的功能主治、用法用量、附方等内容。

原动植物图、手绘图和药材图三图合一，联袂呈现，“三位一体”是本套书的最大特色和独创的表现形式。拍摄的植物彩色图片，生动地反映了植物不同生长期的原貌；植物科学画师在植物生境现场观察、解剖后描摹，为原植物进行“写真”，制作标准图片，艺术地再现了中草药的风貌；高清晰度的药材图片，科学地呈现了药材的显著鉴别特征。

本书可供广大中医药从业人员及爱好者、植物野外观察爱好者和植物手绘人员使用。



前 言

中医中药是中华民族文化的瑰宝，数千年来为中华民族的繁衍、昌盛起着非常重要的作用。中华民族使用中草药防病治病历史已久，迄今已有五千余年，为人类的发展做出了特有的贡献。

由于中草药使用历史悠久，分布地域广阔，种类繁多，来源复杂，加之历史医学著作多有良莠以及民间习惯用药等诸多因素，同名异物与同物异名现象普遍存在，新品种也在不断涌现，致使业界众说纷纭，中草药质量也参差不齐。

编者全面反映本套书所载中草药的原动植物的生长环境和习性，系统地介绍中草药的来源情况，厘清近似种及易混淆种的区别要点，历尽艰辛，跋山涉水，足迹遍布大江南北。在原植物生境地拍摄了大量的原色图片，生动地反映了植物不同生长期的原貌；拍摄了高清晰度的药材图片，科学地呈现了药材的显著鉴别特征；一批植物科学画师现场观摩、临摹，为原植物进行“写真”，制作标准图片，精确地反映植株和器官的形态特征，艺术地再现了中草药的风貌。负责中草药应用的专家查阅了大量资料，悉心纂写，历叙各药的别名、来源、动植物特征、生境、分布、采集加工、药材性状、性味归经、功能主治、用法用量、注意、附方和附注等。

本书力求以全球视野来描述中草药的生境分布和历史沿革，同时结合当代科研成果，希望能为中草药资源保护和科学利用提供参考。

由于中草药种类繁杂，加上编者的知识水平等方面的原因，书中错漏之处在所难免，祈盼海内外同道、读者批评指正，以便今后改正。

《中国中草药三维图典》编辑委员会

2017年4月



凡 例

一、本书共收录212味常见中草药。按中草药的药用部位进行编排，即全草类（67味）、根及根茎类（64味）、茎木类（23味）、皮类（6味）、叶类（9味）、花类（13味）、果实及种子类（20味）、藻类及菌类（4味）和其他类（6味）。

二、本书以中草药的正名或习用名为辞目，按顺序可列有：别名、来源、动植物特征、生境、分布、采集加工、药材性状、性味归经、功能主治、用法用量、注意、附方和附注等13个条目，资料不全的条目从略。

三、本书中绝大多数中草药附有原动植物、手绘和药材等3类彩色图片。对于有多来源的中草药图片均标明了其原动植物来源，而只有一种来源者则不标明。

四、部分手绘图包括原动植物全貌（或局部）和药材识别特征，在图片中分别标明。

五、药材性状条目下，对于有多来源的药材品种按来源分别叙述，详细描述常用的代表品种，其他来源的品种多仅反映与首选品种的不同之处。

六、药材图片的放大比例均附有比例尺。

七、凡有毒性的中草药，均在性味归经条目内注明。非毒性的中草药则不再标明。

八、用法先列内服法，后列外用法，除另有规定外，用法系指水煎内服。剂量以克为单位，如无特别说明，书中用量均为成人1日量，应用时需灵活掌握，但对有毒性的药物用量则须慎重。

九、品种项下收录的内容统称为正文。正文中来源于同一药用部位的中草药，按中文名笔画顺序排列，同笔画数的字按起笔笔形一丨ノ丶乚的顺序排列。

十、附注收录的药材图片均另行标注，但本条目中的原动植物拉丁名不突出标示，以区别于正文。

十一、本书附有中文名索引和拉丁名索引。

十二、本书附方仅供读者参考，需要时须咨询中医师，在中医辨证论治后使用。



一 全草类



一大山广小马天毛凤六水甘石北田
仙白半过血灯防红声灵鸡青虎败佩
金鱼狗泽珍茵鬼穿孩荷透倒浮崩崩
鹅塘蒲锦矮猗辣墨寮磨瞿

一点红	2
大飞扬草	4
大金牛草	5
大浮萍	6
山茨菇	8
山薄荷	9
广金钱草	10
广藿香	12
小飞扬草	14
小金牛草	15
马齿苋	16
马鞭草	17
天香炉	18
毛麝香	19
凤尾草	20
六耳铃	21
水蜈蚣	22
甘茶蔓	23
石上柏	24
石见穿	25
北刘寄奴	26
田基黄	27
仙鹤草	28
白眉草	29
半边莲	30
半枝莲	32
过天网	33
血见愁	34
灯心草	35
防风草	36
红水葵	37
红丝线	38
声色草	39
灵香草	40
鸡骨草	41
青香薷	42
虎耳草	43
败酱	44
佩兰	46

金丝草	47
金钱草	48
鱼腥草	49
狗肝菜	50
泽兰	51
珍珠草	52
茵陈	53
鬼羽箭	55
穿心莲	56
孩儿草	57
荷莲豆	58
透骨消	59
倒扣草	60
浮萍	61
崩大碗	62
篇蓄	63
鹅不食草	64
塘葛菜	65
蒲公英	66
锦地罗	67
矮地茶	68
猗荳草	69
辣蓼	71
墨旱莲	72
寮刁竹	73
磨盘草	75
瞿麦	76

二 根及根茎类



八三千土山千川广天木五牛毛风乌
仙白玄走地百当竹防红两岗郁虎金
南重独姜穿铁黄常章商猕紫糯

八角枫	80
三颗针	81
干姜	83
土茯苓	84
土党参	85
土萆薢	87
山芝麻	88
山豆根	89
山药	90
山海螺	92
千斤拔	93

川芎	95
广东狼毒	96
天南星	97
天麻	99
木香	100
五指毛桃	101
牛大力	102
牛膝	103
毛冬青	104
风沙藤	105
乌药	106
仙茅	107
白毛蛇	108
白芍	109
白芷	110
白背叶根	112
白菰	113
白薇	114
玄参	115
走马胎	116
走马箭	117
地黄	118
地榆	120
百合	122
当归	124
竹节参	125
防己	126
红大戟	127
两面针	128
岗梅根	129
岗稔根	130
郁金	131
虎杖	135
金锁匙	136
南丹参	137
南沙参	138
重楼	140
独活	142
姜黄	143
姜商陆	144
穿破石	145
铁包金	147
黄马胎	148
黄连	149
黄花倒水莲	152

黄精	153
黄藤	156
常山	157
章表根	158
商陆	159
猕猴桃根	161
紫菀	162
糯稻根	163

三 茎木类



九三大川广小古石白过血江青苦
胆络宽通紫猴漆

九里香	166
三丫苦	168
大驳骨	169
川木通	170
广东络石藤	172
小驳骨丹	173
小通草	174
古山龙	177
石楠藤	178
白花丹	179
白花茶	180
过岗龙	181
血风藤	182
江南柏	183
青风藤	184
苦木	185
胆木	186
络石藤	187
宽筋藤	188
通草	189
紫花杜鹃	191
猴耳环	192
漆大姑	193

四 皮类



地杜厚海椿藤

地骨皮	196
杜仲	198
厚朴	199

海桐皮	201
椿皮	202
藤杜仲	203

五 叶类



小布龙竹青苦枇罗胡

小野鸡尾	206
布渣叶	207
龙利叶	208
竹卷心	209
青蒟叶	210
苦丁茶	211
枇杷叶	212
罗汉叶	213
胡颓子叶	215

六 花类



千木辛鸡茱蚌凌黄旋密蒲

千日红	218
木芙蓉花	219
木棉花	220
木槿花	221
辛夷	222
鸡冠花	224
茉莉花	225
蚌花	226
凌霄花	227
黄花杜鹃	228
旋覆花	229
密蒙花	231
蒲黄	232

七 果实及种子类



八土大山广小马乌水石龙白冬光
决赤芡豆

八角茴香	236
土花椒	237
大风子	238
山橙	239

广枣	240
小茴香	242
马钱子	243
马兜铃	244
乌梅	245
水红花子	246
水杨梅	247
石榴皮	248
龙眼肉	249
白扁豆	250
冬瓜皮	251
光皮木瓜	252
决明子	253
赤小豆	254
芡实	255
豆蔻	256

八 藻类及菌类



马石海银

马勃	260
石耳	261
海藻	262
银耳	263

九 其他类



儿天虫安芦青

儿茶	266
天竺黄	267
虫白蜡	268
安息香	269
芦荟	270
青黛	272

参考文献	273
中文名索引	274
拉丁名索引	281



全草类

QUAN CAO LEI



一点红

【别名】红背叶、叶下红、羊蹄草。

【来源】本品为菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC. 的全草。

【植物特征】一年或多年生草本。茎直立或近基部倾斜，绿色，高10~50 cm，枝条粉绿色。叶互生；叶片稍肉质，生于茎下部的叶卵形，长5~10 cm，宽3~6.5 cm，先端钝，边缘琴状分裂；茎上部的叶较小，倒卵状长圆形或长圆形，全缘或有细齿，无柄而抱茎，叶背常带紫红色。头状花序具长梗，花期时直径1~1.3 cm，为疏散的伞房花序；总苞圆筒形，深绿色，总苞片1层；花紫红色，全为两性管状花；花冠长约8 mm，檐部稍扩大，5深裂。瘦果圆柱形，具5纵棱，长3~4 mm。冠毛白色，柔软，略短于花冠。花期7—11月，果期9—12月。

【生境】常生山坡草地、荒地、田边和耕地上。

【分布】广东、香港、海南、云南、贵州、四川、湖北、湖南、江苏、浙江、安徽、福建、台湾等地。亚洲其他热带地区和非洲也有分布。

【采集加工】夏、秋季采收，晒干。

【药材性状】本品长20~50 cm。根细而弯曲，灰黄色，有须根。茎圆柱形，直径2~3 mm，暗绿色或黄绿色，下部被茸毛。叶多皱缩，展平后基生叶呈琴状分裂，长5~10 cm，灰绿色或暗绿色，顶端裂片大；茎生叶较小，全缘或具齿，基部抱茎。头状花序2~3个排成伞房状，总苞圆柱形，

总苞片1层，呈线状披针形或近线形，长约1 cm，花为管状，棕黄色。瘦果狭长圆形，长约3 mm，有棱，冠毛白色。气微，味苦。以叶多、色绿者为佳。

【性味归经】味苦，性凉。归肺、胃、大肠经。

【功能主治】清热利尿，散瘀消肿。用于上呼吸道感染，咽喉肿痛，口腔溃疡，疖肿疮疡，皮肤湿疹，跌打损伤。可治疗扁桃体炎，肺炎，乳腺



炎，急性肠炎，细菌性痢疾，泌尿系统感染，睾丸炎。

【用法用量】用量15~30 g；或鲜品捣烂取汁缓饮。外用适量，鲜品捣烂敷患处。

【附 方】

① 小儿上呼吸道感染，急性扁桃体炎：一点红、古羊藤各等量，每500 g煎药液500 mL。3个月至3岁，每次20~40 mL；3岁以上酌增。

② 大叶性肺炎：一点红、岗梅各30 g，十大功劳15~30 g，水煎，分2次服。每日1剂。

③ 泌尿系统感染，睾丸炎：一点红、狗肝菜各500 g，车前草250 g，加水1500 mL，煎成500 mL。每次服20 mL，每日3次。

④ 麦粒肿：一点红、千里光、野菊花各9 g，水煎，分2次服。每日1剂。

⑤ 疖，蜂窝组织炎，脓肿，乳腺炎，甲沟炎：一点红、穿心莲、白花蛇舌草、鸡骨香、两面针各30 g，共研细粉。高压消毒后，加凡士林至1000 g，即成15%的药膏。敷患处，每日1次。

⑥ 接断趾：一点红、千里光各等量。捣烂，加红糖少许外敷。用于



治疗前首先应清创，正确复位，皮肤缝合，小夹板固定，每日换药1次。换药时用25%穿心莲溶液清洗伤口。

⑦ 乳腺炎，疖肿：（1）鲜一点红适量，加食盐少许，捣烂敷患处，每日换1次。（2）鲜一点红30 g（干品15 g），水煎服。

⑧ 无名肿毒，口疮：鲜一点红的茎叶适量，加红糖水少许，捣烂敷患处，每日换2次。

⑨ 跌打损伤，瘀血肿痛：鲜一点红、酢浆草各适量，捣烂，加酒少许，热敷患处。

大飞扬草

【别名】大乳汁草、天泡草、大飞羊、节节花。

【来源】本品为大戟科植物飞扬草 *Euphorbia hirta* L. 的全草。



【植物特征】一年生草本。高15~50 cm。含白色乳汁，常淡红色或淡紫色，被长硬毛，基部分枝。单叶对生，长圆状披针形或卵状披针形，长1~4 cm，叶面中部常有紫斑，两面包被毛；叶柄长1~2 mm；托叶小，披针形，边缘刚毛状撕裂。花序杯状，多数排列成密集的腋生头状花序状，总花梗长约0.5 mm；总苞片钟状，外面密被短柔毛，顶4裂，腺体4，有白色花瓣状附属物；花单性，无花被，雌雄花生于同一总苞内；雌花单生于花序中央；雄花几朵位于雌花外围，每花仅雄蕊1。蒴果卵状三棱形，长1.5 mm，被短柔毛。花、果期5—12月。

【生境】生于村镇路旁或草地。

【分布】我国南部各省区。世界热带地区多见。原产中美洲。

【采集加工】夏、秋二季采挖全草，洗净，晒干。

【药材性状】本品长15~50 cm，地上部分

被长硬毛。根细长而弯曲。茎近圆柱形，直径1~3 mm，黄褐色或红棕色；质脆，易折断，断面白色，中空。叶对生，常皱缩，易破碎，完整叶展平后长圆状卵形或略近披针形，长1~4 cm，绿褐色或灰黄色，基部偏斜，边缘有细钝齿，有3条明显的基出叶脉。杯状聚伞花序密集成头状，腋生。蒴果卵状三棱形。气微，味淡、微涩。以叶多、色绿者为佳。

【性味归经】味酸、微苦，性凉；有小毒。归肺、膀胱、大肠经。

【功能主治】清热解毒，利湿止痒，通乳。用于肺痈，乳痈，疔疮肿毒，牙疳，痢疾，泄泻，热淋，血尿，细菌性痢疾，阿米巴痢疾，肠炎，肠道滴虫，支气管炎，肾盂肾炎。外用治



湿疹，脚癣，皮炎，皮肤瘙痒。

【用法用量】用量6~10 g。外用适量，鲜品捣烂敷患处或鲜品煎水洗患处。

【注意】孕妇慎用。

【附方】

① 细菌性痢疾，急性肠炎，消化不良，肠道滴虫：大飞扬草60~300 g，水煎，分2~4次服。

② 慢性气管炎：鲜大飞扬草120 g，桔梗9 g，水煎2次，每次煎煮2小时，过滤，合并滤液混合浓缩至60 mL，加白糖适量。每次服20 mL，每日3次。10日为1个疗程，连服两个疗程。

③ 湿疹：大飞扬草1000 g，黑面神2000 g，毛麝香250 g，加水45000 mL，煎成15000 mL。根据湿疹部位可选择坐浴、湿敷或外涂。有感染者，加穿心莲煎水内服。

④ 脚癣：大飞扬草330 g，白花丹220 g，小飞扬、乌柏叶、五色梅、扛板归各110 g，水煎2次，过滤去渣，浓缩成1000 mL。搽患处。



大金牛草

【别名】大金不换、紫背金牛、华南远志。

【来源】本品为远志科植物金不换 *Polygala glomerata* Lour. [*Polygala chinensis* L.] 的全草。



毛，种阜盔状。花期4—10月。

【生境】生于山坡、路旁等草地。

【分布】海南、广东、福建、广西、云南等地。印度、越南、菲律宾也有分布。

【采集加工】夏、秋季采收带根全草，抖净泥沙，晒干。

【药材性状】本品长10~20 cm。根单一。茎单一或有少数分枝，直径0.15~0.2 cm，灰绿色至灰褐色，微有短毛。叶互生，倒卵形、长圆形至长圆状披针形，长2~5 cm，暗绿色至黄褐色，顶端钝或短尖，基部楔形，全

缘，边缘稍反卷，有时叶腋间残存短小的总状花序或果序。气微，味淡。以叶多、色绿者为佳。

【性味归经】味甘、淡，性平。归肺、脾经。

【功能主治】清热解毒，祛痰止咳，平肝消积，活血散瘀。用于咳嗽胸痛，咽炎，支气管炎，肺结核，百日咳，小儿疳积，肝炎，小儿麻痹后遗症，痢疾。外用治痈疽，疔肿，跌打损伤，毒蛇咬伤。

【用法用量】用量15~30 g。外用适量，鲜品捣烂敷患处。

【植物特征】一年生直立草本。高10~50 cm。小枝圆柱形，被皱曲短柔毛。叶互生，膜质，倒卵形、椭圆形或披针形，长2.5~5.5 cm，宽1~1.5 cm，先端钝，基部楔尖，全缘而反卷，疏被短柔毛；中脉在上面具槽，侧脉不明显；叶柄短，被柔毛。花淡黄色、白色或微红，两侧对称，排成腋生、少花的总状花序；苞片脱落；萼片5，被缘毛，外面3枚小，卵状披针形，长约2 mm，里面2枚大，镰刀形，具爪；花瓣3片，基部合生，侧生2片较短，内侧基部有一束白色柔毛，龙骨瓣长约4 mm，顶部背面有2束条裂的鸡冠状附属物；雄蕊8，花药顶孔裂。蒴果圆形，直径约2 mm，边缘有狭翅和缘毛；种子被



大浮萍

【别名】水浮莲、水浮萍。

【来源】本品为天南星科植物大藻 *Pistia stratiotes* L. 的全草。

【植物特征】水生飘浮草本。须根密集。叶簇生成莲座状，叶片倒三角形、倒卵形、扇形至倒卵状长楔形，长1.5~10 cm，宽1.5~6 cm，两面被毛。佛焰苞生于叶腋内，叶状，白色，长0.5~1.2 cm；肉穗花序短于佛焰苞，花单性，无花被；上部雄花序有花2~8，雄蕊2；下部雌花序具单花，子房1室。浆果卵圆形。花期5—11月。

【生境】生于池塘、水沟等处。

【分布】香港、广东、广西、海南、台湾、福建、江西、江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、山东、云南、四川。全球热带及亚热带地区均

有分布。

【采集加工】夏季叶片茂盛时捞取，除去须根，晒干。

【药材性状】本品皱缩成团块状，无茎。叶簇生，叶片展开后呈倒卵状扇形，长3~10 cm，宽3~4 cm，淡绿色至黄绿色，两面均有柔毛。叶脉自基

部扇状伸展。下部有时残留须根。质松软，易碎。气微，味咸。以叶片大、色青绿、除净须根者为佳。

【性味归经】味辛，性凉。归肺、膀胱经。

【功能主治】疏风透疹，利尿除湿，凉血活血，解毒。用于风热感冒，麻





疹不透，荨麻疹，水肿，小便不利，风湿痹痛，皮肤瘙痒，丹毒，无名肿毒。外用治汗斑，湿疹。

【用法用量】用量9~15 g。外用适量，鲜品捣汁涂患处或煎水洗患处。

【注 意】孕妇忌服。本品根有微毒，内服应去须根。

【附 方】

① 荨麻疹：大浮萍、亚麻仁、皂刺、刺蒺藜、海桐皮各9~15 g，水煎服。

② 湿疹：大浮萍90 g，焙干研末，炼蜜为丸服。

③ 水肿：大浮萍、糖各120 g，清水3碗，煎成1碗，分3次服。服后大量排尿，肿胀便消。忌食盐。

【附 注】本品为广东和广西地方性习惯用药，与《中华人民共和国药典》所载浮萍不同，后者为浮萍科紫萍 *Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid. 的全草。



山茨菇

【别名】土细辛。

【来源】本品为马兜铃科植物山慈菇 *Asarum sagittarioides* C. F. Liang 的全草。



【植物特征】多年生草本。根茎匍匐，有许多绳索状须根；须根肉质，直径1~2.5 cm，有辛辣味。叶生于根茎上，近簇生，叶片近革质，卵形至戟形，长10~20 cm，宽6~12 cm，先端常渐尖，基部心形，后裂片耳形，下伸或稍外展，叶面略被毛，有浅绿色斑块，背面脉上被短柔毛；叶柄长达30 cm。花早春开放，蓝紫色，1或2朵腋生；花被管倒葫芦形，中部缢缩，盛开时檐部直径约4 cm，裂片阔卵形，长1.5 cm，宽1.8 cm，里面有疣状突起；雄蕊6，花丝极短；花柱中部以下合生。

【生境】生于山谷溪边林下阴湿处。

【分布】广东、广西。

【采集加工】全年可采，全草鲜用或晒干。

【药材性状】本品略卷缩，灰棕色至灰褐色。根茎短，节上肉质绳索状须根，长5~12 cm，直径1~2.5 mm，灰黄色，质硬而脆，易折断，断面白色，粉性。叶生于根茎的节上，稍密，有长叶柄，叶片卵形至戟形，稍厚，长7~15 cm或更长，顶端渐尖，后裂片呈耳垂状至三角形，有时叉开；叶面青褐色至棕褐色，叶背较浅，叶脉网状，有灰白色短柔毛。花腋生，花柄长1~1.5 cm，花被管基部膨大，中间缢缩，檐部3裂，裂片宽卵形，顶端短尖，灰褐色，喉部有白色疣状物。气辛香，味辛辣麻舌，微苦。以根叶

齐全、叶褐色、根断面粉白色、味辛辣者为佳。

【性味归经】味辛，性温；有小毒。归肺、脾、胃经。

【功能主治】祛风散寒，解毒，止痛。用于感冒头痛，咳嗽痰多，牙痛，跌打肿痛，毒蛇咬伤。

【用法用量】用量3~6 g。

【附注】本品为华南地区习惯性用药，原植物多种。除本种外，广东北部产的山慈菇多为大花细辛 *Asarum magnificum* Tsiang ex C. Y. Cheng et C. S. Yang 和五岭细辛 *Asarum wulingense* C. F. Liang。

