



新编 常用临床药物 手册

主编 卢晓阳 饶跃峰

从 A-Z 中英文通用名称 国际音标 记忆法 一句话药理 常用适应证
相关联药物 常规用法用量 禁忌证 妊娠哺乳安全等级 管理属性



人民卫生出版社



新编常用临床 药物手册

名誉主编:王伟林

主 编:卢晓阳 饶跃峰

副 主 编:马葵芬 郑飞跃 胡云珍 姜赛平

编 者 (以姓氏笔画为序):

马葵芬	王临润	王融溶	石佳娜	卢晓阳
叶子奇	朱玥璇	羊红玉	李 茵	李 慧
李 鑫	杨 思	吴秀华	吴佳莹	沃佩斌
郑飞跃	单文雅	赵璐萍	胡云珍	柳 琳
饶跃峰	姜赛平	洪 昀	徐 强	缪 静

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编常用临床药物手册/卢晓阳,饶跃峰主编. —北京:人民卫生出版社,2017

ISBN 978-7-117-24081-9

I. ①新… II. ①卢… ②饶… III. ①临床药学-手册
IV. ①R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 023272 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康, 购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

版权所有,侵权必究!

新编常用临床药物手册

主 编: 卢晓阳 饶跃峰

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph @ pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京市艺辉印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 11.5

字 数: 309 千字

版 次: 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 版第 2 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-24081-9/R · 24082

定 价: 27.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ @ pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

序

合理用药是提高药物治疗水平、降低医疗费用、使人民群众获得优质医疗服务的必要条件,也是反映医疗水平的重要环节和推进医改进程的重要内容。强化合理用药可以为患者获得安全、有效、经济的药物治疗提供保障,同时也可减轻家庭和社会的经济负担,使有限的医疗资源得到优化配置,具有巨大的经济效益和深远的社会效益。

随着当今国内外新药物的开发和上市日新月异,医疗领域的国际交流与合作日趋频繁,在这样的时代背景下,一本融汇中西、特色鲜明的药物手册的出版既符合时代的需求,也是医药学科发展和进步的体现。

《新编常用临床药物手册》一书的编写汇集 20 余位一线医院药师多年的工作临床实践和教学经验,他们长期工作在临床药学实践和教学的第一线,不仅具有实践经验,还具有很丰富的教材编写经验,这些都为本书的编写质量的可靠性、药物信息的准确性以及临床指导的适用性提供了有力保证。本书在广泛调研国内外经典药物治疗相关著作的基础上,征询各方医药专家意见,集思广益,将临床常用的 600 余种药物按药名首字母拼音顺序进行逐一介绍,包括各个药物的中英文标准通用名、国际音标、构词解析、药理机制、适应证、相关词汇、常用给药途径及成人常用日剂量等,结合临床用药的特点,采用统一而科学的编排方式,将这些重要信息汇编成一册,内容简明精炼、实用易读,可

作为广大医务人员用药知识日常学习和查询的口袋用书。希望此新编药物手册的出版,能进一步提升医疗机构药事管理水平,促进合理用药,从而实现医疗服务质量的持续改善,更好地为广大人民群众健康服务。

中国工程院院士

传染病诊治国家重点实验室主任

国家感染性疾病协同创新中心主任

李在明

2017年4月于杭州

前言

随着国际化程度的提高,医疗卫生领域的国际交流与合作也在不断深入。大量医务人员出国访问与交流,来国内讲学、工作和学习的外籍专业人士日益增多。为此,一本体现国际化特色、融贯中西的《新编常用临床药物手册》应运而生。

全书将临床常用药物按通用名首字母拼音顺序进行逐一介绍,其中包括每种药物的中英文标准通用名称、国际音标、记忆法、一句话药理、批准适应证、相关联药物、常规用法用量、禁忌证、妊娠及哺乳安全等级、药物管理属性等内容,附录包括常用药名词干中英文对照及举例表、美国 FDA 药物妊娠安全性分类、Hale 博士药物哺乳期危险性等级分类、《处方管理办法》、特殊药品目录等重要药学实践相关信息。

全书内容简明而扼要,排版新颖而易读,对每一个药物的描述涵盖了药物命名规则、药物化学、药理学、药物治疗学的思路和规则,并紧密贴近临床实践。编者参阅大量文献和典籍,并根据多年实践经验和国际交流学习心得,将临床药物治疗相关内容汇于一册,以便为广大医务工作者提供方便、准确、快捷的药物信息,促进临床药物的合理使用。同时,本书也可作为了解医药专业、学习药学专业外语的参考书。

在本书编写过程中受到多方专家及同道的指点和帮助,在此致以最诚挚的感谢。

限于编者水平,书中难免有不妥或谬误之处,恳望各位读者批评指正,以期在今后的实践和学习中得以改善。不胜感激!

编者

2017年3月 杭州

使用说明

本手册收录的药物信息主要包括了药品的中文通用名称、英文名称(INN)、国际音标、记忆法、所属类别、药理作用、临床适应证、相关联药品、常规用法用量、禁忌证、妊娠安全等级、哺乳安全等级及是否属于基本药物、非处方药(OTC)或特殊管理类药品等重要信息,每个收录药物均以如下版式编排:

法定通用名	INN名称+国际音标	记: 构词法、词根、词缀等, 常用商品名(英文)
对乙酰氨基酚 依次:妊娠、哺乳、基药、OTC、精麻等属性	acetaminophen[æ,sitə'minɒfən] 【记】acet(乙酰基), amino-(氨基), phen(phenol苯酚, 又称“扑热息痛(paracetamol)”, 商品名有“泰诺林(Tylenol)”。 【类】非甾体抗炎药(NSAIDs) 【药】唯一可单方口服的苯胺类NSAIDs, 作用机制与布洛芬、双氯芬酸类似, 具有较强解热、镇痛作用, 抗炎作用弱, 大剂量或长期使用易导致肝脏损伤, 用于感冒引起的发热及缓解各种轻至中度疼痛。 【联】phenacetin非那西丁; benorilate贝诺酯; propacetamol丙帕他莫 【量】口服, 一次325-650mg, 一日不超过4g, 可间隔4-6小时重复用药一次; 解热用不超过3天, 止痛用不超过5天。 【禁】(严重)肝、肾功能不全者禁用。	类: 药物类别(小类), 可能有多种类别, 不超过三种 药: 前半句主要药理作用和特点, 后半句主要适应证 联: 药理作用最相近的、容易混淆的、结构派生的等; 一般列2~3个药
量: 常用剂型的成人常用剂量, 口服、注射、栓剂等用法	禁: 最主要的禁忌证; 过敏者禁用等普识一般不列	

注:

1. 本手册中药物均为通用名称,但很多药物国内外生产企业众多,书中提供的信息,尤其是涉及使用方法、剂量、疗程等信息如与批准的药品说明书不同时,以药品说明书为准。

2. 本手册以收录临床常用的单方西药为主,未收录复方药物及中成药。

目 录

第 1 单元:A	阿苯达唑—奥硝唑	1
第 2 单元:B	巴利昔单抗—布托啡诺	29
第 3 单元:C	茶苯海明—醋氯芬酸	52
第 4 单元:D	达比加群—多西他赛	57
第 5 单元:E	厄贝沙坦—二氢麦角碱	76
第 6 单元:F	伐地那非—福辛普利	81
第 7 单元:G	钆喷酸—桂哌齐特	99
第 8 单元:H	红霉素—茴拉西坦	106
第 9 单元:J	吉法酯—胍屈嗪	111
第 10 单元:K	咖啡因—喹硫平	121
第 11 单元:L	拉贝洛尔—氯唑西林	133
第 12 单元:M	麻黄碱—莫西沙星	162
第 13 单元:N	那格列奈—诺氟沙星	175
第 14 单元:P	帕利哌酮—普瑞巴林	180
第 15 单元:Q	七叶皂苷钠—炔诺酮	193
第 16 单元:R	绒促性素—瑞替普酶	206
第 17 单元:S	塞来昔布—索利那辛	210
第 18 单元:T	他克林—妥布霉素	226
第 19 单元:W	万古霉素—五氟利多	245
第 20 单元:X	西地那非—血凝酶	250

第 21 单元:Y 亚胺培南—愈创甘油醚	263
第 22 单元:Z 扎鲁司特—唑来膦酸	280
附录	285
附录 1 常用药名词干中英文对照、定义及举例	285
附录 2 美国 FDA 药物妊娠安全分类说明	300
附录 3 Hale 博士哺乳期用药危险性等级说明	302
附录 4 《处方管理办法》	304
附录 5 特殊药品目录	314
药理分类索引	332
英文药名索引	343

第1单元: A

阿苯达唑	albendazole[æl'beɪdəzəʊl]
【C】	【记】al(音“阿”),-bendazole(苯达唑,噻苯达唑类衍生物),商品名有“肠虫清”“Albenza”。
【L3】	
【基】	【类】抗感染药;抗寄生虫药
【OTC】	【药】高效低毒的广谱抗寄生虫药,作用机制与甲苯达唑类似,在体内迅速代谢为砒结构,阻断虫体对多种营养和葡萄糖摄取,抑制寄生虫胞浆微管系统聚合,导致虫体糖原耗竭,用于蛔虫病、蛲虫病等寄生虫病。
	【联】甲苯达唑 mebendazole;奥苯达唑 oxibendazole
	【量】口服,一次 400~800mg,一日 1~2 次。
	【禁】2 岁以下小儿及妊娠期妇女禁用;蛋白尿等各种急性疾病患者、严重肝肾功能不全、活动性溃疡患者禁用。
阿达帕林	adapalene[ə'dəpə:li:n]
【C】	【记】ada(音“阿达”,adamantyl 金刚烷基),palene(音“帕林”,naphthalene 萘,萘衍生物),商品名有“达芙文(Differin)”。
【L3】	
	【类】祛痤疮药;皮肤科用药
	【药】维 A 酸类似物,具有抑制角质形成细胞过度增生并促进其分化作用,作用于维 A 酸核受体,选择性作用更高,还具有抗炎作用,用于粉刺、丘疹、脓疱等寻常型痤疮,不得用于皮肤破损处及严重性痤疮。
	【联】阿维 A acitretin;过氧化苯甲酰 benzoyl peroxide
	【量】涂患处,一日 1 次,睡前清洗患处后使用。
	【禁】对本品成分过敏者禁用。

阿德福韦 【C】 【L4】	adefovir[¹ædəfəviə] 【记】ade(音“阿德”,表 adenine 腺嘌呤),-fovir(福韦,抗病毒药),商品名有“贺维力(Hepsera)”。 【类】抗肝炎病毒药;核苷类逆转录酶抑制剂(NRTI) 【药】核苷类似物,作用机制及适应证与拉米夫定类似,在体内后转化成有活性的二磷酸酯,抑制病毒 DNA 聚合酶而起抗病毒作用,用于 HBV 复制活跃或血清转氨酶 ALT 持续升高的慢性乙型病毒性肝炎。 【联】拉米夫定 lamivudine;替诺福韦 tenofovir 【量】口服,一次 10mg,一日 1 次。 【禁】对本品过敏者禁用。
阿伐斯汀 【B】	acrivastine[¹ækri:'væsti:n] 【记】acriv(音“阿伐”,acrylic 丙烯酸),-astine(斯汀, H₁ 受体拮抗剂),商品名有“欣民立(Semprex)”。注意与抗肿瘤药贝伐珠单抗商品名阿瓦斯丁(Avastin)区别。 【类】抗组胺药;H₁受体拮抗剂 【药】第二代抗组胺药,竞争性拮抗组胺 H₁受体,抑制组胺引起的过敏反应,镇静等中枢副作用少,作用与咪唑斯汀类似,半衰期较短(2~3 小时),用于变应性鼻炎、荨麻疹、湿疹、皮肤瘙痒等过敏性病症。 【联】咪唑斯汀 mizolastine;依美斯汀 emedastine 【量】口服,一次 8mg,一日 2 次。 【禁】对阿伐斯汀或曲普利啶过敏者禁用。
阿法骨化醇 【基】	alfacalcidol[¹ælfə'kælsidɒl] 【记】alfa(音“阿法”,α 位羟基修饰),calci-(维生素 D 类似物,calcium 钙,钙相关的),-ol(醇或酚),商品名有“阿法迪三(Alpha D3)”。 【类】维生素 D 类药;骨密度保护剂 【药】经肝脏转化为有活性的骨化三醇,促进肠道对钙、磷酸盐的吸收,促进骨矿化及降低甲状旁腺激素水平,用于防治骨质疏松症、佝偻病、甲状旁腺功能异常等引起的钙缺乏相关疾病。

续表

阿法骨化醇 【基】	【联】骨化三醇 calcitriol; 维生素 D₂ vitamin D₂; 他卡西醇 (外用治疗银屑病) tacalcitol 【量】口服, 一次 0.5~1μg, 一日 1 次。 【禁】高钙血症、高磷酸盐血症(伴有甲状旁腺功能减退者除外)、高镁血症及维生素 D 中毒症状患者禁用。
阿芬太尼 【麻】	alfentanil[æl'fentənil] 【记】al(音“阿”), -fentanil(芬太尼, 芬太尼类衍生物药), 商品名有“Rapifen”。 【类】麻醉性镇痛药; 阿片类药 【药】静脉速效麻醉性镇痛药, 芬太尼的四氮唑衍生物, 亲脂性强, 起效快, 给药后 1 分钟即达最大镇痛作用, 作用维持时间短, 镇痛强度约为芬太尼的 1/4, 用于小手术麻醉时快速镇痛及复合全麻等。 【联】瑞芬太尼 remifentanil; 舒芬太尼 sufentanil 【量】静脉注射, 7~15μg/kg, 按需给药。 【禁】对阿片类药物过敏及明显不能耐受吗啡类药物患者禁用。
阿加曲班 【B】 【L4】	argatroban[a:ɡə'trəbæn] 【记】arga(音“阿加”, arginine 精氨酸), -troban(曲班, 血栓抑制剂, 血栓素 A₂ 受体拮抗剂), 商品名有“诺保思泰(Novastan)”。 【类】抗凝血药 【药】人工合成的选择性凝血酶抑制剂, 能选择性抑制由凝血酶引起的血小板聚集, 有纤维溶解的促进作用, 用于防治慢性动脉闭塞症, 改善四肢溃疡、静息痛及冷感等症。 【联】达曲班 daltroban; 达比加群 dabigatran; 阿哌沙班 apixaban 【量】静脉滴注, 一次 10mg, 一日 2 次, 疗程不超过 4 周。 【禁】出血性患者、脑栓塞或有可能患脑栓塞症的患者、伴有严重意识障碍的梗死患者禁用。

阿卡波糖	acarbose[ə'kɑ:bəʊs] 【B】【记】a(表加强),carb(carbo-碳,含碳的),-ose(糖,葡萄糖衍生物),一种微生物来源的假性四糖,商品名有“拜唐苹(Glucobay)”。 【L3】 【基】 【类】口服降糖药;α-糖苷酶抑制剂 【药】口服糖苷酶抑制剂,在胃肠道内竞争性抑制α-葡萄糖苷水解酶,降低多糖分解为葡萄糖,减少机体对葡萄糖的吸收利用,配合饮食控制,用于2型糖尿病及降低糖耐量低减者的餐后血糖。 【联】伏格列波糖 voglibose;二甲双胍 metformin 【量】口服,餐前即刻整片吞服或与前几口食物一起咀嚼服用,一次50~100mg,一日3次。 【禁】有明显慢性胃肠功能紊乱患者、患有肠胀气且可能恶化的患者、严重肾功能损害(肌酐清除率低于25ml/min)患者禁用。
阿立哌唑	aripiprazole[æri'paɪprəzəl] 【C】【记】ari(音“阿立”),-piprazole(哌唑,苯基哌嗪衍生物), 【L3】商品名有“安律凡(Abilify)”。 【基】 【类】非典型性抗精神病药 【药】第二代非典型抗精神病药物,是多巴胺(DA)、5-羟色胺(5-HT)部分激动剂,部分激动D₂和5-HT_{1A}受体,拮抗5-HT_{2A}受体,同时具有α受体阻断作用,用于治疗精神分裂症、双相情感障碍等。 【联】达哌唑 dapiprazole;氯氮平 clozapine;帕利哌酮 paliperidone 【量】口服,一次5~30mg,一日1次。 【禁】对本品过敏的患者禁用。
阿仑膦酸	alendronate[ə'lendroneɪt] 【C】【记】alen(音“阿仑”),-dronate(膦酸盐,钙代谢调节药), 【L3】商品名有“福善美(Fosamax)”。 【基】 【类】钙代谢调节药;骨密度保护剂

续表

阿仑膦酸 【C】 【L3】	【药】双膦酸盐衍生物,对骨吸收部位特别是破骨细胞作用的部位有高亲嗜性,能抑制破骨细胞活性,增加骨密度,用于治疗绝经后妇女的骨质疏松症以预防髋部和脊柱骨折,也可用于治疗男性骨质疏松。 【联】唑来膦酸 zoledronic acid;伊班膦酸 ibandronic acid 【量】口服,一次 10mg,一日 1 次;或一次 70mg,一周 1 次,早餐前 30 分钟用至少 200ml 开水送服,不要咀嚼或吮吸药片。 【禁】低钙血症、食管动力障碍、严重肾功能不全者禁用。
阿罗洛尔	arotinolol[ærou'tinolol] 【记】arotin(音“阿罗”,arotinoids 芳维 A 酸类衍生物),-olol(洛尔,普萘洛尔类衍生物),商品名有“阿尔马尔(Almarl)”。 【类】抗肾上腺素药;α、β受体阻断药 【药】选择性肾上腺受体阻断药,可阻断 α 及 β 受体,但阻断 α 受体的作用较弱,故直立性低血压作用弱,其阻断 β 受体的作用比普萘洛尔者强,用于高血压、心绞痛、心动过速及特发性震颤,也可用于青光眼。 【联】普萘洛尔 propranolol;阿替洛尔 atenolol 【量】口服,一次 10mg,一日 2 次;滴眼,一次 1 滴,一日 2 次。 【禁】严重心动过缓、房室传导阻滞、充血性心力衰竭、支气管哮喘及糖尿病性酮症酸中毒者及哺乳期妇女禁用。
阿洛西林	azlocillin[æzləu'silin] 【记】azlo(音“阿洛”),-cillin(西林,青霉素类抗生素),苯咪唑青霉素,商品名有“阿乐欣”。 【类】青霉素类;抗铜绿假单胞菌广谱青霉素类 【药】氨苄西林的酰基衍生物,抗菌作用与哌拉西林、美洛西林相似,体内分布良好,抗铜绿假单胞菌活性较强,用于治疗铜绿假单胞菌等革兰阴性菌所引起的各种感染,治疗严重感染时常与氨基糖苷类联合使用。

阿洛西林	【联】哌拉西林 piperacillin; 氨苄西林 ampicillin 【量】静脉滴注, 一次 1000~3000mg, 一日 2~4 次。 【禁】有青霉素类药物过敏史者或青霉素皮试阳性反应者禁用。
阿米卡星 【D】 【L2】 【基】	amikacin[¹æmikəsin] 【记】ami(音“阿米”, amino 氨基), -kacin(卡星, 卡那霉素衍生物), 又称“丁胺卡那霉素”, 商品名有“Amikin”。 【类】氨基糖苷类抗生素 【药】作用机制与链霉素、庆大霉素类似, 抗菌活性强, 抗菌谱广, 与其他类抗菌药协同作用好, 耐药率较低, 不良反应与庆大霉素相当, 用于对庆大霉素、卡那霉素耐药革兰阴性杆菌引起的感染。 【联】卡那霉素 kanamycin; 依替米星 etimicin; 布替卡星 butikacin 【量】肌肉注射或静脉滴注, 一次 200~600mg, 一日 2 次。 【禁】对阿米卡星或其他氨基糖苷类过敏的患者禁用。
阿米洛利 【B】 【L3】	amiloride[ə¹miləraid] 【记】ami(音“阿米”, amino 氨基), loride(音“洛利”, chloride 氯化物), 又称“氨氯吡咪”, 商品名有“必达疏”“Midamor”。 【类】保钾利尿药 【药】保钾利尿药, 氨苯蝶啶的衍生物, 作用与氨苯蝶啶类似, 抑制肾脏远端小管和集合管的 Na⁺ 重吸收, 利尿作用弱, 保钾效果强, 不需经肝脏代谢, 用于水肿性疾病及难治性低钾血症的辅助治疗。 【联】氨苯蝶啶 triamterene; 螺内酯 spiro lactone 【量】口服, 一次 2.5~5mg, 一日 1~2 次。 【禁】严重肾功能减退、高钾血症患者禁用。

续表

A

阿米替林 【C】 【L2】 【基】	amitriptyline[æmi'triptli:n] 【记】ami(音“阿米”, amino 氨基), -triptyline(替林, 三环类衍生物), 商品名有“依拉维(Elavil)”。 【类】三环类抗抑郁药(TCA) 【药】最常用的 TCA 药之一, 抗抑郁作用与丙米嗪相似, 能抑制 5-羟色胺(5-HT)和去甲肾上腺素(NA)再摄取, 其镇静作用在三环类中最强, 有抗胆碱作用, 用于治疗焦虑性或激动性抑郁症, 也用于神经病理性疼痛及小儿遗尿症和多动症等。 【联】马普替林 maprotiline; 氯米帕明 clomipramine 【量】口服, 一日 150~250mg, 一日 2~4 次, 一日不超过 300mg。 【禁】严重心脏病、青光眼、尿潴留、癫痫史、甲状腺功能亢进、重症肌无力及使用单胺氧化酶抑制剂(MAOIs)者禁用。
阿莫罗芬	amorolfine['æməʊrɒlfɪ:n] 【记】a(表强调), morolfine(morpholine 吗啉, 吗啉衍生物), 商品名有“罗每乐(Loceryl)”。 【类】抗真菌药; 皮肤科用药 【药】吗啉类新型结构的外用广谱抗真菌药, 能抑制真菌细胞膜麦角固醇生物合成, 发挥抑菌及杀菌作用, 抗菌谱广, 全身吸收少, 对指(趾)甲感染效果好, 用于足癣、体癣等皮肤及黏膜浅表真菌感染。 【联】吗啉(一种有氨刺激气味的无色有机溶剂) morpholine; 特比萘芬 terbinafine 【量】外用, 一日 1 次。 【禁】妊娠期妇女及准备怀孕的妇女禁用。
阿莫西林 【B】 【L1】 【基】	amoxicillin[ə,mɒksi'silin] 【记】amo(amino 氨基), -cillin(西林, 青霉素衍生物), 对羟基氨苄西林, 商品名有“阿莫仙(Uni-Amocin)”。 【类】青霉素类抗生素