

2017年

国家护士执业资格考试

冲刺模拟试卷与解析

主 编 张淑彦 魏保生

副主编 霍利敏 张宁宁



中国医药科技出版社

2017 年国家护士执业资格考试 冲刺模拟试卷与解析

主 编 张淑彦 魏保生
副主编 霍利敏 张宁宁

中国医药科技出版社

内 容 提 要

《2017 年国家护士执业资格考试冲刺模拟试卷与解析》由资深考试专家依据最新大纲考查要求、考查形式,在分析了历年考试试题的基础上编写而成。本书包括四套模拟试卷并配有参考答案与解析,每套模拟试卷分专业实务和实践能力两个考试科目,为护士执业资格考试考前必做。本书具有高效、全面的特点,是参加护士执业资格考试的首选。

图书在版编目 (CIP) 数据

2017 年国家护士执业资格考试冲刺模拟试卷与解析 / 张淑彦, 魏保生主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2017. 1

ISBN 978 - 7 - 5067 - 8923 - 3

I. ①2… II. ①张… ②魏… III. ①护士 - 资格考试 - 题解 IV. ①R192.6 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 318087 号

美术编辑 陈君杞

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm¹/₁₆

印张 12¹/₂

字数 261 千字

版次 2017 年 1 月第 1 版

印次 2017 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河市腾飞印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 8923 - 3

定价 48.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编 委 会

主 编 张淑彦 魏保生

副主编 霍利敏 张宁宁

编 委 (以姓氏笔画为序)

于文红	王力芳	王秀丽	王建国	王淑华	尤 蔚
牛 菲	牛换香	方文英	朱耀成	付 涛	闫丽娟
任艳萍	刘 钊	刘月梅	刘庆华	刘红旗	刘彦才
刘葆升	齐 欢	张 娟	张宁宁	张利萍	张素英
张淑彦	高幼帛	郭文兵	崔永华	崔清华	谭建平
霍利敏	魏 云	魏立强	魏保生	魏宾燕	

前 言

想要顺利通过护士执业资格考试的确不是件容易的事情，因为从报名到考试也就那么几个月的时间，而且还有很多工作要做，不可能把全部时间都花在复习应考上。因此，如何利用有限的时间科学高效地复习，是摆在考生面前不容忽视的问题。鉴于此，我们花费了大量时间和心血，精心研究大纲要求和考试命题规律，编写了本书。

本书适合于考生考前冲刺所用。本书由资深专家依据最新大纲考查要求、考查形式，在分析了历年考试试题的基础上编写而成，充分体现了考试命题特点和时代精神，所出题目从不同角度覆盖了大纲所要求掌握的各知识点内容，每套试卷的题型、题量及出题范围均等同于正规试卷。全书共编写了四套模拟试卷，每套模拟试卷分专业实务和实践能力两个考试科目，在每套模拟试卷后皆附有参考答案及解析。考生在全面复习的基础上，于考前通过做全真模拟考题进行冲刺模拟训练可以取得事半功倍的复习效果。

本书重在突出“应试”与“解惑”两个基本点，贴近考试，针对性强，在题型、题量的分配上更具科学性。考生在熟读教材之后，通过此书可夯实自身基础，掌握解题思路，以不变应万变，轻松应战考试！

全体编者祝广大考生，在激烈的竞争中能如愿以偿！

编者

2016年11月

目 录

2017 年国家护士执业资格考试冲刺模拟试卷 1	1
专业实务	1
实践能力	15
2017 年国家护士执业资格考试冲刺模拟试卷 2	30
专业实务	30
实践能力	44
2017 年国家护士执业资格考试冲刺模拟试卷 3	60
专业实务	60
实践能力	74
2017 年国家护士执业资格考试冲刺模拟试卷 4	89
专业实务	89
实践能力	103
2017 年国家护士执业资格考试冲刺模拟试卷答案解析 1	118
专业实务	118
实践能力	126
2017 年国家护士执业资格考试冲刺模拟试卷答案解析 2	136
专业实务	136
实践能力	145
2017 年国家护士执业资格考试冲刺模拟试卷答案解析 3	155
专业实务	155
实践能力	163
2017 年国家护士执业资格考试冲刺模拟试卷答案解析 4	173
专业实务	173
实践能力	182

专业实务

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 护士收集资料的方法不包括
 - A. 观察
 - B. 交谈
 - C. 体格检查
 - D. 实验室检查
 - E. 阅读有关资料
2. 下列属于主观资料的是
 - A. 头晕
 - B. 肌张力三级
 - C. 膝关节红肿、压痛
 - D. 血压 16.3/10.6kPa
 - E. 骶尾部皮肤破损 1cm × 2cm
3. 对患者进行心理社会评估采用的最主要方法是
 - A. 体格检查
 - B. 交谈和观察
 - C. 心理社会测试
 - D. 阅读相关资料
 - E. 使用疼痛评估工具
4. 病室内最适宜的湿度是
 - A. 20% ~ 30%
 - B. 30% ~ 40%
 - C. 40% ~ 50%
 - D. 50% ~ 60%
 - E. 60% ~ 70%
5. 关于出院护理的“健康指导”，下列哪项概念的陈述不妥
 - A. 单纯普及卫生常识
 - B. 包括饮食指导
 - C. 包括休息指导
 - D. 包括复诊指导
 - E. 必要时给予功能锻炼指导
6. 一般患者入院，值班护士接住院处通知后，应
 - A. 准备床单元
 - B. 迎接新患者
 - C. 填写入院病历
 - D. 通知医生
 - E. 通知营养室
7. 盆腔炎患者应采取半坐卧位，其目的是
 - A. 借助于重力作用使膈肌位置下降
 - B. 促使感染局限化，减少中毒反应
 - C. 促进渗出性物质的吸收
 - D. 减轻腹部疼痛
 - E. 减少局部充血

8. 江某, 右下肢外伤后, 未得到正确的处理, 而导致破伤风。为其伤口换药后污染敷料的处理方法是
- A. 过氧乙酸浸泡后清洗 B. 高压灭菌后再清洗
C. 丢入污物桶再集中处理 D. 日光下曝晒再清洗
E. 送焚烧炉焚烧
9. 执行隔离技术, 下列哪项步骤是错误的
- A. 取下口罩, 将污染面向内折叠 B. 从指甲至前臂顺序刷手
C. 隔离衣挂在走廊里, 清洁面在外 D. 从页面抓取避污纸
E. 隔离衣应每天更换、消毒
10. 不属于物理消毒灭菌的方法是
- A. 燃烧法 B. 臭氧灭菌灯消毒法
C. 微波消毒灭菌法 D. 浸泡法
E. 生物净化法
11. 铺无菌盘时哪项是错误的
- A. 用无菌持物钳夹取治疗巾 B. 注意使治疗巾边缘对齐
C. 治疗巾开口部分及两侧反折 D. 有效期不超过 6 小时
E. 避免潮湿和暴露过久
12. 无菌持物钳的正确使用方法是
- A. 取放时钳端应闭合 B. 使用时保持钳端向上
C. 可夹取任何无菌物品 D. 到远处取物时应速去速回
E. 钳端可触碰搪瓷罐的内面和罐口
13. 林老先生因脑中风右侧肢体瘫痪, 为预防压疮发生, 最好的护理方法是
- A. 每 2 小时为他翻身按摩一次 B. 每天请家属看他皮肤是否有破损
C. 给他用气圈 D. 让其保持左侧卧位
E. 鼓励他做肢体功能锻炼
14. 呼吸增快常见于
- A. 高热 B. 颅内疾病
C. 安眠药中毒 D. 呼吸中枢衰竭
E. 老年人
15. 肿瘤性发热常见热型为
- A. 稽留热 B. 弛张热
C. 间歇热 D. 超高热
E. 不规则热
16. 使血压测量值相对准确的措施不包括
- A. 被测者取坐位时, 肱动脉平第 4 肋软骨 B. 缠袖带松紧以放入一指为宜
C. 重测血压必须使汞柱降至“0” D. 偏瘫患者在健侧肢体测量
E. 须密切观察血压的患者, 应固定测量者
17. 测量脉搏的首选部位是

- A. 颞动脉
C. 肱动脉
E. 颈动脉
- B. 桡动脉
D. 足背动脉
18. 下列不属于微量元素的是
- A. 锌
C. 碘
E. 硒
- B. 铁
D. 镁
19. 低盐饮食每日限用食盐
- A. 2g
C. 6g
E. 10g
- B. 4g
D. 8g
20. 产妇张某, 分娩时会阴部撕伤, 局部红、肿、热、痛, 现给予湿热敷, 操作时应特别注意
- A. 床单上铺橡胶中单
C. 水温调节适度
E. 伤口周围涂凡士林
- B. 每 5 分钟更换敷布 1 次
D. 执行无菌操作
21. 为患者进行热疗时, 下列说法正确的是
- A. 温水擦浴时水温应为 $32 \sim 34^{\circ}\text{C}$
B. 麻醉未清醒的患者应用热水袋温度为 $50 \sim 60^{\circ}\text{C}$
C. 温水坐浴时水温为 $50 \sim 60^{\circ}\text{C}$
D. 湿热敷时水温是 $60 \sim 70^{\circ}\text{C}$
E. 局部浸泡时水温应为 50°C
22. 留 24 小时尿标本作 17-羟类固醇检查, 为防止尿中激素被氧化, 其标本应加的防腐剂是
- A. 甲苯
C. 甲醛
E. 亚硝酸钠
- B. 浓盐酸
D. 稀盐酸
23. 多尿指昼夜尿量至少超过
- A. 2000ml
C. 2500ml
E. 3000ml
- B. 2300ml
D. 2800ml
24. 下列插管长度不妥的是
- A. 大量不保留灌肠: $7 \sim 10\text{cm}$
C. 保留灌肠: $10 \sim 15\text{cm}$
E. 男患者导尿: $22 \sim 24\text{cm}$
- B. 小量不保留灌肠: $7 \sim 10\text{cm}$
D. 肛管排气: $7 \sim 10\text{cm}$
25. 便秘患者的护理, 下列哪项不妥
- A. 指导患者建立正常的排便习惯
C. 给予足够的水分
- B. 选食纤维素丰富的蔬菜、水果
D. 排便时注意采取适当体位

- E. 每天晚上灌肠 1 次
26. 青霉素过敏性休克抢救时, 采取的关键措施是
- A. 立即通知医生
B. 皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素 0.5 ~ 1ml
C. 针刺人中、内关等穴位
D. 立即停药、平卧
E. 给予保暖、吸氧
27. 静脉注射过程中, 如发现患者局部疼痛、肿胀明显, 试抽无回血, 可能的原因是
- A. 静脉痉挛
B. 针刺入过深, 穿破对侧血管壁
C. 针头斜面一半在血管外
D. 针头斜面紧贴血管内壁
E. 针头刺入皮下
28. 封某, 糖尿病, 医嘱皮下注射普通胰岛素 8U, ac 30 分, ac 的执行时间是
- A. 早上 8:00
B. 晚上 8:00
C. 临睡前
D. 饭前
E. 必要时
29. 下列哪类药物服用后须多饮水
- A. 铁剂
B. 止咳糖浆
C. 助消化药
D. 健胃药
E. 磺胺类药
30. 有关超声雾化吸入目的, 正确的叙述是
- A. 抑制细胞活性, 改善通气
B. 减少局部血液, 改善通气
C. 降低神经细胞兴奋性, 改善通气
D. 刺激神经末梢, 改善通气
E. 解除呼吸道痉挛, 改善通气
31. 不符合取药操作要求的是
- A. 取固体药用药匙
B. 取水剂药液前将药液摇匀
C. 药液量不足 1ml, 用滴管吸取
D. 油剂药液滴入杯内后加入适量冷开水
E. 患者个人专用药不可互相借用
32. 输血前的准备工作, 下列哪项是错误的
- A. 检查库存血质量, 血浆呈红色, 不能使用
B. 血液从血库取出后, 在室温内放置 15 分钟再输入
C. 先给患者静脉滴注 0.9% 氯化钠溶液
D. 两人核对供、受血者的姓名、血型和交叉试验结果
E. 在血中加入异丙嗪 25mg, 以防过敏反应
33. 为了给患者补充热量, 输液中应选用
- A. 各种代血浆
B. 0.9% 氯化钠
C. 5% 碳酸氢钠
D. 5% ~ 10% 葡萄糖溶液
E. 50% 葡萄糖注射液
34. 低分子右旋糖酐的主要作用是
- A. 降低血液黏稠度, 改善微循环
B. 提高血浆胶体渗透压
C. 补充蛋白质, 改善循环
D. 补充营养和水分, 减轻水肿

- E. 供给热能, 保持酸碱平衡
35. 防止血标本溶血, 下列哪项是错误的
- A. 选用干燥注射器和针头 B. 避免过度震荡血标本
- C. 采血后带针头沿管壁将血液注入 D. 标本应及时送检
- E. 需全血标本时, 应采用抗凝管
36. 为了准确观察患者的血压, 测量时应尽量做到四定, 即
- A. 定时间、定部位、定体位、定血压计
- B. 定时间、定部位、定血压计、定人员
- C. 定时间、定部位、定体位、定记录格式
- D. 定时间、定体位、定部位、定听诊器
- E. 定时间、定体位、定部位、定袖带
37. 脑出血并发脑疝时, 瞳孔的变化是
- A. 双侧瞳孔变小 B. 双侧瞳孔变大
- C. 双侧瞳孔不等大 D. 双侧瞳孔散大固定
- E. 双侧瞳孔无变化
38. 护理危重患者, 下列哪项措施是错误的
- A. 眼睑不能自行闭合, 覆盖凡士林纱布
- B. 定时帮助患者更换体位
- C. 为患者定时作肢体被动运动
- D. 牙关紧闭、抽搐患者的病室光线应较暗
- E. 发现患者心搏骤停, 首先通知医生
39. 不属于抢救室必需的设备是
- A. 除颤器 B. 壁灯
- C. 抢救车 D. 心源插座
- E. 木板一块
40. 因口服药物引起急性中毒的患者, 意识清醒时应首选
- A. 口服催吐洗胃法 B. 漏斗胃管洗胃法
- C. 注洗器胃管洗胃法 D. 自动洗胃机洗胃法
- E. 药物导泻清除法
41. 死亡的诊断依据不包括
- A. 反射消失 B. 呼吸、心跳停止
- C. 四肢冰冷 D. 瞳孔散大而固定
- E. 心电图呈直线
42. 患者的临终状态又称为
- A. 临床死亡期 B. 脑死亡期
- C. 生物学死亡期 D. 濒死期
- E. 代谢衰退期
43. 下列属于长期备用医嘱的是

- A. 一级护理
C. 普食
E. 青霉素 80 万单位 im q6h
- B. 可待因 30mg q8h prn
D. 氧气吸入
44. 关于冠心病患者保持大便通畅的叙述, 不正确的是
A. 卧床会使肠蠕动减慢
B. 饮食中需增加粗纤维食物
C. 便秘时采用大量不保留灌肠以导泻
D. 用力排便可诱发和加重心力衰竭
E. 用力排便可诱发严重心律失常
45. 成人心尖搏动位于
A. 左侧第 5 肋间隙锁骨中线内侧 0.5 ~ 1.0cm 处
B. 左侧第 4 肋间隙锁骨中线内侧 0.5 ~ 1.0cm 处
C. 胸骨左缘第 4 肋间
D. 胸骨左缘第 3 肋间
E. 剑突下方
46. 下列先天性心脏病中, 哪种属于无分流型
A. 房间隔缺损
B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
E. 右位心
47. 对原发性高血压患者作健康指导, 不正确的是
A. 宜低盐、低脂、低胆固醇、低热量饮食
B. 一级高血压应注意休息, 避免过劳
C. 缓解期适当运动, 控制体重
D. 血压高时服药, 不高时不用服药
E. 每日定时测血压
48. 急性心肌梗死所致心律失常发生率最高的时间为急性心肌梗死后
A. 头 24 小时内
B. 1 ~ 3 天
C. 4 ~ 7 天
D. 2 周以内
E. 1 个月以内
49. 右心衰竭是指
A. 体循环静脉淤血
B. 上腔静脉淤血
C. 下腔静脉淤血
D. 门静脉淤血
E. 肠系膜静脉淤血
50. 慢性风湿性心瓣膜病最常见的瓣膜病变范围为
A. 单纯二尖瓣
B. 二尖瓣合并主动脉瓣
C. 单纯主动脉瓣
D. 主动脉瓣合并肺动脉瓣
E. 肺动脉瓣合并三尖瓣
51. 急性心肌梗死 24 小时内应禁用的药物是

- A. 呋塞米
- B. 利多卡因
- C. 硝酸甘油
- D. 洋地黄
- E. 尿激酶

52. 洋地黄类药物中毒常出现

- A. 体温升高
- B. 呼吸减慢
- C. 心律失常
- D. 血压升高
- E. 心脏杂音

53. 周女士, 65 岁, 肥胖。有高血脂史及高血压 24/13.3 kPa (180/100 mmHg), 近日心前区发生疼痛。如考虑为心绞痛, 胸痛性质应是

- A. 隐痛持续整天
- B. 锻炼后可减轻
- C. 阵发针刺样痛
- D. 刀割样痛
- E. 压迫、发闷或紧缩感

54. 某原发性高血压患者, 吸烟史 20 年, 肥胖, 目前血压 21.3/12.7 kPa (160/95 mmHg), 下列健康教育内容哪项错误

- A. 保持情绪稳定
- B. 适量运动
- C. 高热量、高糖饮食
- D. 戒烟
- E. 控制高血压

55. 心力衰竭患者的饮食, 下列哪项不妥

- A. 低盐
- B. 高热量
- C. 富含维生素
- D. 适量纤维素
- E. 少量多餐

56. 使用洋地黄药物, 下列哪项是错误的

- A. 准确计算洋地黄制剂剂量
- B. 用药前测心率, 婴儿心率 < 80 次/分停药
- C. 观察有无恶心、呕吐及心律不齐
- D. 可同时服用氯化钙
- E. 可同时服用氯化钾

57. 某消化性溃疡患者经常排黑便, 估计其出血量约为

- A. 3 ~ 5 ml
- B. 10 ml
- C. 60 ml
- D. 500 ml
- E. 1000 ml

58. 肝叶切除患者术后护理中错误的是

- A. 应专人护理
- B. 常规吸氧
- C. 鼓励早期下床活动
- D. 术后取平卧位
- E. 术后给予静脉补充营养

59. 消化性溃疡患者饮食宜少量多餐是为了

- A. 减少对胃刺激
- B. 中和胃酸
- C. 减轻腹痛
- D. 避免胃窦部过度扩张

60. 某患者因经常有餐后上腹痛，经确诊为胃溃疡，近3天来大便呈黑色，原因是
A. 溃疡出血
B. 服铁剂
C. 吃菠菜
D. 痔出血
E. 直肠炎
61. 1岁患儿，因腹泻脱水入院。经补液，脱水基本纠正，但患儿精神萎靡、四肢无力、心音低钝、腹胀、腱反射减弱。应考虑为
A. 低血糖
B. 低钙血症
C. 低镁血症
D. 低钾血症
E. 酸中毒
62. 婴儿生理性流涎常发生于
A. 1~2个月
B. 3~4个月
C. 5~6个月
D. 7~8个月
E. 9~10个月
63. 患儿6个月，患鹅口疮5天。其首选的护理诊断/问题是
A. 疼痛：与口腔黏膜炎症有关
B. 营养失调：与拒食有关
C. 体温过高：与感染有关
D. 口腔黏膜改变：与感染有关
E. 皮肤完整性受损：与感染有关
64. 王先生，40岁，上腹隐痛伴反酸、嗝气2个月。检查上腹部有轻度压痛，粪便隐血试验阳性。对下列用药指导错误的是
A. 硫糖铝在餐前服用
B. 吗丁啉在餐前服用
C. 法莫替丁在餐后1小时口服
D. 氢氧化铝在睡前服用
E. 奥美拉唑在餐前服用
65. 胃溃疡合并幽门梗阻患者的术前准备中可减轻胃黏膜水肿的是
A. 术前数日每晚用温等渗盐水洗胃
B. 纠正脱水
C. 纠正碱中毒
D. 术前给予流质饮食
E. 术前晚灌肠
66. 肝硬化门静脉高压最突出的临床表现为
A. 厌油腻
B. 消瘦、乏力
C. 齿龈出血
D. 腹水
E. 黄疸
67. 溃疡病急性穿孔，非手术治疗初期，最重要的措施是
A. 半卧位
B. 输液
C. 控制感染
D. 严密观察病情变化
E. 保持有效的胃肠减压
68. 严重呕血患者应暂禁食
A. 2~4小时
B. 4~6小时
C. 6~8小时
D. 1~2小时

E. 8 ~ 24 小时

69. 下列组织中, ALT 含量最高的是

- | | |
|-------|--------|
| A. 肝 | B. 骨骼肌 |
| C. 肾 | D. 心肌 |
| E. 胰腺 | |

70. 人体每日氯化钠的生理需要量为

- | | |
|-------------|-------------|
| A. 3 ~ 4g | B. 5 ~ 9g |
| C. 10 ~ 20g | D. 20 ~ 30g |
| E. < 3g | |

71. 对脱水患者, 计算出 24 小时应补的液体总量后, 输液速度应

- | | |
|----------------|---------------|
| A. 24 小时平均分配输入 | B. 先快后慢 |
| C. 先慢后快 | D. 在 12 小时内输完 |
| E. 8 小时内输完 | |

72. 急性菌痢的大便化验结果为

- | | |
|---|----------------|
| A. 深褐色软便, 潜血(+) | |
| B. 黏液脓样便, 镜检 WBC(+ + +), 红细胞(+ +), 脓细胞(+ +) | |
| C. 软便, 镜检未见异常 | D. 稀糊便, 镜检未见异常 |
| E. 稀便, 镜检有植物细胞、脂肪滴 | |

73. 女, 50 岁, 胃大部切除术后 2 周。患者进食 10 ~ 20min 后出现上腹饱胀、恶心呕吐、头晕、心悸、出汗、腹泻等。应考虑并发

- | | |
|-----------|----------|
| A. 吻合口炎症 | B. 吻合口梗阻 |
| C. 倾倒综合征 | D. 低钾血症 |
| E. 代谢性酸中毒 | |

74. 关于肛门坐浴的作用的描述错误的是

- | | |
|--------------|-----------|
| A. 能增进局部血运 | B. 促进炎症吸收 |
| C. 缓解肛门括约肌痉挛 | D. 清洁作用 |
| E. 有止血作用 | |

75. 腹外疝的发病基础是

- | | |
|--------------------|----------|
| A. 腹壁有先天性或后天性薄弱或缺损 | B. 营养不良 |
| C. 腹腔压力增加 | D. 腹部穿透伤 |
| E. 继发于腹腔内脏器的损伤 | |

76. 在我国引起急性胰腺炎的最常见病因为

- | | |
|--------------|-----------|
| A. 大量饮酒和暴饮暴食 | B. 手术创伤 |
| C. 胆道疾病 | D. 流行性腮腺炎 |
| E. 高钙血症 | |

77. 肠梗阻非手术治疗期间梗阻解除的标志是

- | | |
|--------------|------------|
| A. 胃肠减压后腹痛减轻 | B. 呕吐后腹胀减轻 |
| C. 轻度压痛无肌紧张 | D. 肛门排便、排气 |

- E. 肠鸣音亢进转为消失
78. 胆道 T 管拔除前夹管期间应注意观察的内容是
- A. 体温、血压、意识 B. 腹痛、血压、体温
- C. 腹痛、呕吐、体温 D. 黄疸、血压、意识
- E. 腹痛、体温、黄疸
79. 最能提示急性出血坏死型胰腺炎的化验结果是
- A. 低血磷 B. 低血糖
- C. 低血钙 D. 血清淀粉酶显著增高
- E. 白细胞计数明显增高
80. 重症肺炎小儿存在
- A. 代谢性酸中毒 B. 呼吸性酸中毒
- C. 代谢性酸中毒和呼吸性酸中毒 D. 代谢性碱中毒
- E. 呼吸性碱中毒
81. 患儿, 2 岁, 因肺炎入院。经治疗后症状好转, 又突然高热, 呼吸困难, 右肺叩诊浊音。该患儿可能并发了
- A. 急性心力衰竭 B. 呼吸衰竭
- C. 中毒性脑病 D. 中毒性心肌炎
- E. 脓胸
82. 某支气管扩张大咯血的患者, 突然中止咯血, 张口瞪目, 两手乱抓, 应首先考虑
- A. 休克 B. 呼吸衰竭
- C. 心力衰竭 D. 脑栓塞
- E. 窒息
83. 大咯血窒息处理, 首先应
- A. 加压吸氧 B. 输血
- C. 注射止血剂 D. 清除口腔内血块
- E. 进行人工呼吸
84. 一患儿生后 3 天, 发热、鼻塞。体检: 体温 39.8°C , 咽部充血, 诊断为“上感”。对该患儿的护理措施应首选
- A. 解开过厚衣被散热 B. 口服退热药物
- C. 用退热栓降温 D. 用 0.5% 麻黄素滴鼻
- E. 用 50% 乙醇擦浴
85. 慢性阻塞性肺气肿主要引起
- A. 左心衰竭 B. 心肌炎
- C. I 型呼吸衰竭 D. 心包炎
- E. II 型呼吸衰竭
86. 肺炎时容易并发脓胸、脓气胸的常见病原体是
- A. 肺炎球菌 B. 溶血性链球菌
- C. 金黄色葡萄球菌 D. 铜绿假单胞菌

- E. 白色念珠菌
87. 患者女性, 16 岁, 支气管哮喘发作 1 小时, 烦躁, 发绀, 呼吸 26 次/分, 心率 120 次/分, 律齐, 以下哪项措施不当
- A. 协助患者采取舒适的坐位
B. 给予吸氧 3L/min
C. 守候患者床旁, 安慰患者
D. 忌用普萘洛尔
E. 禁用氨茶碱
88. 支气管扩张症患者痰的特点是
- A. 黄果冻样
B. 大量脓痰久置分 3 层
C. 铁锈色
D. 绿色
E. 粉红色
89. 缩唇呼吸的重要性是
- A. 加强呼吸运动
B. 减少呼吸困难
C. 避免小气道塌陷
D. 减轻呼吸肌劳累
E. 减少胸痛
90. 咯血护理措施不正确的是
- A. 静卧休息, 尽量少翻动
B. 大咯血时, 应取平卧位, 头偏向一侧
C. 咯血不止时, 嘱患者屏气以利止血
D. 保持大便通畅
E. 若为肺结核咯血则应卧向患侧
91. 无并发症的水痘患儿应隔离至
- A. 体温正常
B. 发病后 1 周
C. 出疹后 3 天
D. 疱疹开始结痂
E. 疱疹全部结痂
92. 关于水痘的叙述, 以下哪项不正确
- A. 水痘是由水痘带状疱疹病毒引起的疾病
B. 以全身出现水疱疹为特征
C. 感染水痘后一般可持久免疫, 但可发生带状疱疹
D. 水痘只通过飞沫传染
E. 四季可发病, 以冬、春季为高
93. 厌氧菌感染的脓液特点是
- A. 脓液稠厚, 黄色无臭
B. 稀薄, 淡红色
C. 绿色, 有霉腥味
D. 灰白, 无臭
E. 有特殊恶臭
94. 5 岁患儿, 上唇疳挤压后出现寒战、高热、头痛、昏迷。首先应考虑
- A. 败血症
B. 菌血症
C. 脓毒血症
D. 蜂窝织炎
E. 海绵状静脉窦炎
95. 有关妇科检查准备和注意事项, 下述哪项不妥
- A. 检查时应认真、仔细