

Les meilleures associations de plantes

花园植物完美搭配

本尼迪克特·布达松（法）/著 赵昕/译

观赏植物
蔬菜的完美搭配

- * 相生相宜
- * 布局合理
- * 颜色协调

长江出版传媒
湖北科学技术出版社

花园植物完美搭配

本尼迪克特·布达松（法） 著

赵昕 译

图书在版编目 (CIP) 数据

花园植物完美搭配 / (法) 布达松著 ; 赵昕译. — 武汉 : 湖北科学技术出版社, 2017. 4

ISBN 978-7-5352-7350-5

I. ①花… II. ①布… ②赵… III. ①观赏植物—景观设计 IV. ①S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 290777 号

les meilleures associations de plantes © Larousse 2011

责任编辑：胡 婷

封面设计：胡 博

特别顾问：吴芳琳 柏 森 林 炜

出版发行：湖北科学技术出版社

电话：027—87679468

地 址：武汉市雄楚大街 268 号

邮编：430070

(湖北出版文化城 B 座 13—14 层)

网 址：<http://www.hbstp.com.cn>

印 刷：武汉市金港彩印有限公司

邮编：430023

787 毫米×1092 毫米 1/16

8. 75 印张

2017 年 4 月第 1 版

2017 年 4 月第 1 次印刷

定价：48.00 元

本书如有印装质量问题 可找本社市场部更换





目 录

与月季的完美搭配	1
月季与银蒿	6
月季与鼠尾草	8
月季与荆芥	10
月季与美洲茶	12
月季‘蓝色狂想曲’、‘阿尔弗雷德·卡里埃夫人’ 与‘卡罗琳’	14
月季与薰衣草	16
月季与黄杨	18
月季与老鹳草	20
月季与铁线莲	22
变色月季与金丝桃	24
月季与八宝景天	26

与灌木的搭配种植	29
紫藤、铁线莲与美洲茶	32
墨西哥橘与卫矛	34
红叶石楠与红千层	36

紫叶黄栌与羽衣草	38
胡颓子、灰白叶岩月季和毛剪秋罗	40
羽扇槭和漆姑草	42
杜鹃花、马醉木和帚石楠	44
金叶墨西哥橘和扁柏	46
花葵、溲疏和薰衣草	48
绣球	50
紫叶风箱果、黑麦冬、牛至	52
金叶绣线菊和分药花	54

多年生植物搭配	57
鸢尾、石竹、鸡尾兰和风铃草	60
橐吾、珍珠菜、鬼灯檠	62
钓钟柳和桃叶风铃草	64
六出花、松果菊、金鸡菊	66
箱根草、玉簪、金盞草	68
四翅滨藜和麝香锦葵	70
高翠雀花、山桃草、草地鼠尾草	72



飞蓬、滨菊、红缬草	74
瞿草和百子莲	76
矾根、星芹、白茅	78
针茅、蓝羊茅和铺地竹	80

一年生植物搭配 83

苋、大丽花、波斯菊	86
紫茉莉和蜀葵	88
矢车菊、蓝盆花和鸡冠花	90
雁河菊、雏菊、常春藤	92
郁金香和勿忘草	94
黑种草和金光菊	96
六倍利和凤仙花	98
醉蝶花和山字草	100
天人菊和鬼针草	102
矮牵牛和双距花	104
波斯菊和花菱草	106
柳叶马鞭草和马缨丹	108

最好的蔬菜伴侣 111

胡萝卜和韭葱	116
桃子和大蒜	118
西红柿和孔雀草	120
甜玉米、南瓜和豌豆	122
草莓和细香葱	124
酸模和欧芹	126
萝卜和叶用甜菜	128
茄子和矮生四季豆	130
卷心菜、生菜和百里香	132
覆盆子和勿忘草	134

与月季的完美搭配

月季是花园里的常见植物，它因枝叶的装饰效果而独具美感。不同品种的月季组合在一起更具魅力，尤其是藤本月季。

精心养护月季需遵循的原则

> 首先挑选好心仪的月季品种，然后选择能够增加美观效果的其他花卉种植在月季植株底端或旁侧。如果顺序颠倒，比如在已组合好的花簇中再加入一株不同的月季，很可能喧宾夺主。

> 花卉的芳香气味不仅是女性的最爱，还能够防治病虫害。比如，薰衣草的香味能够驱赶蚂蚁与蚜虫；芸香与鼠尾草也是害虫的劲敌。

> 可在月季周围种一些薔草、大戟或天竺葵，并留出足够的空间。景天与紫菀开花后，与月季相得益彰，增添花园的美感。在光照较好的花丛处，薰衣草也是月季的最佳搭配拍档。

> 对于露地栽种的月季，搭配原则与上述并无差别。设想一下哪些种类的花卉能够为月季增添色彩，哪些灌木植物或多年生草本植物能够衬托出月季的色彩。藤本月季的枝条僵直且易枯萎，故比灌木月季更需要其他植株枝叶的点缀。株型矮小的月季（高度不超过1m）底部枝叶生长茂盛，可与其他多年生草本植物的枝叶共同将花丛装扮得

更加丰盈多姿。

> 在对灌木与月季，或月季之间进行嫁接时，必须保证植株已经成熟。



藤本月季生长茂盛，多姿多彩



可将颜色鲜艳的月季混种在一起，但不可超过两种颜色

- 月季与黄杨最容易搭配。无论是灌木月季还是藤本月季，都可以在其前部种植黄杨，并按时修剪。之后可以尝试栽种一些易于养护且生命力较强的花卉品种，但必须严格遵循植株间距要求。
- 需要注意的是，如果在月季开花前无法得知其颜色，那么搭配植株时就需谨慎。为此，需要认真研究以确认嫁接植株的花色搭配，如白色与紫色，白色与红色，或黄色与橘色。粉色系与各种色调搭配都需谨慎。

栽种建议

- > **购买前**，可去植物园或向公众开放的花园里观察不同品种的月季，这是了解其形态与花色的最佳途径。
- > **选定栽种位置**。最好选择一处光照条件较好的空地，因为月季每天最少需要接受4小时的光照。生命力较强的月季品种也可以在半阴处生长，但开花仍需要充足的光照。

> 栽种前, 若土壤较干, 需要先浇一遍水。同时还要把月季根部浸入水中5分钟, 使根土湿润。若不是在秋末或冬季栽种, 则只能购买带有根土的植株, 因为根须所携带的泥土有助于移栽植株重新生根。若购买的是裸根植株, 必须立即栽种。若土壤结冻或有涝渍, 需要先把植株栽种在假植沟里。

> 裸根植株栽种前需要先修剪根部, 即剪去少量过粗的根系以及干枯或损伤严重的根须。气生根无须重新修剪, 因为苗农此前已经修剪过。

- 随后将根部放入2/3土与1/3水混合成的窝根土中, 条件允许的话可掺入少量牛粪或促进根生长的激素(园艺用品商店盒装出售)。植株根部非常需要这种混合型土壤的栽培。

- 挖一个较深的坑(深度至少40~50cm), 在坑底放入有机肥并覆盖一层土, 然后将月季植株放在坑的中央, 固定在堆起的垄土上, 使根颈部分(根与茎之间的凸节)处于土壤表层。

- 将挖出的土重新填入坑中, 微微压实, 浇适量水。若在秋冬季栽种幼株, 还需往根部培土至茎的15~20cm高处, 以防寒。

> 带有土球的植株栽种后成活更快。栽种时需要挖一个较大的坑并松土, 随后在坑底放入有机肥并铲土覆盖。



若网购月季植株, 需在收货后将外包装拆掉, 并尽快栽种在土壤里



使用混合型窝根土的月季植株

- 覆土高度与植株根茎部齐平, 可用工具柄垄土以稳固土壤并使深度适宜。

- 月季与灌木植株的根部之间应留有足够空间(根据灌木生长状况, 间距为80~100cm或1.5~2m不等, 与装饰花丛边缘的黄杨根部应间距40~50cm), 避免植株根部因吸收养分而交叉生长。

养护建议

月季的养护方法比较简单。

> **为使植株生长旺盛，应定期施肥。**月季对土壤养分的需求较高。秋季时应准备好堆肥，以供植株生长期对有机肥的需求。苧麻肥也可作为一种长效缓释肥。对于盆栽月季，需要在生长期以及春季至夏末期间施两次有机肥。

> **若月季根部周围长有多年生丛生植物，则无需除草，**否则就要用一层较厚的稻草覆盖苗根（注意，不要用松针层作覆盖层），以防止杂草生长，还可以在夏季保证土壤长时间湿润。

> **按时剪掉枯萎的花以及无花的徒长枝。**

> **往根部浇水，**次数不用太频繁，但每次都要浇透，注意不能弄湿枝条。对于砂质土壤，要改造土壤结构，以改善其蓄水功能。植株栽种后的3~4年，应在每年春、秋季施加堆肥。

> **为预防病虫害，**需要做到以下几点。

- 使用绿肥。木贼堆肥具有杀灭真菌（由菌菇引起的病害）的功效，同时还能对铁线莲根部起到

保护作用。苧麻肥具有滋补作用并能防治蚜虫。聚合草能够驱除粉虱。

- 发现被虫子咬啮的叶片要及时摘掉并扔到垃圾桶里，切记不要随便扔在地面或堆肥上，以防止病虫害传染。
- 可在月季植株下栽种芳香植物（细香葱、鼠尾草、百里香、薰衣草），这些植物同样能驱除害虫。
- 用酒精为用过的修枝剪消毒后，才能为其他月季剪枝，以免病虫害在不同植株间传播。



对月季进行修剪以保证植株生长旺盛且多花

小知识

如果植株未成活或长势微弱甚至逐渐干枯，就不能在同一个地方重新栽种其他植株了，除非将此处至少80cm³的土壤换成其他土。最好将花园里其他种类的月季混合栽种，并改良原始土壤。

> **植株的修剪高度取决于品种。**对灌木月季而言，通常需减去枝条长度的1/3。藤本月季的分枝减去其长度的一半即可，这样植株的外形看上去会更自然、美观。对于枝条向上攀长的植株，冬末时需要将枯枝剪掉，同时修剪其外形；而枝条下垂的植株需在花季过后修剪其外形，秋季或冬末时再清理枯枝。



月季与银蒿

藤本月季‘西方大地’ ↓*1.50~1.80 m ↔**1.50 m ❀*** 5~9月

银蒿‘波维斯城堡’ ↓50~70cm ❀ 6~7月

你是否喜欢深色的花朵？如果答案是肯定的，那么可以选择栽种半重瓣的藤本月季‘西方大地’。它的花瓣为橘黄色，花心为黄色，抗逆性较强，可抵抗多种病虫害。花期更长，从夏初至9月底可持续开花，是所有月季爱好者青睐的一个品种。可以搭配种植银蒿‘波维斯城堡’，那银光闪烁的叶片既可缓和‘西方大地’浓烈的色彩，又能使植株更显优雅、高贵。

如何搭配？

藤本月季‘西方大地’需要充足的生长空间，可供选择的栽种位置可以是绿篱围成的一角空间，花径尽头的一片空地，也可以是面积较大的一片绿地。这一品种的月季植株生长迅速，很容



银蒿‘波维斯城堡’

在露台上

● 这种月季株型较大，最好栽种在花园的露台上或直径较大的高桶状花盆里。如果喜欢这种花色，但没有足够的空间栽种这个品种，可以改为选择被称为‘明媚阳光’的野月季（高约为50cm）、‘琥珀皇后’（高约50~70cm）或英国月季‘魔力光辉’，它的花瓣为黄色，且散发迷人的香味。

● 银蒿在花盆里生长状况良好，在较热及有风的室外环境中同样可以正常生长。需要注意的一点是，不要使土壤过于干旱，因为蒿属植物虽然耐旱，但长时间处于干旱的环境中，根部无法吸收到植株生长所需的水分，很可能导致根系枯萎。

● 最佳的浇灌方式为喷灌，可以将导水管插孔，放在植株根部之间，使水喷洒在植株上。根据植株在不同季节对水分的不同需求，可以选择不同的浇灌方式。

易就能长至1.8m左右的高度，同时枝叶向四周不断延伸。而银蒿‘波维斯城堡’高达70~80cm，丛径达70~80cm，但外形并不繁重。可将其栽种在灌木花丛的前排，如同一条起装饰作用的束带，也可以将其栽种到花园小径旁边，花团簇拥的小径会被装扮得多姿多彩。如果月季是缘墙生长的，就围绕其种植‘波维斯城堡’，这样一来，便为月季增添了另一道色彩，使月季沉浸在银白色的花海里，更具迷人姿态。

如何栽植？

> **土壤：**‘西方大地’最适宜栽种在土质良好的土壤里，但因其抗逆性较强，也可以将它种在其他土壤中。春季为植株施1次有机肥以促进花蕾的生成。秋季时，往土壤中加入一些堆肥或腐殖质（掺



藤本月季‘西方大地’



来促进自身生长。

> **光照：**‘西方大地’与‘波维斯城堡’都需要充足的光照，如果天气较为炎热，‘波维斯城堡’的枝叶对光照的要求会更高。

> **植物抗逆性：**这2种植物都耐寒，尤其是‘波维斯城堡’，只要保证土壤良好的排水性便可以承受较低的气温。如果土壤过于潮湿，植株会因根部腐烂而枯萎。

如何养护？

> **藤本月季：**冬末时，剪掉其枝条一半的长度。如果未在此时为植株剪枝，它的生长幅度会相对较小，只能攀缘较短

的长度。

> **银蒿：**冬季要随时将枯萎的枝条剪掉。在植株栽种后的最初几年内，为使枝叶生长繁盛，需要在冬末时将植株高度剪至离地面20cm左右。

入碎枝、枯叶、松针)以增加土壤养分。即使较贫瘠、干旱的土壤，只要排水性较好，银蒿也能正常生长，但如果缺少活水，植株是无法存活的。把银蒿栽种在月季周围，可以吸收浇灌月季时的水分

小知识

银蒿因其与众不同的叶丛形态而成为人们的优先选择，但该植株很少开花。由于植株喜温和环境，所以在北方种植时需防寒、防冻。如果植株在冬季遭遇低温霜冻天气，只需将受损的枝条从底部剪掉即可。

其他尝试

- 在花色较深的品种中，红色绒状花朵的灌木月季若与银蒿‘波维斯城堡’搭配种植，会给人一种和谐的感觉。此外，‘波维斯城堡’还可以与‘红衣主教黎塞留’或‘查尔斯磨坊’搭配，其形态会显得精致而高雅。

- 开蓝色花朵的堇菜与藤本月季‘西方大地’栽种在一起能产生简单而协调的美观效果，就像是生长在一起的天竺葵与风铃草。

- 如果想选择一些开白色花朵的植株与深红色的月季栽种在一起，首选应该是丝石竹，该植株能够开出一层绒球状的花朵，与月季搭配最合适不过了。当然，也可以选择珠蓍‘雪球’。它可长至60cm高，并在7~9月开花。

月季与鼠尾草

月季‘雪舞芭蕾’ ↓ 50~60 cm ↔ 1 m 🌸 6~9月

鼠尾草‘玫瑰皇后’ ↓ 60 cm 🌸 6~8月

‘雪舞芭蕾’整个夏季都会开花，无论栽种在庭院露地，还是盆栽在阳台或露台，都会起到极其美观的装饰作用。在花开最旺盛的时节，白色的花朵紧密地簇拥在一起，几乎覆盖整棵植株。夏季，将鼠尾草‘玫瑰皇后’与月季‘雪舞芭蕾’搭配在一起栽种，翠绿的枝条与白色、玫红色花朵既形成鲜明的对比，又交相辉映，再加上繁茂的外形烘托，呈现出一派繁盛的景观。



月季‘雪舞芭蕾’

装饰秘籍

如果在7月中旬将鼠尾草已开花的枝条减去1/3的长度，花期能够延长至夏末。秋季气温较温和的情况下，新枝条会继续生长并在9月初再次开花。

如何搭配？

‘雪舞芭蕾’可种植在花园的阶地上或假山向阳的一面。刚刚栽种的植株高度只有50cm左右，但到第二年就会覆盖周围1m³左右的空间。鼠尾草‘玫瑰皇后’能够长至与月季‘雪舞芭蕾’同样的高度，而且整个夏季，植株上花团簇拥，呈现出一派欣欣向荣的景象。

> 栽种位置：每2棵月季植株根部之间插种1株鼠尾草，两者之间要预留出80cm的距离，使鼠尾草的生长不受限制——要知道，鼠尾草的生长速度是非常迅速的。如果是盆栽，需要选取宽为50cm的长方形花盆，因为‘雪舞芭蕾’的枝条在长到一

在露台上

- 可将月季种植在直径为50cm的花盆里或更大一些的木桶中。与其他品种的月季不同的是，‘雪舞芭蕾’不需要太深的土壤，只要能够满足根系横向生长即可。
- 如果把鼠尾草扦插在月季花盆中，要求月季植株必须达到1m高，否则就先把鼠尾草单独栽种在直径为50cm的花盆里，然后将花盆摆放在月季的周围或前面，起到装饰的效果。



鼠尾草‘玫瑰皇后’

定长度后会倒垂向根茎部生长。另外，在花盆的四角栽种一部分鼠尾草，既能起到美化效果，又可以有效收拢月季的枝条。

如培栽植？

> **土壤：**排水性好的土壤是植株生长的有利条件，但这种月季的生命力较强，对土壤的要求并不十分严格。鼠尾草在较贫瘠的土壤中同样能够茁壮成长。然而，长期有水分滞留的硬性土壤却无法保证植株的存活，鼠尾草根部分可能会因腐烂而枯萎。在这种情况下，需要往土壤中掺入一些粗砂或泥炭，秋季时还要施加适量堆肥。

> **光照：**月季需要接受充足的光照。在阳光充沛的夏季，月季会开出大量的花朵。鼠尾草同样喜光、喜热，但也能接受半阴环境，因此可以将鼠尾草栽种在光热条件稍次的地方。

> **植物抗逆性：**无论是‘雪舞芭蕾’还是‘玫瑰皇后’，都是抗逆性较强的植物，但冬季时的生长环境不能过于寒冷。对于露台上的盆栽植株，因

冬季风大，需要将植株摆放在朝南的位置，温度低于0℃时还需要为花盆包裹保护层。

如何养护？

在月季生长期间，要随时修剪枝条，防止其过于繁盛而影响鼠尾草的正常生长。因此，在栽种时需要合理安排植株的密度。

> **月季：**可以根据需要，在冬末时节将植株的枝条剪掉1/4~1/3的长度。如果植株栽种在花园的一般土壤里，便无需施肥；如果栽种在假山上较贫瘠的土壤里，则需要初春时为植株施加1次有机肥。植株上凋谢的花朵，要用修枝剪从花冠根部剪掉。

> **鼠尾草：**在花期末，要将枯萎的花枝剪掉。秋季或冬末，新枝条发芽之前，需要把鼠尾草修剪至齐地的高度。

其他尝试

在抗逆性较强的月季中，‘仙女’是深受人们喜爱的品种。它的花朵为绒球状，花蕾为浅玫瑰色，花朵盛开后会有白色的渐变，植株直径可长至1.5m左右。可以选择开蓝紫色花朵的草地鼠尾草与它搭配栽种。



仙女



草地鼠尾草

月季与荆芥

月季 '吉莱纳·德·菲利贡德' ↓ 2~4m ☆ 5~10月

大花荆芥 ↓ 70~90 cm ☆ 6~10月

这是杂交月季中花色最理想、养护相对容易的一个品种。它的花色为浅黄色，与杏黄色相近，可以很好地突出荆芥的青蓝色。



荆芥

在露台上

- 首先栽种月季，后面至少留出30cm的空隙，然后在其根部四周40cm处种植几棵荆芥。若月季植株较大，就在其前部也种植一棵荆芥，荆芥会迅速生长环绕月季周围。
- 要想形成和谐优美的紫色氛围，可选择种植蓝蔓月季，它还能为你点缀一抹白色。

如何搭配？

只需将荆芥环绕月季种植即可。需要注意的是：2种植株之间应至少预留40cm的空间以供荆芥枝条的扩展，因为荆芥每年的生长速度较快，空间太少会阻碍植株的正常生长。同时，月季根部也需要足够的生长空间。月季的植株不高，但蔓延较快，因此最理想的栽种位置是花园里沿墙面延伸的小径旁。当然，也可以将月季种植在篱笆旁。


如何栽植？

> **土壤：**月季 '吉莱纳·德·菲利贡德' 和荆芥都对土壤无特别要求，只要保证土壤的排水性较好即可。'吉莱纳·德·菲利贡德' 可以在相对贫瘠的土壤中存活，而荆芥甚至能够在岩性土壤里生长。如果想让植株生长旺盛，可以在栽种前加入些堆肥使土壤肥沃，或者在栽种时为植株施加一些有机肥，尤其是露台上的盆栽月季。

> **光照：**无论是盆栽还是露地种植的月季，都需要接受充足的光照。将月季绑缚在向南墙面、藤架或篱笆上，植株便可以旺盛的生长并开出大量花朵。若将月季种植在温度较高的位置，如被正午阳光直

射的南墙根，开出的花朵会相对较小，但数量会更多。荆芥同样需要充足的光照，因为阳光会增强它的香味。一天之中月季可能会在几小时内遮住阳光，但荆芥完全能够承受这几小时的荫蔽。

> **植物抗逆性：**这2种植物在大多数地区都可以广泛种植，但最好不要在冬季特别严寒的地区种植。



吉莱纳·德·菲利贡德

小知识

荆芥有许多不同的品种，最好挑选大花荆芥和杂交荆芥‘六巨山’，‘六巨山’比普通荆芥株型更高、更紧凑，花穗更挺拔，有着淡蓝紫色的总状花序，最重要的是它非常容易养护，无需特别的照顾就可以盛放。

如何养护？

植株刚刚栽种后的几年里，在枝叶生长浓密之前，用藁杆或草褥覆盖地面以保持土壤湿润并防止杂草丛生。夏季到来时，如果土壤变得干燥，要适量浇水。

> **月季：**在生长过程中，要随时将枯萎的花朵摘掉，以保持外形美观，同时也能预防病虫害。在刚刚栽种后的几年，每逢初春时节，要剪掉枝条长度的1/3，这样可以使分枝有规则地生长，植株也因此显得茂盛而浓密。对于绑缚在墙体或篱笆上的藤本月季，要及时将开花的分枝剪掉，避免植株无序生长而显得繁重。

> **荆芥：**冬末时节，在植株重新发芽生长之前，需要对贴地表的枯枝烂叶进行修剪，保证植株来年可以有序生长。

其他尝试

- 薰衣草或分药花同属地中海地区的灌木植物，对热量的要求与‘吉莱纳·德·菲利贡德’相似，且都可以承受适度的干燥环境，因此也可以与‘吉莱纳·德·菲利贡德’搭配种植。

- 许多品种的月季都可以与荆芥搭配种植，尤其像浅粉色的‘康斯斯普赖’、亮粉色的‘粉色的云’或者浅红色的‘樱束’。