

1960

上海市科学技术论文选集

农 业



1980

to the



1960

上海市科学技术论文选集

农 业

上海市科学技术论文编选委员会

上海科学技术出版社

1960

上海市科学技术论文选集

农 业

上海市科学技术论文编选委员会

*

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

上海市书刊出版业营业登记证093号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店经售

商务印书馆上海厂印刷

*

开本787×1092 1/16 印张6 8/16 插页8 字数121,000

1962年8月第1版 1962年8月第1次印刷

印数 1—2,050 (其中精装 50 册)

统一书号：16119 · 469

定 价：(十四) 1.45 元

上海市科学技术論文編选委員會名单

主任委員：周 仁

副主任委員：卢子道 曹未风 苏步青

程孝剛 沈克非 胡永暢

委 員：(以姓氏筆划為序)

王公衡	王應暉	王鳴岐	盧子道	盧東明	盧鶴紱
朱 泼	朱元鼎	莊孝德	華明之	孫洪鈞	江厚樞
劉瑞三	任鴻雋	汪 獄	杜大公	呂廣杰	嚴東生
沈克非	沈善炯	李時庄	李承祜	李國豪	李春芬
李銳夫	苏步青	苏延賓	苏德隆	邵家麟	周 仁
周同慶	周志宏	陳 植	孟慶元	范仲奕	羅宗洛
鄭 勉	茅 琮	胡汝鼎	胡永暢	趙承嘏	殷宏章
崔予庭	曹未風	曹天欽	許克端	張作人	張宗漢
張香桐	黃鳴龍	程門雪	程孝剛	賀崇實	馮德培
鄒元爔	蔡叔厚	談家楨	錢寶鈞	戴 弘	謝希德
薩本炘	鄺安坤				

前　　言

上海市科学硏究机关、生产技术部門和高等院校为了总结經驗，檢閱成果，促进学术活动的深入开展，在一九六一年七月成立了上海市科学技术論文編选委員會，負責在上海市范圍內征集和編选一九六〇年的科学技术論文。經過半年的努力，現已完成，并将选出的論文汇編成为“上海市一九六〇年科学技术論文选集”出版。

此次應征的論文，絕大部分是由各有关部门經過討論，认为比較优秀而推荐出来的，也有少数論文是由个人直接應征参加的。應征的論文均由編选委員會各专业小組聘請有关学科的专家先行审閱，对每一篇論文作出評論，然后由各专业小組进行初步选拔，最后再由編选委員會进行总的平衡并决定取舍。參加审閱的专家共計四百余人，其中有的是外地的专家。評選时大家都本着以质量为重的精神，以过去专科学报中比較优秀的論文作为参考标准，作出最后决定。工作可能还有不周到之处，但是大家都尽了很大的努力。

本选集中所刊載的論文共計八十九篇。其中数学七篇，化学六篇，生物学十一篇，工程技术三十二篇，农业八篇，医药卫生二十五篇。这些論文有的在本門学科的理論上提出了新的見解和发展；有的对于促进国民经济發展有較重大的意义，有的則是两者兼备。論文的作者有老科学家，青年科学工作者，也有新成长起来的工人出身的专家。

这次論文編选虽以一九六〇年为主，但一九五八年和一九五九年研究完成而未发表的主要著作也被包括在内。因此，可以说这本选集反映了自一九五八年大跃进以来，特別是一九六〇年上海市科技界以論文方式表达出来的一些优秀成果。这里当然不可能将所有的优秀成果全部都反映出来，因为有很多的研究結果已經直接应用了而未曾写成論文，也有一些研究虽已获得了成果，但还需繼續进行研究。尽管如此，这本选集还是可以供我們了解近年来上海市科学技术研究工作的一个梗概。从选集全面看来，可以看到成就，也可以看到薄弱环节。总的說来，它将增强我們科技界在中国共产党的领导下发奋图强，为社会主义建設事业服务的信心和决心。

希望这本选集可供我們檢閱科学技术研究成果的参考，并鼓舞全市科学技术工作者繼續鼓足干勁，在現有的基础上不断提高，为实现党所号召的把我国建成为一个具有現代工业、現代农业和現代科学文化的偉大的社会主义强国而作出貢献。

上海市科学技术論文編选委員會

1962年2月

目 录

- 水稻蘖数变化規律的研究.....雷宏俶 王天鐸 (1)
单季晚稻拔节期烤田的生理意义.....王万里 陈景治 奚鼎保 宋廷生 (16)
不同密植条件下小麦群体发展的动态.....余叔文 周嘉槐 (35)
上海大白菜增产技术的研究.....楊式琅 (50)
上海秋番茄增产途径的研究.....熊助功 (60)
赤霉素在蔬菜栽培中的应用.....周荣仁 黃文徽 (68)
赤霉素的土法生产.....中国科学院植物生理研究所植物激素組 (87)
金魚、鯉、鯔的不同成熟程度卵球的受精
和胚胎发育的关系.....朱 洗 王幽兰 林志春 (97)

水稻蘖数变化規律的研究

雷宏做 王天鐸*

(中国科学院植物生理研究所)

【摘要】本文报告了不同密、肥条件下水稻蘖数变化規律的試驗研究結果，并应用动力学方法分析了大量資料，得出一些經驗公式，可以用来近似地代表蘖数变化过程、分蘖勢与每苗所占面积的关系、不同土壤肥力条件下基本苗数与有效穗数的关系、分蘖勢与分蘖穗数的关系等，为农民“肥田宜稀，瘦田宜密”的經驗提供了理論依据，并加以数量化。这些經驗公式可以作为农业生产上对密度、肥料等进行运筹时的依据，如(1)按照对有效穗数的要求决定栽插苗数；(2)根据不同密度条件下氮肥增穗作用的不同，安排基肥用量；(3)根据分蘖勢推算有效穗数，以便确定后期肥、水措施等。

本文表明水稻群体有它自己的发展規律，群体对蘖数的自动調节使不同密度田的蘖数趋于接近是其重要規律之一；同时这些結果也为認識分蘖发生的机制提供了线索，如分蘖发生的随机性，它对营养面积的依賴关系及閾值的存在等。这些結果說明应用动力学方法来研究群体发展規律是有效的。

一、前 言

合理密植是农业“八字宪法”中重要的一环。要获得高产，就必须有較多的穗数，也就必须有較多的蘖数；但蘖数过多，每蘖的生长受到削弱，每穗粒重显著下降，而且莖秆細弱，容易倒伏，对产量都有不利影响，因此每亩穗数应有一个适宜的范围。水稻有分蘖的特性，而且在某些条件下分蘖数变化的幅度很大，以致最后的穗数与插秧时的基本苗数差异很大。應該插多少秧才能达到所需的穗数，插秧以后如何促进或抑制分蘖的产生，以及如何預見有效穗数等一系列問題都要求对不同条件下群体蘖数的变化規律有透彻的認識。本文报导了本所近年来对水稻蘖数变化所做試驗的結果和从它們得到的結論。

二、蘖数变化過程

图1中画出了1959年本所在上海市松江县用晚稻“老来青”所做行穴距相同、每

* 本工作在群体概念方面受到殷宏章先生的启发，統計方法方面得到中国科学院数学研究所張里千先生、华东化工学院吳乙申先生、复旦大学汪嘉同、錢翼文先生的帮助，并曾引用本所唐錫华先生的一部分数据（表3及4）；實驗工作中有本所的許多同志參加測定，謹在此表示謝意。

穴苗數不同的密度試驗中各密度田蘖數变化的过程。各曲綫的形状相似，包括下列几个阶段：返青后开始产生分蘖，蘖数几乎直线上升；蘖数增加速度减慢以至停止，蘖数达极大值；一部分分蘖死亡，曲綫向下弯；蘖数稳定下来，直到成熟。




图 1 晚稻行穴距相同,每穴苗数不同的对比田单位面积上蘖数的变化

蘖数变化的前一段，即自蘖数开始上升至分蘖高峰期。停止上升并开始下降的一段可以用一个二次三项式来表示：

$$y_t = y_0(a + bt + ct^2) \quad (2.1)$$

式中 y_t 为 t 时的蘖数； t 从返青后开始分蘖时算起； y_0 为原有苗数，即最初蘖数； a 、 b 、 c 都是常数。 a 的数值应为 1，实际计算结果， a 的数值与 1 略有出入，但差异不大。公式(2.1)也可写作：

$$y_t = y_0(1 + bt + ct^2) \quad (2.2)$$

公式(2.1)或(2.2)中的 b 代表分蘖发生的初速，即 $t=0$ 时的速度，或称分蘖势， c 代表加速度，在各试验中都是负数，反映了使分蘖产生速度逐渐降低的因素。

三、早期分蘖发生速度与密度、基肥水平的关系

既然早期分蘖产生速度可以用公式(2.1)或(2.2)代表，则从不同密、肥条件下 b

与 c 的数值可以知道密、肥对分蘖产生速度的影响。

(一) b 、 c 与密度的关系

在我们 1959 年对晚稻所做的每穴苗数不同的试验中，各密度下 b 与 c 的数值如表 1 所示。

表 1 不同密度下 b 与 c 的数值

密度(万苗/亩)	b	c
3	0.576	-0.00839
9	0.260	-0.00421
15	0.144	-0.00251
21	0.101	-0.00198
27	0.049	-0.00105
36	0.034	-0.00065

从表 1 可以看出一个明显的趋势，即密度愈高，则 b 与 c 的绝对值愈小。

如果以密度的倒数 $(\frac{1}{y_0})$ 即每苗所占的平均面积为横坐标，以 b 和 $-c$ 为纵坐标做图(见图 2、3)，则可以看到它们的关系大体上都是线性的(图 2 中代表 3 万苗/亩




图 2 分蘖势 b 与每苗所占面积的关系(每穴苗数不同对比田)
(图中实线为公式(3.3)所代表的直线部分，虚线代表极稀密度(3 万苗/亩)的一点与直线的偏离)




图 3 参数 c 与每苗所占面积的关系(每穴苗数不同对比田)

的最后一点偏离較远，在下述統計計算中未包括进去)，可以用下列線性方程来表示：

$$b = k_1 \left(\frac{1}{y_0} - a_1 \right) \quad (3.1)$$

$$c = -k_2 \left(\frac{1}{y_0} - a_2 \right) \quad (3.2)$$

用統計方法求出 k_1 、 a_1 、 k_2 、 a_2 的数值分別代入公式(3.1)、(3.2)得：

$$b = 41.1 \left(\frac{1}{y_0} - 0.00101 \right) \quad r_{(8)} = 0.996^{***} \textcircled{1}$$

$$c = -0.631 \left(\frac{1}{y_0} - 0.00059 \right) \quad r_{(8)} = 0.954^{**}$$

在另一組每穴苗数相同，行穴距不同的密度試驗中（品种同是晚稻“老来青”）也得到类似的关系，将 b 、 c 的数值对 $\frac{1}{y_0}$ 求線性回归方程得：

$$b = 46.8 \left(\frac{1}{y_0} - 0.00046 \right) \quad r_{(8)} = 0.831^*$$

$$c = -1.78 \left(\frac{1}{y_0} - 0.00058 \right) \quad r_{(8)} = 0.912^*$$

公式(3.1)的意义可以理解为：在一定范围内，分蘖势(b)与每苗所占面积($\frac{1}{y_0}$)中超出一最低限度的面积(a_1)以外的部分成正比，这一最低限度的面积可以看作主茎开始分蘖所需营养面积的閾值。不言而喻，所謂分蘖势与最小面积都是統計的，实际上个体之間还存在着比較大的差异。公式(3.1)能适用于全田主茎所占平均面积大于 $a_1 \left(\frac{1}{y_0} > a_1 \right)$ 的情况，如果全田主茎所占平均面积小于 a_1 时，由于概率分布的关系，分蘖势并不一定等于零。

从早稻与中稻的各一个品种的密度試驗数据也得到与公式(3.1)相符合的关系，而且相关很高。

但也应指出，在另一些試驗^[1]中也得到与(3.1)不符合的关系，在严育瑞等^[2]的盆栽試驗中，甚至出現不同密度下每苗所占面积不同时分蘖产生初速几乎相等的情况。

至于单位面积上分蘖产生的初速，即 $t=0$ 时 y_t 对 t 的导数，则为：

$$\frac{dy_t}{dt} = y_0 b = y_0 k_1 \left(\frac{1}{y_0} - a_1 \right) = k_1 (1 - a_1 y_0) \quad (3.3)$$

即总分蘖势与各苗閾值总和($a_1 y_0$)以外的面积成正比，密度愈高，则 $a_1 y_0$ 愈大，而总分蘖势愈低，但在密度很低时， $a_1 y_0$ 与 1 相較甚小，不同密度間的总分蘖势相差不大。

^① r 为相关系数，右下角括弧中的数字为自由度。 r 的数值右上角有 * 者置信度为 0.95，** 为 0.99，*** 为 0.999。

因为 b 与 c 都是密度的函数, 将公式(3.1)、(3.2)代入公式(2.1)或(2.2)中即可得早期单位面积上总蘖数(y_t)与密度的函数关系, 如代入(2.2)即得:

$$y_t = y_0 \left[1 + k_1 \left(\frac{1}{y_0} - a_1 \right) t - k_2 \left(\frac{1}{y_0} - a_2 \right) t^2 \right] \quad (3.4)$$

这是在同一条件下适用于一定范围内不同密度田的通式。

(二) 分蘖高峰期与密度的关系

从图1中看到, 当蘖数上升至一定阶段后开始下降, 輗数达到最大值的时间称为分蘖高峰期; 它到达的条件是:

$$\frac{dy_t}{dt} = 0 \quad (3.5)$$

$$\frac{d^2y_t}{dt^2} < 0 \quad (3.6)$$

将(3.4)代入(3.5)得:

$$\begin{aligned} \frac{dy_t}{dt} &= \frac{d}{dt} y_0 \left[1 + k_1 \left(\frac{1}{y_0} - a_1 \right) t - k_2 \left(\frac{1}{y_0} - a_2 \right) t^2 \right] \\ &= y_0 \left[k_1 \left(\frac{1}{y_0} - a_1 \right) - 2k_2 \left(\frac{1}{y_0} - a_2 \right) t \right] \\ &= k_1 (1 - a_1 y_0) - 2k_2 (1 - a_2 y_0) t = 0 \end{aligned} \quad (3.7)$$

$$\frac{d^2y_t}{dt^2} = -2k_2 (1 - a_2 y_0) < 0 \quad (3.8)$$

(我們只考慮 $\frac{1}{y_0} > a_2$ 的情況)

所以

$$t_{\max} = \frac{k_1 (1 - a_1 y_0)}{2k_2 (1 - a_2 y_0)} \quad (3.9)$$

t_{\max} 为分蘖高峰期到达的时期。

t_{\max} 是密度 y_0 的函数, 从 t_{\max} 对 y_0 的微分可以求出密度对分蘖高峰期的影响:

$$\frac{dt_{\max}}{dy_0} = \frac{d}{dy_0} \frac{k_1 (1 - a_1 y_0)}{2k_2 (1 - a_2 y_0)} = \frac{k_1 (a_2 - a_1)}{2k_2 (1 - a_2 y_0)^2} \quad (3.10)$$

式中 k_1 、 k_2 及 $(1 - a_2 y_0)^2$ 都是正数, 故导数 $\frac{dt_{\max}}{dy_0}$ 是正或负决定于 $a_2 - a_1$ 之值。在前举每穴苗数不同試驗中, $a_2 < a_1$ 即 $a_2 - a_1 < 0$, $\frac{dt_{\max}}{dy_0}$ 为負值, 即密度愈高, 則分蘖高峰期到来愈早, 与图1中所看到的趋势符合。在每穴苗数相同、行穴距不同的試驗中則 $a_2 > a_1$, 但差异不显著。

(三) 分蘖发生速度与密度的关系

求公式(3.4)对时间的微分可以得到分蘖发生速度:

$$\frac{\partial y_t}{\partial t} = k_1(1 - a_1 y_0) - 2k_2(1 - a_2 y_0)t \quad (3.11)$$

再对密度(y_0)微分就可得到分蘖发生速度与密度的关系:

$$\frac{\partial}{\partial y_0} \frac{\partial y_t}{\partial t} = -k_1 a_1 + 2k_2 a_2 t \quad (3.12)$$

前面已經看到当 $t=0$ 时分蘖发生速度随密度的增高而降低, 現在我們看到由于 k_1 較 k_2 大得多, 当 t 不甚大时, 公式(3.12)的数值小于零, 仍然是密度愈高, 单位面积上分蘖发生的速度愈低。

要估計单位面积上所产生的分蘖的总数, 則应考慮自开始分蘖起至分蘖高峰期止的整个时期, 即

$$0 < t < \frac{k_1(1 - a_1 y_0)}{2k_2(1 - a_2 y_0)} \quad (3.13)$$

在每穴苗数不同的試驗里 $a_1 > a_2$, 則 $\frac{1 - a_1 y_0}{1 - a_2 y_0} < 1$ 。公式(3.13)可写作:

$$0 < t < \frac{k_1(1 - a_1 y_0)}{2k_2(1 - a_2 y_0)} < \frac{k_1}{2k_2} \quad (3.14)$$

代入(3.12)得:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y_0} \frac{\partial y_t}{\partial t} &= -k_1 a_1 + 2k_2 a_2 t < -k_1 a_1 + 2k_2 a_2 \left(\frac{k_1}{2k_2} \right) \\ &= -k_1 a_1 + k_1 a_2 = k(a_2 - a_1) < 0 \end{aligned} \quad (3.15)$$

即密度愈高, 則分蘖增加速度愈低的关系在高峰期到来之前的整个时期都存在, 前面已經推导出这个試驗里密度愈高則分蘖愈少, 这是与一般經驗符合的。甚至在每穴苗数相同、行穴距不同試驗里 a_1 略小于 a_2 , 上述推导不适用的情况下, 由于早期高密度降低分蘖产生速度的作用很明显, 总分蘖数也还是随密度的增加而减少。

(四) 分蘖发生速度与氮肥的关系

从分蘖势 b 与每苗所占面积的关系看起来, 分蘖发生的速度很可能受土壤肥力的影响, 从过去經驗中也知道, 氮肥对分蘖速度有很大的影响。1960年我們做了一組試驗, 其中密度有3个水平, 无机与有机氮肥連对照在內共有8个水平, 表2中列出了这个試驗中各处理的 b 与 c 的数值, 从表中可以看出, b 值随氮肥量增加而增加。

表 2 不同密肥条件下蘖数变化曲綫中的参数^①

密 度 (万苗/亩)	基 肥	牛粪(千斤/亩)				对照	硫酸銨(斤/亩)		
		8	4	2	1		0	5	15
27.15	<i>b</i>	0.0628	0.0455	0.0153	0.0101	0.0181	0.0422	0.0324	0.0855
	<i>-c</i>	0.00155	0.00112	0.000347	0.000245	0.000408	0.00108	0.000980	0.00241
18.75	<i>b</i>	0.120	0.108	0.122	0.0995	0.102	0.121	0.115	0.144
	<i>-c</i>	0.00302	0.00268	0.00300	0.00257	0.00245	0.00302	0.00274	0.00412
6.95	<i>b</i>	0.203	0.200	0.198	0.215	0.161	0.246	0.222	0.262
	<i>-c</i>	0.00438	0.00437	0.00437	0.00472	0.00330	0.00547	0.00502	0.00622

① *b* 的单位为蘖/苗/天; *-c* 的单位为蘖/苗/天²。

在将各肥料水平下不同密度田的 *b* 与每苗所占面积做图时, 可看到虽然每苗所占面积愈多则 *b* 愈高的趋势很明显, 但二者的关系与直线相去甚远, 而且普遍地是每苗所占面积最大的一点低于前二点的延长线, 即当密度低时分蘖势不能随每苗所占面积直线上升。这种情况在图 2 中最后一点上也曾看到, 其原因可能是由于在一定肥料水平下, 根系伸展范围有限, 有一部分营养面积不能充分利用。目前因同一肥料水平下的密度等级太少, 还不能确定曲线的形式, 但必须注意公式 (3.1) 适用范围的上限。

四、分蘖的死亡

在蘖数达到高峰以后, 由于一部分分蘖以至于某些主茎的死亡, 萍数逐渐下降, 因而最后的蘖数或有效穗数(由于有一部分无效分蘖后者较前者略低)总是低于最高蘖数。

关于分蘖死亡的原因曾做过不同的推測。从群体的光强分布规律来看, 光强随叶层的加多而减弱, 在群体的叶面积超过一定限度时, 下部的光强就不足以补偿呼吸的消耗。过去曾估计当叶面积系数等于 4~5 之间时就达到了这一个界限^[3]。我们曾在 1959 年晚稻孕穗期间测量过死去的分蘖的高度, 发现它们都不超过 60 厘米, 而根据当时叶面积分布的测定这个高度以上的叶面积系数在 2 与 3 之间, 即小于 4~5, 昼夜平均光强应为补偿点的两倍以上, 但 60 厘米是最大死蘖的顶点的高度, 大部分死蘖的大部分光合作用面积比这低得多, 所接受的光也弱得多。根据以前的试验^[4], 分蘖长到一定阶段以后就很少从主茎吸取有机养料, 光强不足时分蘖(或主茎)因饥饿而死亡是很自然的。死蘖与存活蘖在高度上明显的分野很强烈地提示光强的不足所造成的有机食料的不足可能是分蘖死亡的主要因素。

1960年唐錫華^[5]所做的不同时期施高氮肥、人工稀疏的試驗結果为肥与光对巩固分蘖的作用提供了有用的資料。在这个試驗里从7月19日分蘖高峰期开始至9月初分5次对基本苗为24万/亩的晚稻田分別进行施高氮肥与人为去掉一些植株(稀疏)的处理。表3与表4中列出其中两次处理后分蘖数与分蘖干重百分比的变化。可以看出在分蘖高峰期以后施氮肥并不能显著减少分蘖的死亡，因而也不能提高分蘖干重百分比。与此相比人工稀疏改善光照的处理在7月19日处理时则可以明显地减少分蘖的死亡，同时也增加了分蘖干重百分比。这个試驗也說明高密度下后期下部光照的不足是分蘖死亡的重要原因。

表3 高肥及稀疏对分蘖的影响($\frac{\text{总蘖数}}{\text{主茎数}} \times 100$)

处理 日期 (日/月)		处 理	基本田	高 肥	稀 疏
取样日期 (日/月)					
19/VII 分蘖高峰期	19/VII	185	167	186	
	26/VII	181	209	213	
	2/VIII	173	200	226	
	9/VIII	195	216	267	
	23/VIII	140	158	201	
	25/X(收获)	103	109	143	
16/VIII 幼穗分化期	16/VIII	189	153	144	
	23/VIII	140	128	161	
	30/VIII	138	158	148	
	6/IX	—	143	137	
	13/IX	110	121	126	
	25/X(收获)	103	120	110	

表4 高肥及稀疏对分蘖干重的影响($\frac{\text{分蘖重}}{\text{总重}} \times 100$)

处理 日期 (日/月)		处 理	基本田	高 肥	稀 疏
取样日期 (日/月)					
19/VII 分蘖高峰期	19/VII	21.2	17.1	21.5	
	26/VII	18.8	21.7	22.6	
	2/VIII	12.0	18.7	22.1	
	9/VIII	13.6	17.3	30.1	
	23/VIII	7.83	11.4	24.2	
	25/X(收获)	3.42	4.89	21.8	
16/VIII 幼穗分化期	16/VIII	8.25	10.8	8.20	
	23/VIII	7.83	7.61	14.3	
	30/VIII	6.60	13.1	8.61	
	6/IX	1.64	9.42	10.2	
	13/IX	6.15	6.83	4.26	
	25/X(收获)	3.42	7.35	4.22	

五、基本苗数与有效穗数的关系

(一) 基本苗数与有效穗数的相关

由于对蘖的死亡情况研究得不够，目前还不能从最高蘖数推算有效穗数。在几組密度試驗中最高蘖数与有效穗数的相关很低，而原有苗数与有效穗数的相关却很高，如图 4 中所示前举每穴苗数不同的試驗中后二者之間的线性相关很好，可以用线性方程表示之：

$$y_w = \alpha + \beta y_0 \quad (5.1)$$

其中 y_w 为有效穗数， α 、 β 为常数。从图 4 的数据統計得出的方程是：

$$y_w = 18.8 + 0.376 y_0 \quad r_{[4]} = 0.928^{**}$$

行穴距不同試驗的回归方程为：

$$y_w = 15.4 + 0.445 y_0 \quad r_{[4]} = 0.988^{***}$$

我們也曾对国内其他人所做密度試驗^{[1][6~9]}的数据做过統計計算，线性相关大都在 0.9 以上。可以认为，在其他条件相似的情况下，在相当大的密度范围内（有几組試驗最高最低密度相差 10 倍以上）原有苗数与有效穗数的关系可以用直線代表。

公式 (5.1) 中 α 值是回归直線延伸后在纵軸上的截距，相当于这一点的实际田块是不存在的，但它能近似地代表低密度田的有效穗数。 β 則是直線的斜率，代表原有苗数相差一单位时有效穗数相差的数目，例如 $\beta = 0.376$ ，即原有苗数增减一千則有效穗数平均相应增减 376 个。在我們所計算过的例子中，最小的 β 值为 0.376，最大的为 0.784，都小于 1，即有效穗数的差异永远小于原有苗数的差异。水稻群体蘖数变化的趋势是不同密度田的总蘖数逐步接近，这是群体自动調節能力的一个表現，群体对蘖数的調節能力愈强，则 β 值愈小。图 4 中的虚線代表原有苗数，实線代表蘖数变化的最后結果（在过程中曾超过实線），可以看出偏高或偏低密度的蘖数都有向一个中間值靠攏的趋势，这一中間值为 $\alpha / (1 - \beta)$ ，因为当 y_0 等于 $\alpha / (1 - \beta)$ 时， y_w 与 y_0 相等。

(二) 肥料对 α 、 β 的影响

公式 (5.1) 中 α 、 β 之为常数是对密度 (y_0) 而言，它們是肥料水平的函数。表 5




图 4 不同密度水稻田群体蘖数变化趋势

表5 不同密肥条件下的有效穗数 (万/亩)

基肥 密度 (万苗/亩)	牛粪(千斤/亩)				对照	硫酸銨(斤/亩)		
	8	4	2	1		5	15	45
27.15	31.22	30.95	27.96	27.42	27.42	29.59	28.51	25.29
13.75	28.93	20.21	19.80	18.98	16.09	18.01	23.24	22.14
6.95	22.94	14.60	18.49	15.43	15.57	17.93	18.28	20.29

表6 基本苗数与有效穗数的回归直线的参数

基肥 参数	牛粪(千斤/亩)				对照	硫酸銨(斤/亩)		
	8	4	2	1		0	5	15
α	19.17	12.05	14.30	11.06	9.77	12.00	15.51	16.47
β	0.430	0.619	0.488	0.599	0.622	0.617	0.491	0.473
$\alpha/(1-\beta)$	33.6	31.6	28.0	27.5	25.9	31.4	30.5	31.2


是不同基肥(氮肥)水平, 不同密度各对比田的有效穗数。从不同基肥的各組密度田求出的 α 、 β 值列于表 6, 可以看出: 氮肥愈高, 則 α 值愈高, 而 β 值愈低, α 与 β 成很好的負相关。可以用下列公式表示之:

$$\beta = \beta_0 + \gamma\alpha \quad (5.2)$$

将統計得到的 β_0 与 γ 数值代入, 得:

$$\beta = 0.871 - 0.0238\alpha \quad r_{[6]} = -0.945^{***}$$

此外我們曾以 29 組晚稻密度对比田的資料求 α 、 β 的綫性相关, 得到的相关系数也高达 -0.949 (图 5)。

图5 基本苗数与有效穗数的回归直线($y_\alpha = \alpha + \beta y_0$)中 α 及 β 的相关图

至于不同肥料水平下的 $\alpha/(1-\beta)$ 的数值, 如表 6 所示, 变化幅度并不很大, 如果以百分數計算, 則肥料对 $\alpha/(1-\beta)$ 的影响不及对 α 与 β 的影响。考慮到前面所說