



怎样猎捕野兽

江西省商业厅编写

江西人民出版社

內 容 提 要

江西是个多山地区，野兽种类很多。特别是自向山区进军以后，獵捕野兽的工作也日見重要。这本书就是通俗的介绍了各种野兽的經濟价值、生活习性、獵捕方法和剥皮晾晒与保管方法。書末还附录兽皮的規格和价格。全書图文并茂，十分通俗，內容新鲜丰富，是山区农民、上山下乡干部的一本好書。

怎样猎捕野兽

江西省商业厅编写

*

江西人民出版社出版

(南昌市三緯路11号)

(江西省書刊出版業營業許可証出字第一号)

江西印刷公司印刷 江西省新华書店发行

*

書号：01261

开本：787×1092 1/32 · 印張：17/16 · 字数：25,000

1958年9月第一版

1958年9月第一版第一次印刷

印数：1—20,078

統一書号：T16110·109

定价：(6)一角三分

怎样猎捕野兽

江西省商业厅编写

江西人民出版社

目 录

一	獵捕野兽的好处.....	(3)
二	野生动物的生态習性.....	(5)
三	獵捕野兽的季节.....	(17)
四	獵捕方法.....	(19)
五	剥皮晾晒与保管方法.....	(36)
	附录: 兽皮的规格和价格	(40)

一 獵捕野獸的好處

我國山多地廣，有着挖之不尽的豐富寶藏。我們祖國所產的野生動物，種類繁多，物品珍貴，在山區、森林、田畝和湖沼到處皆是。在我們這樣一個山高水長的家裡，如果能很好的掌握季節，有計劃的組織捕獵野獸，對加速社會主義建設，改善和提高人民的生活，都很有利。

獵捕野獸是農業社、山區人民的一項很好的副業生產。我國所產的野獸種類很多，僅就畜產部門所收購的皮張來說，主要毛皮就有五、六十種，全國每年收購的獸皮多達三千餘萬張，而且潛力很大。這項副業，利用農余時間，晚裝早收，是增加收入的好門路。一張豹皮可以賣三十多元；一張好的水獺皮可以賣三、四十元；一般的野獸皮張，也能賣到二、三元一張。還有虎骨、鹿茸、麝香，都是十分貴重的東西。如果捕得一只活猴、活狢子，價值一、二十元；一只活虎可以售一、二百元；像我國西南所產的貓熊，更是世界稀有的珍貴動物。去年，銅鼓縣棋平鄉祖庄林業生產合作社的一個社員，利用業余打獵，一冬就捕得七十一只野獸，增加收入三百五十多元。又如，金溪縣左坊鄉第四高級農業社，消滅了一只老虎，連皮帶肉賣得了一百二十八元，並且得到了政府的獎勵。

消滅害獸，對保護和發展農業生產有很大的意義。野生動物對農業生產都有不同程度的危害。如白天的種子，晚上就被狢子、貉子、獾子當作飼料吃掉。一只麝子一年糟塌的庄稼約等於几百斤糧食；野豬的危害就更大。像德興、婺源等地，經常有些猴子學插秧，把插好了的禾秧都倒翻過來。還有許多

猛兽，如虎、豹、狼、野猪对我们的畜牧事业和人身的威胁都很大，许多地区都发生过虎、豹伤人的事情。抚州有一个农业社，一夜就被老虎吃了四只猪。再说，1956—1967年全国农业发展纲要（修正草案）第十七条规定：“从1956年起，在十二年内，在一切可能的地方，基本上消灭危害山区生产最严重的兽害。保护和發展有经济价值的野生动物。”由此可见，獵捕野兽对保护和發展农业生产，有相当重大意义。

兽皮是人们所喜爱的珍品。兽皮可硝制皮大衣、皮帽、围巾、手套和制革，产品轻暖美观，质地坚韧。鹿茸、麝香和一部分兽骨，是贵重的藥物原料。活兽活猴可供玩赏，还可作标本以及科学研究之用，猴血可制血清。这些东西，不仅国内大量需要，国际市场也很受欢迎。

出口品名	出口数量	換 國 物 資								备注
		肥田粉	汽油	运汽貨車	噴气式机	單斗机	鋼材	联收割机	拖拉机	
水獭皮	8 256 6	張張張 3360斤	1公吨				1公吨	1部		
黄狼皮	34 30 230 1945	張張張張 1公吨	1公吨	1部				1部		
麂皮	76 154 26828	張張張 1公吨				1台	1公吨			
草兔皮	100 1600 631576	張張張 220市斤			1架		1公吨			
狸褥子皮子	10 950	条条 1公吨							1部	
活子猬	8 80	只只	1公吨	1部						

二 野生動物的生态习性

一个獵捕能手，既要机智勇敢、能吃苦、能耐劳，还要掌握野生動物的生活習性。如野兽起伏的地方、活动的時間、爱吃的飼料、体型的大小和生理特点等。为此本書选择了十余种重要毛皮動物的生态習性分別介绍于下：

(一) 水獭

食肉目鼬科動物，是一种珍贵的毛皮兽。水獭的毛色深褐或赤褐，毛短茸厚皮板结实，耐用性最高。体長60—75公分，尾長30—50公分。体呈流线型，腿短，头宽而扁，耳小而圆，尾扁平发达便于潜水，爪短且钝，鬚長。

水獭在我国东北、西南、华东和中南都有。它多居于溪流、湖泊和江河等淡水地区的岸边石缝或树洞中。主要食料是鱼类、蝦、鼠、兔和青蛙等，算是一种食肉性较强的动物。水獭在水中非常活跃，但是在陆地上跑的不快，很容易被人追上。水獭的繁殖季节，一般在春天和秋天，北京动物园的記載，二、三、八、九月都交配过和繁殖过，怀孕为8—9星期，每胎仔1—4只，一般为2只。




图1：水獭

(二) 獾子

亦名白獾，动物学上叫鼬獾，属于食肉目鼬科，是一种比较贵重的毛皮动物。

鼬獾体长30—39公分，尾长15—19公分，毛呈青棕色或灰白色，有面纹、颈纹、额纹，爪细长。常居住在森林、丛林和草原茂盛的田野间，经常出入于田埂和果树林内，行动敏捷并能上树。獾子食性杂，小鸟、昆虫、蚯蚓、野果和谷物种子等都吃。长江中、下游各省都有生产，但品质以浙江生产的为最好。

鼬獾繁殖有规律，每年4月底5月初是它的生产期，每胎产仔为2—3只。




图2：獾子（白獾）

(三) 黄狼

俗称黄鼠狼，是鼬科动物中的一种重要毛皮兽。

黄狼的体型甚小，头部尖似鼠，全身呈长条形，毛色随着季节而变换，夏季深褐色，冬季淡黄色，在嘴鼻下部及颈间有白色假面。雄性黄狼身长为30—40公分，尾长18—22公分。雌的较雄的稍小。

黄狼分布很广，我国从南到北，从东到西，几乎各省都

有。它在小树林、疏林、灌木林、草原、沼泽、郊野农田和人烟稠密的柴垛、草堆、乱石和破旧的房屋里都可以生存。黄狼性情凶猛残忍，捕食能力最强，夜半喜偷鸡食。能爬树，也能游泳，因此鱼、蛙、鸟、昆虫和家禽等都是它的食料。

黄狼繁殖季节为春季，每年2—4月份交配，怀孕40—42天，3—5月份生产，产仔一般为4—5只，最多的可达7—8只。幼兽一年成熟，又可交配繁殖。




图3：黄狼

(四) 犴

又名猪犴，食肉目鼬科动物，遍产于全国各地。

犴的体形是前尖后圆，脚短，尾粗，通身麻灰色，青色箭毛，硬而富有弹性。犴状很像一只半大猪仔，身长60—70公分，尾长20公分左右。

犴穴居住在近水的地方，善于啄土，自能掏洞营穴，有时与貉子同居一穴，犴自居洞底好似主人，貉子则居洞口抵挡风

寒，好似封建社会的主僕制度，甚为有趣。犴的食性较杂，鱼、蛙以及植物飼料都吃。

犴的交配季节在每年3月，北方地区延至4、5月，每胎产仔3—4只。




图4：犴

(五) 貉子

北方称貉子，南方亦叫狗犴，食肉目犬科的主要毛皮动物。东北、华东和中南的产量较多。

貉子形态似狗，比狗矮小，形又类狐，但较狐短弱。常喜居坎穴，也倦伏在疏林、草原河谷和近水地带的洞穴中。貉子




图5：貉子

胆小，白天休息，晚上才出来觅食。

貉子毛稍带黑黄色，底绒细而长，为浅褐色。体长50—65公分，尾较短，不及身长的三分之一，四肢很短小，嘴短齿类，爬行类，两栖类和鱼类。植物性饲料有野果、根茎、谷类和豆类等。

貉子怀孕期为62天，一般在三月中交配，每胎可产仔5—10只。

(六) 狐

狐的色型最多，有草狐、赤狐、火狐、沙狐、黑狐和十字狐等，毛色由浅到深都有。

狐的体型较貉子长大，身长60—70公分，尾很长，超过身




图6：狐

体的二分之一，达40—45公分，尾尖白色；后足腺发达，有异味，俗称狐骚。

狐的生境复杂，分布于全国各地，适应力强，几乎任何地方都可安身。狐性狡诈、多疑，一般在黎明和薄暮外出活动，有时在白天也来寻找食物。狐的食性很杂，鸟、兽、虫、鱼以及各种蔬菜野果都是狐的主要饲料，最满意的食料是山鸡和野兔。

狐的配偶期一般为春初，也有时推迟至3、4月份，怀孕51—56天。每胎产仔3—9只，平均5—6只。幼狐成熟很快，6—8个月即能独立生活。

(七) 香狸

香狸在动物学上叫小灵猫，属食肉目灵猫科。

香狸形态像猫，额部较狭，两耳距离稍近，毛色棕黄发灰，并有黑色斑点。体长35—40公分，尾长18—25公分。

香狸是穴居或石居，善于攀缘。食物较杂，各种鼠类、鸟类、家禽、昆虫、鱼类、果子和蔬菜皆可食。

香狸在南方各省无固定繁殖，每胎仔数3—5只。




图7：香狸

(八) 九江狸

毛皮业中称为青棕，亦称九节狸，动物学上叫大灵猫，与香狸同是一属。

九江狸，体形细长，两耳较香狸距离大，颈长，四肢中
长，毛色青灰，或混有黄褐色，两侧有斑点，尾上有圈纹，一
般分为九个节，故称九节狸。身躯较香狸长大，身长70—80公
分，尾长46—48公分。生境、食性都与香狸相似，但不善攀
缘，亦喜盗食家禽。在南方四季均可繁殖。




图8：九江狸

(九) 狸子

又叫花猫、野猫，动物学上叫豹猫，属食肉目猫科。

狸子形态与家猫相似，但体型稍大，长45—65公分，尾长
23—30公分。

狸子全身有花点，有的明显，有的不明显。尾上有8—10
个不完整的圈纹，耳背有白斑，头额上有几条额纹，毛色往北
较浅，往南较深，品种以云南、贵州所产的为最好。

狸子生境复杂，多居住在森林、灌木林的树洞、山谷的洞
穴以及城市近郊土洞。

狸子性情凶猛，纯食肉性，以偷食家禽为主，还吃啮齿和
鸟类小动物。

配偶期4月左右，每胎3—4只，并可与家猫杂交。

(十) 石犴

学名食蟹獾，食肉目獾科，皮毛稍次于貉子。

石犴体長45—55公分，尾長20—30公分，面部發赤，两颊有白紋通及两眉。

石犴的飼料以蛇、鼠为主，故多居住在树洞里。对石犴的繁殖規律，还没有可靠的結論。

(十一) 狼

狼屬犬科，形态及大小似家犬，尾巴蓬松下拖，不像狗的尾巴向上弯曲。有人說：狼是狗的祖先。這句話是有道理的。狼的毛是灰黃中混青黑色，特別在頸、背及尾毛上青灰毛較多。狼嘴細尖，嗅覺發達，善于奔走，狼嚎是帶長聲的，不像狗叫。

狼的適應力很強，生境很廣，可以說從南到北，從沙漠到草原，從湖邊至高山都能生存。

狼的性情兇猛、胆大、狡猾，夜間、白天都會出來活動。




图9：狼

狼性喜羣居，常常几十只一起外出獵食，能使任何野兽都感到害怕。特別在牧区，对羊羣的危害性很大，有时狼羣碰到人，也会襲击伤害。狼除了獵一些中小型的动物外，还爱吃腐爛了的尸体。

狼的怀孕期为60—63天，产仔期3—4月份，每胎4—6只。

(十二) 虎

虎乃兽中之王，是一种最兇猛的动物。在我国有东北虎和华南虎两种。虎的毛色分深黄和浅黄两种，周身有黑色环紋。老虎居住的地方不在大山，也不在森林，而是在莽草叢生，蘆茅叢多的山澗溪水附近，虎穴方向多朝南。

老虎是晝伏夜行，晚上出来覓食，是純食肉性的动物，它常捕食較大型的野兽，如野猪、熊、狼和鹿等。

老虎一年生育一次，怀孕期为100—110天，每胎产仔2—4只，小虎4年后才成熟。



图10: 虎

(十三) 豹

有金錢豹、艾叶豹、荷叶豹和龟纹豹等，我国东北、西北、西南、中南等地都有生产。

豹的身長120—150公分，尾長80—90公分，周身有好似銅錢、荷叶或龟紋的画紋，是一种比獅、虎更兇暴更殘忍的野獸。

豹胆大，晝夜都出来活动，行动灵活会爬树，隱蔽巧妙。因此比虎的危害性更大。

豹常伏在草叢中和樹杈上，靜待其它动物經過，則一躍而下。如遇到人路過樹下，特別是婦孺，很容易遭它的殘害。飼料比虎更廣，虎仅食大动物，豹在捕不到食物的时候，連一鼠、一蛙、一鳥也不放过。

豹的繁殖期根据地区气候的寒暖而不同，自秋末至春初，孕期90—100天，一胎2—4只，小仔二年半后独立生活。




图11: 豹

(十四) 野猪

屬有蹄目猪科，好似家猪，两耳豎起，鼻較長。一般有蹄目的动物都是食草的，但野猪能杂食，野草、坚果、根莖、昆虫和鼠类都吃。

野猪居住山陵，繁殖很快，一胎能产仔6—8只，小仔当年就可成熟。



图12: 野猪

(十五) 麂

分山麂、麝麂两种，产于南方各省。山麂生长在山野丘陵地区，因食料少，麂的体质与皮质都较消瘦。麝麂生长在湖泽平原地带，藏匿在蘆荻草中间，因湖草肥美，较山麂肥壮。

麂子的毛短，颜色有黄褐色及青灰色两种，黄色又名黄麂，青色又名青麂，未成年的小鹿还有灰白色小花点，亦名花麂。麂是食草动物，爱吃青草、嫩芽、种子、叶子等，在秋末和冬天，麂常常出来吃农作物，对农业生产破坏很大。麂的警惕性不高，在追赶时常常碰到猎人的网里。

麂皮本身与季节性的关系较小，一年四季所猎取的麂皮，都可以制革。不过冬季所产皮板坚韧，品质最佳；夏季所产麂皮，皮板薄、分量轻，品质最差。麂子在夏季交配繁殖，为了保护麂子的生产，在夏季最好不要捕捉。九、十月以后，草木