



岩石学

岩石薄片研究指导

古石学
古石辨析與研究

岩石学 岩石薄片研究指导

[美国] H·威廉斯 F·J·特訥 C·M·吉尔勃特 合著

董 瑞 译



中国工业出版社

全书共分三篇，包括十九章，第一篇为火成岩，第二篇为变质岩，第三篇为沉积岩，内容着重阐述岩石薄片在显微镜下的研究，并对岩石的产地、分类、成分、结构、构造、相互之间的关系以及有关岩石成因理论问题等都加以分析和探讨，叙述详尽、系统，图很多，易于参照，是一本研究岩石薄片的比较完备的著作。

本书可供地质院校学生和研究生研究岩石之用，也可供地质勘探人员和岩矿鉴定人员参考。

H. Williams F.J. Turner C.M. Gilbert

PETROGRAPHY

*An Introduction
to the Study of Rocks
in Thin Sections*

W.H. Freeman and Company

San Francisco, 1955

* * *

岩 石 学

岩石薄片研究指导

董 瑞 譯

*

地质部地质书刊编辑部编辑（北京西四羊市大街地质部院内）

中国工业出版社出版（北京佟麟阁路丙10号）

北京市书刊出版业营业许可证字第110号

中国工业出版社第四印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*

开本787×1092^{1/16}·印张16^{5/8}·插页1·字数325,000

1964年9月北京第一版·1964年9月北京第一次印刷

印数0001—4,060·定价(科七)2.10元

*

统一书号：15165·3124(地质-282)

原序

本书着重在岩石描述方面，而不是成因問題的討論，同时着重岩类学，而不是范围广闊的岩理学的研究。虽然用相当大的篇幅專門論述了火成岩和变质岩的成因形式，然而也更多地討論了沉积岩是如何形成的。我們假定讀者們已經學过怎样利用放大鏡鑑定岩石，并且也已經熟悉了光性矿物学的原理。如果他有了这个基础，那么本书所写的材料也足可供每星期有六小时實驗的一年課程之用；由于本书适当地选择了各类岩石，學生們在一學期內就可以获得一个研究岩石薄片的令人滿意的基础。

我們感到以前有关这一类的教科书，似乎很少注意到沉积岩。这是很可惜的，因为大多数学地质的学生，現在轉入石油工业部門，在这里沉积学問題却是十分重要的。尽管如此，由于篇幅所限，有必要把利用油浸法研究沉积物的方法省略掉，而着重在这些岩石的被人們大大忽視了的薄片觀察。

經驗告訴我們，描述火成岩最好从显然是由岩漿生成的細粒岩属开始，然后考慮相当于細粒岩属的較粗粒岩属，因为有些較粗粒岩石的成因还是有值得怀疑之处。火成岩的描述并不是按照一般次序来进行，而是首先討論基性火成岩，最后討論粗粒的硅質火成岩，这样做對我們說來倒也合适，因为有一些硅質火成岩似乎具有变质成因的跡象，因此把重点放在許多火成和变质現象的过渡性质上来加以闡述。

本书中不但沒有創立新的岩石名称，相反地，却尽可能縮減一些岩石名称。某些比較少見的岩石也象常見的岩石一样，占有同样大的篇幅；不过讀者應該考慮到：对岩石叙述都一样长，但对少見的种属往往比常見种属的說明还要长些。簡略說来，一种岩石的多少是不能以描述的长短为尺度来衡量的。

大多数学生都喜欢看到岩石整整齐齐地排在分类表和图表中，因为这是有助于简单記憶的。我們也用了一些这样的方法，不过我們感到“鵠籠式分类法”是会給人們带来不正确的概念。我們的方針是始終把重点放在所有岩系的漸变性质上以及所有岩类的不定性质上。并且由于只用文字来描述岩石往往难以相互比較，所以提供了許多插图。我們所画的岩石大約二分之一来自美国，尽可能也多选一些其它地区，特別是欧洲的例子。为了留出这些插图所占的篇幅，而把专家所發表的，对許多学生們來說并不是馬上可以利用的参考文献一律刪去，同时也刪去了特殊岩石的产地目录。另一方面則編进了許多人都曉得的著述，因为其中某些內容可供參考。

由于各种原因，本书还不是写得完善的一本书，我們希望讀起来将不感到什么困难。无论编写哪一种入門教科书都会遇到特別困难之处，尤其困难的是分类問題和哪一部分應該取舍的問題。关于岩石的命名和类别、描述岩石的次序或描述的重点等，只有少数教師取得了一致的意見；上述每一方面都将要以个人的偏好和他所

教級的要求來作為指導。

本書負責編寫人員如下：第一篇“火成岩”為威廉斯；第二篇“變質岩”為特訥；第三篇“沉積岩”為吉爾勃特。至于顯微繪圖，除了圖130由哈頓(C.O.Hutton)教授，圖113由克利雷(R.S.Creely)先生繪出外，其餘均為威廉斯所繪。

作者編寫此書時，泰洛爾(J.H.Taylor)教授供給了一套英國的沉積鐵礦標本；阿道爾夫克諾夫(Adolph Knopf)教授供給科羅拉多州西班牙峰的煌斑岩；羅勃特康普頓(Robert Campion)教授供給瑞典的紫蘇花崗岩；泰雷(C.E.Tilley)教授和阿格利爾(S.Agrell)博士提供許多英國和斯堪的那維亞的資料；芮德(H.H.Read)教授和瓦爾特皮奇爾(Walter Pitcher)博士供給蘇格蘭和愛爾蘭的變質岩標本；赫斯(H.H.Hess)教授供給新澤西州的三迭紀輝綠岩；普利德爾(R.T.Pridor)教授供給澳洲西部的白榴石質岩石；彼德密西(Peter Misch)教授供給中國的標本；布伦諾桑德爾(Bruno Sander)教授供給奧地利阿爾卑斯山的變質岩；馬蕭斯(W.H.Mathews)教授供給加拿大的沉積岩。承蒙以上諸君惠予借給或贈給作為舉例之用的標本，在此謹致謝意。

威廉斯(Howel Williams)

特訥(Francis J.Turner)

吉爾勃特(Charles M.Gilbert)

加利福尼亞州伯克利

1953年8月

目 录

原序

第一篇 火成岩

| | |
|------------------------------|-----|
| 第一章 緒論 | 1 |
| 火成岩的成因..... | 1 |
| 岩漿的演化..... | 2 |
| 岩漿的凝結階段..... | 5 |
| 火成岩共生組合或岩類..... | 5 |
| 第二章 火成岩的結構及分類 | 7 |
| 結構..... | 7 |
| 火成岩的術語及分類..... | 16 |
| 本書採用的分類方法..... | 22 |
| 第三章 輝長岩類——鈣礫性基性火成岩 | 24 |
| 玄武岩和輝綠岩（大部分為細粒和中粒）..... | 24 |
| 輝長岩及其相關的岩石..... | 31 |
| 第四章 硅性輝長岩類——富礫質基性火成岩 | 38 |
| 細粒類型..... | 38 |
| 較粗粒類型..... | 43 |
| 第五章 超鎂鐵質岩類及煌斑岩 | 49 |
| 超鎂鐵質岩類..... | 49 |
| 煌斑岩..... | 57 |
| 第六章 閃長岩類、二長岩類和正長岩類 | 62 |
| 細粒岩..... | 63 |
| 較粗粒類型..... | 72 |
| 第七章 花崗閃長岩類、石英二長岩類和花崗岩類 | 82 |
| 細粒類型..... | 82 |
| 中粒和粗粒類型..... | 88 |
| 第八章 火成碎屑岩 | 102 |
| 基性噴出物..... | 104 |
| 中性和酸性噴出物..... | 105 |
| 石屑噴出物..... | 107 |
| 火成碎屑岩的變質..... | 107 |

第二篇 变质岩

| | |
|----------------------------------|-----|
| 第一章 变质作用、变质作用的岩石标志及变质作用的产物 | 109 |
| 变质作用..... | 109 |
| 控制变质作用的条件..... | 109 |
| 变质作用的类型..... | 110 |
| 变质岩組构的某些特征..... | 112 |
| 变质相..... | 116 |
| 变质岩的簡略分类..... | 117 |
| 第二章 角頁岩和斑点板岩 | 119 |
| 产状..... | 119 |
| 組构..... | 120 |
| 矿物成分..... | 121 |
| 主要岩类的岩石描述..... | 122 |
| 第三章 压碎岩、糜棱岩及千枚糜棱岩 | 134 |
| 压碎变形作用及变晶变形作用..... | 134 |
| 糜棱岩..... | 135 |
| 压碎岩..... | 137 |
| 千枚糜棱岩..... | 139 |
| 第四章 板岩、千枚岩及低級变质片岩 | 141 |
| 产状..... | 141 |
| 矿物成分..... | 142 |
| 板岩及千枚岩..... | 143 |
| 云母片岩及石英鈉长石片岩..... | 144 |
| 低級鈣质片岩..... | 147 |
| 綠色片岩..... | 148 |
| 鎂质片岩..... | 151 |
| 藍閃石片岩..... | 152 |
| 第五章 高級片岩、角閃岩、粒变岩及榴輝岩 | 155 |
| 产状..... | 155 |
| 矿物成分..... | 156 |
| 高級泥质片岩..... | 157 |
| 长英质片岩及长英质粒变岩..... | 159 |
| 高級鈣质片岩及叶理状大理岩..... | 162 |
| 角閃岩..... | 163 |
| 輝石粒变岩..... | 165 |
| 苦閃橄欖岩..... | 166 |

| | |
|----------|-----|
| 榴輝岩..... | 166 |
|----------|-----|

第三篇 沉积岩

| | |
|---------------------|-----|
| 第一章 沉积岩的成因..... | 168 |
| 緒論..... | 168 |
| 沉积岩形成的因素..... | 169 |
| 构造环境的控制..... | 177 |
| 第二章 沉积岩的成分及结构 | 179 |
| 一般分类..... | 179 |
| 矿物在沉积物中的产状及稳定性..... | 180 |
| 沉积岩的结构..... | 183 |
| 碎屑颗粒的大小及分选..... | 186 |
| 碎屑颗粒的球度及圆度..... | 187 |
| 颗粒的聚集形式..... | 188 |
| 颗粒的方位..... | 192 |
| 第三章 砂岩 | 193 |
| 分类..... | 193 |
| 瓦克岩及硬砂岩..... | 198 |
| 石屑瓦克岩及石屑硬砂岩..... | 200 |
| 石屑砂粒碎屑岩..... | 203 |
| 长石砂岩..... | 207 |
| 长石质砂岩..... | 211 |
| 石英砂粒碎屑岩..... | 212 |
| 砂岩中的自生胶结物..... | 215 |
| 第四章 泥质岩 | 218 |
| 一般成分及术语..... | 218 |
| 粘土矿物..... | 219 |
| 岩石描述..... | 221 |
| 第五章 钙质岩 | 223 |
| 成分及分类..... | 223 |
| 研究方法..... | 225 |
| 有机石灰岩..... | 225 |
| 碎屑石灰岩..... | 229 |
| 隐晶石灰岩..... | 233 |
| 白云岩及白云石灰岩..... | 234 |
| 碳酸盐岩石中的自生硅酸盐..... | 238 |
| 第六章 其它类型沉积岩 | 239 |

| | |
|-------------|-----|
| 硅质沉积..... | 240 |
| 富铁沉积..... | 245 |
| 磷酸盐质沉积..... | 252 |
| 硬石膏及石膏..... | 255 |
| 参考文献 | 259 |

第一篇 火成岩

第一章 緒論

火成岩的成因

火成岩是岩漿——即全部或一部分由具有矽酸鹽熔融體成分的液體所組成的、熾熱而流動着的造岩物質——經過冷卻和凝固過程形成的。岩漿可含有氣相物質，或者几乎全部由固體結晶質組成。另一方面，變質岩則是在缺乏矽酸鹽熔融體的條件下，由於礦物的重結晶作用以及礦物之間相互反應的結果而形成，這些礦物雖然在高溫下，但是仍處於固體狀態。礦物與移動着的流體（通常是水氣或水溶液）之間的離子交換會使礦物成分和化學成分產生變化，同樣也會使固體岩石的結構發生變化，這個變化可以在寬廣的溫度和壓力範圍內產生。這種蝕變作用稱為交代作用。在地殼比較深的地方，火成現象和變質現象往往混在一起而不易察覺；因此，來源於該處的許多岩石都顯示了過渡的特點。在這些岩石中有所謂混合岩。

那末無庸置疑，絕大多數火山岩是由大部分呈液體狀態的岩漿造成的。但是，許多位於地殼深處的深成岩的成因問題，還是沒有得到解決。這類岩石有一些似乎是在流動着的造岩物質侵入時形成的。可是在岩石形成時造岩物質還只是局部呈液體狀態的。例如許多花崗岩，除了那些呈岩床、岩脈和小的岩株狀產出的以外，是否一度完全呈液體狀態或者大部分呈液體狀態是值得懷疑的。某些地質學家們認為，那些位於褶皺山脈中心部分的形成岩基的花崗岩，大部分是屬於交代成因，即原先岩石經受“花崗岩化作用”的結果。另外一些地質學家們則相信，它們可能是主要由巨厚的地槽沉積物構成的褶皺山根經過選擇熔化作用發育而成。儘管這些假說強而有力，然而這些岩基花崗岩肯定是歸入火成岩，因為從侵入關係來看，已經證明了它們曾經被大量的、足以供給為侵入所必須的流動性的液態物質所滲透。

事實很明了，在火山岩中，玄武岩和基性安山岩是比其它類型的火山岩占有絕大優勢，而另一方面，在深成岩中，花崗岩和花崗閃長岩是遠比所有其它各類深成岩豐富得多。根據這一事實可引出以下的論點：火山岩和絕大多數深成岩，即使它們的成分範圍幾乎完全相同，而是來源於兩種不同的原生岩漿。按照這個概念，火山岩及與其密切相關的形成岩床、岩脈、環狀岩脈、錐層侵入體、岩盆、岩蓋等的侵入岩，都是從原生的玄武岩岩漿轉變而來，該岩漿系由深處的、位於大陸和海洋之下的玄武岩質圈所供給，或者是位於更深處的超基性物質的部分熔化而成。然而形成岩基的深成岩及與其相關的侵入體却只限於分布在大陸地區，支持這

種論點的人們認為，它們絕大部分是由硅鋁壳的下部經過分異熔化作用所产生的原生花崗岩岩漿轉變而成。某些地質學家們通過更進一步的研究，推測有兩種原生的玄武岩岩漿，其中一種為環繞地球的硅鎂質（橄欖石）玄武岩圈，該圈經過不同過程而產生粗面岩和响岩之類的礫性熔岩；另外一種為次硅鋁質（拉班玄武岩性）玄武岩，推測此岩漿只發現於大陸之下，並且可能是由於硅鎂質玄武岩與硅鋁圈底部相互接觸所引起的混染作用形成的。這種次硅鋁質玄武岩一向被認為是形成安山岩、英安岩及流紋岩之類的鈣礫性熔岩。然而必須強調指出的是，這兩種說法只不過是相當符合於試驗結果的工作中的假說而已。的確如此，最近的研究推測拉班玄武岩性玄武岩並非局限在大陸上分布，有時也在海洋中部出現，正如分布在夏威夷群島的那樣。另外又提出兩種其他的原生岩漿——斜長岩岩漿和橄欖岩岩漿，斜長岩岩漿是由大陸壳的基性部分轉變而來，橄欖岩岩漿則是由環繞地球的、位於玄武岩圈之下的圈轉變而來。大多數屬於前寒武紀的巨大的斜長岩侵入體已被認為是由前者轉變而成，而一般在許多褶皺山脈中的巨大的蛇紋岩岩床則是由後者轉變而來。因為這些論點的進一步討論是超出本書範圍之外，讀者可參閱259頁所載的參考書籍。


岩漿的演化

原生岩漿的成分是可以變更的，從而產生許多種火成岩。現在讓我們考慮一下引起這種變更的三個方式。

分異作用

這是一個原先為均質岩漿分裂成幾個不同成分的部分的作用。可以設想，它可能是由於在溫度不斷升降的情況下，液體岩漿中離子或“分子”的遷移而引起，但是這個機械作用可能沒有什麼重要性。均質的熔融體可分成兩個或更多的不混溶部分；然而，除了在硫化物熔融體的極少情況下可以發生這種機械作用以外，通過對矽酸鹽熔融體的室內試驗，證明這個作用對於火成岩的形成也是無關重要的。分異作用的另一方式是氣體的遷移。上升的氣泡可以聚集起來，並且稍微把岩漿中的揮發組份從一個地方搬到另一個地方。不過，比以上所述三種作用中的任何一種都重要得多的乃是結晶作用造成的岩漿分離作用。火成岩的某些礦物通常是由於大致在同一溫度時結晶而一起共生。典型的共生組合為橄欖石和拉長石；同樣有石英和鐵橄欖石，以及正長石和奧長石。另一方面，某些成對礦物則很少看到在一起共生；其中有橄欖石和鈉長石，以及白雲母和拉長石。這些關係是意味著冷卻的岩漿有分別結晶作用。當結晶作用進行時，固相與液相之間經常有保持平衡的趨勢。當溫度下降時，為了要保持這種平衡關係，早期形成的晶体便與液體相互反應，從而在成分上有所改變。反應作用可能繼續進行，因此產生一個均勻的固體溶液的連續系列。例如斜長石系，最初形成的晶体是那些含氧化鈣最富的長石；當反應繼續進行

并且溫度下降时，晶体就逐渐含有更多的鈉质。此种变化构成連續反应系。另一方面，某些鐵鎂质矿物当冷却和反应繼續进行时，在一定溫度下即轉变为具有不同結晶构造的其它矿物。例如橄欖石轉变为紫苏輝石，普通輝石轉变为角閃石。这种突然的变化則构成不連續反应系。下面的图解表示出两个主要反应系，該图解主要是巴尔斯根据鮑溫的原始图解經過修正后得出的。



在以上二系列中，早期形成的高溫矿物通常是一起結晶的。这就是含有橄欖石和鎂质輝石的輝長岩之类岩石，所以时常含有鈣性长石的原因。低温矿物也同样趋向于在一起共生，因此云母、硷性长石和石英在花崗岩之类的岩石中是密切共生的。同理，某些矿物則趋于互不相容，因此很少看到石英和倍長石、正長石和拉長石等靠在一起的現象。

当晶体与液体之間的反应作用进行得完全时，最后岩石中的矿物显然不是最初形成的那些矿物，而是恰巧相反的矿物。但是，如果反应作用由于冷却太快或其它原因而进行得不完全，那末两个系列中早期形成的矿物都会在最后岩石中作为残晶而繼續存在。这就是見到的环带状长石及鐵鎂质矿物被其它矿物外壳所包围的原因。

于是，当我们考慮上列图解的两个反应系时，必須記住会有某些变化。不連續系的每一种鐵鎂质矿物都有类质同象变种，富含氧化鎂的矿物在正常的生成次序中都先于那些富含鐵的矿物。富含氧化鎂的橄欖石，即鎂橄欖石，往往与富含氧化鈣的斜長石同时生成，但富含鐵质的橄欖石，即鐵橄欖石，一般是比较晚的，直到石英和正長石沉淀时还在形成。其它因素也可以改变正常次序。岩漿內揮发組份富集的不断变化也影响閃石和云母的产出時間。更重要的因素也取决于二反应系分离程度的不同，因为它能影响残余液体內各种元素之間的比例。例如，残余液体中硷质对二氧化硅及氧化鋁之和的比例是很重要的，該比例决定着岩石是否含有象霞石之类的副長石矿物，或霓石、鈉閃石之类的鐵鈉硅酸盐矿物。

岩漿中重矿物向下沉降和輕矿物向上浮起的这一趋势，加强了因結晶作用产生

的岩浆分离作用。因此，晶体沉降和晶体浮升对于火成岩中产生的变化是重要的。橄榄石和钙性长石在厚的岩床和岩流底部附近富集，证明这些早期形成的晶体发生了沉降作用，正如维苏威火山喷发时最初喷出物中含有大量白榴石晶体，即可证实轻矿物有向上浮升的作用一样。这个作用可以使原来的玄武岩岩浆在火山渊中逐渐大致成层，因此流出熔岩的种类，部分决定于溢出量，部分决定于从喷发通道喷出的火山渊所居的深度。引起分异的另一个作用是气体流动，因为气泡可以附着在晶体上而使晶体上浮，或促使间隙中的液体上升。此外还有一个作用是压滤作用，它可以使晶体软块内最后残余的液体从岩浆渊的某一地方被挤到另一个地方，或者使残余液体流入切割已凝结的物质的裂缝里去。这样的作用是由于活泼的岩浆的不断起伏、火山渊壁张力裂缝的开口，以及随着地壳运动同时发生的压缩作用所造成。

同化作用

岩浆的演化也受着它与围岩相互反应的影响。如果岩浆的温度是在它开始结晶时的温度以上，那末它就可以随着岩浆渊壁的熔化而被混染；然而这种情况往往不可能实现，特别是在拥有深成岩浆的地方。但是必须考虑的是已经开始结晶的岩浆。假定岩浆具有花岗岩的成分，普通角闪石和奥长石已经从液体分离出来，并且假如围岩是主要由普通辉石和拉长石组成的辉长岩。那末，拉长石是在連續反应系中比奥长石结晶较早的矿物，而普通辉石则是在不連續反应系中比角闪石结晶较早的矿物。于是岩浆不能溶解拉长石或普通辉石，这是因为对它们来说，岩浆已经处于过饱和状态。代之而起的是一种复杂的反应作用，该作用可以使这些外来矿物转变为角闪石和奥长石，后二者在特殊时间内是与液体处于平衡状态的。另外再考虑镁橄榄石正在结晶的较热的岩浆，同时假定围岩也包含有在不連續反应系中结晶较晚的普通辉石晶体。在这些条件下，普通辉石实际上是会被岩浆溶解的；为了供给熔融作用所必需的潜热，于是等量的橄榄石便由液体中沉淀下来。至于发生哪一种同化作用，将取决于围岩的组成矿物，同时取决于邻近岩浆中正在结晶着的是哪些矿物。无论如何，岩浆是被混染了，并且岩浆最终形成的岩石是具有混染成因的。这些混染岩特别常见于大深成岩体边缘附近。例如有些闪长岩就是按着此种方式，由于花岗岩岩浆与辉长岩或石灰岩两相相互反应的结果而造成。

岩浆的混合作用

混染岩，特别是火山岩和浅处的侵入岩，也可以由部分结晶的岩浆经过混合作用而形成。推测的证据是：在单独的熔岩流中有成分极不相同的斜长石斑晶在一起密切共生，其中许多斑晶似乎与石基未保持平衡关系。科罗拉多州圣胡安火山区域中有许多实例，该地的玄武岩、安山岩、流纹岩等是从同一个裂口或相邻裂口内接连不断地剧烈喷溢出来的。另外在日本及加利福尼亚的火山岩中也记载有若干实例，该地的流纹岩与玄武岩密切共生，前者含有环带状斜长石斑晶，斑晶中心部分富含钙质，而玄武岩中环带状长石的中心部分却富含钠质。在日本箱根火山的某些

安山质熔岩中，斜长石斑晶和輝石斑晶都出現反环带构造，即斜长石的边缘比中心部分含有更多的鈣质；輝石的边缘比中心部分含有更多的镁质，而铁质含量则恰巧相反。这种异常的斑晶可能是由于围岩的同化作用进行得不完全而被混入熔岩中，但它们广泛而均匀地分布在许多熔岩流内，又很象是不同岩浆在喷出前相互混合的结果。在哥斯达黎加，某些熔接凝灰岩主要是由细小的玻璃颗粒组成，玻璃的折射率显然不同，表示在成分上有很宽的范围；此外如阿拉斯加的万烟谷的热的火山碎屑沉积，系由白色流纹浮岩和暗色安山岩层的混合物组成，它们是由于活泼的岩浆的沸腾作用所形成。这种密切的混合现象，推测是不均匀熔融体的同时喷发造成的。

岩浆的凝结阶段


岩浆最初形成的矿物通常是不含水的，因为它是在高温下从只含有少量挥发（超熔性或易熔的）组份的熔融体内发育而成。这样的矿物称为火成矿物。随着它们的形成，残余液体就富集了相当多的挥发成分，使后来形成的矿物乃是那些象閃石和云母之类含氢氧根的矿物，这些矿物称为液成矿物。

岩浆凝结的各个連續阶段之間并没有明显的划分界綫。对于这些阶段已經有許多命名，但究竟應該如何应用的問題还是有分歧的意見。一般說來，第一期——只形成火成矿物的时期——被引述为正岩浆期。有些作者把形成了含水量低的、含氢氧根的矿物的结晶时期也併入此期。随后大約至 $600^{\circ}-800^{\circ}\text{C}$ 时，岩浆即进入伟晶期，此期内大部分是液相（硅酸盐熔融体）、结晶相、气（水液）相等同时并存。再后，当温度大約至 $400^{\circ}-600^{\circ}\text{C}$ 时即进入气成期，晶体与气体之間达到平衡状态。最后为热液期，温度大約 $100^{\circ}-400^{\circ}\text{C}$ ，此时晶体、水溶液与水气之間都保持了平衡。

岩浆凝结到最后阶段时，富含挥发分的残余液体引起了广泛的蚀变作用，于是原先的矿物便被新的矿物所穿切或交代。这种蚀变作用称为后期作用或后期变质。它们包括有钠长石化作用、沸石化作用、綠泥石化作用等，并且那种石英与长石的互結連晶也发展成为显微伟晶岩。要把这些蚀变作用同交代蚀变作用区别开来，往往很困难或者是不可能的，后者乃是由于外来溶液进入已經凝固了的岩石所引起。

火成岩共生組合或岩类

如果在一个广大地区內包含有大致是同一个时代的火成岩，并且这些火成岩都是从同一个母岩浆轉变而来，那末該地区可称为岩区。在这样一个岩区内，所有岩石不管是侵入岩或者是噴出岩，它们在矿物成分和化学成分上都具有許多特性，根据这些特性就可以把它们同其它岩区的岩石区别开来。例如意大利羅馬和那不勒斯外围地区含钾显著的白榴石质熔岩形成一个岩区；同样，得克薩斯州外佩克斯的富



含钠质火山岩也形成一个岩区。

从化学家的观点上来看，依据钙质与碱质之间的比例可将火成岩系分为四类。如果把一个岩系内各种岩石的化学分析结果画在“成分变化图表”上，那末可以看出：当二氧化硅百分数大于61时， $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 的重量百分数等于 CaO 的重量百分数，此系称为钙性岩系；如果 $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 与 CaO 的等量关系存在，而二氧化硅百分数介于56与61之间，则此系称为钙碱性岩系；如果介于51与56之间，即为碱钙性岩系；小于51时则称为碱性岩系。根据这个图表，绝大多数玄武岩—粗面岩—响岩等共生组合构成碱性岩系，而绝大部分的玄武岩—安山岩—英安岩—流纹岩等共生组合则

构成鈣性岩系或鈣硷性岩系。

很早以前即已确定了，这些岩系虽然不局限在某些地区或构造环境中分布，然而却是这些地区或构造环境的特征。鈣性岩系和鈣硷性岩系通常見于造山带中，其它各系則特別聚集在海洋地区和相当稳定的大陆地区，該大陆地区主要的变形作用是由于断层所造成。鈣性岩系和鈣硷性岩系主要分布在环繞太平洋的褶皺山脉帶內，所以把它們归入太平洋类型。硷性岩系通常多見于大西洋及其两岸地区，因此可归入大西洋类型。但这样来选择名称是不妥当的，因为在太平洋中部的火山島上也广泛地分布着大西洋类型的岩石。按照鉀或鈉中某一个占居优势，可将硷性岩系再进一步划分。对于富含鈉的岩群來說可以保留所謂“大西洋的”这个名称，該岩群的特点是粗面岩和响岩与玄武岩共生；对于富含鉀的岩群則可引用地中海类型这个名称。后者系属于罗馬岩区、維苏威和斯特朗博利熔岩的范畴，最显著的特点是出現大量鉀长石或白榴石，或者两种俱备。詳細的研究对于三种岩浆类型是不同构造环境的特点这一概念，已經置以很大的怀疑，因为两种或甚至所有三种类型都可以在同一个地区中发育着。虽然如此，为了对比火成岩群，这些名称还是值得保留的。

本书的目的主要是研究岩类学，而不是岩理学，因此足可以結束这一章，至于岩浆演化的試驗要略将在特訥和魏胡根所著的“火成岩及变质岩 岩理学”一书中（11頁）进一步申述。

第二章 火成岩的結構及分类

結構

要想明确地区別构造和結構这两个名詞是困难的。一般說來，构造系指在野外大范围内能够辨認出来的特点而言，例如层带、綫理、节理、多孔性等。另一方面，結構則指結晶程度、颗粒大小或粒度、岩石中矿物成分之間的組构关系或几何形象关系而言。这些結構特点很可以阐明火成岩从母岩浆内凝結的条件，因为結構特点是受結晶速度和結晶次序的控制，而結晶速度和結晶次序又取决于岩浆的最初溫度、成分、气体含量以及粘性等，同时还取决于岩浆凝固时所处的压力环境。

首先考慮結晶程度。某些火成岩，例如花崗岩，全部由結晶质組成，因此归入全晶质类；其它火成岩，例如黑曜岩，完全由玻璃組成，則属于全玻璃质；另外一些火成岩，包括許多熔岩和浅处的侵入岩，它們既含玻璃质又含結晶质，則称为半晶质。如果象图1所示的非常細小的初期結晶，同时它們都具有双折射性质，那末可称为微晶；如果晶体更小，呈球状、棒状和毛发状，则称为雛晶。